

図54.2010年と比べた喫煙状況の変化(喫煙者のみN=478)




図55.禁煙者435人における禁煙理由(複数回答)




図56.飲酒量を減らさなければならぬと感じたことがあるかの状況




図57.他の人に自分の飲酒について批判され困ったことがあるかの状況




図58.自分の飲酒について良くないとか申し訳ないと感じたことがあるかの状況




図59.神経を落ち着かせたり二日酔いを治すため迎え酒をしたことがあるかの状況




図60.今の缶ビール350mlの値段の認識状況




図61.男性飲酒者781人におけるアルコールの価格上昇と行動




図62.女性飲酒者853人におけるアルコールの価格上昇と行動




図63.飲酒者1634人における禁酒する缶ビール350mlの値段の状況




図64.飲酒者1634人における禁酒する可能性のある理由(複数回答)

表1.AUDITスコア別基本属性(統計的有意差が認められた項目)

AUDIT スコア		0-7	8-15	16-19	20-40	p ^a
		(N=1299)	(N=223)	(N=27)	(N=26)	
女性		827 (63.7)	46 (20.6)	5 (18.5)	4 (15.4)	<0.01
職業	農林水産業	19 (1.4)	7 (3.1)	2 (7.4)	0 (0.0)	<0.01
	建設建築業	47 (3.4)	22 (9.9)	4 (14.8)	3 (11.5)	
	運輸保安業	31 (2.2)	13 (5.8)	1 (3.7)	1 (3.8)	
	製造業	143 (10.2)	25 (11.2)	1 (3.7)	5 (19.2)	
	販売・サービス業	258 (18.4)	67 (30.0)	8 (29.6)	5 (19.2)	
	事務職	179 (12.8)	21 (9.4)	2 (7.4)	4 (15.4)	
	主婦	293 (20.9)	10 (4.5)	1 (3.7)	1 (3.8)	
	学生	30 (2.1)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	無職	122 (8.7)	27 (12.1)	5 (18.5)	3 (11.5)	
	その他	161 (11.5)	25 (11.2)	3 (11.1)	4 (15.4)	
	無記入	16 (1.1)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	
初めて飲酒した年齢	7才以下	11 (0.8)	5 (2.2)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
	8-9才	6 (0.4)	3 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	10-11才	20 (1.4)	7 (3.1)	0 (0.0)	1 (3.8)	
	12-13才	18 (1.3)	6 (2.7)	1 (3.7)	4 (15.4)	
	14-15才	41 (2.9)	20 (9.0)	3 (11.1)	1 (3.8)	
	16-17才	147 (10.5)	40 (17.9)	10 (37.0)	6 (23.1)	
	18-19才	481 (34.3)	82 (36.8)	7 (25.9)	9 (34.6)	
	20才以上	508 (36.2)	46 (20.6)	3 (11.1)	4 (15.4)	
	忘れた	61 (4.4)	13 (5.8)	2 (7.4)	0 (0.0)	
	無記入	5 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (3.8)	

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表2.AUDITスコア別飲酒の状況(統計的有意差が認められた項目)

AUDIT スコア		0-7	8-15	16-19	20-40	p ^a
		(N=1299)	(N=223)	(N=27)	(N=26)	
習慣的飲酒の状況	毎日飲酒	139 (9.9)	115 (51.6)	16 (59.3)	20 (76.9)	<0.01
	毎日ではないが習慣的飲酒	197 (14.1)	66 (29.6)	9 (33.3)	4 (15.4)	
	機会飲酒	784 (55.9)	39 (17.5)	2 (7.4)	0 (0.0)	
	やめた	25 (1.8)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (3.8)	
	もともと飲まない	141 (10.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	当該なし	13 (0.9)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (3.8)	
過去1年間の平均飲酒頻度	毎日	124 (8.8)	98 (43.9)	11 (40.7)	18 (69.2)	<0.01
	週5-6日	56 (4.0)	39 (17.5)	10 (37.0)	3 (11.5)	
	週3-4日	114 (8.1)	35 (15.7)	4 (14.8)	4 (15.4)	
	週1-2日	172 (12.3)	30 (13.5)	2 (7.4)	1 (3.8)	
	月2-3日	185 (13.2)	15 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	月1日	103 (7.3)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	年6-11日	152 (10.8)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	年1-5日	317 (22.6)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	飲酒していない	76 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
1年前と比べ飲酒状況の変化	回数も量も増えた	47 (3.4)	13 (5.8)	1 (3.7)	6 (23.1)	<0.01
	回数は変わらないが量増えた	25 (1.8)	16 (7.2)	5 (18.5)	5 (19.2)	
	回数は減ったが量増えた	9 (0.6)	9 (4.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	
	回数は増えたが量減った	27 (1.9)	8 (3.6)	0 (0.0)	3 (11.5)	
	回数変わらず量減った	141 (10.1)	70 (31.4)	9 (33.3)	3 (11.5)	
	回数も量も減った	331 (23.6)	28 (12.6)	2 (7.4)	0 (0.0)	
	もともと飲まない	99 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	やめた	25 (1.8)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (3.8)	
	変らない	593 (42.3)	76 (34.1)	9 (33.3)	8 (30.8)	
	当該なし	2 (0.1)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	
アルコール入手先(複数選択)	ディスカウント酒店	419 (29.9)	126 (56.5)	19 (70.4)	17 (65.4)	<0.01
	コンビニエンスストア	197 (14.1)	58 (26.0)	6 (22.2)	9 (34.6)	
	従来の酒店	61 (4.4)	23 (10.3)	3 (11.1)	4 (15.4)	
	その他	46 (3.3)	3 (1.3)	1 (3.7)	3 (11.5)	

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表3.AUDITスコア別飲酒時のトラブル(統計的有意差が認められた項目)

AUDIT スコア		0-7	8-15	16-19	20-40	p ^a
		(N=1299)	(N=223)	(N=27)	(N=26)	
あなたが飲酒 したことによって 誰かがケガを した経験	ない あるが過去1年間はない 過去1年間にある	1277 (91.1) 21 (1.5) 1 (0.1)	200 (89.7) 20 (9.0) 3 (1.3)	15 (55.6) 7 (25.9) 5 (18.5)	15 (57.7) 8 (30.8) 3 (11.5)	<0.01
アルコール依存 症の診断や治療 を受けた経験	過去1年間にある 1年以上前にある 過去1年間も1年以上前も両方 ない わからない	9 (0.6) 1 (0.1) 0 (0.0) 1287 (91.8) 2 (0.1)	0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4) 221 (99.1) 0 (0.0)	0 (0.0) 1 (3.7) 0 (0.0) 26 (96.3) 0 (0.0)	2 (7.7) 0 (0.0) 1 (3.8) 23 (88.5) 0 (0.0)	<0.01
飲酒による被害(複数回答)						
<加害者>		<加害内容>				
職場	職場	120 (8.6)	21 (9.4)	10 (37.0)	4 (15.4)	<0.01
知らない人	職場	92 (6.6)	24 (10.8)	7 (25.9)	2 (7.7)	<0.01
父	父	80 (5.7)	15 (6.7)	6 (22.2)	5 (19.2)	<0.01
友人知人	父	55 (3.9)	12 (5.4)	6 (22.2)	3 (11.5)	<0.01
職場	友人知人	36 (2.6)	6 (2.7)	5 (18.5)	3 (11.5)	<0.01
父	友人知人	35 (2.5)	9 (4.0)	3 (11.1)	3 (11.5)	<0.01
近隣住民	近隣住民	35 (2.5)	3 (1.3)	4 (14.8)	2 (7.7)	<0.01
親戚	親戚	32 (2.3)	2 (0.9)	4 (14.8)	0 (0.0)	<0.01
仕事相手	仕事相手	28 (2.0)	10 (4.5)	1 (3.7)	3 (11.5)	<0.01
近隣住民	近隣住民	28 (2.0)	3 (1.3)	3 (11.1)	0 (0.0)	0.01
友人知人	友人知人	25 (1.8)	1 (0.4)	1 (3.7)	2 (7.7)	0.05
友人知人	友人知人	17 (1.2)	10 (4.5)	5 (18.5)	2 (7.7)	<0.01
兄弟	兄弟	16 (1.1)	4 (1.8)	3 (11.1)	1 (3.8)	<0.01
祖父	祖父	15 (1.1)	5 (2.2)	0 (0.0)	2 (7.7)	0.02
職場	職場	14 (1.0)	3 (1.3)	2 (7.4)	0 (0.0)	0.03
家族その他	家族その他	14 (1.0)	2 (0.9)	2 (7.4)	0 (0.0)	0.02
職場	職場	11 (0.8)	4 (1.8)	2 (7.4)	1 (3.8)	<0.01
父	父	10 (0.7)	4 (1.8)	0 (0.0)	2 (7.7)	<0.01
父	父	9 (0.6)	2 (0.9)	0 (0.0)	2 (7.7)	<0.01
職場	職場	8 (0.6)	3 (1.3)	2 (7.4)	0 (0.0)	<0.01
友人知人	友人知人	8 (0.6)	2 (0.9)	1 (3.7)	3 (11.5)	<0.01
家族その他	家族その他	7 (0.5)	4 (1.8)	2 (7.4)	0 (0.0)	<0.01
友人知人	友人知人	7 (0.5)	4 (1.8)	2 (7.4)	0 (0.0)	<0.01
知らない人	知らない人	7 (0.5)	1 (0.4)	2 (7.4)	0 (0.0)	<0.01
友人知人	友人知人	6 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	2 (7.7)	<0.01
母	母	5 (0.4)	0 (0.0)	2 (7.4)	0 (0.0)	<0.01
祖父	祖父	4 (0.3)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (3.8)	0.04
祖父	祖父	4 (0.3)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (3.8)	0.04
母	母	4 (0.3)	2 (0.9)	1 (3.7)	0 (0.0)	0.04
兄弟	兄弟	4 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.8)	0.01
親戚	親戚	4 (0.3)	0 (0.0)	2 (7.4)	0 (0.0)	<0.01
家族その他	家族その他	4 (0.3)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	0.01
近隣住民	近隣住民	4 (0.3)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	0.01
友人知人	友人知人	3 (0.2)	1 (0.4)	3 (11.1)	2 (7.7)	<0.01
知らない人	知らない人	3 (0.2)	1 (0.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	0.02
近隣住民	近隣住民	2 (0.1)	3 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0.03
親戚	親戚	2 (0.1)	1 (0.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
職場	職場	2 (0.1)	1 (0.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
知らない人	知らない人	2 (0.1)	1 (0.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
子	子	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
親戚	親戚	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
親戚	親戚	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
子	子	1 (0.1)	1 (0.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
親戚	親戚	1 (0.1)	1 (0.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
近隣住民	近隣住民	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
仕事相手	仕事相手	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (3.7)	1 (3.8)	<0.01
祖父	祖父	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.8)	<0.01
祖母	祖母	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.8)	<0.01
仕事相手	仕事相手	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.8)	<0.01
子	子	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
知らない人	知らない人	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.7)	0 (0.0)	<0.01
<人生に影響を与えたか>						
飲酒による 困った経験は 人生に影響を 与えたか	影響を与えなかった 少し影響を与えた かなり影響を与えた 重大な影響を与えた 無回答	207 (14.8) 232 (16.5) 98 (7.0) 32 (2.3) 730 (52.1)	35 (15.7) 51 (22.9) 20 (9.0) 3 (1.3) 114 (51.1)	3 (11.1) 12 (44.4) 8 (29.6) 0 (0.0) 4 (14.8)	1 (3.8) 6 (23.1) 3 (11.5) 3 (11.5) 13 (50.0)	<0.01

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表4.AUDITスコア別睡眠・精神状況(統計的有意差が認められた項目)

AUDIT スコア		0-7	8-15	16-19	20-40	p ^a
		(N=1299)	(N=223)	(N=27)	(N=26)	
調査前30日間の中途覚醒	全くなかった	386 (27.5)	50 (22.4)	6 (22.2)	4 (15.4)	<0.01
	めったになかった	341 (24.3)	62 (27.8)	3 (11.1)	1 (3.8)	
	時々あった	427 (30.5)	86 (38.6)	13 (48.1)	16 (61.5)	
	しばしばあった	80 (5.7)	16 (7.2)	3 (11.1)	1 (3.8)	
	常にあった	60 (4.3)	9 (4.0)	2 (7.4)	4 (15.4)	
	無回答	5 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間の早朝覚醒	全くなかった	447 (31.9)	56 (25.1)	5 (18.5)	3 (11.5)	<0.01
	めったになかった	320 (22.8)	47 (21.1)	6 (22.2)	2 (7.7)	
	時々あった	390 (27.8)	87 (39.0)	11 (40.7)	12 (46.2)	
	しばしばあった	73 (5.2)	17 (7.6)	4 (14.8)	3 (11.5)	
	常にあった	62 (4.4)	16 (7.2)	1 (3.7)	6 (23.1)	
	無回答	7 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間の不眠による屋間の不調	全くなかった	754 (53.8)	135 (60.5)	9 (33.3)	10 (38.5)	0.01
	めったになかった	213 (15.2)	44 (19.7)	10 (37.0)	2 (7.7)	
	時々あった	281 (20.0)	38 (17.0)	5 (18.5)	11 (42.3)	
	しばしばあった	33 (2.4)	5 (2.2)	2 (7.4)	2 (7.7)	
	常にあった	16 (1.1)	1 (0.4)	1 (3.7)	1 (3.8)	
	無回答	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間の主観的睡眠観	非常によい	217 (15.5)	37 (16.6)	4 (14.8)	2 (7.7)	0.01
	かなりよい	811 (57.8)	144 (64.6)	14 (51.9)	11 (42.3)	
	かなり悪い	239 (17.0)	38 (17.0)	7 (25.9)	12 (46.2)	
	非常に悪い	19 (1.4)	1 (0.4)	2 (7.4)	1 (3.8)	
	無回答	13 (0.9)	3 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間のいつもより集中できたか	できた	239 (17.0)	47 (21.1)	5 (18.5)	3 (11.5)	<0.01
	いつもと変らなかった	954 (68.0)	153 (68.6)	20 (74.1)	15 (57.7)	
	いつもよりできなかった	98 (7.0)	22 (9.9)	2 (7.4)	5 (19.2)	
	全くできなかった	6 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	3 (11.5)	
	無回答	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間に生きがいを感じるがあったか	あった	186 (13.3)	46 (20.6)	5 (18.5)	7 (26.9)	0.01
	いつもと変らなかった	900 (64.2)	150 (67.3)	14 (51.9)	13 (50.0)	
	いつもよりなかった	175 (12.5)	19 (8.5)	5 (18.5)	3 (11.5)	
	全くなかった	37 (2.6)	8 (3.6)	3 (11.1)	3 (11.5)	
	無回答	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間に簡単に物事を決めることができたか	できた	160 (11.4)	29 (13.0)	2 (7.4)	2 (7.7)	<0.01
	いつもと変らなかった	1063 (75.8)	176 (78.9)	23 (85.2)	17 (65.4)	
	いつもよりできなかった	67 (4.8)	17 (7.6)	2 (7.4)	4 (15.4)	
	全くできなかった	5 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	3 (11.5)	
	無回答	4 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間のいつもより問題を解決できなかったことがあったか	全くなかった	369 (26.3)	72 (32.3)	8 (29.6)	7 (26.9)	0.03
	あまりなかった	687 (49.0)	108 (48.4)	6 (22.2)	13 (50.0)	
	あった	195 (13.9)	30 (13.5)	10 (37.0)	4 (15.4)	
	たびたびあった	46 (3.3)	13 (5.8)	3 (11.1)	2 (7.7)	
	無回答	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間のいつもより日常生活を楽しく送ることができたか	できた	190 (13.6)	55 (24.7)	2 (7.4)	4 (15.4)	<0.01
	いつもと変らなかった	944 (67.3)	145 (65.0)	19 (70.4)	17 (65.4)	
	いつもよりできなかった	140 (10.0)	21 (9.4)	3 (11.1)	4 (15.4)	
	全くできなかった	24 (1.7)	2 (0.9)	3 (11.1)	1 (3.8)	
	無回答	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間のいつもより問題を積極的に解決することができたか	できた	216 (15.4)	48 (21.5)	6 (22.2)	3 (11.5)	<0.01
	いつもと変らなかった	971 (69.3)	156 (70.0)	19 (70.4)	17 (65.4)	
	いつもよりできなかった	92 (6.6)	17 (7.6)	2 (7.4)	3 (11.5)	
	全くできなかった	16 (1.1)	2 (0.9)	0 (0.0)	3 (11.5)	
	無回答	4 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間のいつもより気が重くて落ち込むことがあったか	全くなかった	329 (23.5)	70 (31.4)	8 (29.6)	2 (7.7)	0.05
	あまりなかった	581 (41.4)	100 (44.8)	5 (18.5)	14 (53.8)	
	あった	303 (21.6)	38 (17.0)	10 (37.0)	7 (26.9)	
	たびたびあった	83 (5.9)	15 (6.7)	4 (14.8)	3 (11.5)	
	無回答	3 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間の自信を失ったことがあったか	全くなかった	383 (27.3)	81 (36.3)	7 (25.9)	5 (19.2)	0.05
	あまりなかった	588 (41.9)	96 (43.0)	10 (37.0)	12 (46.2)	
	あった	280 (20.0)	37 (16.6)	6 (22.2)	6 (23.1)	
	たびたびあった	44 (3.1)	9 (4.0)	4 (14.8)	3 (11.5)	
	無回答	4 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
調査前30日間の自分が役に立たない人間だと考えたか	全くなかった	545 (38.9)	110 (49.3)	9 (33.3)	7 (26.9)	<0.01
	あまりなかった	515 (36.7)	81 (36.3)	9 (33.3)	11 (42.3)	
	あった	183 (13.1)	22 (9.9)	5 (18.5)	3 (11.5)	
	たびたびあった	52 (3.7)	9 (4.0)	4 (14.8)	5 (19.2)	
	無回答	4 (0.3)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表5.AUDITスコア別喫煙状況(統計的有意差が認められた項目)

AUDIT スコア		0-7	8-15	16-19	20-40	p ^a
		(N=1299)	(N=223)	(N=27)	(N=26)	
喫煙状況	習慣的喫煙	235 (16.8)	87 (39.0)	15 (55.6)	9 (34.6)	<0.01
	習慣的ではないが喫煙	28 (2.0)	6 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	やめた	270 (19.3)	69 (30.9)	8 (29.6)	13 (50.0)	
	もともと吸わない	756 (53.9)	56 (25.1)	3 (11.1)	1 (3.8)	
	無回答	10 (0.7)	5 (2.2)	1 (3.7)	3 (11.5)	
起床後喫煙 までの時間	5分以内	69 (4.9)	30 (13.5)	3 (11.1)	6 (23.1)	<0.01
	6-30分	74 (5.3)	26 (11.7)	9 (33.3)	3 (11.5)	
	31-60分	71 (5.1)	25 (11.2)	3 (11.1)	2 (7.7)	
	1時間以上	44 (3.1)	14 (6.3)	1 (3.7)	0 (0.0)	
	わからない	11 (0.8)	5 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	当該なし	1030 (73.5)	123 (55.2)	11 (40.7)	15 (57.7)	
1年前と 比べ喫煙 状況の変化	禁煙した	16 (1.1)	9 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	<0.01
	本数を減らした	66 (4.7)	20 (9.0)	5 (18.5)	0 (0.0)	
	値段の安い銘柄に変えた	10 (0.7)	5 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	安い銘柄に変え本数減らした	3 (0.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	今までどおり	170 (12.1)	62 (27.8)	10 (37.0)	11 (42.3)	
	その他	8 (0.6)	2 (0.9)	1 (3.7)	0 (0.0)	
当該なし	1026 (73.2)	124 (55.6)	11 (40.7)	15 (57.7)		

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表6.AUDITスコア別アルコール価格に関する項目(統計的有意差が認められた項目)

AUDIT スコア		0-7	8-15	16-19	20-40	p ^a
		(N=1299)	(N=223)	(N=27)	(N=26)	
今の缶ビール 350mlの値段の 感じ方	高い	396 (28.2)	94 (42.2)	13 (48.1)	12 (46.2)	<0.01
	ちょうどよい	456 (32.5)	92 (41.3)	12 (44.4)	11 (42.3)	
	安い	41 (2.9)	7 (3.1)	1 (3.7)	1 (3.8)	
	わからない	397 (28.3)	29 (13.0)	1 (3.7)	2 (7.7)	
	無回答	9 (0.6)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	
アルコールの 値段が1.5倍 になった時の 行動	同じ商品で同じ量を飲む	129 (9.2)	42 (18.8)	5 (18.5)	6 (23.1)	<0.01
	安いものに変え量は同じ	188 (13.4)	78 (35.0)	11 (40.7)	11 (42.3)	
	同じ商品のまま量を減らす	181 (12.9)	43 (19.3)	6 (22.2)	3 (11.5)	
	安いものに変え量も減らす	174 (12.4)	42 (18.8)	3 (11.1)	4 (15.4)	
	酒をやめる	68 (4.9)	3 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	わからない	198 (14.1)	12 (5.4)	2 (7.4)	1 (3.8)	
当該なし	361 (25.7)	3 (1.3)	0 (0.0)	1 (3.8)		
アルコールの 値段が2倍 になった時の 行動	同じ商品で同じ量を飲む	62 (4.4)	27 (12.1)	0 (0.0)	2 (7.7)	<0.01
	安いものに変え量は同じ	148 (10.6)	66 (29.6)	11 (40.7)	11 (42.3)	
	同じ商品のまま量を減らす	138 (9.8)	36 (16.1)	6 (22.2)	2 (7.7)	
	安いものに変え量も減らす	250 (17.8)	69 (30.9)	6 (22.2)	7 (26.9)	
	酒をやめる	140 (10.0)	10 (4.5)	2 (7.4)	1 (3.8)	
	わからない	208 (14.8)	14 (6.3)	2 (7.4)	2 (7.7)	
当該なし	353 (25.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (3.8)		
アルコールの 値段が3倍 になった時の 行動	同じ商品で同じ量を飲む	34 (2.4)	21 (9.4)	0 (0.0)	2 (7.7)	<0.01
	安いものに変え量は同じ	112 (8.0)	40 (17.9)	8 (29.6)	10 (38.5)	
	同じ商品のまま量を減らす	74 (5.3)	24 (10.8)	3 (11.1)	2 (7.7)	
	安いものに変え量も減らす	226 (16.1)	87 (39.0)	12 (44.4)	8 (30.8)	
	酒をやめる	268 (19.1)	25 (11.2)	3 (11.1)	1 (3.8)	
	わからない	232 (16.5)	24 (10.8)	1 (3.7)	2 (7.7)	
当該なし	353 (25.2)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (3.8)		
禁酒するビール 350mlの値段	100円	10 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	<0.01
	200円	18 (1.3)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	300円	84 (6.0)	12 (5.4)	0 (0.0)	1 (3.8)	
	400円	56 (4.0)	5 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	500円	191 (13.6)	37 (16.6)	5 (18.5)	5 (19.2)	
	600円	49 (3.5)	11 (4.9)	3 (11.1)	0 (0.0)	
	800円	74 (5.3)	17 (7.6)	3 (11.1)	2 (7.7)	
	1000円	110 (7.8)	33 (14.8)	4 (14.8)	3 (11.5)	
	1500円以上	18 (1.3)	5 (2.2)	0 (0.0)	3 (11.5)	
	わからない	257 (18.3)	55 (24.7)	5 (18.5)	5 (19.2)	
	やめない	67 (4.8)	43 (19.3)	7 (25.9)	6 (23.1)	
	当該なし	365 (26.0)	3 (1.3)	0 (0.0)	1 (3.8)	
	禁酒する可能 性のある理由 (複数回答)	病気にかかる	734 (52.4)	171 (76.7)	19 (70.4)	
医師などから禁酒指導		413 (29.5)	122 (54.7)	18 (66.7)	11 (42.3)	<0.01
やめない		65 (4.6)	24 (10.8)	4 (14.8)	5 (19.2)	<0.01

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表7.CAGEスコア別基本属性(統計的有意差が認められた項目)

CAGE スコア		0-1 (N=1402)	2-4 (N=173)	p ^a
女性		823 (58.7)	59 (34.1)	<0.01
職業	農林水産業	22 (1.6)	6 (3.5)	<0.01
	建設建築業	64 (4.6)	12 (6.9)	
	運輸保安業	38 (2.7)	8 (4.6)	
	製造業	157 (11.2)	17 (9.8)	
	販売・サービス業	291 (20.8)	47 (27.2)	
	事務職	186 (13.3)	20 (11.6)	
	主婦	291 (20.8)	14 (8.1)	
	学生	32 (2.3)	2 (1.2)	
	無職	137 (9.8)	20 (11.6)	
	その他	168 (12.0)	25 (14.5)	
	無記入	16 (1.1)	2 (1.2)	
初めて 飲酒した 年齢	7才以下	13 (0.9)	4 (2.3)	<0.01
	8-9才	7 (0.5)	2 (1.2)	
	10-11才	22 (1.6)	6 (3.5)	
	12-13才	21 (1.5)	8 (4.6)	
	14-15才	56 (4.0)	9 (5.2)	
	16-17才	176 (12.6)	27 (15.6)	
	18-19才	510 (36.4)	69 (39.9)	
	20才以上	526 (37.5)	35 (20.2)	
	忘れた	66 (4.7)	10 (5.8)	
	無記入	5 (0.4)	3 (1.7)	

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表8.CAGEスコア別飲酒の状況(統計的有意差が認められた項目)

CAGE スコア		0-1 (N=1402)	2-4 (N=173)	p ^a
習慣的 飲酒の 状況	毎日飲酒	221 (15.8)	69 (39.9)	<0.01
	毎日ではないが習慣的飲酒	219 (15.6)	57 (32.9)	
	機会飲酒	791 (56.4)	34 (19.7)	
	やめた	21 (1.5)	7 (4.0)	
	もともと飲まない	138 (9.8)	3 (1.7)	
	当該なし	12 (0.9)	3 (1.7)	
過去1年間 の平均 飲酒頻度	毎日	195 (13.9)	56 (32.4)	<0.01
	週5-6日	76 (5.4)	32 (18.5)	
	週3-4日	119 (8.5)	38 (22.0)	
	週1-2日	186 (13.3)	19 (11.0)	
	月2-3日	194 (13.8)	6 (3.5)	
	月1日	101 (7.2)	6 (3.5)	
	年6-11日	149 (10.6)	4 (2.3)	
	年1-5日	310 (22.1)	8 (4.6)	
	飲酒していない	72 (5.1)	4 (2.3)	
1年前と 比べ飲酒 状況の変化	回数も量も増えた	53 (3.8)	14 (8.1)	<0.01
	回数は変わらないが量増えた	36 (2.6)	15 (8.7)	
	回数は減ったが量増えた	16 (1.1)	3 (1.7)	
	回数は増えたが量減った	32 (2.3)	6 (3.5)	
	回数変わらず量減った	184 (13.1)	39 (22.5)	
	回数も量も減った	330 (23.5)	31 (17.9)	
	もともと飲まない	98 (7.0)	1 (0.6)	
	やめた	22 (1.6)	6 (3.5)	
	変らない	629 (44.9)	57 (32.9)	
	当該なし	2 (0.1)	1 (0.6)	
アルコール 入手先 (複数選択)	ディスカウント酒店	476 (34.0)	105 (60.7)	<0.01
	スーパーマーケット	605 (43.2)	93 (53.8)	<0.01
	コンビニエンスストア	212 (15.1)	58 (33.5)	<0.01
	従来の酒店	75 (5.3)	16 (9.2)	<0.01
	自動販売機	7 (0.5)	2 (1.2)	<0.01

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表9.CAGEスコア別飲酒時のトラブル(統計的有意差が認められた項目)

CAGE スコア		0-1 (N=1402)	2-4 (N=173)	p ^a
あなたが飲酒 したことによって 誰かがケガを した経験	ない あるが過去1年間はない 過去1年間にある	98 (7.0) 99 (7.1) 100 (7.1)	27 (15.6) 28 (16.2) 29 (16.8)	<0.01
アルコール依存 症の診断や治療 を受けた経験	過去1年間にある 1年以上前にある 過去1年間も1年以上前も両 ない わからない	10 (0.7) 2 (0.1) 1 (0.1) 1388 (99.0) 1 (0.1)	1 (0.6) 1 (0.6) 1 (0.6) 169 (97.7) 1 (0.6)	0.02
飲酒による被害(複数回答)				
<加害者>		<加害内容>		
知らない人	からまれた	98 (7.0)	27 (15.6)	<0.01
父	暴力・暴言	88 (6.3)	18 (10.4)	<0.01
友人知人	からまれた	60 (4.3)	16 (9.2)	<0.01
父	他人に対し恥をかいた	35 (2.5)	15 (8.7)	<0.01
その他の親戚	からまれた	53 (3.8)	15 (8.7)	<0.01
仕事相手	からまれた	31 (2.2)	11 (6.4)	<0.01
職場	暴言・暴力	39 (2.8)	11 (6.4)	0.01
友人知人	無理に飲まされた	21 (1.5)	8 (4.6)	<0.01
父	失禁など身体のお世話	25 (1.8)	7 (4.0)	0.04
職場	その他	14 (1.0)	6 (3.5)	<0.01
職場	他人に対し恥をかいた	18 (1.3)	6 (3.5)	0.03
家族その他	からまれた	8 (0.6)	5 (2.9)	<0.01
職場	交通事故・飲酒運転	8 (0.6)	5 (2.9)	<0.01
友人知人	セクシャルハラスメント	14 (1.0)	5 (2.9)	0.03
仕事相手	暴力・暴言	4 (0.3)	4 (2.3)	<0.01
友人知人	店や警察からの注意や連絡	9 (0.6)	4 (2.3)	0.02
仕事相手	無理に飲まされた	11 (0.8)	4 (2.3)	0.05
友人知人	金銭トラブル	6 (0.4)	3 (1.7)	0.03
近隣住民	セクシャルハラスメント	2 (0.1)	2 (1.2)	0.01
兄弟	店や警察からの注意や連絡	3 (0.2)	2 (1.2)	0.04
知らない人	交通事故・飲酒運転	3 (0.2)	2 (1.2)	0.04
その他の人	からまれた	3 (0.2)	2 (1.2)	0.04
祖父	無理に飲まされた	0 (0.0)	1 (0.6)	<0.01
子供	からまれた	0 (0.0)	1 (0.6)	<0.01
<人生に影響を与えたか>				
飲酒による 困った経験は 人生に影響を 与えたか	影響を与えなかった 少し影響を与えた かなり影響を与えた 重大な影響を与えた 無回答	217 (15.5) 256 (18.3) 101 (7.2) 30 (2.1) 798 (56.9)	29 (16.8) 45 (26.0) 28 (16.2) 8 (4.6) 63 (36.4)	<0.01

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表10.CAGEスコア別睡眠・精神状況(統計的有意差が認められた項目)

CAGE スコア		0-1	2-4	p ^a
		(N=1402)	(N=173)	
調査前30日間 の中途覚醒	全くなかった	399 (28.5)	42 (24.3)	0.05
	めったになかった	376 (26.8)	37 (21.4)	
	時々あった	472 (33.7)	69 (39.9)	
	しばしばあった	90 (6.4)	12 (6.9)	
	常にあった	60 (4.3)	13 (7.5)	
	無回答	5 (0.4)	0 (0.0)	
調査前30日間 の不眠による 昼間の不調	全くなかった	834 (59.5)	74 (42.8)	<0.01
	めったになかった	231 (16.5)	38 (22.0)	
	時々あった	287 (20.5)	48 (27.7)	
	しばしばあった	35 (2.5)	7 (4.0)	
	常にあった	13 (0.9)	6 (3.5)	
	無回答	2 (0.1)	0 (0.0)	
調査前30日間 の主観的 睡眠観	非常によい	238 (17.0)	22 (12.7)	<0.01
	かなりよい	883 (63.0)	97 (56.1)	
	かなり悪い	248 (17.7)	48 (27.7)	
	非常に悪い	18 (1.3)	5 (2.9)	
	無回答	15 (1.1)	1 (0.6)	
調査前30日間 のいつもより 集中できたか	できた	261 (18.6)	33 (19.1)	<0.01
	いつもと変らなかった	1031 (73.5)	111 (64.2)	
	いつもよりできなかった	102 (7.3)	25 (14.5)	
	全くできなかった	6 (0.4)	4 (2.3)	
	無回答	2 (0.1)	0 (0.0)	
調査前30日間 の心配事が あってよく 眠れなかった ことがあったか	全くなかった	478 (34.1)	44 (25.4)	<0.01
	あまりなかった	635 (45.3)	68 (39.3)	
	あった	237 (16.9)	49 (28.3)	
	たびたびあった	50 (3.6)	11 (6.4)	
	無回答	2 (0.1)	1 (0.6)	
調査前30日間 に生きがいを 感じる事が あったか	あった	209 (14.9)	35 (20.2)	<0.01
	いつもと変らなかった	976 (69.6)	101 (58.4)	
	いつもよりなかった	177 (12.6)	25 (14.5)	
	全くなかった	39 (2.8)	12 (6.9)	
	無回答	1 (0.1)	0 (0.0)	
調査前30日間 に簡単に物事 を決めることが できたか	できた	173 (12.3)	20 (11.6)	<0.01
	いつもと変らなかった	1150 (82.0)	129 (74.6)	
	いつもよりできなかった	71 (5.1)	19 (11.0)	
	全くできなかった	5 (0.4)	4 (2.3)	
	無回答	3 (0.2)	1 (0.6)	
調査前30日間 いつもより 問題を解決でき なくて困った ことがあったか	全くなかった	413 (29.5)	43 (24.9)	0.01
	あまりなかった	734 (52.4)	80 (46.2)	
	あった	202 (14.4)	37 (21.4)	
	たびたびあった	51 (3.6)	13 (7.5)	
	無回答	2 (0.1)	1 (0.6)	
調査前30日間 いつもより 日常生活を 楽しく送る ことができたか	できた	222 (15.8)	29 (16.8)	<0.01
	いつもと変らなかった	1015 (72.4)	110 (63.6)	
	いつもよりできなかった	144 (10.3)	24 (13.9)	
	全くできなかった	20 (1.4)	10 (5.8)	
	無回答	1 (0.1)	0 (0.0)	
調査前30日間 自信を失った ことがあったか	全くなかった	438 (31.2)	38 (22.0)	<0.01
	あまりなかった	636 (45.4)	70 (40.5)	
	あった	280 (20.0)	49 (28.3)	
	たびたびあった	45 (3.2)	15 (8.7)	
	無回答	3 (0.2)	1 (0.6)	
調査前30日間 自分が役に 立たない人間 だと考えたか	全くなかった	616 (43.9)	55 (31.8)	<0.01
	あまりなかった	551 (39.3)	65 (37.6)	
	あった	176 (12.6)	37 (21.4)	
	たびたびあった	56 (4.0)	14 (8.1)	
	無回答	3 (0.2)	2 (1.2)	

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表11.CAGEスコア別喫煙状況(統計的有意差が認められた項目)

CAGE スコア		0-1 (N=1402)	2-4 (N=173)	p ^a
喫煙状況	習慣的喫煙	286 (20.4)	60 (34.7)	<0.01
	習慣的ではないが喫煙	30 (2.1)	4 (2.3)	
	やめた	302 (21.5)	58 (33.5)	
	もともと吸わない	769 (54.9)	47 (27.2)	
	無回答	15 (1.1)	4 (2.3)	
起床後喫煙 までの時間	5分以内	87 (6.2)	21 (12.1)	<0.01
	6-30分	96 (6.8)	16 (9.2)	
	31-60分	84 (6.0)	17 (9.8)	
	1時間以上	48 (3.4)	11 (6.4)	
	わからない	10 (0.7)	6 (3.5)	
	当該なし	1077 (76.8)	102 (59.0)	
1年前と 比べ喫煙 状況の変化	禁煙した	18 (1.3)	7 (4.0)	<0.01
	本数を減らした	74 (5.3)	17 (9.8)	
	値段の安い銘柄に変えた	12 (0.9)	3 (1.7)	
	安い銘柄に変え本数減らし	4 (0.3)	0 (0.0)	
	今までどおり	210 (15.0)	43 (24.9)	
	その他	10 (0.7)	1 (0.6)	
	無回答	1074 (76.6)	102 (59.0)	

a: χ^2 検定

人数(列の%)

表12.CAGEスコア別アルコール価格に関する項目(統計的有意差が認められた項目)

CAGE スコア		0-1 (N=1402)	2-4 (N=173)	p ^a
今の缶ビール 350mlの値段の 感じ方	高い	440 (31.4)	75 (43.4)	<0.01
	ちょうどよい	502 (35.8)	69 (39.9)	
	安い	44 (3.1)	6 (3.5)	
	わからない	406 (29.0)	23 (13.3)	
	無回答	10 (0.7)	0 (0.0)	
アルコールの 値段が1.5倍 になった時の 行動	同じ商品で同じ量を飲む	161 (11.5)	21 (12.1)	<0.01
	安いものに変え量は同じ	236 (16.8)	52 (30.1)	
	同じ商品のまま量を減らす	193 (13.8)	40 (23.1)	
	安いものに変え量も減らす	191 (13.6)	32 (18.5)	
	酒をやめる	65 (4.6)	6 (3.5)	
	わからない	200 (14.3)	13 (7.5)	
	当該なし	356 (25.4)	9 (5.2)	
アルコールの 値段が2倍 になった時の 行動	同じ商品で同じ量を飲む	85 (6.1)	6 (3.5)	<0.01
	安いものに変え量は同じ	193 (13.8)	43 (24.9)	
	同じ商品のまま量を減らす	153 (10.9)	29 (16.8)	
	安いものに変え量も減らす	272 (19.4)	60 (34.7)	
	酒をやめる	141 (10.1)	12 (6.9)	
	わからない	212 (15.1)	14 (8.1)	
	当該なし	346 (24.7)	9 (5.2)	
アルコールの 値段が3倍 になった時の 行動	同じ商品で同じ量を飲む	52 (3.7)	5 (2.9)	<0.01
	安いものに変え量は同じ	143 (10.2)	27 (15.6)	
	同じ商品のまま量を減らす	88 (6.3)	15 (8.7)	
	安いものに変え量も減らす	265 (18.9)	68 (39.3)	
	酒をやめる	271 (19.3)	26 (15.0)	
	わからない	236 (16.8)	23 (13.3)	
	当該なし	347 (24.8)	9 (5.2)	
禁酒するビール 350mlの値段	100円	9 (0.6)	1 (0.6)	<0.01
	200円	20 (1.4)	0 (0.0)	
	300円	88 (6.3)	9 (5.2)	
	400円	58 (4.1)	3 (1.7)	
	500円	205 (14.6)	33 (19.1)	
	600円	53 (3.8)	10 (5.8)	
	800円	82 (5.8)	14 (8.1)	
	1000円	128 (9.1)	22 (12.7)	
	1500円以上	20 (1.4)	6 (3.5)	
	わからない	283 (20.2)	39 (22.5)	
	やめない	97 (6.9)	26 (15.0)	
当該なし	359 (25.6)	10 (5.8)		
禁酒する可能 性のある理由 (複数回答)	病気にかかる	809 (57.7)	133 (76.9)	<0.01
	病気についてより知る	73 (5.2)	19 (11.0)	<0.01
	医師などから禁酒指導	477 (34.0)	87 (50.3)	<0.01
	飲酒関連疾患の治療の開発	36 (2.6)	11 (6.4)	<0.01

a: χ^2 検定

人数(列の%)

Ⅲ. 平成 24 年度(2012 年)調査

支 局		地 点			対 象	

(成人における飲酒)－11月

2012年11月

F 1. (職 業) あなたの職業をおきかしてください。

シートNo.=01

- | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ⑪ |
| 農林漁業
(家族従業)
を含む | 商工・サービス業
(家族従業を)
含む | 事務職 | 労務職 | 自由業
管理職 | 無職の
主婦 | 学 生 | その他
無 職 | |

F 2. (性)

- | | | |
|----------|----------|---|
| 1 | 2 | ⑫ |
| 男 性 | 女 性 | |

F 3. (年 齢)

--	--	--	--

⑬ ⑭ 歳

F 4. (教 育) 学校はどこまで行きましたか。

- | | | | |
|----------|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | ⑮ |
| (新) 中 学 | (新) 高 校 | (新) 短大・大学 | |
| (旧) 小・高小 | (旧) 中 学 | (旧) 高 専 大 | |

【20歳以上の人に】

次に、お酒のことについてうかがいます。

ここでいう「お酒」とはビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーといったアルコール飲料のことですが、アルコール濃度が1%未満のノンアルコールビールなどは除いてお考えください。

Q 1. 【回答票 1】 あなたの現在の飲酒の様子を教えてください。この中から、1つだけ選んでください。

- 1 (ア) 習慣的に飲酒する
- 2 (イ) 習慣的ではないが飲酒する
- 3 (ウ) やめた
- 4 (エ) もともと飲まない
- 5 (オ) わからない

Q 2. 【回答票 2】 あなたは、過去1年間に平均するとお酒をどれくらいの頻度で飲みますか。この中から、1つだけ選んでください。

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1 (ア) 毎日2回以上 | 7 (キ) 1ヵ月に1日 |
| 2 (イ) 毎日1回 | 8 (ク) 1年間に6~11日 |
| 3 (ウ) 1週間に5~6日 | 9 (ケ) 1年間に1~5日 |
| 4 (エ) 1週間に3~4日 | 10 (コ) 過去1年間は飲酒していない |
| 5 (オ) 1週間に1~2日 | 11 わからない |
| 6 (カ) 1ヵ月に2~3日 | |
- } → (Q 3へ)

S Q 1. 【回答票 3】 よく飲むお酒はどんな種類ですか。この中からあてはまるものをすべてあげてください。(M. A.)

- 1 (ア) ビール
- 2 (イ) 日本酒
- 3 (ウ) ワイン
- 4 (エ) 焼酎、サワー類
- 5 (オ) アルコール度が低く甘いお酒 (果実酒など)
- 6 (カ) ウイスキー、ブランデー、ウォッカなどの強いお酒
- 7 (キ) その他 ()
- 8 (ク) 特に決まっていない
- 9 (ケ) わからない

S Q 2. 【回答票 4】 もし、あなたがよく飲んでいるアルコールの価格が1.5倍になった場合、あなたは どうしますか。この中から、1つだけ選んでください。

- 1 (ア) 同じ商品で同じ量を飲み続ける
- 2 (イ) 今より安いものに変え、量はかえない
- 3 (ウ) 同じ商品のままで、量を減らす
- 4 (エ) 今より安いものに変え、量も減らす
- 5 (オ) 酒をやめる
- 6 (カ) その他 ()
- 7 (キ) わからない

S Q 3. 【回答票 5】 もし、あなたがよく飲んでいるアルコールの価格が、度数が高くなるにつれて上がった場合、あなたは どうしますか。ここに示しているアルコール度数を参考にして、この中から1つだけ選んでください。

アルコール度数の参考：ビール3~9%，ワイン10~15%，日本酒15%前後，焼酎ストレート20~40%，ウイスキーストレート40%前後

- 1 (ア) 同じ商品で同じ量を飲み続ける
- 2 (イ) 今より安いものに変え、量はかえない
- 3 (ウ) 同じ商品のままで、量を減らす
- 4 (エ) 今より安いものに変え、量も減らす
- 5 (オ) 酒をやめる
- 6 (カ) その他 ()
- 7 (キ) わからない

S Q 4. 【回答票 6】 では、どのような理由があればご自身の飲酒量を半分に減らしますか。この中からあてはまるものをすべてあげてください。(M. A.)

- 1 (ア) 病気にかかる
- 2 (イ) 飲酒に関連する病気についてもっと知る
- 3 (ウ) 子どもから飲酒をやめるように言われる
- 4 (エ) 医師や医療関係者からやめるように言われる
- 5 (オ) 飲酒運転取り締まりの強化
- 6 (カ) アルコール価格の値上げ
- 7 (キ) アルコール生産量・販売量の規制
- 8 (ク) 減らさない
- 9 (ケ) その他 ()
- 10 (コ) わからない

【20歳以上の人に】

Q 3. 【回答票 7】あなたは、今までに家族・友人・医師などから飲酒について心配されたり、酒の減量を指摘されたことがありますか。この中から、**1つだけ**選んでください。

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1
(ア)
過去1年間にある | 2
(イ)
あるが、過去1年間はない | 3
(ウ)
ない | 4
わからない |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|

【調査員注： 内の質問文は読み上げずに回答票を示し、対象者に質問文を読んで答えてもらう】

Q 4. 【回答票 8】では、ここに書いてある質問を読み、あてはまるものを**1つだけ**選んでください。回答は、(ア) (イ) などの記号でお答えください。

【調査員注： 以下の質問文は読み上げない】

あなたは今までに医療機関でアルコール依存症の治療を受けたことがありますか。

- 1 (ア) はい、この1年間に受けたが、1年より前には受けていない
- 2 (イ) はい、この1年間には受けていないが、1年より前に受けた
- 3 (ウ) はい、この1年間も、それ以前も受けた
- 4 (エ) いいえ (今まで1度も受けたことがない)
- 5 わからない

Q 5. 【回答票 9】次の質問はいかがでしょう。あてはまるものを**1つだけ**選んでください。

回答は、(ア) (イ) などの記号でお答えください。

【調査員注： 以下の質問文は読み上げない】

あなたが20才未満のときに、大人の飲酒が原因で、暴力・暴言やセクシャルハラスメントを受けたり、もしくは大人の飲酒者にからまれたことがありますか。

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1
(ア)
ある | 2
(イ)
ない | 3
わからない |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|

Q 6. 【回答票 10】次の質問はいかがでしょう。あてはまるものを**1つだけ**選んでください。

回答は、(ア) (イ) などの記号でお答えください。

【調査員注： 以下の質問文は読み上げない】

これまでに、あなたの飲酒が原因で、20才未満の子どもに、暴力・暴言やセクシャルハラスメントをしたり、もしくは子供にからんだことがありますか。

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1
(ア)
ある | 2
(イ)
ない | 3
わからない |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|

Q 7. 【回答票 11】次の質問はいかがでしょう。あてはまるものを**1つだけ**選んでください。

回答は、(ア) (イ) などの記号でお答えください。

【調査員注： 以下の質問文は読み上げない】

今までに、どなたかの飲酒が原因で、あなたが嫌な思い、または困った経験をしたことがありますか。

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1
(ア)
ある | 2
(イ)
ない | 3
わからない |
| ↓ | | → (Q 8へ) |

S Q 1. 【回答票 12】 次の質問はいかがでしょう。この中からあてはまるものをすべてあげてください。回答は、(ア) (イ) などの記号でお答えください。(M. A.)

【調査員注：以下の質問文は読み上げない】

では、どなたかの飲酒が原因で、あなたが嫌な思い、または困った経験とはどのようなものですか。

- 1 (ア) 暴言・暴力
- 2 (イ) からまれた
- 3 (ウ) セクシャルハラスメント
- 4 (エ) 飲酒の強要
- 5 (オ) 謝るなどの問題の後始末
- 6 (カ) 飲酒による身体問題の世話
- 7 (キ) 外部からの注意や連絡
- 8 (ク) 他人に対して恥をかいた
- 9 (ケ) 経済的問題
- 10 (コ) その他 ()
- 11 答えたくない・わからない

S Q 2. 【回答票 13】 次の質問はいかがでしょう。あてはまるものを1つだけ選んでください。回答は、(ア) (イ) などの記号でお答えください。

【調査員注：以下の質問文は読み上げない】

では、そのような経験はあなたの生き方や考え方に影響をあたえましたか。

- | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
| 重大な
影響を与えた | かなり
影響を与えた | 少し
影響を与えた | 影響を
与えなかった | わからない |

【20歳以上の人に】

Q 8. 【回答票 14】 あなたはふだん、酒類・アルコール含有飲料を、平均するとどのくらいの頻度で飲みますか。この中から、1つだけ選んでください。

- | | | |
|--|---|------------|
| 1 (ア) 1週間に4回以上
2 (イ) 1週間に2~3回
3 (ウ) 1ヵ月に2~4回 | 4 (エ) 1ヵ月に1回以下
5 (オ) まったく飲まない
6 わからない | } → (Q 9へ) |
|--|---|------------|

S Q 1. 【回答票 15】 では、飲酒するときには、通常どのくらいの量を飲みますか。ここに示している表をご参考にお答えください。この中から、1つだけ選んでください。

- ・「日本酒」1合 = 2単位
- ・「ビール」大瓶 633ml 1本 = 2.5単位, 500ml = 2単位, 350ml = 1.4単位
- ・「ウイスキー」水割りダブル1杯 = 2単位
- ・「焼酎・泡盛」お湯割り1杯 = 1単位
- ・「ワイン」グラス1杯 = 1.5単位
- ・「梅酒」小コップ1杯 = 1単位

- 1 (ア) 10単位以上
- 2 (イ) 7~9単位
- 3 (ウ) 5~6単位
- 4 (エ) 3~4単位
- 5 (オ) 1~2単位以下
- 6 (カ) まったく飲まない
- 7 わからない

S Q 2. 【回答票 16】では、1 度に 6 単位以上飲酒することがありますか。ある場合は、どのくらいの頻度ですか。この中から、1 つだけ選んでください。

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 (ア) 毎日あるいはほとんど毎日 | 4 (エ) 1 ヶ月に 1 回未満 |
| 2 (イ) 1 週間に 1 回 | 5 (オ) な い |
| 3 (ウ) 1 ヶ月に 1 回 | 6 わからない |

【20 歳以上の人に】

Q 9. 【回答票 17】あなたには、子どもがいますか。

- | | | |
|-----|-----|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| い る | いない | わからない |

Q10. 【回答票 18】ところで、この 1 ヶ月間に、あなたは仕事の^{ない}日に 1 日平均してどのくらいの時間、パソコンや携帯電話、スマートフォンなどを通してインターネットをしましたか。ゲームやメールの利用も含めて、この中からあてはまるものを 1 つ選んでください。

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 (ア) 5 時間以上 | 5 (オ) 1 時間未満 |
| 2 (イ) 3 時間以上 5 時間未満 | 6 (カ) まったくしなかった |
| 3 (ウ) 2 時間以上 3 時間未満 | 7 わからない |
| 4 (エ) 1 時間以上 2 時間未満 | |

Q11. 【回答票 19】あなたのご家庭の、最近 1 年間の収入は、税込みでいくらでしたか。臨時収入、副収入、ボーナス、年金、アルバイトを含めたご家族全員の収入の合計に近いものを、この中から 1 つ選んでください。

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 (ア) 100 万円未満 | 7 (キ) 800~1,000 万円未満 |
| 2 (イ) 100~200 万円未満 | 8 (ク) 1,000~1,200 万円未満 |
| 3 (ウ) 200~300 万円未満 | 9 (ケ) 1,200~1,500 万円未満 |
| 4 (エ) 300~400 万円未満 | 10 (コ) 1,500 万円以上 |
| 5 (オ) 400~600 万円未満 | 11 (サ) 収入なし |
| 6 (カ) 600~800 万円未満 | 12 答えたくない・わからない |

表1. 男女別回答者の基本属性

	男性 N=644(100%)	女性 N=687(100%)
年代(実数, %)		
20-29才	75 (11.6%)	81 (11.8%)
30-39才	139 (21.6%)	123 (17.9%)
40-49才	106 (16.5%)	133 (19.4%)
50-59才	93 (14.4%)	129 (18.8%)
60-69才	126 (19.6%)	105 (15.3%)
70才以上	105 (16.3%)	116 (16.9%)
仕事(実数, %)		
農林漁業	12 (1.9%)	11 (1.6%)
商工・サービス業	81 (12.6%)	66 (9.6%)
事務職	156 (24.2%)	121 (17.6%)
労務職	189 (29.3%)	115 (16.7%)
自由業・管理職	24 (3.7%)	4 (0.6%)
主婦	0 (0.0%)	299 (43.5%)
学生	18 (2.8%)	15 (2.2%)
その他	164 (25.5%)	56 (8.2%)
最終学歴(実数, %)		
中学	69 (10.7%)	71 (10.3%)
高校	308 (47.8%)	358 (52.1%)
短大・大学以上	265 (41.1%)	258 (37.6%)
不明	2 (0.3%)	0 (0.0%)
地域ブロック(実数, %)		
北海道	30 (4.7%)	34 (4.9%)
東北	42 (6.5%)	53 (7.7%)
関東	150 (23.3%)	150 (21.8%)
京浜	73 (11.3%)	69 (10.0%)
甲信越	33 (5.1%)	24 (3.5%)
北陸	21 (3.3%)	13 (1.9%)
東海	76 (11.8%)	79 (11.5%)
近畿	61 (9.5%)	62 (9.0%)
阪神	43 (6.7%)	48 (7.0%)
中国	35 (5.4%)	44 (6.4%)
四国	17 (2.6%)	21 (3.1%)
九州・沖縄	63 (9.8%)	90 (13.1%)
都市規模(実数, %)		
主要大都市	170 (26.4%)	193 (28.1%)
その他の市	412 (64.0%)	425 (61.9%)
町村	62 (9.6%)	69 (10.0%)

表2. 男女別現在の飲酒習慣

	男性 N=644(100%)	女性 N=687(100%)
飲酒状況 (実数, %)		
習慣的に飲酒	235 (36.5%)	83 (12.1%)
習慣的ではないが飲酒	236 (36.6%)	236 (34.4%)
やめた	42 (6.5%)	31 (4.5%)
もともと飲まない	130 (20.2%)	337 (49.1%)
わからない	1 (0.2%)	0 (0.0%)

表3. 男女別過去1年間の飲酒頻度

	男性 N=644(100%)	女性 N=687(100%)
過去1年間の飲酒頻度 (実数, %)		
毎日2回以上	9 (1.4%)	0 (0.0%)
毎日1回	160 (24.8%)	53 (7.7%)
週5-6日	50 (7.8%)	18 (2.6%)
週3-4日	61 (9.5%)	40 (5.8%)
週1-2日	101 (15.7%)	60 (8.7%)
月2-3日	59 (9.2%)	62 (9.0%)
月1日	22 (3.4%)	48 (7.0%)
年6-12日	16 (2.5%)	32 (4.7%)
年1-5日	30 (4.7%)	60 (8.7%)
過去1年間飲酒せず	133 (20.7%)	310 (45.1%)
わからない	3 (0.5%)	4 (0.6%)

表3-1. 過去1年間に飲酒した者のうち、男女別よく飲むアルコールの種類(複数回答)

	男性 N=508(100%)	女性 N=373(100%)
よく飲むアルコールの種類 (実数, %) 複数選択		
ビール	379 (74.6%)	216 (57.9%)
焼酎・サワー類	231 (45.5%)	127 (34.0%)
日本酒	104 (20.5%)	44 (11.8%)
ワイン	58 (11.4%)	80 (21.4%)
ウイスキー、ブランデーなどの強い酒	57 (11.2%)	20 (5.4%)
果実酒などアルコール度が低い甘い酒	46 (9.1%)	111 (29.8%)
特に決まっていない	6 (1.2%)	2 (0.5%)
その他	0 (0.0%)	1 (0.3%)