

大浦 智子（星城大学リハビリテーション学部講師）  
加藤 清人（平成医療専門学院教授）  
木村 大介（星城大学リハビリテーション学部助教）  
斎藤 民（独立行政法人国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部室長）  
齋藤 玲子（新潟大学大学院医歯学総合研究科国際保健学分野教授）  
鈴木 翼（新潟大学医歯学総合病院次世代医療人育成センター特任助教）  
高木 大資（東京大学大学院医学系研究科特任研究員）  
竹内 研時（東北大学大学院歯学研究科博士課程）  
田代 敦史（新潟市保健衛生部医監）  
林 尊弘（東海医療科学専門学校理学療法科講師）  
平井 寛（岩手大学工学部社会環境工学科准教授）  
平田 幸夫（神奈川歯科大学大学院歯学研究科教授）  
福島 慎太郎（京都大学こころの未来研究センター）  
藤田 美鈴（千葉大学大学院医学研究院環境健康科学講座助教）  
藤原 武男（国立成育医療研究センター 成育社会医学部部長）  
渕田 慎也（神奈川歯科大学大学院歯学研究科大学院生）  
細川 陸也（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻看護科学コース修士課程）  
松山 祐輔（東北大学大学院 歯学研究科 博士課程）  
宮國 康弘（日本福祉大学大学院医療・福祉マネジメント研究科修士課程）

# 分担研究報告

# I 大規模調査の実施と 地域診断・地域格差と関連要因の検討

## 特集論文

## 健康格差と健康の社会的決定要因の「見える化」

—JAGES 2010-11プロジェクト

近藤 克則<sup>1)</sup>, JAGESプロジェクト

「健康日本21（第2次）」で、「健康格差の縮小」とソーシャル・キャピタル（地域のつながり）など「社会環境の質の向上」が明示され、介護予防でも地域診断に基づく地域づくりへの重視が謳われるようになった。しかし歐米に比べ我が国ではそれらに必要な「見える化」が遅れている。

これらの課題に取り組むため厚生労働科学研究費補助金などで組織されたJAGES (Japan Gerontological Evaluation Study, 日本老年学的評価研究) プロジェクトの取り組みを紹介し「見える化」の可能性と課題を考察することが小論の目的である。

本研究プロジェクトでは、まず先行研究レビューに基づきベンチマークの必要性や限界・課題、政策評価ベンチマーク指標群の枠組みと指標選択基準、要介護リスクと保護要因などについてまとめた。次に全国31市町村との共同研究により、要介護認定を受けていない10万人超の高齢者のデータベースを構築して指標群を作成し、保険者にフィードバックするベンチマーク・システムを開発した。さらに総合研究で解明されたリスク要因や保護的要因、応用研究としての介入研究などに基づく指標群の妥当性の検証などを行った。考察では、行政と研究者の共同の仕組みやデータベース、ベンチマーク・システム開発の多面的な意義と、ベンチマーク指標の妥当性の検証など今後の課題について述べた。

健康格差と健康の社会的決定要因の「見える化」による効果的・効率的・公正な介護政策のために総合的なベンチマーク・システムのプロトタイプを開発し、社会保障領域における大規模データ活用の可能性と課題を考察した。

キーワード 見える化、ベンチマーク、介護予防、健康格差、ソーシャル・キャピタル

## 1. 背景

## 1) 「見える化」導入を巡る背景

我が国は、世界一の超高齢社会への対応を迫られている。しかも、社会保障に使える資源は限られている。効果のない施策や技術には資源の配分をやめ、より効果や効率が良いものへ振り向けるため、英語圏の諸国を中心にエビデンスに基づく政策・実践(EBP: Evidence Based Policy & Practice)が重視されている。そしてエ

ビデンスを得るためのデータベースなどの基盤整備や、プログラム評価・政策評価研究の蓄積が進められてきている。そこでは3E (効果effectiveness、効率efficiency、公正equity) + 1E (参加empowerment)などを多面的に「見える化」し、これらの改善を図ることが目指されている(近藤, 2012)。

海外では、因果や効果を検証することに主眼を置く無作為化対照比較試験(Randomized controlled trial, RCT)に代表される(準)実験的な方法で、(内的)妥当性の高いエビデンスが蓄積されてきた。その一方で、「RCTの結果は、他の集団においても適用できる外的妥当性は低い」という批判

<sup>1)</sup> 千葉大学予防医学センター

に応えるべく、全数（全施設・全患者）を対象とする大規模データを活用し、可能な範囲で数値化した指標を用いて相対比較をするベンチマーク・システムも開発されてきた。その結果を、国民に「見える化」し、パフォーマンスに基づく支払い（Pay for Performance, P4P）のような報酬支払制度と結びつける動きと連動して広がっている。例えば、医療で言えば米国のDRG/PPS (Diagnosis Related Group/Prospective Payment System, 診断群別包括支払方式) や英国のQOF (Quality Outcome and Framework) などのP4P（医療の質に基づく支払い研究会, 2007), 米国のHospital Compare (The Centers for Medicare & Medicaid Services) やNursing Home Compare (池崎, 2012; 澤田・近藤, 2007), 英国のPerformance Assessment Framework (PAF) (近藤, 2004)などであり、DRGやP4Pは日本や韓国などアジアにも広がってきてている（鄭・井上, 2012）。

それらの開発・導入過程を見ると、いずれもデータベースが構築され試作された指標が公表されるに、理念・理論レベル、指標の枠組みレベル、個別指標レベルにおける学術的な批判だけでなく、煩雑さや混乱、それを上回る実用性はあるのかなど、現場からの批判も加えられている（近藤, 2012）。それに応える形で、当初試行的に開発された多くの指標の中から信頼性や妥当性の検証がなされた一部の指標が選ばれるなど、施策レベルで導入され評価が定まるまでには、徐々に改善されるプロセスに10年単位の開発研究期間をかけている。日本でも、医療分野における先駆例であるDPC (Diagnosis Procedure Combination) が、その例にある。

このような「見える化」の動きは、我が国では遅れていたが、3E (効果effectiveness, 効率efficiency, 公正equity) に優れた施策・プログラムが求められるにつれて、今後は徐々に広がっていくと思われる。例えば、2013年6月の閣議決定「科学技術イノベーション総合戦略～新次元日本創造

への挑戦～」の中で、「国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現」に向けた重点的取組の一つとして、「介護・医療関連情報の『見える化』の推進」の取組みを進めることとされている。その説明資料の中で紹介されているのが、我々が開発した「介護予防Webアトラス」（健康社会研究センター, 2011）である。これは、平成22～24年度の厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）の指定研究として組織された「介護保険の総合的政策評価ベンチマーク・システムの開発」(H22-長寿-指定-008) 研究班（代表研究者 近藤克則）の成果の一部である。

そこで、本特集論文では、介護予防におけるベンチマークによる「見える化」の到達点と課題を多面的に検討することにする。なお、この研究班では、介護予防とケアの質の二つを対象に研究が進められたが、ここでは介護予防に限定して取り上げる。

## 2) 介護予防における「見える化」を巡る背景

医療において診療報酬レセプト電子化の遅れが指摘されていたこともあり、2000年に導入された介護保険では、当初から介護報酬とリンクした介護保険給付データをはじめ、要介護認定や保険料賦課データも含め、データの電子化が進められていた。しかし、国保連合会が集中管理している介護保険給付データを除き、地方分権化の流れも受けて、他のデータは保険者の管理下におかれていた。技術的には、保険料の算定根拠となる所得水準データも含まれる保険料賦課データと要介護認定データ、さらに利用実績のわかる給付データとも、被保険者番号を結合キーに用いれば結合可能で、個票データとして分析可能な大規模データとしての活用可能性はあった。さらに保険者は、介護保険事業計画に向けて3年に一度の高齢者を対象にした調査（第5期の日常生活圏域ニーズ調査など）や2次介護予防事業の対象（旧特定高齢者）把握のための基本チェックリストなどの貴重な情

報も収集していた。しかし、個人情報保護条例などに基づく市町村の審査委員会からの承認を得る手続きの煩雑さの割に、手続きを進める介護保険担当職員にとって、即効性の感じられる成果が得られることはあまりない。そのこともあり、それらが要介護認定データなどと結合されて分析されることは稀であった。そのため、現実的なデータ結合や研究者による利用可能性は低く、一部の理解ある保険者からデータ提供を受けた一部の研究者による分析や研究に留まっていた。

つまり介護保険事業のために多くの行政データが集められており、潜在的には大規模データ活用による「見える化」の可能性はあったにもかかわらず、それを実現するための保険者と研究者との継続的な共同研究は少なかった。

### 3) 介護予防においてソーシャル・キャピタルが着目された背景

「見える化」を進める上で一つ問題になるのは、何に関する情報を「見える化」するかである。目的によって、あらゆるもののが「見える化」の対象となりうるが、小論で扱う介護予防に限定すれば、要介護リスクや社会資源など介護予防施策に資する情報がまずは対象となる。2006年から介護予防重視システムの導入がなされたものの、その後の経過の中で、問題点が徐々に明らかになってきた。老健局の介護予防マニュアル(平成24年3月改定)によれば「要支援状態となるおそれの高い人を対象とした2次予防事業に主眼を置いた取り組みでは、対象者の把握に多大な努力が費やされ、介護予防プログラムへの参加を働きかけることが十分にできない、参加者が集まらない、ニーズを満たすプログラムを提供できないなどの課題」が明らかとなってきた。早期発見・早期治療にあたる2次予防施策の限界が明らかになるに従い、代替策として着目されるようになったのが地域づくりによる一次予防である。

「健康日本21(第二次)」(厚生労働大臣(小宮

山洋子), 2012)でも同様に、「健康を支え、守るために社会環境の整備」を「健康格差の縮小」のためにも追求することが明示された。その参考資料において、社会環境の例として示されているのがソーシャル・キャピタル(地域のつながり)である(次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会, 2012)。その背景には、本特集の相田論文で紹介されているように、まだ研究途上ではあるものの、ソーシャル・キャピタルが豊かな地域ほどそこに暮らす人々の健康状態が良いことを示す研究が蓄積されてきていることがあった。一方で、日本などアジアでの知見や介護予防、高齢者における研究は多くない。施策にのせるにはその根拠となるエビデンスが求められており、地域づくりの課題設定やソーシャル・キャピタルの涵養を意図した介入後のモニタリングや介入効果の評価などに用いることができるベンチマーク・システムが必要だが、そのようなものは国際的にもまだ開発途上にある。

## 2. 目的

以上のような背景を踏まえ、本特集論文で紹介する一連の研究プロジェクトの目的は、効果的・効率的・公正な介護政策のための総合的なベンチマーク・システム開発である。するために、第1に、エビデンスづくりに不可欠なデータベースの構築を目指して、介護保険者と研究組織との共同研究の仕組み、第2に、地域診断に基づく介護予防政策の課題設定から事業計画立案、効果評価までに活用できるベンチマーク・システムを開発した。第3に、先行研究レビューで要介護リスクや保護的要因を明らかにするとともに、横断および縦断分析による実証研究によって、妥当性のあるベンチマーク指標を抽出することを目的とした。

これらを通じ、個人情報を保護した上で、日常生活圏域ニーズ調査データや要介護認定、保険料賦課データなど、複数のデータを個別レベルで結合すること、研究者側から見れば効果的な介護予

防事業計画・プログラムのためのエビデンスづくりに使える質の高い縦断研究ができるデータベースとそれを活用した研究基盤を整備することを目指した。保険者側から見れば既存のデータ資産を活用し、「見える化」による介護予防事業の課題設定や、エビデンスに基づく政策の立案を可能にすることを、厚生労働行政など国や社会レベルから見れば、行政の持つデータを活用して、効果や効率・公正（健康格差）の評価ができるベンチマーク・システムのプロトタイプを開発することなどを目指した。

### 3. 方法

本研究プロジェクトでは、理論研究と開発研究、実証研究を行った。

#### 1) 理論研究

先行研究を踏まえて、第1に、ベンチマーク開発の必要性や限界・課題などを整理し、第2に、多面的な指標群によるベンチマークのための政策評価指標群の枠組みと指標選択基準を検討し、第3に、介護予防において重要と考えられるリスク要因と保護要因について特に健康の社会的決定要因を重視してレビューした。

#### 2) 開発研究

第1に、介護保険者と研究組織との共同研究の仕組み、第2に、エビデンスづくりに不可欠なデータベース構築のための大規模データ収集のための調査方法、第3に、フィードバック機能を併せ持つベンチマーク・システム、の3つを開発した。

#### 3) 実証研究

効果のある介護予防政策立案のための基礎研究としてリスク要因や保護的要因の解明、応用研究としての介入研究、およびそれらのエビデンスに基づくベンチマーク指標群の予測妥当性や内容的妥当性、外的妥当性の検証などを行った。

リスク要因や保護的要因の解明では、2003年調査データなどをベースラインとする縦断研究によって要介護認定や認知症を伴う要介護認定などをエンドポイントに要介護リスク要因やそれを緩和する要因を探索した。またJAGES 2010-11年度調査データの横断分析では多地域間比較で健康に望ましい関連を示す社会環境要因を探索した。

## 4. 結果

### 1) 理論研究

ベンチマーク開発の必要性や限界・課題などについては、「第3章 医療・福祉の『見える化』とマネジメント」(近藤, 2012)において、医療・福祉における政策やサービスの「見える化」を、そのマネジメントに有用なものとするための5つの視点—①格付けではなく、マネジメント・サイクルを回すための評価、②マネジメント主体によるボトムアップ型評価の支援、③マクロ・メゾ・ミクロのマルチレベルや多要素で相互に補完しあう評価の枠組み、④複数の評価基準・方法による多元的・多面的評価、⑤大規模データベースを活用した多数の保険者などマネジメント主体間のベンチマークによる比較、などについて整理した。

先行研究をもとに、研究班で論議を重ね、政策評価指標群の枠組みとして図1に示す5要素と2側面（近藤, 2012）、および6つのベンチマーク指標選択基準を提示した（尾島論文参照）。




図1 政策評価指標群の枠組み

## 健康格差と健康の社会的決定要因の「見える化」—JAGES 2010-11プロジェクト

介護予防において重要と考えられるリスク要因や保護要因について先行研究をレビューし、その結果を「健康の社会的決定要因－疾患・状態別「健康格差」レビュー」(近藤, 2013b)にまとめ、ベンチマークしてモニタリングすべきと考えられる要因を検討する基礎資料とした。

### 2) 開発研究

(1) 共同研究の仕組み (2) データ収集のための調査方法、(3) ベンチマーク・システムの3つを開発した。

#### (1) 共同研究の仕組みの開発

第1に、共同研究の仕組みでは、全国の市町村の大規模な縦断研究を担える共同研究体制するために16大学・研究機関の研究者が参加するプロジェクト体制を組織した(表1)。

介護保険者とは研究協定を結び、個人情報を暗号化するソフトなどを開発して、個人情報保護と縦断分析に必要な個票データの結合の両立を可能とした。

費用面では、多市町村間のベンチマーク比較に必要な10万人規模の調査費用(1票1000円として調査実施経費のみで1億円)は、単独の科学的研究費補助金では基盤研究(A)でも賄えないため、多くの研究者が研究費を拠出し合うとともに、第

5期介護保険事業計画の策定のための日常生活圏域ニーズ調査を兼ねられることから保険者にも一部の調査費用を負担してもらうことで確保した。

#### (2) データ収集のための調査方法の開発

第2に、必要なデータ収集のための調査では、最終的には図2に示す北海道から東北、関東、中部、中国、九州、沖縄に渡る12道県25保険者31市町村の協力を得ることができた。対象とした保険者は、説明会を2回開催した他、いろいろな機会を通じて募って協力を得られた保険者である。要介護認定を受けていない高齢者169,215人に調査票を郵送(2市町村のみ民生委員による配布回収)し、112,123人から回答を得た(回収率66.3%)。対象者は、各市町村(都市部のみ校区)から全数または無作為に抽出したものである。調査対象者数が多かったこと、協力保険者を順次開拓したこと、研究費が单年度では確保できなかったことなどの理由で、第1期(2010年8月)、第2期(2011年1月~2月)、第3期(2011年4月)、第4期(2011年12月から翌年1月)の4期に分けて実施した。

大規模調査を構想し、5種類の調査票を準備した。A4版で12ページの調査票のうち10ページ(83.3%)は共通コア項目とし日常生活圏域ニーズ調査項目とJAGES独自項目を含み、残りの1.5ページ(12.5%)は研究費を提供した研究者の個別の

表1 平成24年度研究班

氏名	所属	氏名	所属
近藤克則	日本福祉大学社会福祉学部	川島典子	筑紫女子学園大学短期大学部
尾島俊之	浜松医科大学医学部	冷水豊	日本福祉大学地域ケア研究推進センター
小坂健	東北大学大学院歯学研究科	平野隆之	日本福祉大学社会福祉学部
竹田徳則	星城大学リハビリテーション学部	長澤紀美子	高知県立大学社会福祉学部
泉田信行	国立社会保障・人口問題研究所	斎藤雅茂	日本福祉大学社会福祉学部
野口晴子	国立社会保障・人口問題研究所	山本龍生	神奈川歯科大学社会歯科学講座
藤野善久	産業医科大学医学部	三澤仁平	立教大学社会学部
白井こころ	琉球大学法文学部	山田実	京都大学大学院医学研究科
近藤尚己	山梨大学医学工学総合研究部	菖蒲川由郷	新潟大学大学院医歯学総合研究科
吉井清子	日本福祉大学社会福祉学部	吉原麻由美	長崎県立大学看護栄養学部
羽田明	千葉大学大学院環境医学講座	鈴木佳代	日本福祉大学健康社会研究センター
等々力英美	琉球大学大学院医学研究科	中川雅貴	日本福祉大学健康社会研究センター




図2 大規模調査の対象市町村

研究関心を反映した5バージョンを作成し、この5種類の調査票を各市町村の対象者に無作為に送付した。なお、最後の半ページは、各保険者の関心に応じた独自項目とした。

### (3) ベンチマーク・システムの開発

第3に、ベンチマーク・システムについては、総合的な政策評価のためのベンチマーク指標群の枠組み(図1)と収集したデータからベンチマーク指標群を作成し、ベンチマーク結果を保険者にフィードバックするためのWebシステムなどを開発した。

指標群の開発では、図1に示した5要素と2側面の全てを網羅するように、合計249指標のベンチマーク指標群を考案した。データ入手可能性をはじめとする6つの指標選択基準を作成し、それ

に基づいて、コア指標、推奨(recommended)指標、オプション(optional)指標に分けた。その結果、コア指標として22指標を選定した(尾島論文参照)。また健康格差の「見える化」のため、格差指標の検討も行った(近藤尚己論文参照)。

ベンチマークの結果のフィードバックシステムの開発では、WHOのUrban HEART(Urban Health Equity Assessment and Response Tool)(狩野論文参照)も参考に、各指標における3~5分位など相対的な位置で3~5色に塗り分けた保険者向けの報告書を作成し、それを用いた報告会を行った。そこで得られた評価やフィードバックを元に指標の表現の仕方などを改善した。例えば、年齢調整よりも、前期・後期高齢者での層別化の方がわかりやすいとの声が多かったため、そのようにした。平成23年度厚生労働省老健局健康増進等

## 健康格差と健康の社会的決定要因の「見える化」—JAGES 2010-11プロジェクト

事業の補助金を得て、保険者などがインターネット上でベンチマークの結果を地図上で閲覧できるWebGIS（地理情報システムソフト、GeoWize社のInstantAtlas®）を用いて「介護予防Webアトラス」（健康社会研究センター、2011）を開発した（鈴木論文参照）。

### 3) 実証研究

リスク要因や保護的要因の解明、応用研究としての介入研究に取り組んだ。

#### (1) 縦断研究によるリスク要因や保護的要因の解明

まず2003年調査データなどをベースラインとするAGES (Aichi Gerontological Evaluation Study、愛知老年学的評価研究) コホートデータ (Nishi *et al.*, 2011) を用いて、要介護認定 (Aida *et al.*, 2013; Hirai *et al.*, 2012; Aida *et al.*, 2011; Kanamori *et al.*, 2012; Kondo *et al.*, 2009; 近藤他, 2012; 斎藤他, 2013; 平井他, 2009) や認知症を伴う要介護認定 (Yamamoto *et al.*, 2012; 竹田他, 2010; 竹田他, 2007), 死亡 (Aida *et al.*, 2011; Hirai *et al.*, 2012; Saito *et al.*, 2012; 近藤他, 2012; 近藤他, 2012)などをエンドポイントにリスク要因やそれを緩和する要因を探索した（図3）。




図3 (J) AGES 縦断研究によって検証した課題  
SES : Socio-Economic Status (社会経済的地位)  
SRH : Self Rated Health (主観的健康感)

例えば、低所得で孤立していて趣味のない人において、要介護リスクは大きくなること (Saito *et al.*, 2012), 運動をしない人で要介護認定リスク（ハザード比：HR）は大きいが、一人で運動する人よりもスポーツ組織に参加している人のHRは有意に小さいこと (Kanamori *et al.*, 2012), などを報告した。また早期からの予防策を検討するため、リスク要因のより上流にあるリスク (cause of cause) を明らかにするために、コホート研究で要介護リスクであると確認された転倒やうつなどをエンドポイントとするパネル分析を行った。残歯数が少なく義歯を使っていないことが3年後の転倒リスクを高めるリスクであること (Yamamoto *et al.*, 2012), 社会参加していないことが3年後のうつのリスク要因となること (Takagi *et al.*, 2013)などを明らかにした。

これらを通じ、口腔機能や低栄養、転倒、うつ、閉じこもり、物忘れ、主観的健康感が良くないことなどがリスク要因であること、一方、趣味やスポーツ活動、社会的サポートの授受、社会参加などが、健康保護要因であることを検証した。

#### (2) 横断分析による多地域間比較と社会環境要因の分析

市町村あるいは校区レベルでの地域間比較で地域間格差が小さくないことを明らかにし、健康に望ましいあるいはリスクとなる地域環境要因を探索した。例えば、個人要因を調整後にも「転倒が多いまち」(山田他, 2012)があり、地理情報システム (GIS) を用いて「公園などから1km以内に暮らしている高齢者では運動頻度が2割多い」(Hanibuchi *et al.*, 2011) ことなどを明らかにした。

また健康保護要因として地域組織への参加などソーシャル・キャピタルに着目した分析も行った。従来は個人レベルの参加に関する分析が多かったが、小中学校区または市町村を集計単位とする地域レベルの相関分析、およびマルチレベル分析も




図4 地域組織への参加率（月1回以上）




図5 校区別地域組織への参加率

行った。

例えば、図4は、8種類の地域組織への参加率を示したものである。月1回以上の参加率で見ると多い方から趣味の会(36.5%)、スポーツ組織(22.7%)などである。これらの組織のいずれかに参加している者の割合を前期・後期高齢者別に小学校区単位で集計した結果を図5に示す。前期高齢者に比べ、後期高齢者でやや参加率は低いもの

の、前期高齢者で34~73%、後期高齢者では27~75%と、加齢による減少以上に地域間格差が大きいことがわかる。前期高齢者と後期高齢者の参加率の間には正の相関関係が見られ、前期高齢者が参加しているほど後期高齢者も参加していることを意味している。これらの地域差は、個人要因によってのみ決まるというよりも、社会参加のしやすさ、あるいは社会组织の豊かさなど、何らかの

健康格差と健康の社会的決定要因の「見える化」—JAGES 2010-11プロジェクト

地域社会環境の特性を反映している可能性が高い。

### (3) まちづくりによる介護予防の可能性の検証

多くの高齢者が地域組織などに参加しているようないソーシャル・キャピタル豊かなまちづくりを進めることによる介護予防の可能性を検討するには、多くの研究課題がある。①個人レベルだけでなく地域レベルで見ても社会参加率やソーシャル・キャピタルが高い水準の地域ほど要介護リスク者割合が低く要介護認定率も低いことを観察研究で確認すること、②意図的な介入で社会参加を増やせること、③それに伴ってリスク要因を持つ者が減少し、健康保護要因や健康指標の改善が見られることを検証することが必要となる。

まず①ソーシャル・キャピタルと要介護リスクや認定率などとの関連についての観察研究では、以下のような検証を行った。まず要介護リスクについて、スポーツ組織参加率が高い小学校区ほ

と転倒率が低いこと、趣味の会参加者が多い市町村ほど Geriatric Depression Scale (GDS) 高齢者うつ尺度得点の平均点が低い（うつ傾向が弱い）こと、いずれかの地域組織に参加している後期高齢者多い小学校区ほど認知症リスクをもつ者が少ないこと、などの関連を明らかにした（図 6）（近藤、2013c；社会保障審議会介護保険部会、2013、P27）。

地域組織への参加以外にも信頼感などのソーシャル・キャピタル指標と健康との関連については、横断分析 (Aida *et al.*, 2009; Ichida *et al.*, 2009) に加え縦断分析 (Aida *et al.*, 2011; Aida *et al.*, 2013) で検証を進めた。一方で、表2に示すように、地域組織の種類によって、参加している者の割合が多い校区ほど、要介護リスク者の割合が低いとは限らないことも明らかにした(近藤, 2013a, c)。ただし、これは地域相関分析の結果であり、個人レベルで縦断分析をすると、いずれ


スポーツ関係・ボランティア・趣味関係のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や認知症やうつリスクが低い傾向がみられる。

調查方法


2010年8月～2012年1月にかけて、北海道、東北、関東、東海、関西、中国、九州、沖縄地方に分布する31自治体に居住する高齢者の中、要介護認定を受けていない高齢者169,201人を対象に、郵送調査（一部の自治体は訪問調査）を実施。  
112,123人から回答。

## 【研究デザインと分析方法】


## JAGES(日本老年学的評価研究)プロジェクト



趣味関係のグループへの参加割合が高い地域ほど、うつ得点(低いほど良い)の平均点が低い相関が認められた



図表については、厚生労働科学研究班(研究代表者:近藤克則氏)からの提供



ボランティアグループ等の地域組織への参加割合が高い地域ほど、認知症リスクを有する後期高齢者の割合が少ない相関が認められた。




図6 社会参加と介護予防効果の関係について

表2 ソーシャル・キャピタル指標と要介護リスク指標の相関（校区レベル）

情緒 受領 提供	サポート 「あり」		政治 関係		業界・ 同業者 団体		宗教 関係		町内会 自治会		老人 クラブ		垂直型 組織 ＊1		ボラン ティア		スporte r		趣味 の会		水平型 組織 ＊2		友人 と会う	
	年 数 回 以 上	月 1 ～ 2 回 以 上																						
	提 供	受 領	提 供	受 領																				
前期 高 齢 者	生活機能低下		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	運動機能低下		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	低栄養		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	x
	認知機能低下		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	閉じこもり		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	残歯数20本未満		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	転倒経験あり		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	GDS平均点		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
後期 高 齢 者	生活機能低下		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	運動機能低下		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	x
	低栄養		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	x
	認知機能低下		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	閉じこもり		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	残歯数20本未満		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	
	転倒経験あり		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	xx
	GDS平均点		x x x x		x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x		x x x x x x x x x	

■ p&lt;0.05 r≥0.3(健康にとって良い関連)

△ p&lt;0.05 r&lt;0.3(健康にとって良い関連)

○ p&lt;0.1 r不問(健康にとって悪い関連)


× p&gt;0.1 r不問(健康によって悪い関連)

×× p&lt;0.05 r不問(健康によって悪い関連)

\*1 政治関係、業界・同業者団体、宗教関係、町内会・自治会、老人クラブの5つの組織

\*2 ボランティアグループ、スポーツ組織、趣味の会の3つの組織

近藤克則 (2013c)



スポーツ関係のグループやクラブへの参加者割合

(月1回以上) 注: 本図は①単身高齢者割合、②高齢者有業率、③最終学歴「小・中学校以下」の高齢者割合、④課税対象所得で調整した偏残差プロット図である。①～③については当該保険者の前期高齢者における割合、④については当該保険者全体の割合である。

図7 要介護認定率と地域組織への参加

も参加している者の方が、参加していない者よりも健康を保っていた。

要介護認定率についても、単身高齢者割合など

を調整後にも、前期高齢者においてスポーツの会・趣味の会参加割合の高い保険者ほど、認定率は低いことを確認した（図7）（伊藤・近藤、2013）。

②意図的な介入で組織参加や社会的サポートは増やせるかを検証するためには、地域介入研究が必要となる。そこで、武豊町で「憩いのサロン」事業を導入し、その前後にデータを収集して、地域介入プログラム評価研究を行った。その結果、介入後に社会的サポート（竹田他, 2009）や地域組織への参加（近藤他, 2010）が増え、健康情報の入手源となっていること（大浦他, 2013）を確認できた。

③地域介入に伴って健康指標の改善が見られるのかについては、逆の因果など内生性を排除する操作変数法を用いても、サロン参加者において主観的健康感が良い者が2.5倍多いことを検証した（Ichida et al., 2013）（相田論文参照）。

## 5. 考察

本研究は、介護予防領域において、エビデンスに基づく政策・実践（EBP：Evidence Based Policy & Practice）を目指して、1) 介護保険者と研究者との共同研究の仕組み、2) 地域診断から効果評価まで「見える化」によるマネジメントに活用できるベンチマーク・システム、3) 先行研究レビューや実証研究によって妥当性のあるベンチマーク指標群などを開発することを目的としたものであった。

### (1) 行政と研究者の共同の仕組みづくりの意義

従来からその必要性は認識されていたにもかかわらずEBPに必要な行政と研究者が共同する仕組みや基盤となるデータベース構築は、散発例に留まっていた。その実現に必要なデジタル化された情報が介護保険者の手元にあり、潜在的に大きな価値を持つデータの活用を研究者は望んでいたにもかかわらず進んで来なかった。その理由は、行政、研究者の両方にあったと考えられる。

行政は、大規模データを持っていたが厳重な個人情報保護を求められ、手間のかかる手続きをとっても縦断研究が必要であることを担当者が

ようやく理解した頃、部署を移動してしまうため共同研究は持続しなかった。一方、研究者の側にも原因はある。複数の市町村職員から「研究者はデータを持っていくが、よく分からない報告書を返してくれるだけで、行政上あまり役だった覚えがない」というような声を聞いた。これでは、担当職員が手間やリスクを伴う個人情報保護審査委員会や上司の説得などに取り組む気にならなくても不思議はない。また学界では、緻密な分析に基づく普遍性を追求した研究が高く評価される文化があり、ある市町村における（普遍性が担保されない）、交絡要因に関わる十分な情報のない行政データを用いたプログラム評価研究やプログラム開発研究への評価は低いきらいがある。プログラム／政策評価研究は、米国などではテキストの改訂が重ねられていること（Rossi et al., 2005）と比較すると、日本ではごく一部の研究者が取り組んでいるに過ぎず、大学院などにおける系統的な研究者育成もあまり行われていない。

しかし今後は、日本でもEBPの文化が育ち、行政施策やプログラム評価研究が普及していくことが望まれる。その上で、今回の研究のように、介護保険者（行政）が取り組む介護保険事業計画策定のための調査に研究者が協力して、共同して調査研究を進める仕組みとその成果を共有する経験を積み重ねていくことが必要と思われる。

### (2) データベースとベンチマーク・システム開発の意義

個人情報を保護した上で、日常生活圏域ニーズ調査データや要介護認定、保険料賦課データなど、複数の行政データと独自調査項目のデータを個票レベルで結合した大規模なデータベースの意義は大きい。質の高い縦断研究が可能となるほか、従来は対照群が得られないために効果の検証ができなかった準実験的なプログラム・政策評価研究のデータ基盤となる。そのデータを活用した優れたベンチマーク・システムを開発できれば、①自治

体間や②小地域（日常生活圏域や校区など）間の格差の「見える化」で、自らの長所を把握できると共に重点課題を設定できる、また③成績の良い保険者や小地域の特徴などに学んで、状況改善のための手がかりを得ることができる。さらに④やり方を改善した後の調査データもプールしてパネルデータにできれば、他保険者や小地域を対照群にすることで、介入による変化や効果を検証し、より強固な因果推論が可能となる。⑤効果が見られれば、費用対効果も比較検証して、3E（効果effectiveness、効率efficiency、公正equity）に優れたプログラムや政策マネジメントが期待できる。

本研究では、このような可能性を持つデータ収集の方法論や介護政策のための総合的なベンチマーク・システムの1つのプロトタイプを開発できたと考える。

### (3) ベンチマーク指標の妥当性の検証

介護予防政策のベンチマーク指標には、その指標によって将来の要介護リスクや保護的な要因を予測できること（予測妥当性）や、捉えるべき内容を捉えていること（内容的妥当性）が求められる。例えば、健康と関連があるソーシャル・キャピタル関連指標として地域組織への参加率などを指標として用いるためには、それが高い保険者で要介護認定率が低いことを確認する必要がある。そこで地域組織への参加率と要介護リスクや要介護認定率との関連を検証したところ、表2に示すように、そのような関連は一部の組織参加においてのみ見られ、地域組織の種類によって、参加割合が高いほど、その保険者や校区の要介護リスク者割合が低いとは限らないことも明らかになった（伊藤・近藤、2013；近藤、2013a, c）。ただし、これは地域相関分析の結果であり、個人レベルで縦断分析をすると、いずれも参加している者が、参加していない者よりも健康を保っていた。つまり、生態学的錯謬（ecological fallacy）と呼ばれる現象である。逆に、個人レベルでの分析だ

けでは個人主義的錯謬（individualistic fallacy、個人レベルの変数間の関連からグループレベルの関連を誤って推論すること）（市田、2007）と呼ばれる現象があることも知られている。これら二つの錯謬を避けるためには、地域・人口集団レベルの要因と個人レベルの要因の両者を同時に考慮して要介護リスクとの関連を検討するマルチレベル分析を用いた分析で、指標群の妥当性を検証することの重要性が確認された。

### (4) 今後の課題

ベンチマークによる「見える化」システムの開発・改良・活用に関わって、多くの課題が見えてきた。①持続可能な共同研究体制づくり、②データ入手手段階、③指標づくりと検証、④表示の仕方、⑤活用される条件づくりなどについて次のような課題が残されている。

①共同研究体制づくりでは、プログラム評価研究・行政評価研究を担える（意志がある）研究者と評価研究に努力・協力しEBPを志向する行政職を育成できる場が必要である。日本社会にEBP文化の定着を望む研究者・行政職などのネットワークが期待される。また保険者の行政ニーズに応える分析やデータ構築と保守管理には、ポスドクなどの人材とノウハウの蓄積が不可欠である。現在の短期間の研究助成による任期制の雇用形態では、いつ貴重な蓄積が失われるかわからない。EBPの共通基盤として安定的な研究資金と研究組織が望まれる。

②データ入手手段階では、JAGES 2010-11年度調査の回収率は66.3%で、この種の調査としては低くはない。しかし、それでも3分の1の高齢者の状態は把握できていない。無回答者に要介護リスク者が多いことが分かっているため（平井他、2012）、一部の保険者で取り組まれているように、無回答者への訪問調査などによってハイリスク者の早期発見と高い回収率のデータ蓄積が望まれる。一方、大都市部では、郵送調査だけでも全数

を対象にすることは難しいと思われ、地域診断に必要なサンプリング抽出率などに関する検討が必要である。また縦断（コホート・パネル）調査への協力が得られるよう、その重要性が広く受け入れられるような行政職や市民向けの教育も必要と思われる。

③指標づくりと検証では、用いられる指標数が少なすぎれば、全体像が見えず、背景要因の分析には不十分となる。一方で、「多すぎるとどこから見て良いか分からぬ」などの保険者担当者の声があった。今回試みたようなコア指標と推奨指標、参考指標など、指標に階層構造を持たせる必要がある。また、多数の指標を作るのは簡単だが、上述した以外にも今回対象ではなかった市町村においても同じような関連が見られるのか（外的妥当性）などの検証などを進め、妥当性の高い指標を選択し、指標間の因果関係も検証していく必要がある。さらに海外に例があるように、時間とともに達成率が高くなるなどの状況変化に伴って指標の見直しも必要である。

④結果の表示の仕方では、はじめはコア指標のみで課題を設定し、その後、その要因分析につながるような、より多くの指標をすぐに見られるようなシステムの開発が必要と思われる。GISやシグナル表示で視覚的に比較できるのは有効と思われたが、その時重要なのは、背景要因が似ている保険者同士で比較することである。今回は、高齢化率が同等の保険者同士で比較できるフィルター機能をつけた。今後、人口密度（都市度）や経済状況などの指標でも類似した自治体同士を選んで比較できるフィルター機能の拡充など、さらに改善の余地はあると思われた。

⑤活用される条件づくりでは、保険者担当者が実際の政策のマネジメントにベンチマーク・システムを使えるようにするために、システムの改善だけでなく、保険者担当者に対する支援が必要と思われる。具体的にはWebGIS操作法についての実演講習会やシステムを活用した地域診断と

次予防に着目した政策立案の支援である。効果検証にシステムを使う前提是、効果が期待される介護予防活動が行われていることである。参照できるGood Practice事例の収集や、住民を巻き込むためのワークショップができるファシリテーター養成なども必要になると思われる。

## 6. 結論

効果的・効率的で公正な介護政策のための総合的なベンチマーク・システムのプロトタイプとして、要介護認定を受けていない高齢者における要介護リスクとソーシャル・キャピタル関連指標について、市町村や校区間で比較（ベンチマーク）した結果をインターネット上で「見える化」するシステムを開発した。共同研究体制の組織の仕方や、指標群の枠組み、10万人規模のデータ収集の方法、指標群の妥当性の検証プロセスなども含め、本研究の概要を紹介した。考察では、このシステムによって、（1）多保険者・日常生活圏域間比較による課題把握、（2）関連する要因の解明による手がかりの入手、（3）比較対照を用いた経年変化で効果検証などを進められる可能性と多くの課題を検討した。

2013年6月の閣議決定に「介護・医療関連情報の『見える化』の推進」が盛り込まれた。「見える化」が導入された他国で見られたように、おそらく理念・理論レベル、指標の枠組みレベル、個別指標レベルにおける学術的な批判が加えられるだろう（近藤、2012）。それに加えて、煩雑さや混乱、それを上回る実用性はあるのかなど現場からの不満や市民からの個人情報保護への不安の声なども上がるだろう。

一方で、ビジネスの世界でビッグデータ活用が進みはじめている。不安の声がある一方で、その利便性から徐々に受け入れられつつあるように見える。介護保険をはじめ社会保障政策の領域でも、個人情報を保護した上で行政の持つデータを活用できるようになれば、大きな可能性がある。小論

で述べた多くの課題を一つずつ克服して、効果的・効率的で、公正でもある政策の立案や推進のためには有用なベンチマークによる「見える化」システムの開発と改善・活用が進むことが期待される。

### 謝辞

本研究は、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(文部科学省)並びに科学研究費補助金(22330172, 22390400, 23243070, 23590786, 23790710, 24390469, 24530698, 24653150, 24683018, 25253052, 25870573, 25870881), 厚生労働科学研究費補助金(H22-長寿-指定-008, H24-循環器等(生習)-一般-007, H24-地球規模-一般-009, H24-長寿-若手-009, H25-健危-若手-015, H26-医療-指定-003(復興), H25-長寿-一般-003), 長寿医療研究開発費(No: 24-17; 研究代表者: 村田千代栄, No: 24-23; 研究代表者: 斎藤 民)などの助成を受けたJAGES(Japan Gerontological Evaluation Study, 日本老年学的評価研究)プロジェクトの研究成果である。記して深謝します。

### 文献

- Aida J, Kondo K, Hirai H et al. (2011) "Assessing the Association Between All-cause Mortality and Multiple Aspects of Individual Social Capital among the Older Japanese," *BMC Public Health.* 11 : 499.
- Aida J, Kondo K, Hirai H et al. (2011) "Association Between Dental Status and Incident Disability in an Older Japanese Population," *Journal of the American Geriatrics Society.* 60 (2) : 338-343.
- Aida J, Kondo K, Kawachi I et al. (2013) "Does Social Capital Affect the Incidence of Functional Disability in Older Japanese? A Prospective Population-based Cohort Study," *Journal of Epidemiology and Community Health.* 67 (1) : 42-47.
- Hanibuchi T, Kawachi I, Nakaya T et al. (2011) "Neighborhood Built Environment and Physical Activity of Japanese Older Adults: Results from the Aichi Gerontological Evaluation Study (AGES)," *BMC Public Health.* 11 : 657.
- Hirai H, Kondo K and Kawachi I (2012) "Social Determinants of Active Aging: Differences in Mortality and the Loss of Healthy Life between Different Income Levels among Older Japanese in the AGES Cohort Study," *Current Gerontology and Geriatrics Research.* 2012 : 9.
- Ichida Y, Hirai H, Kondo K et al. (2013) "Does Social Participation Improve Self-rated Health in the Older Population? A Quasi-experimental Intervention Study," *Social Science & Medicine.* 94 : 83-90.
- Kanamori S, Kai Y, Kondo K et al. (2012) "Participation in Sports Organizations and the Prevention of Functional Disability in Older Japanese: The AGES Cohort Study," *PLoS One.* 7 (11) : e51061.
- Kondo N, Kawachi I, Hirai H et al. (2009) "Relative Deprivation and Incident Functional Disability among Older Japanese Women and Men: Prospective Cohort Study," *Journal of Epidemiology and Community Health.* 63 (6) : 461-467.
- Nishi A, Kondo K, Hirai H et al. (2011) "Cohort Profile: The AGES 2003 Cohort Study in Aichi, Japan" *Journal of Epidemiology.* 21 (2) : 151-157.
- Rossi PH, Freeman HE and Lipsey MW (2005) *Evaluation: A Systematic Approach.* Sage Publications.
- Saito M, Kondo N, Kondo K et al. (2012) "Gender Differences on the Impacts of Social Exclusion on Mortality among Older Japanese: AGES Cohort Study," *Social Science & Medicine.* 75 (5) : 940-945.
- Takagi D, Kondo K and Kawachi I (2013) "Social Participation and Mental Health: Moderating Effects of Gender, Social Role and Rurality," *BMC Public Health.* 13 (1) : 701.
- The Centers for Medicare & Medicaid Services. Hospital Compare. Medicare.gov. <<http://www.medicare.gov/hospitalcompare/search.html>> Accessed January 4, 2014.
- Yamamoto T, Kondo K, Hirai H et al. (2012) "Association Between Self-Reported Dental Health Status and Onset of Dementia: A 4-Year Prospective Cohort Study of Older Japanese Adults from the Aichi Gerontological Evaluation Study (AGES) Project," *Psychosomatic Medicine.* 74 (3) : 241-248.
- Yamamoto T, Kondo K, Misawa J et al. (2012) *Dental Status and Incident Falls among Older Japanese: A Prospective Cohort Study.* London : BMJ.
- 池崎澄江(2012)「アメリカのナーシングホームにおけるケアの質の管理」『季刊社会保障研究』48(2) : 165-174
- 市田行信(2007)「4つの錯誤」近藤克則『検証「健康格差社会」—介護予防に向けた社会疫学的大規模調査』116-119, 医学書院
- 伊藤大介, 近藤克則(2013)「要支援・介護認定率とソーシャル・キャピタル指標としての地域組織への参加割合の関連—JAGESプロジェクトによる介護保険者単位の分析—」『社会福祉学』54(2) : 56-69
- 医療の質に基づく支払い研究会(2007)『P4Pのすべて—医療の質に対する支払い方式とは』医療タイムス社

健康格差と健康の社会的決定要因の「見える化」—JAGES 2010-11プロジェクト

- 大浦智子, 竹田徳則, 近藤克則 他 (2013) 「「憩いのサロン」参加者の健康情報源と情報の授受：サロンは情報の授受の場になっているか？」『保健師ジャーナル』69(9) : 7
- 厚生労働科学研究班 (研究代表者 近藤克則) (2013) 長寿科学総合研究事業「介護保険の総合的政策評価 ベンチマークシステムの開発」報告書 (H22-長寿-指定-008)
- 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会、次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会 (2012) 「健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料」厚生労働省
- 厚生労働大臣 (小宮山洋子) (2012) 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るために基本的な方針」厚生労働省
- 近藤克則 (2004) 『「医療費抑制の時代」をこえて—イギリスの医療・福祉政策』医学書院
- 近藤克則, 平井寛, 竹田徳則 他 (2010) 「ソーシャル・キャピタルと健康」『行動計量学』37 : 27-37
- 近藤克則 (2012) 『「医療クライシス」を超えて—イギリスと日本の医療・介護のゆくえ』医学書院
- 近藤克則, 芦田登代, 平井寛 他 (2012) 「高齢者における所得・教育年数別の死亡・要介護認定率とその性差—AGESプロジェクト縦断研究ー」『医療と社会』22(1) : 19-30
- 近藤克則 (2013a) 「ソーシャル・キャピタルと高齢者の健康」イチロー・カワチ, 等々力英美編『ソーシャル・キャピタルと地域の力』日本評論社
- 近藤克則 (編) (2013b) 『健康の社会的決定要因 疾患・状態別「健康格差」レビュー』日本公衆衛生協会
- 近藤克則 (2013c) 「公衆衛生における地域の力(ソーシャル・キャピタル)の醸成支援」『保健師ジャーナル』69(4) : 252-259
- 近藤尚己, 近藤克則, 横道洋司 他 (2012) 「高齢者における所得の相対的剥奪と死亡リスク—AGES追跡研究ー」『医療と社会』22(1) : 91-101
- 斎藤雅茂, 近藤克則, 尾島俊之 他 (2013) 「高齢者の生活に満足した社会的孤立と健康寿命喪失との関連； AGESプロジェクト4年間コホート研究より」『老年社会科学』35(3) : 331-341
- 澤田如, 近藤克則 (2007) 「米国のナーシングホームにおけるケアの質マネジメントシステム 文献レビューと現場経験をもとに」『病院管理』44(3) : 293-302
- 社会保障審議会介護保険部会 (2013) 「資料1 生活支援、介護予防等について」社会保障審議会 介護保険部会 (第47回 平成25年9月4日) 厚生労働省
- 竹田徳則, 近藤克則, 平井寛 他 (2007) 「地域在住高齢者の認知症発症と心理・社会的側面との関連」『作業療法』26 : 55-65, (訂正記事『作業療法』27(2) : 212, 2008に掲載)
- 竹田徳則, 近藤克則, 平井寛 (2009) 「心理社会的因素に着目した認知症予防のための介入研究—ポビュレーション戦略に基づく介入プログラム理論と中間アウトカム評価ー」『作業療法』28(2) : 178-186
- 竹田徳則, 近藤克則, 平井寛 (2010) 「地域在住高齢者における認知症を伴う要介護認定の心理社会的危険因子—AGES プロジェクト3年間のコホート研究」『日本公衆衛生雑誌』57(12) : 1054-1065
- 鄭丞媛, 井上祐介 (2012) 「質に基づく支払い (Pay for performance : P4P) の動向と今後のあり方」『季刊社会保障研究』48(2) : 186-196
- 日本福祉大学健康社会研究センター (2011) 「介護予防 Webアトラス」<<http://www.doctoral.co.jp/WebAtlas/>>2014年1月4日アクセス
- 平井寛, 近藤克則, 尾島俊之 他 (2009) 「地域在住高齢者の要介護認定のリスク要因の検討—AGES プロジェクト3年間の追跡研究」『日本公衆衛生雑誌』56(8) : 501-512
- 山田実, 松本大輔, 林尊弘 他 (2012) 「転倒の少ない市町はあるか：AGESプロジェクト」「厚生の指標』59(8) : 1-7
- 連絡先 近藤克則  
BZH12275@nifty.ne.jp

## Visualization of Health Inequalities and Social Determinants of Health —JAGES 2010-11 Project

Katsunori Kondo<sup>1)</sup>, JAGES Project

### Abstract

Health Japan 21 (Stage 2) aims to reduce health inequalities, improve the social environment including social capital (social cohesion) and promote a shift to community development based on community diagnosis, even for the prevention of functional decline. However, Japan is behind Western countries regarding visualization.

Here we outline the Japan Gerontological Evaluation Study (JAGES) project funded by the Ministry of Health, Labour and Welfare Grant-in-Aids for Scientific Research etc. to address these issues and discuss potentials and challenges for increasing visualization.

First, JAGES determined the importance of benchmarks and their limitations and challenges based on a literature review, established a scheme for benchmarks in policy evaluation and indicator selection criteria and determined risks and protective factors of incident functional disability. Next, a collaborative study with 31 municipalities around Japan was conducted to build a database of over 100,000 older adults who were ineligible for long-term care, compile indicators and develop a benchmark system for providing feedback to insurers. Analyses were performed on the appropriateness of indicators based on risk factors or protective factors clarified in longitudinal studies and community intervention studies.

We discuss the framework for government-researcher collaboration, the multidimensional significance of developing a database and benchmark system and future challenges such as testing the appropriateness of benchmarks, the potential and challenges for developing a prototype comprehensive benchmark system for effective, efficient and equitable long-term care policies based on visualization of health inequalities and social determinants of health and use of big data in the field of social security.

**Keywords :** Visualization, Benchmark, Care prevention, Inequalities in health, Social capital

<sup>1)</sup> Center for Preventive Medical Science, Chiba University

## 特集論文

## Urban HEARTの枠組みを活用した 介護予防ベンチマーク指標の開発

尾島 傑之<sup>1)</sup>, JAGESプロジェクト

人口が高齢化し、要介護高齢者が増加する中、効果的な介護予防対策を推進していく必要がある。そのためには、要介護に関連する要因等に関する見える化を進めることができると考えられる。そこで、地域で活用できる介護予防ベンチマーク指標を開発することがこの研究の目的である。まず、評価指標の枠組みを検討し、指標の候補を作成した。次に、良い指標の評価基準を作成し、多数の指標の候補から、コア指標と推薦指標を選定した。また、年齢の交絡への対応方法を検討した。そして、実際に全国の31地域についての評価を行った。評価指標の枠組みについて検討した結果、5要素と2側面による独自に作成した分類と、世界保健機関（WHO）によるUrban HEARTの枠組みを活用することとした。それらの枠組みで指標の候補を列挙し、249の指標の候補が作成された。良い指標の評価基準を検討し、正確性、内容的代表性、社会的受容性、学術的重要性、介入可能性、入手容易性の6つを採用することとした。交絡への対応については、限定、層化、直接法年齢調整、間接法年齢調整、ペイズ推定値（間接法年齢調整）、多変量解析、回帰分析の残差等を検討した結果、自治体の事務職員等へのわかりやすさを重視して層化を原則として採用することとした。各指標について評価を行い、22個のコア指標と、18個の推薦指標が選定され、それを用いた評価を行った。今後、開発されたベンチマーク指標による評価結果を用いて、対応戦略の特定を進めていく必要がある。

キーワード 介護予防、ベンチマーク、Urban HEART

### 1. 背景と目的

日本では、他の先進諸国にも増して急速に人口の高齢化が進行しており、そのために、要介護高齢者が増加しており、効果的な介護予防対策を推進していく必要がある。対策の政策形成を加速させ、科学的な対応が行われるようにするために、要介護に関連する要因等に関する見える化を進めることが必要であると考えられる。折しも、世界保健機関（WHO）がUrban HEART（Urban Health Equity Assessment and Response Tool、都市に

おける健康の公平性評価・対応ツール）を開発していた。そこで、Urban HEARTの枠組みを活用して、地域で活用できる介護予防ベンチマーク指標を開発することがこの研究の目的である。

### 2. 方法

研究の開始にあたって、まず評価指標の枠組みを独自に作成した。一方で、世界保健機関（WHO）が開発したUrban HEARTにおいては、健康アウトカム（総合指標、疾病別の死亡率／罹患率）、健康の社会的決定要因（物理的環境とインフラ、社会・人間開発、経済、ガバナンス（健康管理政策））という指標区分が使用されているため、こ

<sup>1)</sup>浜松医科大学健康社会医学講座