

有、問題点の把握、問題発生時の対処法など綿密な打ち合わせ。

②自殺リスクが高まった場合に、病態に応じた相談先の確立と、一時避難的な保護や入院などが可能となるような準備。

③何よりも専門的なケースマネージャーの養成のための教育システムの確立と、その人員の充足。

それぞれ、今までの行政を含むリソースを利用するだけでは弾力的かつ迅速な対処は十分ではないので、その受け皿の充実を、時間がかかっても確実に進めていく必要がある。さらに、今後クリニカルパスのブラッシュアップとともに、PEECコースを基本形として、自殺未遂者に症例を絞ったPEEC自殺未遂者ケアコースを開発し、ファシリテーターの養成など喫緊の課題に取り組

む必要がある。

### 参考文献

- 1) 多職種連携クリニカルパスの開発に向けて。平成24年度厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業(精神障害分野))研究報告書(主任研究者:伊藤弘人)。2013
- 2) 「自殺未遂者への対応:救急外来(ER)・救急科・救命救急センターのスタッフのための手引き」作成班:自殺未遂者への対応—救急外来(ER)・救急科・救命救急センターのスタッフのための手引き—。日本臨床救急医学会, 2009
- 3) 日本臨床救急医学会監修:PEECガイドブック。へるす出版, 東京, 2012
- 4) 大塚耕太郎, 河西千秋, 岸 泰宏他:来院した自殺未遂患者へのケアQ&A—実践編2011—。日本臨床救急医学会, 2011

### abstract

#### Significance of the Use of Clinical Pass for the Attempted Suicide Patients in the Daily Life

Yasufumi Miyake<sup>1,2)</sup>

Previous history of attempted suicide is known as one of the crucial risk factors of death from suicide. A large proportion of these patients has required hospitalization to level I trauma centers for longstanding physical and mental treatment. After the termination of physical problems, they routinely need many kinds of supports such as in mental disease state, in relationship with their family, in employment opportunity and in economical destitution. It's very important that expert psychological social workers or clinical psychologists as the case managers continuously take care of them to maintain their satisfactory mental and physical conditions after hospitalization.

We developed a new type of clinical pass thought to be very useful to put all information about the patients' daily life conditions together and build up a closer cooperation with every participant. The prolonged use of this prototype will contribute strongly to improve the patients' daily psychic symptoms and reduce major life stressors.

Not only on-the-job training but off-the-job training for the case managers will be another clue to the successful prevention of suicidal attempt in the daily life.

*Jpn Bull Soc Psychiat 22:163-169, 2013*

<sup>1)</sup> Department of Emergency and Critical Care Medicine, Showa University School of Medicine / Showa University Hospital Emergency Medical Center

<sup>2)</sup> Advisory Committee for the Care of Attempted Suicide Patients, Japanese Society for Emergency Medicine

