

図表168 12.衣類を破る・脱ぐ(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 12.衣類を破る・脱ぐ (op)	なし	132	91.0%	109	85.8%	241	88.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	8	5.5%	9	7.1%	17	6.3%
	月に1~2回程度	3	2.1%	3	2.4%	6	2.2%
	週に1回程度	1	.7%	2	1.6%	3	1.1%
	週に2~3回	1	.7%	2	1.6%	3	1.1%
	ほぼ毎日	0	.0%	2	1.6%	2	.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表169 13.収集癖(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 13.収集癖(op)	なし	128	88.3%	121	95.3%	249	91.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	8	5.5%	4	3.1%	12	4.4%
	月に1~2回程度	4	2.8%	0	.0%	4	1.5%
	週に1回程度	1	.7%	0	.0%	1	.4%
	週に2~3回	1	.7%	2	1.6%	3	1.1%
	ほぼ毎日	3	2.1%	0	.0%	3	1.1%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表170 14.てんかん発作(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 14.てんかん発作(op)	なし	136	93.8%	122	96.1%	258	94.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	6	4.1%	5	3.9%	11	4.0%
	月に1~2回程度	1	.7%	0	.0%	1	.4%
	週に1回程度	2	1.4%	0	.0%	2	.7%
	週に2~3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表171 15.気分易変性(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 15.気分易変性(op)	なし	34	23.4%	35	27.6%	69	25.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	27	18.6%	28	22.0%	55	20.2%
	月に1~2回程度	28	19.3%	17	13.4%	45	16.5%
	週に1回程度	22	15.2%	13	10.2%	35	12.9%
	週に2~3回	14	9.7%	20	15.7%	34	12.5%
	ほぼ毎日	20	13.8%	14	11.0%	34	12.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表172 16.集中力低下(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 16.集中力低下(op)	なし	37	25.5%	33	26.0%	70	25.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	20	13.8%	25	19.7%	45	16.5%
	月に1~2回程度	21	14.5%	11	8.7%	32	11.8%
	週に1回程度	15	10.3%	15	11.8%	30	11.0%
	週に2~3回	19	13.1%	19	15.0%	38	14.0%
	ほぼ毎日	33	22.8%	24	18.9%	57	21.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表173 17.特定の物や人に対する強いこだわり(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 17.特定の物や人に対する強いこだわり(op)	なし	47	32.4%	63	49.6%	110	40.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	15	10.3%	15	11.8%	30	11.0%
	月に1～2回程度	14	9.7%	10	7.9%	24	8.8%
	週に1回程度	15	10.3%	15	11.8%	30	11.0%
	週に2～3回	20	13.8%	12	9.4%	32	11.8%
	ほぼ毎日	34	23.4%	12	9.4%	46	16.9%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表174 18.ストレス脆弱性(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 18.ストレス脆弱性(op)	なし	33	22.8%	27	21.3%	60	22.1%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	19	13.1%	30	23.6%	49	18.0%
	月に1～2回程度	14	9.7%	14	11.0%	28	10.3%
	週に1回程度	21	14.5%	10	7.9%	31	11.4%
	週に2～3回	21	14.5%	18	14.2%	39	14.3%
	ほぼ毎日	37	25.5%	28	22.0%	65	23.9%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表175 19.服薬非遵守(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 19.服薬非遵守(op)	なし	74	51.0%	67	52.8%	141	51.8%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	28	19.3%	32	25.2%	60	22.1%
	月に1～2回程度	17	11.7%	8	6.3%	25	9.2%
	週に1回程度	5	3.4%	8	6.3%	13	4.8%
	週に2～3回	12	8.3%	6	4.7%	18	6.6%
	ほぼ毎日	9	6.2%	6	4.7%	15	5.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表176 20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為(op)	なし	69	47.6%	73	57.5%	142	52.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	23	15.9%	26	20.5%	49	18.0%
	月に1～2回程度	17	11.7%	11	8.7%	28	10.3%
	週に1回程度	16	11.0%	6	4.7%	22	8.1%
	週に2～3回	11	7.6%	7	5.5%	18	6.6%
	ほぼ毎日	9	6.2%	4	3.1%	13	4.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表177 21.徘徊(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 21.徘徊(op)	なし	110	75.9%	90	70.9%	200	73.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	9	6.2%	20	15.7%	29	10.7%
	月に1～2回程度	4	2.8%	5	3.9%	9	3.3%
	週に1回程度	3	2.1%	3	2.4%	6	2.2%
	週に2～3回	10	6.9%	5	3.9%	15	5.5%
	ほぼ毎日	9	6.2%	4	3.1%	13	4.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表178 22.多動・行動の停止(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 22.多動・行動の停止 (op)	なし	94	64.8%	76	59.8%	170	62.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	13	9.0%	19	15.0%	32	11.8%
	月に1~2回程度	17	11.7%	10	7.9%	27	9.9%
	週に1回程度	6	4.1%	9	7.1%	15	5.5%
	週に2~3回	8	5.5%	5	3.9%	13	4.8%
	ほぼ毎日	7	4.8%	8	6.3%	15	5.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表179 23.強迫行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 23.強迫行為(op)	なし	114	78.6%	99	78.0%	213	78.3%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	11	7.6%	10	7.9%	21	7.7%
	月に1~2回程度	5	3.4%	5	3.9%	10	3.7%
	週に1回程度	4	2.8%	4	3.1%	8	2.9%
	週に2~3回	6	4.1%	4	3.1%	10	3.7%
	ほぼ毎日	5	3.4%	5	3.9%	10	3.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表180 24.過食・拒食(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 24.過食・拒食(op)	なし	110	75.9%	96	75.6%	206	75.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	13	9.0%	17	13.4%	30	11.0%
	月に1~2回程度	10	6.9%	5	3.9%	15	5.5%
	週に1回程度	3	2.1%	0	.0%	3	1.1%
	週に2~3回	3	2.1%	2	1.6%	5	1.8%
	ほぼ毎日	6	4.1%	7	5.5%	13	4.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表181 25.多飲水(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 25.多飲水(op)	なし	120	82.8%	110	86.6%	230	84.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	4	2.8%	9	7.1%	13	4.8%
	月に1~2回程度	7	4.8%	2	1.6%	9	3.3%
	週に1回程度	4	2.8%	0	.0%	4	1.5%
	週に2~3回	4	2.8%	2	1.6%	6	2.2%
	ほぼ毎日	6	4.1%	4	3.1%	10	3.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表182 26.異食(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 26.異食(op)	なし	143	98.6%	124	97.6%	267	98.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	1	.7%	1	.8%	2	.7%
	月に1~2回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に1回程度	1	.7%	0	.0%	1	.4%
	週に2~3回	0	.0%	1	.8%	1	.4%
	ほぼ毎日	0	.0%	1	.8%	1	.4%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表183 27.物質依存(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(1) 27.物質依存(op)	なし	121	83.4%	108	85.0%	229	84.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	12	8.3%	10	7.9%	22	8.1%
	月に1~2回程度	1	.7%	2	1.6%	3	1.1%
	週に1回程度	3	2.1%	0	.0%	3	1.1%
	週に2~3回	1	.7%	0	.0%	1	.4%
	ほぼ毎日	7	4.8%	7	5.5%	14	5.1%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表184 予測される症状・問題行動(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問17-(2) 予測される症状・問題行動(op)	1.自殺念慮(op) [問17-(2)]	28	19.3%	37	29.1%	65	23.9%
	2.自傷行為(op) [問17-(2)]	25	17.2%	21	16.5%	46	16.9%
	3.言語的暴力(op) [問17-(2)]	58	40.0%	39	30.7%	97	35.7%
	4.身体的暴力(op) [問17-(2)]	36	24.8%	22	17.3%	58	21.3%
	5.衝動性(op) [問17-(2)]	86	59.3%	61	48.0%	147	54.0%
	6.器物破壊(op) [問17-(2)]	36	24.8%	26	20.5%	62	22.8%
	7.他者への迷惑行為(op) [問17-(2)]	81	55.9%	49	38.6%	130	47.8%
	8.性的逸脱行為(op) [問17-(2)]	11	7.6%	7	5.5%	18	6.6%
	9.放火(op) [問17-(2)]	4	2.8%	1	.8%	5	1.8%
	10.失禁(op) [問17-(2)]	19	13.1%	14	11.0%	33	12.1%
	11.不潔行為(op) [問17-(2)]	28	19.3%	11	8.7%	39	14.3%
	12.衣類を破る・脱ぐ(op) [問17-(2)]	9	6.2%	8	6.3%	17	6.3%
	13.収集癖(op) [問17-(2)]	9	6.2%	5	3.9%	14	5.1%
	14.てんかん発作(op) [問17-(2)]	7	4.8%	4	3.1%	11	4.0%
	15.気分易変性(op) [問17-(2)]	84	57.9%	76	59.8%	160	58.8%
	16.集中力低下(op) [問17-(2)]	78	53.8%	69	54.3%	147	54.0%
	17.特定の物や人に対する強いこだわり(op) [問17-(2)]	69	47.6%	45	35.4%	114	41.9%
	18.ストレス脆弱性(op) [問17-(2)]	83	57.2%	76	59.8%	159	58.5%
	19.服薬非遵守(op) [問17-(2)]	66	45.5%	56	44.1%	122	44.9%
	20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為(op) [問17-(2)]	53	36.6%	35	27.6%	88	32.4%
	21.徘徊(op) [問17-(2)]	33	22.8%	20	15.7%	53	19.5%
	22.多動・行動の停止(op) [問17-(2)]	33	22.8%	28	22.0%	61	22.4%
	23.強迫行為(op) [問17-(2)]	15	10.3%	12	9.4%	27	9.9%
	24.過食・拒食(op) [問17-(2)]	27	18.6%	22	17.3%	49	18.0%
	25.多飲水(op) [問17-(2)]	23	15.9%	16	12.6%	39	14.3%
	26.異食(op) [問17-(2)]	2	1.4%	1	.8%	3	1.1%
	27.物質依存(op) [問17-(2)]	24	16.6%	17	13.4%	41	15.1%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表185 生活障害評価 食事(op)

	入院後3ヶ月時点						
	opA群		opB群		合計		
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
問18 生活障害評価 食事 (op)	1) 適量の食事を適時にとることができる。	42	29.0%	48	37.8%	90	33.1%
	2) 時に施設からの提供を必要とする場合があるが、1)が だいたい自主的にできる。	26	17.9%	26	20.5%	52	19.1%
	3) 時に助言や援助がなければ、 偏食したり、過食になったり、 不規則になったりする。	38	26.2%	32	25.2%	70	25.7%
	4) いつも同じものばかりを食べ たり、食事内容が極端に貧 しかったり、いつも過食になっ たり、不規則になったりする。 (略)	24	16.6%	11	8.7%	35	12.9%
	5) 常に食事へ目を配っておか ないと不食に陥ったり、偏食、 過食など問題の食行動があ り、健康を害す。	15	10.3%	10	7.9%	25	9.2%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表186 生活障害評価 生活リズム(op)

	入院後3ヶ月時点						
	opA群		opB群		合計		
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
問18 生活障害評価 生活リ ズム(op)	1) 一定の時刻に自分で起き ることができ、自分で時間の過 ごし方を考えて行動できる。	28	19.3%	36	28.3%	64	23.5%
	2) 時に寝過ごすことがある が、だいたい自分なりの生活リ ズムが確立している。(略)	39	26.9%	37	29.1%	76	27.9%
	3) 時に助言がなければ、寝過 ごすが、週に1度を越えて生 活リズムを乱すことがあっても 元に戻る。(略)	46	31.7%	32	25.2%	78	28.7%
	4) 起床が遅く、生活のリズム が週1回を越えて不規則に傾 きがちですぐには元に戻らな い。(略)	24	16.6%	15	11.8%	39	14.3%
	5) 臥床がちで、昼夜逆転した りする。	8	5.5%	7	5.5%	15	5.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表187 生活障害評価 保清(op)

	入院後3ヶ月時点						
	opA群		opB群		合計		
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
問18 生活障害評価 保清 (op)	1) 洗面、整髪、ひげ剃り、入 浴、着替え等を自主的に問題 なく行っている。(略)	26	17.9%	39	30.7%	65	23.9%
	2) 洗面、整髪、ひげ剃り、入 浴、着替え等がある程度自主 的に行っている。(略)	34	23.4%	34	26.8%	68	25.0%
	3) 個人衛生を保つためには、 週1回程度の助言や援助が 必要である。(略)	43	29.7%	27	21.3%	70	25.7%
	4) 個人衛生を保つために、 強い援助や助言を必要とす る。(略)	28	19.3%	18	14.2%	46	16.9%
	5) 助言や援助をしても、個人 衛生を保つことができず、自室 の清掃やかたづけを、助言や 援助をしてもしないか、できな い。	14	9.7%	9	7.1%	23	8.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表188 生活障害評価 金銭管理(op)

	入院後3ヶ月時点					
	opA群		opB群		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
問18 生活障害評価 金銭管理(op)						
1) 1ヵ月程度のやりくりが自分で出来る。また、大切な物を管理できる。	22	15.2%	40	31.5%	62	22.8%
2) 時に月の収入を超える出費をしてしまい、必要な出費を控えたりする。時折大切な物を失くしてしまう。	18	12.4%	22	17.3%	40	14.7%
3) 一週間程度のやりくりはだいたいできるが、時に助言を必要とする。(略)	29	20.0%	23	18.1%	52	19.1%
4) 3~4日に一度手渡して相談する必要がある。大切な物の管理が一人では難しく、強い助言や援助を必要とする。	28	19.3%	26	20.5%	54	19.9%
5) 持っているお金をすぐに使ってしまう。大切な物の管理が自分では出来ない。	48	33.1%	16	12.6%	64	23.5%
合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表189 生活障害評価 服薬管理(op)

	入院後3ヶ月時点					
	opA群		opB群		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
問18 生活障害評価 服薬管理(op)						
1) 薬の必要性を理解しており、適切に自分で管理している。	21	14.5%	31	24.4%	52	19.1%
2) 薬の必要性は理解していないにもかかわらず、時に飲み忘れることもあるが、助言が必要なほどではない。(週に1回以下)	24	16.6%	34	26.8%	58	21.3%
3) 薬の必要性は理解しておらず、時に飲み忘れるので助言を必要とする。(週に2回以上)	30	20.7%	23	18.1%	53	19.5%
4) 飲み忘れや、飲み方を間違えたり、拒薬、大量服薬をすることがしばしばある。(略)	35	24.1%	24	18.9%	59	21.7%
5) 助言や援助をしても服薬しないか、できないため、ケア態勢の中で与薬を行ったり、デボ剤が中心となる。(略)	35	24.1%	15	11.8%	50	18.4%
合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表190 生活障害評価 対人関係(op)

	入院後3ヶ月時点					
	opA群		opB群		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
問18 生活障害評価 対人関係(op)						
1) あいさつや当番などの最低限の近所づきあいが自主的に問題なくできる。(略)	14	9.7%	21	16.5%	35	12.9%
2) 1)が、だいたい自主的にできる。	25	17.2%	29	22.8%	54	19.9%
3) だいたいできるが、時に助言がなければ孤立的になりがち(略)	35	24.1%	45	35.4%	80	29.4%
4) 1)で述べたことがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちとなる。(略)	38	26.2%	20	15.7%	58	21.3%
5) 助言・介入・誘導してもできないか、あるいはしようせず(略)	33	22.8%	12	9.4%	45	16.5%
合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表191 生活障害評価 電話の利用(op)

	入院後3ヶ月時点					
	opA群		opB群		合計	
1) 電話を使うことができ、電話で病状相談したり診察の予約をとったりできる。(略)	31	21.4%	46	36.2%	77	28.3%
2) 電話を使うことができるが、電話を積極的に活用していない。または、病院や支援サービスからの電話に出ないことがある。	36	24.8%	30	23.6%	66	24.3%
3) 電話をだいたい使っているが、相手の都合を考えずに深夜や早朝に電話することがみられたり(略)	23	15.9%	29	22.8%	52	19.1%
4) 必要な場面でも電話をかけることはぐまればあり、病院や支援サービスからの電話にも出られないことが多い。(略)	27	18.6%	11	8.7%	38	14.0%
5) 電話が使えないか、電話を使ったとしても病院や支援サービスからの電話にはほとんど出られない。(略)	28	19.3%	11	8.7%	39	14.3%
合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表192 生活障害評価 買い物(op)

	入院後3ヶ月時点					
	opA群		opB群		合計	
1) 計画的に買い物が行え、(略)	25	17.2%	44	34.6%	69	25.4%
2) 日用品の買い物は行えるが必要なものの購入に抵抗するなど節約のし過ぎが見られたり、浪費の傾向が見られる。	27	18.6%	25	19.7%	52	19.1%
3) 必要のないものを購入したり、適時適量の買い物が行えないため、買い物に関してときに助言や援助が必要となる。	23	15.9%	24	18.9%	47	17.3%
4) 必要のないものを購入したり、適時適量の買い物が行えないため、買い物に関して強い助言や援助を必要とする。(略)	36	24.8%	24	18.9%	60	22.1%
5) 買い物が適切に行えず、または、他人に必要以上のものを買い与えたりしており、助言しても修正できない。(略)	34	23.4%	10	7.9%	44	16.2%
合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表193 生活障害評価 交通手段(op)

	入院後3ヶ月時点					
	opA群		opB群		合計	
1) 必要に応じて、公共交通や自家用車が利用でき、時間通りに移動が行える。	27	18.6%	44	34.6%	71	26.1%
2) 公共交通を利用できるが、所要時間が余計にかかったり、乗り間違いや料金の支払いミス、乗車券紛失などが生じる。(略)	17	11.7%	20	15.7%	37	13.6%
3) 公共交通の利用に関してときに助言や援助が必要となる。(略)	29	20.0%	25	19.7%	54	19.9%
4) 乗り間違いや乗り損ない、乗車券紛失などが多く、公共交通の利用に関して強い助言や援助が必要となる。(略)	27	18.6%	23	18.1%	50	18.4%
5) 乗り間違いや乗り損ない、乗車券紛失が頻発し、助言や指導を行っても公共交通が利用できず(略)	45	31.0%	15	11.8%	60	22.1%
合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表194 日常生活能力(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問19 日常生活能力(op)	精神障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通にできる	4	2.8%	16	12.6%	20	7.4%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に一定の制限を受ける	27	18.6%	34	26.8%	61	22.4%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする	44	30.3%	40	31.5%	84	30.9%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、常時援助を要する	62	42.8%	31	24.4%	93	34.2%
	精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできない	8	5.5%	6	4.7%	14	5.1%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表195 心気症(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 心気症(op)	なし	51	35.2%	34	26.8%	85	31.3%
	ごく軽度	19	13.1%	27	21.3%	46	16.9%
	軽度	25	17.2%	31	24.4%	56	20.6%
	中等度	23	15.9%	18	14.2%	41	15.1%
	やや重度	14	9.7%	9	7.1%	23	8.5%
	重度	11	7.6%	6	4.7%	17	6.3%
	最重度	2	1.4%	2	1.6%	4	1.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表196 不安(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 不安(op)	なし	23	15.9%	12	9.4%	35	12.9%
	ごく軽度	24	16.6%	26	20.5%	50	18.4%
	軽度	25	17.2%	35	27.6%	60	22.1%
	中等度	25	17.2%	26	20.5%	51	18.8%
	やや重度	30	20.7%	19	15.0%	49	18.0%
	重度	12	8.3%	8	6.3%	20	7.4%
	最重度	6	4.1%	1	.8%	7	2.6%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表197 情動的引きこもり(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 情動的引きこもり(op)	なし	21	14.5%	26	20.5%	47	17.3%
	ごく軽度	32	22.1%	27	21.3%	59	21.7%
	軽度	17	11.7%	29	22.8%	46	16.9%
	中等度	34	23.4%	24	18.9%	58	21.3%
	やや重度	18	12.4%	11	8.7%	29	10.7%
	重度	19	13.1%	9	7.1%	28	10.3%
	最重度	4	2.8%	1	.8%	5	1.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表198 概念の統合障害(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 概念の統合障害 (op)	なし	24	16.6%	37	29.1%	61	22.4%
	ごく軽度	26	17.9%	22	17.3%	48	17.6%
	軽度	26	17.9%	28	22.0%	54	19.9%
	中等度	23	15.9%	14	11.0%	37	13.6%
	やや重度	19	13.1%	13	10.2%	32	11.8%
	重度	21	14.5%	10	7.9%	31	11.4%
	最重度	6	4.1%	3	2.4%	9	3.3%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表199 罪責感(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 罪責感(op)	なし	79	54.5%	63	49.6%	142	52.2%
	ごく軽度	31	21.4%	30	23.6%	61	22.4%
	軽度	8	5.5%	19	15.0%	27	9.9%
	中等度	17	11.7%	12	9.4%	29	10.7%
	やや重度	6	4.1%	3	2.4%	9	3.3%
	重度	4	2.8%	0	.0%	4	1.5%
	最重度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表200 緊張(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 緊張(op)	なし	40	27.6%	36	28.3%	76	27.9%
	ごく軽度	25	17.2%	36	28.3%	61	22.4%
	軽度	26	17.9%	26	20.5%	52	19.1%
	中等度	33	22.8%	23	18.1%	56	20.6%
	やや重度	14	9.7%	3	2.4%	17	6.3%
	重度	6	4.1%	3	2.4%	9	3.3%
	最重度	1	.7%	0	.0%	1	.4%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表201 衝動性と不自然な姿勢(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 衝動性と不自然な姿勢(op)	なし	56	38.6%	73	57.5%	129	47.4%
	ごく軽度	19	13.1%	24	18.9%	43	15.8%
	軽度	27	18.6%	12	9.4%	39	14.3%
	中等度	17	11.7%	8	6.3%	25	9.2%
	やや重度	14	9.7%	3	2.4%	17	6.3%
	重度	11	7.6%	6	4.7%	17	6.3%
	最重度	1	.7%	1	.8%	2	.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表202 誇大性(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 誇大性(op)	なし	79	54.5%	82	64.6%	161	59.2%
	ごく軽度	20	13.8%	17	13.4%	37	13.6%
	軽度	14	9.7%	10	7.9%	24	8.8%
	中等度	14	9.7%	10	7.9%	24	8.8%
	やや重度	6	4.1%	2	1.6%	8	2.9%
	重度	8	5.5%	5	3.9%	13	4.8%
	最重度	4	2.8%	1	.8%	5	1.8%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表203 抑うつ気分(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 抑うつ気分(op)	なし	55	37.9%	36	28.3%	91	33.5%
	ごく軽度	29	20.0%	34	26.8%	63	23.2%
	軽度	26	17.9%	32	25.2%	58	21.3%
	中等度	20	13.8%	12	9.4%	32	11.8%
	やや重度	7	4.8%	6	4.7%	13	4.8%
	重度	8	5.5%	5	3.9%	13	4.8%
	最重度	0	.0%	2	1.6%	2	.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表204 敵意(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 敵意(op)	なし	54	37.2%	59	46.5%	113	41.5%
	ごく軽度	26	17.9%	28	22.0%	54	19.9%
	軽度	18	12.4%	11	8.7%	29	10.7%
	中等度	17	11.7%	13	10.2%	30	11.0%
	やや重度	14	9.7%	9	7.1%	23	8.5%
	重度	13	9.0%	6	4.7%	19	7.0%
	最重度	3	2.1%	1	.8%	4	1.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表205 猜疑心(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 猜疑心(op)	なし	44	30.3%	58	45.7%	102	37.5%
	ごく軽度	29	20.0%	19	15.0%	48	17.6%
	軽度	17	11.7%	20	15.7%	37	13.6%
	中等度	24	16.6%	17	13.4%	41	15.1%
	やや重度	5	3.4%	6	4.7%	11	4.0%
	重度	19	13.1%	6	4.7%	25	9.2%
	最重度	7	4.8%	1	.8%	8	2.9%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表206 幻覚による行動(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 幻覚による行動 (op)	なし	64	44.1%	80	63.0%	144	52.9%
	ごく軽度	18	12.4%	13	10.2%	31	11.4%
	軽度	8	5.5%	13	10.2%	21	7.7%
	中等度	18	12.4%	9	7.1%	27	9.9%
	やや重度	8	5.5%	6	4.7%	14	5.1%
	重度	22	15.2%	4	3.1%	26	9.6%
	最重度	7	4.8%	2	1.6%	9	3.3%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表207 運動減退(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 運動減退(op)	なし	45	31.0%	42	33.1%	87	32.0%
	ごく軽度	28	19.3%	30	23.6%	58	21.3%
	軽度	25	17.2%	21	16.5%	46	16.9%
	中等度	20	13.8%	25	19.7%	45	16.5%
	やや重度	16	11.0%	2	1.6%	18	6.6%
	重度	9	6.2%	7	5.5%	16	5.9%
	最重度	2	1.4%	0	0%	2	0.7%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表208 非協調性(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 非協調性(op)	なし	38	26.2%	48	37.8%	86	31.6%
	ごく軽度	25	17.2%	31	24.4%	56	20.6%
	軽度	28	19.3%	14	11.0%	42	15.4%
	中等度	15	10.3%	14	11.0%	29	10.7%
	やや重度	13	9.0%	7	5.5%	20	7.4%
	重度	23	15.9%	9	7.1%	32	11.8%
	最重度	3	2.1%	4	3.1%	7	2.6%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表209 不自然な思考内容(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 不自然な思考内 容(op)	なし	39	26.9%	55	43.3%	94	34.6%
	ごく軽度	18	12.4%	18	14.2%	36	13.2%
	軽度	20	13.8%	14	11.0%	34	12.5%
	中等度	25	17.2%	18	14.2%	43	15.8%
	やや重度	15	10.3%	7	5.5%	22	8.1%
	重度	16	11.0%	11	8.7%	27	9.9%
	最重度	12	8.3%	4	3.1%	16	5.9%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表210 情動の平板化(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 情動の平板化 (op)	なし	40	27.6%	50	39.4%	90	33.1%
	ごく軽度	26	17.9%	25	19.7%	51	18.8%
	軽度	25	17.2%	23	18.1%	48	17.6%
	中等度	23	15.9%	17	13.4%	40	14.7%
	やや重度	19	13.1%	7	5.5%	26	9.6%
	重度	9	6.2%	4	3.1%	13	4.8%
	最重度	3	2.1%	1	.8%	4	1.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表211 興奮(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 興奮(op)	なし	52	35.9%	56	44.1%	108	39.7%
	ごく軽度	28	19.3%	20	15.7%	48	17.6%
	軽度	20	13.8%	21	16.5%	41	15.1%
	中等度	18	12.4%	17	13.4%	35	12.9%
	やや重度	15	10.3%	8	6.3%	23	8.5%
	重度	9	6.2%	4	3.1%	13	4.8%
	最重度	3	2.1%	1	.8%	4	1.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表212 失見当識(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
問20 BPRS 失見当識(op)	なし	82	56.6%	88	69.3%	170	62.5%
	ごく軽度	25	17.2%	25	19.7%	50	18.4%
	軽度	13	9.0%	6	4.7%	19	7.0%
	中等度	15	10.3%	1	.8%	16	5.9%
	やや重度	3	2.1%	2	1.6%	5	1.8%
	重度	4	2.8%	4	3.1%	8	2.9%
	最重度	3	2.1%	1	.8%	4	1.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表213 BPRS 総得点(op)

		BPRS 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後3ヶ月時点	opA群	51.1	19.3	18.0	99.0
	opB群	43.2	16.8	18.0	95.0
	合計	47.4	18.6	18.0	99.0

図表214 BPRS 総得点45点以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRS 総得点45点以上(op)	非該当	58	40.0%	75	59.1%	133	48.9%
	該当	87	60.0%	52	40.9%	139	51.1%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表215 BPRS 6点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRS 6点以上1項目以上(op)	非該当	71	49.0%	87	68.5%	158	58.1%
	該当	74	51.0%	40	31.5%	114	41.9%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表216 BPRSの合計が45以上 または 6点以上の個数が1つ以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRSの合計が45以上 または 6点以上の個数が1つ以上 (op)	非該当	48	33.1%	72	56.7%	120	44.1%
	該当	97	66.9%	55	43.3%	152	55.9%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表217 行動障害 A項目3点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
行動障害 A項目3点以上1項目以上(op)	非該当	72	49.7%	74	58.3%	146	53.7%
	該当	73	50.3%	53	41.7%	126	46.3%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表218 行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上(op)	非該当	132	91.0%	113	89.0%	245	90.1%
	該当	13	9.0%	14	11.0%	27	9.9%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表219 行動障害 A項目他害3点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上(op)	非該当	75	51.7%	80	63.0%	155	57.0%
	該当	70	48.3%	47	37.0%	117	43.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表220 行動障害 B項目3点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
行動障害 B項目3点以上1項目以上(op)	非該当	20	13.8%	33	26.0%	53	19.5%
	該当	125	86.2%	94	74.0%	219	80.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表221 過去入院歴2群 BPRS総得点(op)

		BPRS 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
過去入院歴2群	入院なしおよび1年未満	46.2	17.7	18.0	96.0
	1年以上	48.9	19.6	18.0	99.0
	合計	47.4	18.6	18.0	99.0

図表222 年齢2群 BPRS総得点(op)

		BPRS 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
年齢2群	65歳以上	46.6	17.7	18.0	84.0
	65歳未満	47.7	19.0	18.0	99.0
	合計	47.4	18.6	18.0	99.0

図表223 入院形態2群 BPRS総得点(op)

		BPRS 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院形態2群	医療保護	50.3	18.1	19.0	96.0
	任意	43.8	18.4	18.0	99.0
	合計	47.2	18.5	18.0	99.0

図表224 主診断2群(統合失調症) BPRS総得点(op)

		BPRS 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
主診断2群(統合失調症)	F20 統合失調症	51.9	18.7	18.0	99.0
	F20 統合失調症以外	43.1	17.4	18.0	94.0
	合計	47.4	18.6	18.0	99.0

図表225 主診断2群(気分障害) BPRS総得点(op)

		BPRS 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
主診断2群(気分障害)	F3 気分(感情)障害	40.8	15.9	19.0	85.0
	F3 気分(感情)障害以外	49.2	18.8	18.0	99.0
	合計	47.4	18.6	18.0	99.0

図表226 主診断3群 BPRS総得点(op)

		BPRS 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
主診断3群	F20 統合失調症	51.9	18.7	18.0	99.0
	F3 気分(感情)障害	40.8	15.9	19.0	85.0
	それ以外の主診断	44.8	18.3	18.0	94.0
	合計	47.4	18.6	18.0	99.0

図表227 BPRS総得点 不安-抑うつ

		BPRS 不安-抑うつ 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後1年時点	基本調査群	10.0	4.5	4.0	26.0
	opA群	10.4	4.9	4.0	24.0
	合計	10.1	4.6	4.0	26.0

図表228 BPRS総得点 欲動性低下

		BPRS 欲動性低下 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後1年時点	基本調査群	11.5	5.2	4.0	28.0
	opA群	11.0	4.9	4.0	28.0
	合計	11.4	5.1	4.0	28.0

図表229 BPRS総得点 思考障害

		BPRS 思考障害 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後1年時点	基本調査群	11.5	5.2	4.0	28.0
	opA群	11.4	5.8	4.0	27.0
	合計	11.5	5.3	4.0	28.0

図表230 BPRS総得点 興奮

		BPRS 興奮 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後1年時点	基本調査群	7.5	3.5	3.0	21.0
	opA群	7.3	3.5	3.0	19.0
	合計	7.4	3.5	3.0	21.0

図表231 BPRS総得点 敵意-疑惑

		BPRS 敵意-疑惑 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後1年時点	基本調査群	7.8	4.1	3.0	21.0
	opA群	7.9	4.1	3.0	21.0
	合計	7.8	4.1	3.0	21.0

図表232 BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上	非該当	379	86.9%	126	86.9%	505	86.9%
	該当	57	13.1%	19	13.1%	76	13.1%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表233 BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上	非該当	330	75.7%	114	78.6%	444	76.4%
	該当	106	24.3%	31	21.4%	137	23.6%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表234 BPRS 思考障害 6点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上	非該当	315	72.2%	106	73.1%	421	72.5%
	該当	121	27.8%	39	26.9%	160	27.5%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表235 BPRS 興奮 6点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRS 興奮 6点以上1項目以上	非該当	369	84.6%	129	89.0%	498	85.7%
	該当	67	15.4%	16	11.0%	83	14.3%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表236 BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		基本調査群		opA群		合計	
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上	非該当	371	85.1%	118	81.4%	489	84.2%
	該当	65	14.9%	27	18.6%	92	15.8%
	合計	436	100.0%	145	100.0%	581	100.0%

図表237 BPRS総得点 不安-抑うつ(op)

		BPRS 不安-抑うつ 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後3ヶ月時点	opA群	10.7	5.1	4.0	24.0
	opB群	10.5	4.4	4.0	24.0
	合計	10.6	4.8	4.0	24.0

図表238 BPRS総得点 欲動性低下(op)

		BPRS 欲動性低下 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後3ヶ月時点	opA群	11.2	5.0	4.0	28.0
	opB群	9.4	4.5	4.0	25.0
	合計	10.4	4.9	4.0	28.0

図表239 BPRS総得点 思考障害(op)

		BPRS 思考障害 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後3ヶ月時点	opA群	12.0	6.3	4.0	28.0
	opB群	9.3	5.4	4.0	26.0
	合計	10.7	6.0	4.0	28.0

図表240 BPRS総得点 興奮(op)

		BPRS 興奮 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後3ヶ月時点	opA群	8.2	3.9	3.0	18.0
	opB群	6.7	3.4	3.0	19.0
	合計	7.5	3.7	3.0	19.0

図表241 BPRS総得点 敵意-疑惑(op)

		BPRS 敵意-疑惑 合計点(op)			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後3ヶ月時点	opA群	8.9	4.9	3.0	21.0
	opB群	7.2	4.3	3.0	20.0
	合計	8.1	4.7	3.0	21.0

図表242 BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRS 不安-抑うつ 6点以上1項目以上(op)	非該当	118	81.4%	113	89.0%	231	84.9%
	該当	27	18.6%	14	11.0%	41	15.1%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表243 BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRS 欲動性低下 6点以上1項目以上(op)	非該当	111	76.6%	106	83.5%	217	79.8%
	該当	34	23.4%	21	16.5%	55	20.2%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表244 BPRS 思考障害 6点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRS 思考障害 6点以上1項目以上(op)	非該当	100	69.0%	104	81.9%	204	75.0%
	該当	45	31.0%	23	18.1%	68	25.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表245 BPRS 興奮 6点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRS 興奮 6点以上1項目以上(op)	非該当	120	82.8%	118	92.9%	238	87.5%
	該当	25	17.2%	9	7.1%	34	12.5%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表246 BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上(op)

		入院後3ヶ月時点					
		opA群		opB群		合計	
BPRS 敵意-疑惑 6点以上1項目以上(op)	非該当	105	72.4%	110	86.6%	215	79.0%
	該当	40	27.6%	17	13.4%	57	21.0%
	合計	145	100.0%	127	100.0%	272	100.0%

図表247 入院形態

		病院区分									
		日本精神科病院協会加盟病院		日本総合病院精神医学会加盟病院		全国自治体病院協議会加盟病院		国立精神医療施設長協議会		合計	
問04 入院形態	措置	8	1.3%	0	0.0%	5	9.1%	0	0.0%	13	1.8%
	医療保護	304	47.8%	1	50.0%	31	56.4%	9	60.0%	345	48.7%
	任意	324	50.9%	1	50.0%	19	34.5%	6	40.0%	350	49.4%
	合計	636	100.0%	2	100.0%	55	100.0%	15	100.0%	708	100.0%

図表248 過去入院歴2群

		度数	%
過去入院歴2群	入院なしおよび1年未満	367	51.8%
	1年以上	341	48.2%
	合計	708	100.0%

図表249 年齢2群

		度数	%
年齢2群	65歳以上	245	34.6%
	65歳未満	463	65.4%
	合計	708	100.0%

図表250 入院形態2群

		度数	%
入院形態2群	医療保護	345	49.6%
	任意	350	50.4%
	合計	695	100.0%

図表251 主診断2群(統合失調症)

		度数	%
主診断2群(統合失調症)	F20 統合失調症	411	58.1%
	F20 統合失調症以外	297	41.9%
	合計	708	100.0%

図表252 主診断2群(気分障害)

		度数	%
主診断2群(気分障害)	F3 気分(感情)障害	118	16.7%
	F3 気分(感情)障害以外	590	83.3%
	合計	708	100.0%

図表253 1.自殺念慮

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 1.自殺念慮	なし	305	84.3%	157	71.7%	462	79.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	45	12.4%	50	22.8%	95	16.4%
	月に1~2回程度	10	2.8%	5	2.3%	15	2.6%
	週に1回程度	0	.0%	2	.9%	2	.3%
	週に2~3回	1	.3%	1	.5%	2	.3%
	ほぼ毎日	1	.3%	4	1.8%	5	.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表254 2.自傷行為

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 2.自傷行為	なし	314	86.7%	171	78.1%	485	83.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	39	10.8%	41	18.7%	80	13.8%
	月に1~2回程度	9	2.5%	3	1.4%	12	2.1%
	週に1回程度	0	.0%	3	1.4%	3	.5%
	週に2~3回	0	.0%	1	.5%	1	.2%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表255 3.言語的暴力

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 3.言語的暴力	なし	165	45.6%	114	52.1%	279	48.0%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	108	29.8%	54	24.7%	162	27.9%
	月に1~2回程度	52	14.4%	22	10.0%	74	12.7%
	週に1回程度	19	5.2%	12	5.5%	31	5.3%
	週に2~3回	8	2.2%	8	3.7%	16	2.8%
	ほぼ毎日	10	2.8%	9	4.1%	19	3.3%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表256 4.身体的暴力

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 4.身体的暴力	なし	236	65.2%	148	67.6%	384	66.1%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	102	28.2%	53	24.2%	155	26.7%
	月に1~2回程度	20	5.5%	13	5.9%	33	5.7%
	週に1回程度	2	.6%	2	.9%	4	.7%
	週に2~3回	2	.6%	2	.9%	4	.7%
	ほぼ毎日	0	.0%	1	.5%	1	.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表257 5.衝動性

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 5.衝動性	なし	137	37.8%	94	42.9%	231	39.8%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	134	37.0%	70	32.0%	204	35.1%
	月に1~2回程度	51	14.1%	27	12.3%	78	13.4%
	週に1回程度	22	6.1%	17	7.8%	39	6.7%
	週に2~3回	8	2.2%	4	1.8%	12	2.1%
	ほぼ毎日	10	2.8%	7	3.2%	17	2.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表258 6.器物破壊

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 6.器物破壊	なし	243	67.1%	155	70.8%	398	68.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	98	27.1%	54	24.7%	152	26.2%
	月に1~2回程度	16	4.4%	6	2.7%	22	3.8%
	週に1回程度	5	1.4%	1	.5%	6	1.0%
	週に2~3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	3	1.4%	3	.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表259 7.他者への迷惑行為

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 7.他者への迷惑行為	なし	140	38.7%	102	46.6%	242	41.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	120	33.1%	64	29.2%	184	31.7%
	月に1~2回程度	41	11.3%	19	8.7%	60	10.3%
	週に1回程度	28	7.7%	18	8.2%	46	7.9%
	週に2~3回	16	4.4%	6	2.7%	22	3.8%
	ほぼ毎日	17	4.7%	10	4.6%	27	4.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表260 8.性的逸脱行為

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 8.性的逸脱行為	なし	310	85.6%	191	87.2%	501	86.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	39	10.8%	19	8.7%	58	10.0%
	月に1~2回程度	10	2.8%	2	.9%	12	2.1%
	週に1回程度	2	.6%	1	.5%	3	.5%
	週に2~3回	1	.3%	3	1.4%	4	.7%
	ほぼ毎日	0	.0%	3	1.4%	3	.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表261 9.放火

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 9.放火	なし	358	98.9%	214	97.7%	572	98.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	4	1.1%	5	2.3%	9	1.5%
	月に1~2回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に1回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に2~3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表262 10.失禁

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 10.失禁	なし	261	72.1%	132	60.3%	393	67.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	27	7.5%	21	9.6%	48	8.3%
	月に1~2回程度	30	8.3%	9	4.1%	39	6.7%
	週に1回程度	4	1.1%	10	4.6%	14	2.4%
	週に2~3回	5	1.4%	12	5.5%	17	2.9%
	ほぼ毎日	35	9.7%	35	16.0%	70	12.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表263 11.不潔行為

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 11.不潔行為	なし	271	74.9%	160	73.1%	431	74.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	42	11.6%	23	10.5%	65	11.2%
	月に1~2回程度	21	5.8%	9	4.1%	30	5.2%
	週に1回程度	9	2.5%	8	3.7%	17	2.9%
	週に2~3回	7	1.9%	12	5.5%	19	3.3%
	ほぼ毎日	12	3.3%	7	3.2%	19	3.3%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表264 12.衣類を破る・脱ぐ

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 12.衣類を破る・脱ぐ	なし	310	85.6%	189	86.3%	499	85.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	35	9.7%	12	5.5%	47	8.1%
	月に1~2回程度	6	1.7%	3	1.4%	9	1.5%
	週に1回程度	5	1.4%	5	2.3%	10	1.7%
	週に2~3回	4	1.1%	5	2.3%	9	1.5%
	ほぼ毎日	2	.6%	5	2.3%	7	1.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表265 13.収集癖

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 13.収集癖	なし	317	87.6%	188	85.8%	505	86.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	21	5.8%	14	6.4%	35	6.0%
	月に1~2回程度	10	2.8%	4	1.8%	14	2.4%
	週に1回程度	3	.8%	1	.5%	4	.7%
	週に2~3回	5	1.4%	5	2.3%	10	1.7%
	ほぼ毎日	6	1.7%	7	3.2%	13	2.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表266 14.てんかん発作

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 14.てんかん発作	なし	348	96.1%	202	92.2%	550	94.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	12	3.3%	14	6.4%	26	4.5%
	月に1~2回程度	1	.3%	1	.5%	2	.3%
	週に1回程度	1	.3%	2	.9%	3	.5%
	週に2~3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表267 15.気分易変性

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 15.気分易変性	なし	108	29.8%	51	23.3%	159	27.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	87	24.0%	57	26.0%	144	24.8%
	月に1~2回程度	78	21.5%	49	22.4%	127	21.9%
	週に1回程度	40	11.0%	23	10.5%	63	10.8%
	週に2~3回	25	6.9%	17	7.8%	42	7.2%
	ほぼ毎日	24	6.6%	22	10.0%	46	7.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表268 16.集中力低下

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 16.集中力低下	なし	94	26.0%	65	29.7%	159	27.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	64	17.7%	40	18.3%	104	17.9%
	月に1~2回程度	58	16.0%	26	11.9%	84	14.5%
	週に1回程度	38	10.5%	15	6.8%	53	9.1%
	週に2~3回	28	7.7%	21	9.6%	49	8.4%
	ほぼ毎日	80	22.1%	52	23.7%	132	22.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表269 17.特定の物や人に対する強いこだわり

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 17.特定の物や人に対する強いこだわり	なし	133	36.7%	94	42.9%	227	39.1%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	51	14.1%	39	17.8%	90	15.5%
	月に1~2回程度	38	10.5%	24	11.0%	62	10.7%
	週に1回程度	20	5.5%	12	5.5%	32	5.5%
	週に2~3回	42	11.6%	14	6.4%	56	9.6%
	ほぼ毎日	78	21.5%	36	16.4%	114	19.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%