

図表270 18.ストレス脆弱性

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 18.ストレス脆弱性	なし	82	22.7%	55	25.1%	137	23.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	67	18.5%	41	18.7%	108	18.6%
	月に1～2回程度	57	15.7%	31	14.2%	88	15.1%
	週に1回程度	46	12.7%	20	9.1%	66	11.4%
	週に2～3回	30	8.3%	19	8.7%	49	8.4%
	ほぼ毎日	80	22.1%	53	24.2%	133	22.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表271 19.服薬非遵守

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 19.服薬非遵守	なし	159	43.9%	135	61.6%	294	50.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	114	31.5%	54	24.7%	168	28.9%
	月に1～2回程度	22	6.1%	13	5.9%	35	6.0%
	週に1回程度	15	4.1%	4	1.8%	19	3.3%
	週に2～3回	23	6.4%	7	3.2%	30	5.2%
	ほぼ毎日	29	8.0%	6	2.7%	35	6.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表272 20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	なし	160	44.2%	112	51.1%	272	46.8%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	94	26.0%	51	23.3%	145	25.0%
	月に1～2回程度	39	10.8%	19	8.7%	58	10.0%
	週に1回程度	22	6.1%	15	6.8%	37	6.4%
	週に2～3回	33	9.1%	8	3.7%	41	7.1%
	ほぼ毎日	14	3.9%	14	6.4%	28	4.8%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表273 21.徘徊

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 21.徘徊	なし	243	67.1%	158	72.1%	401	69.0%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	46	12.7%	29	13.2%	75	12.9%
	月に1～2回程度	20	5.5%	7	3.2%	27	4.6%
	週に1回程度	14	3.9%	4	1.8%	18	3.1%
	週に2～3回	21	5.8%	2	0.9%	23	4.0%
	ほぼ毎日	18	5.0%	19	8.7%	37	6.4%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表274 22.多動・行動の停止

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 22.多動・行動の停止	なし	224	61.9%	143	65.3%	367	63.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	62	17.1%	37	16.9%	99	17.0%
	月に1～2回程度	27	7.5%	9	4.1%	36	6.2%
	週に1回程度	17	4.7%	5	2.3%	22	3.8%
	週に2～3回	19	5.2%	8	3.7%	27	4.6%
	ほぼ毎日	13	3.6%	17	7.8%	30	5.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表275 23.強迫行為

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 23.強迫行為	なし	268	74.0%	169	77.2%	437	75.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	42	11.6%	24	11.0%	66	11.4%
	月に1~2回程度	15	4.1%	4	1.8%	19	3.3%
	週に1回程度	8	2.2%	5	2.3%	13	2.2%
	週に2~3回	15	4.1%	5	2.3%	20	3.4%
	ほぼ毎日	14	3.9%	12	5.5%	26	4.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表276 24.過食・拒食

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 24.過食・拒食	なし	274	75.7%	166	75.8%	440	75.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	52	14.4%	29	13.2%	81	13.9%
	月に1~2回程度	10	2.8%	7	3.2%	17	2.9%
	週に1回程度	6	1.7%	5	2.3%	11	1.9%
	週に2~3回	13	3.6%	9	4.1%	22	3.8%
	ほぼ毎日	7	1.9%	3	1.4%	10	1.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表277 25.多飲水

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 25.多飲水	なし	279	77.1%	188	85.8%	467	80.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	31	8.6%	13	5.9%	44	7.6%
	月に1~2回程度	13	3.6%	3	1.4%	16	2.8%
	週に1回程度	10	2.8%	4	1.8%	14	2.4%
	週に2~3回	8	2.2%	4	1.8%	12	2.1%
	ほぼ毎日	21	5.8%	7	3.2%	28	4.8%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表278 26.異食

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 26.異食	なし	354	97.8%	211	96.3%	565	97.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	7	1.9%	4	1.8%	11	1.9%
	月に1~2回程度	0	.0%	1	.5%	1	.2%
	週に1回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に2~3回	0	.0%	1	.5%	1	.2%
	ほぼ毎日	1	.3%	2	.9%	3	.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表279 27.物質依存

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問06-(1) 27.物質依存	なし	331	91.4%	166	75.8%	497	85.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	13	3.6%	30	13.7%	43	7.4%
	月に1~2回程度	5	1.4%	1	.5%	6	1.0%
	週に1回程度	4	1.1%	5	2.3%	9	1.5%
	週に2~3回	2	.6%	9	4.1%	11	1.9%
	ほぼ毎日	7	1.9%	8	3.7%	15	2.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表280 予測される症状・問題行動

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
1.自殺念慮 [問06-(2)]	53	14.6%	50	22.8%	103	17.7%
2.自傷行為 [問06-(2)]	36	9.9%	36	16.4%	72	12.4%
3.言語的暴力 [問06-(2)]	139	38.4%	83	37.9%	222	38.2%
4.身体的暴力 [問06-(2)]	89	24.6%	49	22.4%	138	23.8%
5.衝動性 [問06-(2)]	168	46.4%	105	47.9%	273	47.0%
6.器物破壊 [問06-(2)]	85	23.5%	43	19.6%	128	22.0%
7.他者への迷惑行為 [問06-(2)]	192	53.0%	96	43.8%	288	49.6%
8.性的逸脱行為 [問06-(2)]	32	8.8%	18	8.2%	50	8.6%
9.放火 [問06-(2)]	5	1.4%	4	1.8%	9	1.5%
10.失禁 [問06-(2)]	66	18.2%	47	21.5%	113	19.4%
11.不潔行為 [問06-(2)]	75	20.7%	44	20.1%	119	20.5%
12.衣類を破る・脱ぐ [問06-(2)]	22	6.1%	23	10.5%	45	7.7%
13.収集癖 [問06-(2)]	29	8.0%	19	8.7%	48	8.3%
14.てんかん発作 [問06-(2)]	10	2.8%	15	6.8%	25	4.3%
15.気分易変性 [問06-(2)]	210	58.0%	137	62.6%	347	59.7%
16.集中力低下 [問06-(2)]	170	47.0%	107	48.9%	277	47.7%
17.特定の物や人に対する強いこだわり [問06-(2)]	155	42.8%	77	35.2%	232	39.9%
18.ストレス脆弱性 [問06-(2)]	201	55.5%	130	59.4%	331	57.0%
19.服薬非遵守 [問06-(2)]	206	56.9%	92	42.0%	298	51.3%
20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為 [問06-(2)]	146	40.3%	74	33.8%	220	37.9%
21.徘徊 [問06-(2)]	93	25.7%	54	24.7%	147	25.3%
22.多動・行動の停止 [問06-(2)]	75	20.7%	47	21.5%	122	21.0%
23.強迫行為 [問06-(2)]	42	11.6%	30	13.7%	72	12.4%
24.過食・拒食 [問06-(2)]	50	13.8%	36	16.4%	86	14.8%
25.多飲水 [問06-(2)]	56	15.5%	20	9.1%	76	13.1%
26.異食 [問06-(2)]	4	1.1%	4	1.8%	8	1.4%
27.物質依存 [問06-(2)]	24	6.6%	44	20.1%	68	11.7%
合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表281 精神症状

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
症状がまったくないか、あるいはいくつかの軽い症状が認められるが、日常生活の中ではほとんど目立たない程度である	9	2.5%	12	5.5%	21	3.6%
精神症状は認められるが、安定化している(略)	30	8.3%	22	10.0%	52	9.0%
精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意志の伝達や現実検討にいくらかの欠陥がみられる(略)	82	22.7%	62	28.3%	144	24.8%
精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意志の伝達が判断に欠陥がある(略)	116	32.0%	57	26.0%	173	29.8%
精神症状、人格水準の低下、認知症の症状などにより意志の伝達に粗大な欠陥がある(略)	107	29.6%	46	21.0%	153	26.3%
活発な精神症状、人格水準の著しい低下、重度の認知症の症状などにより著しい逸脱行動(略)	18	5.0%	20	9.1%	38	6.5%
合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表282 GAF尺度

	入院後1年時点						
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計		
問08 GAF尺度	100-91	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	90-81	8	2.2%	3	1.4%	11	1.9%
	80-71	2	.6%	5	2.3%	7	1.2%
	70-61	9	2.5%	12	5.5%	21	3.6%
	60-51	30	8.3%	22	10.0%	52	9.0%
	50-41	25	6.9%	17	7.8%	42	7.2%
	40-31	91	25.1%	57	26.0%	148	25.5%
	30-21	147	40.6%	65	29.7%	212	36.5%
	20-11	37	10.2%	21	9.6%	58	10.0%
	10-1	13	3.6%	15	6.8%	28	4.8%
	0	0	.0%	2	.9%	2	.3%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表283 ADL ベッド上の可動性

	入院後1年時点						
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計		
問09 ADL ベッド上の可動性	0.自立	309	85.4%	170	77.6%	479	82.4%
	1.準備のみ	4	1.1%	8	3.7%	12	2.1%
	2.観察	12	3.3%	7	3.2%	19	3.3%
	3.部分的な援助	17	4.7%	16	7.3%	33	5.7%
	4.広範な援助	6	1.7%	4	1.8%	10	1.7%
	5.最大の援助	4	1.1%	3	1.4%	7	1.2%
	6.全面依存	10	2.8%	11	5.0%	21	3.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表284 ADL 移乗

	入院後1年時点						
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計		
問09 ADL 移乗	0.自立	306	84.5%	166	75.8%	472	81.2%
	1.準備のみ	4	1.1%	9	4.1%	13	2.2%
	2.観察	12	3.3%	8	3.7%	20	3.4%
	3.部分的な援助	18	5.0%	15	6.8%	33	5.7%
	4.広範な援助	4	1.1%	3	1.4%	7	1.2%
	5.最大の援助	4	1.1%	5	2.3%	9	1.5%
	6.全面依存	14	3.9%	13	5.9%	27	4.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表285 ADL 食事

	入院後1年時点						
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計		
問09 ADL 食事	0.自立	241	66.6%	135	61.6%	376	64.7%
	1.準備のみ	42	11.6%	26	11.9%	68	11.7%
	2.観察	38	10.5%	27	12.3%	65	11.2%
	3.部分的な援助	20	5.5%	13	5.9%	33	5.7%
	4.広範な援助	5	1.4%	6	2.7%	11	1.9%
	5.最大の援助	4	1.1%	1	.5%	5	.9%
	6.全面依存	12	3.3%	11	5.0%	23	4.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表286 ADL トイレの使用

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問09 ADL トイレの使用	0.自立	278	76.8%	139	63.5%	417	71.8%
	1.準備のみ	13	3.6%	11	5.0%	24	4.1%
	2.観察	18	5.0%	11	5.0%	29	5.0%
	3.部分的な援助	23	6.4%	27	12.3%	50	8.6%
	4.広範な援助	9	2.5%	8	3.7%	17	2.9%
	5.最大の援助	3	.8%	7	3.2%	10	1.7%
	6.全面依存	18	5.0%	16	7.3%	34	5.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表287 ADL 入浴

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問09 ADL 入浴	0.自立	210	58.0%	96	43.8%	306	52.7%
	1.準備のみ	20	5.5%	15	6.8%	35	6.0%
	2.観察	33	9.1%	18	8.2%	51	8.8%
	3.部分的な援助	47	13.0%	35	16.0%	82	14.1%
	4.広範な援助	21	5.8%	26	11.9%	47	8.1%
	5.最大の援助	8	2.2%	8	3.7%	16	2.8%
	6.全面依存	23	6.4%	21	9.6%	44	7.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表288 ADL 衣服の着脱

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問09 ADL 衣服の着脱	0.自立	238	65.7%	120	54.8%	358	61.6%
	1.準備のみ	26	7.2%	13	5.9%	39	6.7%
	2.観察	29	8.0%	12	5.5%	41	7.1%
	3.部分的な援助	32	8.8%	33	15.1%	65	11.2%
	4.広範な援助	11	3.0%	16	7.3%	27	4.6%
	5.最大の援助	8	2.2%	11	5.0%	19	3.3%
	6.全面依存	18	5.0%	14	6.4%	32	5.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表289 生活障害評価 食事

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 食事	1) 適量の食事を適時にとることができる。	126	34.8%	65	29.7%	191	32.9%
	2) 時に施設からの提供を必要とする場合があるが、1)がだいたい自主的にできる。	59	16.3%	47	21.5%	106	18.2%
	3) 時に助言や援助がなければ、偏食したり、過食になったり、不規則になったりする。	92	25.4%	54	24.7%	146	25.1%
	4) いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりする。(略)	55	15.2%	21	9.6%	76	13.1%
	5) 常に食事へ目を配っておかないと不食に陥ったり、偏食、過食など問題の食行動があり、健康を害す。	30	8.3%	32	14.6%	62	10.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表290 生活障害評価 生活リズム

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 生活リズム	1) 一定の時刻に自分で起きることができ、自分で時間の過ごし方を考えて行動できる。	82	22.7%	48	21.9%	130	22.4%
	2) 時に寝過ぎることがあるが、だいたい自分なりの生活リズムが確立している。(略)	89	24.6%	67	30.6%	156	26.9%
	3) 時に助言がなければ、寝過ぎすが、週に1度を越えて生活リズムを乱すことがあっても元に戻る。(略)	117	32.3%	51	23.3%	168	28.9%
	4) 起床が遅く、生活のリズムが週1回を越えて不規則に傾きがちですぐには元に戻らない。(略)	53	14.6%	30	13.7%	83	14.3%
	5) 臥床がらで、昼夜逆転したりする。	21	5.8%	23	10.5%	44	7.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表291 生活障害評価 保清

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 保清	1) 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等を自主的に問題なく行っている。(略)	70	19.3%	44	20.1%	114	19.6%
	2) 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等がある程度自主的に行っている。(略)	83	22.9%	51	23.3%	134	23.1%
	3) 個人衛生を保つためには、週1回程度の助言や援助が必要である。(略)	104	28.7%	54	24.7%	158	27.2%
	4) 個人衛生を保つために、強い援助や助言を必要とする。(略)	69	19.1%	32	14.6%	101	17.4%
	5) 助言や援助をしても、個人衛生を保つことができず、自室の清掃やかたづけを、助言や援助をしてもしないか、できない。	36	9.9%	38	17.4%	74	12.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表292 生活障害評価 金銭管理

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 金銭管理	1) 1ヵ月程度のやりくりが自分で出来る。また、大切な物を管理できる。	48	13.3%	28	12.8%	76	13.1%
	2) 時に月の収入を超える出費をしてしまい、必要な出費を控えたりする。時折大切な物を失くしてしまう。	50	13.8%	24	11.0%	74	12.7%
	3) 一週間程度のやりくりはだいたいできるが、時に助言を必要とする。(略)	78	21.5%	47	21.5%	125	21.5%
	4) 3~4日に一度手渡して相談する必要がある。大切な物の管理が一人では難しく、強い助言や援助を必要とする。	78	21.5%	35	16.0%	113	19.4%
	5) 持っているお金をすぐに使ってしまう。大切な物の管理が自分では出来ない。	108	29.8%	85	38.8%	193	33.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表293 生活障害評価 服薬管理

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 服薬管理	1) 薬の必要性を理解しており、適切に自分で管理している。	40	11.0%	31	14.2%	71	12.2%
	2) 薬の必要性は理解していないにもかかわらず、時に飲み忘れることもあるが、助言が必要なほどではない。(週に1回以下)	65	18.0%	41	18.7%	106	18.2%
	3) 薬の必要性は理解しておらず、時に飲み忘れるので助言を必要とする。(週に2回以上)	80	22.1%	41	18.7%	121	20.8%
	4) 飲み忘れや、飲み方を間違えたり、拒薬、大量服薬をすることがしばしばある。(略)	78	21.5%	41	18.7%	119	20.5%
	5) 助言や援助をしても服薬しないか、できないため、ケア態勢の中で与薬を行ったり、デポ剤が中心となる。(略)	99	27.3%	65	29.7%	164	28.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表294 生活障害評価 対人関係

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 対人関係	1) あいさつや定番などの最低限の近所づきあいが自主的に問題なくできる。(略)	27	7.5%	11	5.0%	38	6.5%
	2) 1)が、だいたい自主的にできる。	55	15.2%	50	22.8%	105	18.1%
	3) だいたいできるが、時に助言がなければ孤立的になりがち(略)	114	31.5%	57	26.0%	171	29.4%
	4) 1)で述べたことがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちとなる。(略)	97	26.8%	52	23.7%	149	25.6%
	5) 助言・介入・誘導してもできないか、あるいはしようせず(略)	69	19.1%	49	22.4%	118	20.3%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表295 生活障害評価 電話の利用

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 電話の利用	1) 電話を使うことができ、電話で病状相談したり診察の予約をとったりできる。(略)	70	19.3%	44	20.1%	114	19.6%
	2) 電話を使うことができるが、電話を積極的に活用していない。または、病院や支援サービスからの電話に出ないことがある。	92	25.4%	47	21.5%	139	23.9%
	3) 電話をだいたい使うことができるが、相手の都合を考えずに深夜や早朝に電話することがみられたり(略)	74	20.4%	38	17.4%	112	19.3%
	4) 必要な場面でも電話をかけることはごくまれであり、病院や支援サービスからの電話にも出られないことが多い。(略)	61	16.9%	29	13.2%	90	15.5%
	5) 電話が使えないか、電話を使えたとしても病院や支援サービスからの電話にはほとんど出られない。(略)	65	18.0%	61	27.9%	126	21.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表296 生活障害評価 買い物

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 買い物	1) 計画的に買い物が行え、(略)	43	11.9%	31	14.2%	74	12.7%
	2) 日用品の買い物は行えるが、必要なものの購入に抵抗するなど節約のし過ぎが見られたり、浪費の傾向が見られる。	72	19.9%	34	15.5%	106	18.2%
	3) 必要のないものを購入したり、適時適量の買い物が行えないため、買い物に関してときに助言や援助が必要となる。	88	24.3%	48	21.9%	136	23.4%
	4) 必要のないものを購入したり、適時適量の買い物が行えないため、買い物に関して強い助言や援助を必要とする。(略)	85	23.5%	43	19.6%	128	22.0%
	5) 買い物が適切に行えず、または、他人に必要以上のものを買い与えたりしており、助言しても修正できない。(略)	74	20.4%	63	28.8%	137	23.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表297 生活障害評価 交通手段

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問10 生活障害評価 交通手段	1) 必要に応じて、公共交通や自家用車が利用でき、時間通りに移動が行える。	50	13.8%	36	16.4%	86	14.8%
	2) 公共交通を利用できるが、所要時間が余計にかかったり、乗り間違いや料金の支払いミス、乗車券紛失などが生じる。(略)	49	13.5%	21	9.6%	70	12.0%
	3) 公共交通の利用に関してときに助言や援助が必要となる。(略)	76	21.0%	41	18.7%	117	20.1%
	4) 乗り間違いや乗り損ない、乗車券紛失などが多く、公共交通の利用に関して強い助言や援助が必要となる。(略)	72	19.9%	32	14.6%	104	17.9%
	5) 乗り間違いや乗り損ない、乗車券紛失が頻発し、助言や指導を行っても公共交通が利用できず(略)	115	31.8%	89	40.6%	204	35.1%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表298 日常生活能力

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問11 日常生活能力	精神障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通にできる	12	3.3%	13	5.9%	25	4.3%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に一定の制限を受ける	55	15.2%	40	18.3%	95	16.4%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする	131	36.2%	67	30.6%	198	34.1%
	精神障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、常時援助を要する	142	39.2%	72	32.9%	214	36.8%
	精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできない	22	6.1%	27	12.3%	49	8.4%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表299 身体合併症 水中毒

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問12 身体合併症 水中毒	有り	41	11.3%	20	9.1%	61	10.5%
	無し	321	88.7%	199	90.9%	520	89.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%



図表300 身体合併症 反復性イレウス

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問12 身体合併症 反復性イレウス	有り	19	5.2%	16	7.3%	35	6.0%
	無し	343	94.8%	203	92.7%	546	94.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表301 身体合併症 反復性肺炎

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問12 身体合併症 反復性肺炎	有り	14	3.9%	12	5.5%	26	4.5%
	無し	348	96.1%	207	94.5%	555	95.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表302 身体合併症 その他

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問12 身体合併症 その他	有り	38	10.5%	34	15.5%	72	12.4%
	無し	324	89.5%	185	84.5%	509	87.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表303 退院可能性

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問13 退院可能性	困難	282	77.9%	166	75.8%	448	77.1%
	可能性あり	80	22.1%	53	24.2%	133	22.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表304 退院困難理由

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問13 退院困難理由	病状等が重症または不安定であるため	233	82.6%	133	80.1%	366	81.7%
	それ以外の理由	49	17.4%	33	19.9%	82	18.3%
	合計	282	100.0%	166	100.0%	448	100.0%

図表305 退院可能性-退院困難理由2群

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
退院可能性-退院困難理由2群	病状等が重症または不安定であるため	233	64.4%	133	60.7%	366	63.0%
	それ以外の理由と退院可能性あり	129	35.6%	86	39.3%	215	37.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表306 退院可能性-退院困難理由3群

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
退院可能性-退院困難理由3群	退院困難 病状等が重症または不安定であるため	233	64.4%	133	60.7%	366	63.0%
	退院困難 それ以外の理由	49	13.5%	33	15.1%	82	14.1%
	退院可能性あり	80	22.1%	53	24.2%	133	22.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表307 退院できなかった理由

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問14 退院できなかった理由	263	75.8%	154	73.0%	417	74.7%
家庭内調整がうまくいかない為 [問14]	263	75.8%	154	73.0%	417	74.7%
受け入れ先の確保が困難なため [問14]	158	45.5%	114	54.0%	272	48.7%
生活費の確保が困難な為 [問14]	20	5.8%	9	4.3%	29	5.2%
自己負担の費用が増える為 [問14]	12	3.5%	9	4.3%	21	3.8%
地域医療/サービスが不足している為 [問14]	47	13.5%	19	9.0%	66	11.8%
地域社会からの拒否・拒絶・反発・理解不足 [問14]	28	8.1%	7	3.3%	35	6.3%
その他 [問14]	46	13.3%	27	12.8%	73	13.1%
合計	347	100.0%	211	100.0%	558	100.0%

図表308 退院できなかった理由(家庭内調整)

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問14-01 退院できなかった理由(家庭内調整)	263	100.0%	154	100.0%	417	100.0%
過去に近親者が受けたトラウマがあり、関係修復が困難 [問14-01]	78	29.7%	49	31.8%	127	30.5%
家族の疾病への理解が乏しい為 [問14-01]	58	22.1%	35	22.7%	93	22.3%
家族の対応能力が乏しい為 [問14-01]	186	70.7%	106	68.8%	292	70.0%
その他 [問14-01]	32	12.2%	22	14.3%	54	12.9%
合計	263	100.0%	154	100.0%	417	100.0%

図表309 退院できなかった理由(受入先確保困難)

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問14-02 退院できなかった理由(受入先確保困難)	158	100.0%	114	100.0%	272	100.0%
施設の絶対数の不足 [問14-02]	66	41.8%	55	48.2%	121	44.5%
受け入れ施設の対応力不足 [問14-02]	71	44.9%	60	52.6%	131	48.2%
貸主・賃貸業者・他の入居者からの拒否・拒絶・反発・理解不足 [問14-02]	19	12.0%	8	7.0%	27	9.9%
保証人がいない [問14-02]	11	7.0%	3	2.6%	14	5.1%
その他 [問14-02]	23	14.6%	15	13.2%	38	14.0%
合計	158	100.0%	114	100.0%	272	100.0%

図表310 退院できなかった理由(地域医療不足)

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問14-05 退院できなかった理由(地域医療不足)	47	100.0%	19	100.0%	66	100.0%
医療 [問14-05]	18	38.3%	6	31.6%	24	36.4%
障害者総合支援法等に係るサービス [問14-05]	28	59.6%	13	68.4%	41	62.1%
介護保険法等に係るサービス [問14-05]	13	27.7%	5	26.3%	18	27.3%
その他のサービス [問14-05]	7	14.9%	2	10.5%	9	13.6%
合計	47	100.0%	19	100.0%	66	100.0%

図表311 退院支援状況

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問15 退院支援状況	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%
有り	153	42.3%	98	44.7%	251	43.2%
無し	209	57.7%	121	55.3%	330	56.8%
合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表312 退院支援内容

	入院後1年時点					
	F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問15-01 q15内容	153	100.0%	98	100.0%	251	100.0%
ケア会議の実施 [問15-01]	85	55.6%	55	56.1%	140	55.8%
退院プランの作成 [問15-01]	54	35.3%	24	24.5%	78	31.1%
退院パスの作成 [問15-01]	3	2.0%	1	1.0%	4	1.6%
その他 [問15-01]	46	30.1%	33	33.7%	79	31.5%
合計	153	100.0%	98	100.0%	251	100.0%

図表313 心気症

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 心気症	なし	122	33.7%	56	25.6%	178	30.6%
	ごく軽度	70	19.3%	45	20.5%	115	19.8%
	軽度	72	19.9%	42	19.2%	114	19.6%
	中等度	58	16.0%	36	16.4%	94	16.2%
	やや重度	26	7.2%	20	9.1%	46	7.9%
	重度	10	2.8%	18	8.2%	28	4.8%
	最重度	4	1.1%	2	.9%	6	1.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表314 不安

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 不安	なし	69	19.1%	30	13.7%	99	17.0%
	ごく軽度	69	19.1%	39	17.8%	108	18.6%
	軽度	73	20.2%	47	21.5%	120	20.7%
	中等度	76	21.0%	50	22.8%	126	21.7%
	やや重度	42	11.6%	28	12.8%	70	12.0%
	重度	28	7.7%	18	8.2%	46	7.9%
	最重度	5	1.4%	7	3.2%	12	2.1%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表315 情動的引きこもり

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 情動的引きこもり	なし	73	20.2%	46	21.0%	119	20.5%
	ごく軽度	65	18.0%	51	23.3%	116	20.0%
	軽度	52	14.4%	38	17.4%	90	15.5%
	中等度	72	19.9%	38	17.4%	110	18.9%
	やや重度	47	13.0%	24	11.0%	71	12.2%
	重度	38	10.5%	17	7.8%	55	9.5%
	最重度	15	4.1%	5	2.3%	20	3.4%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表316 概念の統合障害

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 概念の統合障害	なし	30	8.3%	56	25.6%	86	14.8%
	ごく軽度	34	9.4%	46	21.0%	80	13.8%
	軽度	77	21.3%	36	16.4%	113	19.4%
	中等度	90	24.9%	30	13.7%	120	20.7%
	やや重度	62	17.1%	20	9.1%	82	14.1%
	重度	52	14.4%	28	12.8%	80	13.8%
	最重度	17	4.7%	3	1.4%	20	3.4%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表317 罪責感

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 罪責感	なし	201	55.5%	116	53.0%	317	54.6%
	ごく軽度	73	20.2%	45	20.5%	118	20.3%
	軽度	43	11.9%	25	11.4%	68	11.7%
	中等度	31	8.6%	23	10.5%	54	9.3%
	やや重度	8	2.2%	4	1.8%	12	2.1%
	重度	6	1.7%	6	2.7%	12	2.1%
	最重度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表318 緊張

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 緊張	なし	112	30.9%	78	35.6%	190	32.7%
	ごく軽度	85	23.5%	49	22.4%	134	23.1%
	軽度	80	22.1%	43	19.6%	123	21.2%
	中等度	50	13.8%	29	13.2%	79	13.6%
	やや重度	17	4.7%	10	4.6%	27	4.6%
	重度	16	4.4%	8	3.7%	24	4.1%
	最重度	2	.6%	2	.9%	4	.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表319 衝動性や不自然な姿勢

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 衝動性や不自然な姿勢	なし	117	32.3%	111	50.7%	228	39.2%
	ごく軽度	64	17.7%	43	19.6%	107	18.4%
	軽度	69	19.1%	30	13.7%	99	17.0%
	中等度	59	16.3%	20	9.1%	79	13.6%
	やや重度	22	6.1%	7	3.2%	29	5.0%
	重度	23	6.4%	6	2.7%	29	5.0%
	最重度	8	2.2%	2	.9%	10	1.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表320 誇大性

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 誇大性	なし	185	51.1%	148	67.6%	333	57.3%
	ごく軽度	59	16.3%	21	9.6%	80	13.8%
	軽度	41	11.3%	24	11.0%	65	11.2%
	中等度	37	10.2%	13	5.9%	50	8.6%
	やや重度	13	3.6%	7	3.2%	20	3.4%
	重度	16	4.4%	6	2.7%	22	3.8%
	最重度	11	3.0%	0	.0%	11	1.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表321 抑うつ気分

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 抑うつ気分	なし	163	45.0%	69	31.5%	232	39.9%
	ごく軽度	84	23.2%	46	21.0%	130	22.4%
	軽度	66	18.2%	45	20.5%	111	19.1%
	中等度	37	10.2%	32	14.6%	69	11.9%
	やや重度	7	1.9%	12	5.5%	19	3.3%
	重度	5	1.4%	15	6.8%	20	3.4%
	最重度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表322 敵意

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 敵意	なし	150	41.4%	113	51.6%	263	45.3%
	ごく軽度	68	18.8%	33	15.1%	101	17.4%
	軽度	64	17.7%	25	11.4%	89	15.3%
	中等度	46	12.7%	26	11.9%	72	12.4%
	やや重度	12	3.3%	14	6.4%	26	4.5%
	重度	14	3.9%	7	3.2%	21	3.6%
	最重度	8	2.2%	1	.5%	9	1.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表323 猜疑心

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 猜疑心	なし	113	31.2%	106	48.4%	219	37.7%
	ごく軽度	76	21.0%	38	17.4%	114	19.6%
	軽度	55	15.2%	29	13.2%	84	14.5%
	中等度	56	15.5%	28	12.8%	84	14.5%
	やや重度	28	7.7%	10	4.6%	38	6.5%
	重度	24	6.6%	7	3.2%	31	5.3%
	最重度	10	2.8%	1	.5%	11	1.9%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表324 幻覚による行動

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 幻覚による行動	なし	121	33.4%	147	67.1%	268	46.1%
	ごく軽度	46	12.7%	31	14.2%	77	13.3%
	軽度	59	16.3%	15	6.8%	74	12.7%
	中等度	53	14.6%	17	7.8%	70	12.0%
	やや重度	27	7.5%	5	2.3%	32	5.5%
	重度	42	11.6%	4	1.8%	46	7.9%
	最重度	14	3.9%	0	.0%	14	2.4%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表325 運動減退

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 運動減退	なし	95	26.2%	55	25.1%	150	25.8%
	ごく軽度	67	18.5%	47	21.5%	114	19.6%
	軽度	72	19.9%	40	18.3%	112	19.3%
	中等度	69	19.1%	33	15.1%	102	17.6%
	やや重度	25	6.9%	21	9.6%	46	7.9%
	重度	25	6.9%	18	8.2%	43	7.4%
	最重度	9	2.5%	5	2.3%	14	2.4%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表326 非協調性

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 非協調性	なし	83	22.9%	66	30.1%	149	25.6%
	ごく軽度	64	17.7%	52	23.7%	116	20.0%
	軽度	89	24.6%	36	16.4%	125	21.5%
	中等度	56	15.5%	22	10.0%	78	13.4%
	やや重度	33	9.1%	21	9.6%	54	9.3%
	重度	25	6.9%	16	7.3%	41	7.1%
	最重度	12	3.3%	6	2.7%	18	3.1%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表327 不自然な思考内容

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 不自然な思考内容	なし	48	13.3%	82	37.4%	130	22.4%
	ごく軽度	54	14.9%	38	17.4%	92	15.8%
	軽度	71	19.6%	34	15.5%	105	18.1%
	中等度	77	21.3%	29	13.2%	106	18.2%
	やや重度	41	11.3%	15	6.8%	56	9.6%
	重度	51	14.1%	18	8.2%	69	11.9%
	最重度	20	5.5%	3	1.4%	23	4.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表328 情動の平板化

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 情動の平板化	なし	57	15.7%	73	33.3%	130	22.4%
	ごく軽度	65	18.0%	39	17.8%	104	17.9%
	軽度	77	21.3%	40	18.3%	117	20.1%
	中等度	78	21.5%	32	14.6%	110	18.9%
	やや重度	39	10.8%	13	5.9%	52	9.0%
	重度	36	9.9%	17	7.8%	53	9.1%
	最重度	10	2.8%	5	2.3%	15	2.6%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表329 興奮

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 興奮	なし	136	37.6%	92	42.0%	228	39.2%
	ごく軽度	70	19.3%	35	16.0%	105	18.1%
	軽度	73	20.2%	39	17.8%	112	19.3%
	中等度	45	12.4%	25	11.4%	70	12.0%
	やや重度	15	4.1%	14	6.4%	29	5.0%
	重度	19	5.2%	12	5.5%	31	5.3%
	最重度	4	1.1%	2	.9%	6	1.0%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表330 失見当識

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問16 BPRS 失見当識	なし	199	55.0%	112	51.1%	311	53.5%
	ごく軽度	68	18.8%	26	11.9%	94	16.2%
	軽度	50	13.8%	30	13.7%	80	13.8%
	中等度	23	6.4%	18	8.2%	41	7.1%
	やや重度	10	2.8%	9	4.1%	19	3.3%
	重度	7	1.9%	15	6.8%	22	3.8%
	最重度	5	1.4%	9	4.1%	14	2.4%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表331 BPRS 総得点

		BPRS 合計点			
		平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院後1年時点	F20 統合失調症	50.0	16.8	18.0	97.0
	F20 統合失調症以外	45.3	16.9	18.0	104.0
	合計	48.2	17.0	18.0	104.0

図表332 BPRS 総得点45点以上

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
BPRS 総得点45点以上	非該当	143	39.5%	120	54.8%	263	45.3%
	該当	219	60.5%	99	45.2%	318	54.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表333 BPRS 6点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
BPRS 6点以上1項目以上	非該当	192	53.0%	129	58.9%	321	55.2%
	該当	170	47.0%	90	41.1%	260	44.8%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表334 BPRSの合計が45以上 または 6点以上の個数が1つ以上

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
BPRSの合計が45以上 または 6点以上の個数が1つ以上	非該当	119	32.9%	98	44.7%	217	37.3%
	該当	243	67.1%	121	55.3%	364	62.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表335 行動障害 A項目3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
行動障害 A項目3点以上1項目以上	非該当	202	55.8%	128	58.4%	330	56.8%
	該当	160	44.2%	91	41.6%	251	43.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%



図表336 行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
行動障害 A項目自傷3点以上1項目以上	非該当	348	96.1%	202	92.2%	550	94.7%
	該当	14	3.9%	17	7.8%	31	5.3%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表337 行動障害 A項目他害3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
行動障害 A項目他害3点以上1項目以上	非該当	203	56.1%	135	61.6%	338	58.2%
	該当	159	43.9%	84	38.4%	243	41.8%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表338 行動障害 B項目3点以上1項目以上

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
行動障害 B項目3点以上1項目以上	非該当	55	15.2%	42	19.2%	97	16.7%
	該当	307	84.8%	177	80.8%	484	83.3%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表339 行動障害判定

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
行動障害判定	非該当	52	14.4%	40	18.3%	92	15.8%
	該当	310	85.6%	179	81.7%	489	84.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表340 生活障害(日常生活能力)判定

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
生活障害(日常生活能力)判定	非該当	198	54.7%	120	54.8%	318	54.7%
	該当	164	45.3%	99	45.2%	263	45.3%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表341 暫定基準 BPRSのみ満たす(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 BPRSのみ満たす(新)	非該当	119	32.9%	98	44.7%	217	37.3%
	該当	243	67.1%	121	55.3%	364	62.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表342 暫定基準 BPRSかつ行動障害を満たす(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 BPRSかつ行動障害を満たす(新)	非該当	134	37.0%	103	47.0%	237	40.8%
	該当	228	63.0%	116	53.0%	344	59.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表343 暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たす(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たす(新)	非該当	228	63.0%	141	64.4%	369	63.5%
	該当	134	37.0%	78	35.6%	212	36.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%



図表344 暫定基準 BPRSかつ生活障害を満たす(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 BPRSかつ生活障害を満たす(新)	非該当	223	61.6%	140	63.9%	363	62.5%
	該当	139	38.4%	79	36.1%	218	37.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表345 暫定基準 行動障害かつ生活障害を満たす(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 行動障害かつ生活障害を満たす(新)	非該当	206	56.9%	122	55.7%	328	56.5%
	該当	156	43.1%	97	44.3%	253	43.5%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表346 暫定基準 BPRSかつ(行動障害または生活障害またはその両方)を満たす(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 BPRSかつ(行動障害または生活障害またはその両方)を満たす(新)	非該当	129	35.6%	102	46.6%	231	39.8%
	該当	233	64.4%	117	53.4%	350	60.2%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表347 暫定基準 BPRSかつ(行動障害A項目または生活障害またはその両方)を満たす(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 BPRSかつ(行動障害A項目または生活障害またはその両方)を満たす(新)	非該当	182	50.3%	121	55.3%	303	52.2%
	該当	180	49.7%	98	44.7%	278	47.8%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表348 暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たさない(新)

		入院後1年時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
暫定基準 BPRSかつ行動障害かつ生活障害を満たさない(新)	非該当	328	90.6%	185	84.5%	513	88.3%
	該当	34	9.4%	34	15.5%	68	11.7%
	合計	362	100.0%	219	100.0%	581	100.0%

図表349 1.自殺念慮(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 1.自殺念慮(op)	なし	107	81.7%	92	65.2%	199	73.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	20	15.3%	34	24.1%	54	19.9%
	月に1~2回程度	2	1.5%	4	2.8%	6	2.2%
	週に1回程度	1	.8%	4	2.8%	5	1.8%
	週に2~3回	1	.8%	2	1.4%	3	1.1%
	ほぼ毎日	0	.0%	5	3.5%	5	1.8%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表350 2.自傷行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 2.自傷行為(op)	なし	115	87.8%	107	75.9%	222	81.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	14	10.7%	24	17.0%	38	14.0%
	月に1~2回程度	1	.8%	4	2.8%	5	1.8%
	週に1回程度	0	.0%	4	2.8%	4	1.5%
	週に2~3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	1	.8%	2	1.4%	3	1.1%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表351 3.言語的暴力(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 3.言語的暴力(op)	なし	67	51.1%	75	53.2%	142	52.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	22	16.8%	28	19.9%	50	18.4%
	月に1~2回程度	15	11.5%	15	10.6%	30	11.0%
	週に1回程度	11	8.4%	10	7.1%	21	7.7%
	週に2~3回	11	8.4%	7	5.0%	18	6.6%
	ほぼ毎日	5	3.8%	6	4.3%	11	4.0%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表352 4.身体的暴力(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 4.身体的暴力(op)	なし	91	69.5%	106	75.2%	197	72.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	21	16.0%	23	16.3%	44	16.2%
	月に1~2回程度	11	8.4%	3	2.1%	14	5.1%
	週に1回程度	5	3.8%	4	2.8%	9	3.3%
	週に2~3回	1	.8%	2	1.4%	3	1.1%
	ほぼ毎日	2	1.5%	3	2.1%	5	1.8%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表353 5.衝動性(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 5.衝動性(op)	なし	51	38.9%	53	37.6%	104	38.2%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	35	26.7%	43	30.5%	78	28.7%
	月に1~2回程度	18	13.7%	16	11.3%	34	12.5%
	週に1回程度	11	8.4%	12	8.5%	23	8.5%
	週に2~3回	8	6.1%	8	5.7%	16	5.9%
	ほぼ毎日	8	6.1%	9	6.4%	17	6.3%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表354 6.器物破壊(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 6.器物破壊(op)	なし	93	71.0%	105	74.5%	198	72.8%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	24	18.3%	27	19.1%	51	18.8%
	月に1~2回程度	7	5.3%	1	.7%	8	2.9%
	週に1回程度	3	2.3%	3	2.1%	6	2.2%
	週に2~3回	4	3.1%	3	2.1%	7	2.6%
	ほぼ毎日	0	.0%	2	1.4%	2	.7%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表355 7.他者への迷惑行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 7.他者への迷惑行為(op)	なし	48	36.6%	74	52.5%	122	44.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	34	26.0%	32	22.7%	66	24.3%
	月に1~2回程度	18	13.7%	10	7.1%	28	10.3%
	週に1回程度	11	8.4%	10	7.1%	21	7.7%
	週に2~3回	13	9.9%	9	6.4%	22	8.1%
	ほぼ毎日	7	5.3%	6	4.3%	13	4.8%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表356 8.性的逸脱行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 8.性的逸脱行為(op)	なし	114	87.0%	136	96.5%	250	91.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	10	7.6%	4	2.8%	14	5.1%
	月に1～2回程度	7	5.3%	0	.0%	7	2.6%
	週に1回程度	0	.0%	1	.7%	1	.4%
	週に2～3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表357 9.放火(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 9.放火(op)	なし	127	96.9%	141	100.0%	268	98.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	4	3.1%	0	.0%	4	1.5%
	月に1～2回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に1回程度	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	週に2～3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表358 10.失禁(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 10.失禁(op)	なし	106	80.9%	116	82.3%	222	81.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	7	5.3%	3	2.1%	10	3.7%
	月に1～2回程度	10	7.6%	6	4.3%	16	5.9%
	週に1回程度	3	2.3%	5	3.5%	8	2.9%
	週に2～3回	2	1.5%	4	2.8%	6	2.2%
	ほぼ毎日	3	2.3%	7	5.0%	10	3.7%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表359 11.不潔行為(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 11.不潔行為(op)	なし	103	78.6%	122	86.5%	225	82.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	11	8.4%	8	5.7%	19	7.0%
	月に1～2回程度	11	8.4%	6	4.3%	17	6.3%
	週に1回程度	4	3.1%	2	1.4%	6	2.2%
	週に2～3回	0	.0%	1	.7%	1	.4%
	ほぼ毎日	2	1.5%	2	1.4%	4	1.5%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表360 12.衣類を破る・脱ぐ(op)

		入院後3ヶ月時点					
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外		合計	
問17-(1) 12.衣類を破る・脱ぐ(op)	なし	114	87.0%	127	90.1%	241	88.6%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	12	9.2%	5	3.5%	17	6.3%
	月に1～2回程度	3	2.3%	3	2.1%	6	2.2%
	週に1回程度	1	.8%	2	1.4%	3	1.1%
	週に2～3回	1	.8%	2	1.4%	3	1.1%
	ほぼ毎日	0	.0%	2	1.4%	2	.7%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表361 13.収集癖(op)

		入院後3ヶ月時点				合計	
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外			
問17-(1) 13.収集癖(op)	なし	115	87.8%	134	95.0%	249	91.5%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	7	5.3%	5	3.5%	12	4.4%
	月に1~2回程度	4	3.1%	0	.0%	4	1.5%
	週に1回程度	1	.8%	0	.0%	1	.4%
	週に2~3回	2	1.5%	1	.7%	3	1.1%
	ほぼ毎日	2	1.5%	1	.7%	3	1.1%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表362 14.てんかん発作(op)

		入院後3ヶ月時点				合計	
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外			
問17-(1) 14.てんかん発作(op)	なし	123	93.9%	135	95.7%	258	94.9%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	6	4.6%	5	3.5%	11	4.0%
	月に1~2回程度	0	.0%	1	.7%	1	.4%
	週に1回程度	2	1.5%	0	.0%	2	.7%
	週に2~3回	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	ほぼ毎日	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表363 15.気分易変性(op)

		入院後3ヶ月時点				合計	
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外			
問17-(1) 15.気分易変性(op)	なし	31	23.7%	38	27.0%	69	25.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	29	22.1%	26	18.4%	55	20.2%
	月に1~2回程度	19	14.5%	26	18.4%	45	16.5%
	週に1回程度	20	15.3%	15	10.6%	35	12.9%
	週に2~3回	16	12.2%	18	12.8%	34	12.5%
	ほぼ毎日	16	12.2%	18	12.8%	34	12.5%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表364 16.集中力低下(op)

		入院後3ヶ月時点				合計	
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外			
問17-(1) 16.集中力低下(op)	なし	33	25.2%	37	26.2%	70	25.7%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	21	16.0%	24	17.0%	45	16.5%
	月に1~2回程度	9	6.9%	23	16.3%	32	11.8%
	週に1回程度	17	13.0%	13	9.2%	30	11.0%
	週に2~3回	22	16.8%	16	11.3%	38	14.0%
	ほぼ毎日	29	22.1%	28	19.9%	57	21.0%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%

図表365 17.特定の物や人に対する強いこだわり(op)

		入院後3ヶ月時点				合計	
		F20 統合失調症		F20 統合失調症以外			
問17-(1) 17.特定の物や人に対する強いこだわり(op)	なし	45	34.4%	65	46.1%	110	40.4%
	この1ヶ月にその他の症状、問題行動は見られなかったが、それ以前にはあった	15	11.5%	15	10.6%	30	11.0%
	月に1~2回程度	11	8.4%	13	9.2%	24	8.8%
	週に1回程度	19	14.5%	11	7.8%	30	11.0%
	週に2~3回	19	14.5%	13	9.2%	32	11.8%
	ほぼ毎日	22	16.8%	24	17.0%	46	16.9%
	合計	131	100.0%	141	100.0%	272	100.0%