

表 2 血管腫・血管奇形患者の全国推定実患者数と全国推定延べ患者数（64歳以下）

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	全体 (95%CI)	特定可 (95%CI)	特定不可 (95%CI)
実患者数	114,012 (101,035-126,989)	50,509 (41,945-59,072)	63,503 (53,802-73,205)
うちリンパ管腫	7,402 (3,886-11,161)	1,632 (471-5,684)	5,770 (2,715-9,100)
延べ患者数	133,534 (119,695-147,372)	53,245 (44,504-61,986)	80,289 (69,598-90,980)
うちリンパ管腫	7,535 (4,002-11,312)	1,632 (471-5,684)	5,903 (2,829-9,254)
2010年			
実患者数	112,666 (98,996-126,336)	48,512 (39,739-57,285)	64,154 (53,714-74,594)
うちリンパ管腫	8,809 (4,741-12,890)	1,693 (223-4,767)	7,116 (3,555-10,743)
延べ患者数	130,117 (115,675-144,560)	50,759 (41,860-59,658)	79,358 (68,001-90,716)
うちリンパ管腫	9,020 (4,920-13,133)	1,693 (223-4,767)	7,327 (3,731-10,989)
2009年			
実患者数	108,723 (92,932-124,515)	43,445 (33,720-53,171)	65,278 (52,892-77,664)
うちリンパ管腫	9,004 (4,342-14,100)	1,183 (157-7,728)	7,820 (3,660-13,444)
延べ患者数	125,266 (108,543-141,989)	45,009 (35,013-55,005)	80,257 (66,871-93,643)
うちリンパ管腫	9,257 (4,543-14,406)	1,183 (157-7,728)	8,074 (3,858-13,753)

2年期間有病率をもとにした推定

2010-2011年	全体 (95%CI)	特定可 (95%CI)	特定不可 (95%CI)
実患者数	178,849 (162,297-195,401)	78,435 (67,549-89,321)	100,414 (87,973-112,855)
うちリンパ管腫	12,249 (7,588-16,909)	2,773 (777-5,421)	9,476 (5,402-13,549)

3年期間有病率をもとにした推定

2009-2011年	全体 (95%CI)	特定可 (95%CI)	特定不可 (95%CI)
実患者数	209,217 (192,245-226,189)	89,820 (78,687-100,952)	119,397 (106,608-132,186)
うちリンパ管腫	14,689 (9,813-19,566)	3,074 (1,025-5,769)	11,615 (7,332-15,898)

3年期間（2年以上受診した対象限定）有病率をもとにした推定

2009-2011年	全体 (95%CI)	特定可 (95%CI)	特定不可 (95%CI)
実患者数	55,146 (46,403-63,890)	23,678 (18,628-29,520)	31,468 (24,614-38,321)
うちリンパ管腫	3,860 (1,840-8,059)	499 (50-5,113)	3,361 (1,490-7,424)

表3 全国推定実患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	53,871 (50,816-56,926)	19,677 (18,362-20,993)	34,194 (32,454-35,933)
10-19	10,392 (8,926-11,859)	3,467 (2,859-4,076)	6,925 (6,066-7,783)
20-29	6,398 (5,355-7,442)	2,107 (1,685-2,528)	4,292 (3,670-4,914)
30-39	10,889 (9,496-12,283)	4,493 (3,867-5,120)	6,396 (5,629-7,163)
40-49	10,667 (9,166-12,168)	4,685 (3,990-5,381)	5,981 (5,176-6,786)
50-59	12,199 (10,209-14,188)	3,564 (2,816-4,313)	8,634 (7,393-9,875)
60-64	9,596 (7,068-12,124)	4,824 (3,667-5,980)	4,772 (3,400-6,144)
合計	114,012 (101,035-126,989)	42,818 (37,245-48,391)	71,194 (63,790-78,598)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	50,488 (47,457-53,519)	19,083 (17,759-20,407)	31,405 (29,697-33,112)
10-19	8,258 (6,896-9,620)	2,647 (2,091-3,203)	5,611 (4,805-6,417)
20-29	6,425 (5,341-7,509)	2,381 (1,918-2,844)	4,044 (3,422-4,665)
30-39	12,776 (11,216-14,337)	5,080 (4,391-5,768)	7,696 (6,824-8,568)
40-49	10,971 (9,381-12,561)	4,651 (3,930-5,372)	6,320 (5,452-7,189)
50-59	13,930 (11,640-16,220)	4,553 (3,655-5,451)	9,377 (7,985-10,768)
60-64	9,818 (7,066-12,570)	3,538 (2,487-4,588)	6,280 (4,579-7,982)
合計	112,666 (98,996-126,336)	41,933 (36,232-47,634)	70,733 (62,764-78,703)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	53,947 (49,928-57,966)	19,458 (17,734-21,182)	34,488 (32,194-36,783)
10-19	7,117 (5,540-8,694)	2,293 (1,653-2,932)	4,824 (3,886-5,762)
20-29	6,395 (5,168-7,621)	1,848 (1,384-2,312)	4,547 (3,784-5,310)
30-39	9,633 (7,998-11,268)	3,555 (2,854-4,257)	6,078 (5,144-7,012)
40-49	10,216 (8,346-12,085)	3,199 (2,448-3,950)	7,016 (5,898-8,135)
50-59	13,076 (10,432-15,720)	4,676 (3,578-5,773)	8,400 (6,854-9,947)
60-64	8,340 (5,520-11,160)	4,359 (3,065-5,653)	3,982 (2,456-5,508)
合計	108,723 (92,932-124,515)	39,388 (32,717-46,059)	69,335 (60,215-78,456)

表 4 全国推定実患者数<性・年齢階級別> (2年期間、3年期間)

2年期間有病率をもとにした推定

2010-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	80,197 (76,452-83,942)	29,964 (28,335-31,594)	50,233 (48,117-52,348)
10-19	14,548 (12,809-16,287)	4,935 (4,209-5,662)	9,613 (8,600-10,626)
20-29	10,677 (9,309-12,044)	3,780 (3,209-4,351)	6,896 (6,100-7,693)
30-39	19,850 (17,946-21,753)	7,935 (7,091-8,778)	11,915 (10,855-12,975)
40-49	16,771 (14,891-18,651)	7,184 (6,323-8,046)	9,587 (8,568-10,606)
50-59	20,938 (18,285-23,591)	6,481 (5,457-7,505)	14,457 (12,827-16,086)
60-64	15,869 (12,606-19,132)	6,921 (5,536-8,306)	8,948 (7,070-10,826)
合計	178,849 (162,297-195,401)	67,201 (60,160-74,241)	111,648 (102,137-121,160)

3年期間有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	112,767 (108,356-117,178)	41,889 (39,974-43,805)	70,878 (68,382-73,373)
10-19	14,501 (12,767-16,235)	4,919 (4,195-5,643)	9,582 (8,572-10,591)
20-29	10,447 (9,108-11,785)	3,702 (3,143-4,261)	6,745 (5,965-7,524)
30-39	19,341 (17,486-21,196)	7,731 (6,909-8,553)	11,610 (10,577-12,643)
40-49	16,771 (14,891-18,651)	7,184 (6,323-8,046)	9,587 (8,568-10,606)
50-59	20,328 (17,752-22,904)	6,297 (5,303-7,292)	14,031 (12,449-15,612)
60-64	15,063 (11,885-18,241)	6,711 (5,347-8,075)	8,351 (6,537-10,166)
合計	209,217 (192,245-226,189)	78,434 (71,194-85,675)	130,783 (121,051-140,514)

3年期間(2年以上受診した対象限定) 有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	29,249 (26,995-31,504)	10,739 (9,766-11,712)	18,510 (17,229-19,792)
10-19	4,269 (3,349-5,189)	1,048 (714-1,383)	3,221 (2,635-3,806)
20-29	2,597 (1,930-3,263)	894 (619-1,168)	1,703 (1,311-2,095)
30-39	4,489 (3,593-5,384)	1,916 (1,507-2,326)	2,572 (2,086-3,059)
40-49	4,570 (3,588-5,553)	2,030 (1,572-2,488)	2,540 (2,015-3,065)
50-59	5,521 (4,220-6,823)	1,069 (659-1,479)	4,452 (3,561-5,343)
60-64	4,451 (2,728-6,174)	1,468 (830-2,106)	2,983 (1,898-4,067)
合計	55,146 (46,403-63,890)	19,165 (15,668-22,662)	35,981 (30,735-41,228)

表5 全国推定実患者数のうち疾患部位を特定できる患者数<性・年齢階級別>（1年期間）

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	23,814 (21,778-25,851)	8,871 (7,987-9,756)	14,943 (13,791-16,095)
10-19	5,881 (4,781-6,980)	1,855 (1,410-2,299)	4,026 (3,371-4,681)
20-29	1,937 (1,366-2,508)	575 (354-795)	1,363 (1,012-1,713)
30-39	5,392 (4,418-6,367)	1,916 (1,507-2,326)	3,476 (2,911-4,041)
40-49	4,094 (3,165-5,023)	1,718 (1,297-2,139)	2,376 (1,869-2,884)
50-59	5,117 (3,857-6,376)	1,069 (659-1,479)	4,047 (3,197-4,897)
60-64	4,274 (2,580-5,968)	1,888 (1,164-2,611)	2,386 (1,416-3,356)
合計	50,509 (41,945-59,072)	17,892 (14,378-21,405)	32,617 (27,567-37,667)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	22,746 (20,705-24,787)	8,985 (8,075-9,894)	13,762 (12,629-14,894)
10-19	4,567 (3,566-5,568)	1,235 (855-1,615)	3,332 (2,710-3,953)
20-29	2,244 (1,599-2,889)	1,088 (775-1,402)	1,155 (823-1,488)
30-39	5,778 (4,732-6,824)	2,117 (1,672-2,561)	3,661 (3,060-4,263)
40-49	4,479 (3,463-5,494)	1,860 (1,404-2,317)	2,618 (2,059-3,178)
50-59	5,313 (3,894-6,732)	1,875 (1,299-2,451)	3,438 (2,595-4,281)
60-64	3,386 (1,782-4,990)	943 (401-1,486)	2,442 (1,381-3,504)
合計	48,512 (39,739-57,285)	18,103 (14,482-21,725)	30,409 (25,257-35,560)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	23,085 (20,438-25,731)	9,266 (8,075-10,457)	13,819 (12,363-15,274)
10-19	3,698 (2,568-4,827)	1,079 (640-1,518)	2,619 (1,928-3,310)
20-29	2,709 (1,902-3,517)	968 (632-1,304)	1,741 (1,269-2,213)
30-39	3,534 (2,545-4,523)	1,255 (838-1,671)	2,279 (1,707-2,851)
40-49	3,767 (2,650-4,883)	933 (527-1,339)	2,834 (2,122-3,545)
50-59	4,164 (2,678-5,650)	1,364 (771-1,957)	2,800 (1,907-3,693)
60-64	2,490 (940-4,039)	1,162 (494-1,831)	1,327 (446-2,209)
合計	43,445 (33,720-53,171)	16,027 (11,978-20,076)	27,419 (21,743-33,095)

表 6 全国推定実患者数のうち疾患部位を特定できる患者数<性・年齢階級別> (2年期間、3年期間)

2年期間有病率をもとにした推定

2010-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	34,881 (32,403-37,358)	13,265 (12,179-14,351)	21,616 (20,224-23,007)
10-19	8,001 (6,720-9,282)	2,427 (1,918-2,937)	5,574 (4,802-6,345)
20-29	3,310 (2,542-4,078)	1,499 (1,140-1,859)	1,811 (1,403-2,220)
30-39	9,662 (8,339-10,986)	3,526 (2,964-4,089)	6,136 (5,375-6,897)
40-49	7,068 (5,849-8,287)	2,889 (2,343-3,436)	4,179 (3,506-4,852)
50-59	9,207 (7,448-10,965)	2,813 (2,138-3,487)	6,394 (5,310-7,478)
60-64	6,306 (4,248-8,363)	2,726 (1,857-3,596)	3,579 (2,391-4,767)
合計	78,435 (67,549-89,321)	29,146 (24,538-33,754)	49,289 (43,011-55,567)

3年期間有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	47,088 (44,224-49,951)	18,010 (16,751-19,268)	29,078 (27,473-30,683)
10-19	7,975 (6,698-9,252)	2,419 (1,911-2,927)	5,556 (4,787-6,325)
20-29	3,239 (2,488-3,991)	1,468 (1,116-1,820)	1,771 (1,372-2,171)
30-39	9,415 (8,125-10,704)	3,436 (2,888-3,984)	5,979 (5,237-6,720)
40-49	7,068 (5,849-8,287)	2,889 (2,343-3,436)	4,179 (3,506-4,852)
50-59	8,939 (7,231-10,646)	2,733 (2,077-3,388)	6,206 (5,154-7,258)
60-64	6,096 (4,072-8,120)	2,517 (1,681-3,352)	3,579 (2,391-4,767)
合計	89,820 (78,687-100,952)	33,472 (28,768-38,176)	56,348 (49,920-62,776)

3年期間 (2年以上受診した対象限定) 有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	14,352 (12,764-15,939)	5,803 (5,088-6,518)	8,548 (7,677-9,420)
10-19	2,658 (1,949-3,366)	484 (257-711)	2,174 (1,693-2,655)
20-29	1,009 (610-1,408)	192 (64-319)	818 (546-1,089)
30-39	1,846 (1,279-2,413)	595 (367-823)	1,251 (912-1,591)
40-49	1,288 (770-1,806)	469 (249-689)	819 (521-1,117)
50-59	1,333 (749-1,935)	119 (0-255)	1,214 (749-1,680)
60-64	1,193 (507-2,653)	0 (0-774)	1,193 (507-1,879)
合計	23,678 (18,628-29,520)	7,660 (6,024-10,089)	16,018 (12,604-19,431)

表7 全国推定実患者数のうち疾患部位を特定できない患者数<性・年齢階級別>（1年期間）

1年期間有病率をもとにした推定<性・年齢階級別>

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	30,057 (27,774-32,339)	10,806 (9,830-11,781)	19,251 (17,944-20,558)
10-19	4,511 (3,541-5,482)	1,613 (1,198-2,028)	2,899 (2,343-3,454)
20-29	4,461 (3,588-5,335)	1,532 (1,172-1,892)	2,929 (2,416-3,443)
30-39	5,497 (4,504-6,490)	2,577 (2,102-3,052)	2,920 (2,402-3,438)
40-49	6,573 (5,394-7,751)	2,967 (2,414-3,521)	3,605 (2,980-4,230)
50-59	7,082 (5,551-8,613)	2,495 (1,869-3,121)	4,587 (3,682-5,492)
60-64	5,322 (3,450-7,195)	2,936 (2,034-3,839)	2,386 (1,416-3,356)
合計	63,503 (53,802-73,205)	24,926 (20,619-29,233)	38,577 (33,182-43,972)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	27,742 (25,497-29,987)	10,099 (9,135-11,063)	17,643 (16,362-18,924)
10-19	3,691 (2,771-4,611)	1,412 (1,006-1,818)	2,279 (1,765-2,794)
20-29	4,181 (3,315-5,047)	1,293 (951-1,634)	2,889 (2,363-3,414)
30-39	6,998 (5,841-8,156)	2,963 (2,437-3,489)	4,035 (3,403-4,666)
40-49	6,492 (5,269-7,716)	2,791 (2,232-3,349)	3,702 (3,037-4,367)
50-59	8,617 (6,820-10,414)	2,678 (1,990-3,367)	5,939 (4,831-7,046)
60-64	6,432 (4,202-8,662)	2,594 (1,695-3,494)	3,838 (2,507-5,169)
合計	64,154 (53,714-74,594)	23,830 (19,446-28,213)	40,324 (34,269-46,380)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	30,862 (27,835-33,890)	10,192 (8,944-11,441)	20,670 (18,891-22,449)
10-19	3,419 (2,320-4,519)	1,214 (748-1,679)	2,205 (1,571-2,839)
20-29	3,685 (2,766-4,605)	880 (560-1,200)	2,805 (2,206-3,405)
30-39	6,099 (4,797-7,402)	2,300 (1,736-2,865)	3,799 (3,060-4,537)
40-49	6,449 (4,953-7,945)	2,266 (1,634-2,898)	4,183 (3,319-5,047)
50-59	8,912 (6,725-11,099)	3,312 (2,388-4,236)	5,600 (4,337-6,863)
60-64	5,851 (3,496-8,205)	3,196 (2,088-4,305)	2,654 (1,408-3,901)
合計	65,278 (52,892-77,664)	23,361 (18,099-28,624)	41,917 (34,793-49,040)

表 8 全国推定実患者数のうち疾患部位を特定できない患者数（2年期間、3年期間）

2年期間有病率をもとにした推定

2010-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	45,316 (42,498-48,134)	16,699 (15,481-17,917)	28,617 (27,017-30,217)
10-19	6,547 (5,372-7,722)	2,508 (1,990-3,026)	4,039 (3,382-4,696)
20-29	7,366 (6,239-8,494)	2,281 (1,838-2,725)	5,085 (4,401-5,770)
30-39	10,187 (8,820-11,555)	4,408 (3,779-5,037)	5,779 (5,041-6,518)
40-49	9,703 (8,271-11,134)	4,295 (3,629-4,961)	5,408 (4,642-6,173)
50-59	11,731 (9,743-13,718)	3,669 (2,898-4,439)	8,062 (6,845-9,280)
60-64	9,563 (7,030-12,097)	4,194 (3,116-5,273)	5,369 (3,914-6,824)
合計	100,414 (87,973-112,855)	38,054 (32,731-43,378)	62,359 (55,242-69,477)

3年期間有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	65,679 (62,309-69,050)	23,879 (22,431-25,328)	41,800 (39,878-43,722)
10-19	6,526 (5,355-7,697)	2,500 (1,983-3,016)	4,026 (3,371-4,681)
20-29	7,207 (6,104-8,311)	2,234 (1,800-2,669)	4,973 (4,304-5,643)
30-39	9,926 (8,594-11,258)	4,295 (3,682-4,908)	5,631 (4,912-6,351)
40-49	9,703 (8,271-11,134)	4,295 (3,629-4,961)	5,408 (4,642-6,173)
50-59	11,389 (9,459-13,319)	3,564 (2,816-4,313)	7,825 (6,643-9,006)
60-64	8,967 (6,516-11,417)	4,194 (3,116-5,273)	4,772 (3,400-6,144)
合計	119,397 (106,608-132,186)	44,962 (39,457-50,467)	74,435 (67,151-81,719)

3年期間（2年以上受診した対象限定）有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	14,898 (13,297-16,499)	4,936 (4,276-5,596)	9,962 (9,021-10,903)
10-19	1,611 (1,032-2,191)	564 (319-810)	1,047 (713-1,381)
20-29	1,588 (1,062-2,114)	702 (459-946)	886 (603-1,168)
30-39	2,642 (1,954-3,331)	1,322 (982-1,661)	1,321 (972-1,669)
40-49	3,282 (2,449-4,116)	1,562 (1,160-1,964)	1,721 (1,289-2,153)
50-59	4,188 (3,042-5,335)	951 (564-1,337)	3,238 (2,478-3,998)
60-64	3,258 (1,779-4,736)	1,468 (830-2,106)	1,790 (949-2,630)
合計	31,468 (24,614-38,321)	11,505 (8,589-14,420)	19,963 (16,025-23,902)

表9 全国推定実患者数のうちリンパ管種関連疾患患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	2,008 (1,417-2,599)	1,267 (933-1,602)	740 (484-997)
10-19	886 (463-1,309)	242 (81-403)	644 (382-906)
20-29	932 (533-1,332)	319 (155-483)	613 (378-848)
30-39	626 (386-1,109)	0 (0-244)	626 (386-866)
40-49	558 (215-901)	312 (133-492)	246 (83-409)
50-59	1,166 (549-1,783)	356 (120-593)	809 (429-1,190)
60-64	1,226 (323-2,129)	629 (211-1,047)	597 (111-1,082)
合計	7,402 (3,886-11,161)	3,126 (1,633-4,864)	4,275 (2,253-6,298)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,962 (1,359-2,565)	1,045 (734-1,355)	917 (625-1,210)
10-19	791 (368-1,214)	265 (89-440)	526 (279-773)
20-29	633 (291-975)	272 (116-429)	361 (175-547)
30-39	1,685 (1,123-2,248)	564 (335-794)	1,121 (788-1,454)
40-49	626 (287-978)	85 (0-182)	542 (287-796)
50-59	1,942 (1,095-2,790)	536 (228-844)	1,406 (867-1,946)
60-64	1,169 (218-2,121)	472 (88-855)	698 (130-1,265)
合計	8,809 (4,741-12,890)	3,238 (1,589-4,899)	5,571 (3,152-7,991)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	2,203 (1,388-3,018)	1,390 (928-1,851)	813 (459-1,166)
10-19	1,094 (471-1,717)	405 (136-673)	689 (335-1,044)
20-29	290 (97-808)	0 (0-325)	290 (97-483)
30-39	1,182 (621-1,743)	314 (105-522)	868 (515-1,221)
40-49	805 (270-1,339)	400 (134-665)	405 (136-674)
50-59	2,697 (1,495-3,899)	974 (473-1,475)	1,723 (1,022-2,424)
60-64	733 (0-1,576)	291 (0-625)	442 (0-951)
合計	9,004 (4,342-14,100)	3,773 (1,777-6,137)	5,231 (2,565-7,963)

表 10 全国推定実患者数のうちリンパ管種関連疾患患者数<性・年齢階級別> (2年期間、3年期間)

2年期間有病率をもとにした推定

2010-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	2,907 (2,188-3,626)	1,683 (1,296-2,071)	1,224 (892-1,555)
10-19	1,131 (651-1,611)	324 (137-510)	808 (514-1,102)
20-29	1,088 (651-1,525)	391 (207-575)	697 (443-950)
30-39	1,970 (1,382-2,557)	543 (322-763)	1,427 (1,060-1,794)
40-49	808 (403-1,213)	234 (79-390)	574 (324-823)
50-59	2,402 (1,503-3,300)	734 (389-1,078)	1,668 (1,114-2,222)
60-64	1,943 (810-3,077)	1,049 (509-1,588)	895 (301-1,489)
合計	12,249 (7,588-16,909)	4,957 (2,940-6,974)	7,291 (4,648-9,935)

3年期間有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	5,495 (4,508-6,482)	2,668 (2,183-3,153)	2,827 (2,325-3,329)
10-19	1,128 (649-1,606)	323 (137-508)	805 (512-1,098)
20-29	1,064 (637-1,492)	383 (203-563)	681 (433-929)
30-39	1,919 (1,346-2,492)	529 (314-744)	1,390 (1,033-1,748)
40-49	808 (403-1,213)	234 (79-390)	574 (324-823)
50-59	2,332 (1,459-3,204)	713 (378-1,048)	1,619 (1,081-2,156)
60-64	1,943 (810-3,077)	1,049 (509-1,588)	895 (301-1,489)
合計	14,689 (9,813-19,566)	5,898 (3,803-7,993)	8,791 (6,010-11,572)

3年期間 (2年以上受診した対象限定) 有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,205 (746-1,664)	734 (479-988)	471 (266-676)
10-19	483 (167-800)	161 (30-292)	322 (137-507)
20-29	464 (180-748)	192 (64-319)	273 (116-429)
30-39	615 (288-943)	198 (67-330)	417 (221-613)
40-49	164 (31-585)	0 (0-288)	164 (31-297)
50-59	928 (429-1,445)	119 (0-255)	809 (429-1,190)
60-64	0 (0-1,874)	0 (0-774)	0 (0-1,100)
合計	3,860 (1,840-8,059)	1,404 (640-3,246)	2,456 (1,200-4,813)

表 11 全国推定実患者数のうちリンパ管種関連疾患をもち疾患部位を特定できる患者数<性・年齢階級別  
> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定			
2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	535 (230-841)	334 (162-505)	202 (68-336)
10-19	403 (137-681)	81 (0-173)	322 (137-507)
20-29	0 (0-487)	0 (0-235)	0 (0-251)
30-39	139 (26-496)	0 (0-244)	139 (26-252)
40-49	0 (0-590)	0 (0-288)	0 (0-302)
50-59	135 (0-728)	0 (0-438)	135 (0-290)
60-64	419 (78-1, 861)	419 (78-761)	0 (0-1, 100)
合計	1, 632 (471-5, 684)	834 (240-2, 645)	798 (231-3, 039)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	350 (97-604)	209 (70-348)	141 (26-256)
10-19	176 (0-378)	88 (0-190)	88 (0-189)
20-29	68 (0-413)	68 (0-146)	0 (0-266)
30-39	369 (127-623)	71 (0-152)	299 (127-471)
40-49	90 (0-506)	0 (0-312)	90 (0-194)
50-59	290 (0-624)	134 (0-288)	156 (0-336)
60-64	349 (0-1, 620)	0 (0-870)	349 (0-750)
合計	1, 693 (223-4, 767)	570 (70-2, 305)	1, 123 (153-2, 462)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	347 (117-1, 007)	347 (117-578)	0 (0-428)
10-19	0 (0-1, 006)	0 (0-498)	0 (0-508)
20-29	0 (0-681)	0 (0-325)	0 (0-357)
30-39	217 (41-779)	0 (0-386)	217 (41-394)
40-49	133 (0-784)	133 (0-287)	0 (0-498)
50-59	195 (0-1, 213)	195 (0-419)	0 (0-795)
60-64	291 (0-2, 257)	291 (0-625)	0 (0-1, 632)
合計	1, 183 (157-7, 728)	966 (117-3, 117)	217 (41-4, 612)

表 12 全国推定実患者数のうちリンパ管種関連疾患をもち疾患部位を特定できる患者数<性・年齢階級別  
> (2年期間、3年期間)

2年期間有病率をもとにした推定

2010-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	608 (283-933)	404 (214-594)	204 (68-339)
10-19	404 (137-683)	81 (0-174)	323 (137-509)
20-29	65 (0-397)	65 (0-140)	0 (0-257)
30-39	496 (227-775)	68 (0-146)	428 (227-629)
40-49	82 (0-464)	0 (0-288)	82 (0-176)
50-59	400 (52-767)	122 (0-263)	278 (52-504)
60-64	718 (78-1,402)	419 (78-761)	298 (0-641)
合計	2,773 (777-5,421)	1,160 (293-2,365)	1,613 (485-3,056)

3年期間有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	936 (539-1,334)	667 (424-910)	269 (114-424)
10-19	403 (137-681)	81 (0-173)	322 (137-507)
20-29	64 (0-389)	64 (0-137)	0 (0-251)
30-39	483 (221-755)	66 (0-142)	417 (221-613)
40-49	82 (0-464)	0 (0-288)	82 (0-176)
50-59	389 (50-745)	119 (0-255)	270 (50-489)
60-64	718 (78-1,402)	419 (78-761)	298 (0-641)
合計	3,074 (1,025-5,769)	1,416 (503-2,667)	1,658 (523-3,103)

3年期間(2年以上受診した対象限定) 有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	268 (50-486)	133 (25-242)	135 (25-244)
10-19	161 (0-347)	81 (0-173)	81 (0-173)
20-29	0 (0-487)	0 (0-235)	0 (0-251)
30-39	70 (0-393)	0 (0-244)	70 (0-149)
40-49	0 (0-590)	0 (0-288)	0 (0-302)
50-59	0 (0-936)	0 (0-438)	0 (0-498)
60-64	0 (0-1,874)	0 (0-774)	0 (0-1,100)
合計	499 (50-5,113)	214 (25-2,395)	285 (25-2,718)

表 13 全国推定実患者数のうちリンパ管種関連疾患をもち疾患部位を特定できない患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,472 (966-1,978)	934 (647-1,221)	538 (319-757)
10-19	483 (167-800)	161 (30-292)	322 (137-507)
20-29	932 (533-1,332)	319 (155-483)	613 (378-848)
30-39	487 (275-942)	0 (0-244)	487 (275-698)
40-49	558 (215-901)	312 (133-492)	246 (83-409)
50-59	1,031 (447-1,615)	356 (120-593)	675 (328-1,022)
60-64	806 (111-1,533)	210 (0-451)	597 (111-1,082)
合計	5,770 (2,715-9,100)	2,293 (1,084-3,777)	3,477 (1,631-5,324)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,612 (1,065-2,159)	836 (558-1,113)	776 (507-1,046)
10-19	615 (246-984)	176 (33-320)	438 (213-664)
20-29	565 (244-886)	204 (69-340)	361 (175-547)
30-39	1,316 (816-1,816)	494 (279-709)	822 (537-1,107)
40-49	536 (219-866)	85 (0-182)	451 (219-684)
50-59	1,652 (877-2,427)	402 (135-669)	1,250 (742-1,759)
60-64	821 (88-1,606)	472 (88-855)	349 (0-750)
合計	7,116 (3,555-10,743)	2,668 (1,162-4,187)	4,448 (2,393-6,556)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,855 (1,102-2,608)	1,042 (643-1,442)	813 (459-1,166)
10-19	1,094 (471-1,717)	405 (136-673)	689 (335-1,044)
20-29	290 (97-808)	0 (0-325)	290 (97-483)
30-39	965 (451-1,479)	314 (105-522)	651 (345-957)
40-49	671 (186-1,157)	267 (50-483)	405 (136-674)
50-59	2,502 (1,353-3,651)	779 (331-1,227)	1,723 (1,022-2,424)
60-64	442 (0-2,023)	0 (0-1,072)	442 (0-951)
合計	7,820 (3,660-13,444)	2,807 (1,265-5,745)	5,014 (2,395-7,699)

表 14 全国推定実患者数のうちリンパ管種関連疾患をもち疾患部位を特定できない患者数<性・年齢階級別>（2年期間、3年期間）

2年期間有病率をもとにした推定

2010-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	2,299 (1,659-2,939)	1,279 (942-1,617)	1,020 (717-1,322)
10-19	727 (339-1,116)	243 (82-404)	485 (257-712)
20-29	1,022 (601-1,444)	326 (158-494)	697 (443-950)
30-39	1,474 (960-1,987)	475 (268-681)	999 (692-1,306)
40-49	726 (339-1,112)	234 (79-390)	492 (261-722)
50-59	2,001 (1,181-2,822)	611 (297-926)	1,390 (884-1,896)
60-64	1,226 (323-2,129)	629 (211-1,047)	597 (111-1,082)
合計	9,476 (5,402-13,549)	3,798 (2,037-5,558)	5,678 (3,365-7,991)

3年期間有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	4,559 (3,661-5,456)	2,001 (1,581-2,421)	2,558 (2,081-3,035)
10-19	725 (337-1,113)	242 (81-403)	483 (256-710)
20-29	1,000 (588-1,412)	319 (155-483)	681 (433-929)
30-39	1,436 (936-1,936)	463 (261-664)	973 (674-1,273)
40-49	726 (339-1,112)	234 (79-390)	492 (261-722)
50-59	1,943 (1,147-2,740)	594 (288-900)	1,349 (858-1,840)
60-64	1,226 (323-2,129)	629 (211-1,047)	597 (111-1,082)
合計	11,615 (7,332-15,898)	4,482 (2,657-6,307)	7,133 (4,675-9,591)

3年期間（2年以上受診した対象限定）有病率をもとにした推定

2009-2011	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	937 (534-1,340)	600 (370-831)	337 (163-510)
10-19	322 (81-575)	81 (0-173)	242 (81-402)
20-29	464 (180-748)	192 (64-319)	273 (116-429)
30-39	546 (235-856)	198 (67-330)	348 (169-526)
40-49	164 (31-585)	0 (0-288)	164 (31-297)
50-59	928 (429-1,445)	119 (0-255)	809 (429-1,190)
60-64	0 (0-1,874)	0 (0-774)	0 (0-1,100)
合計	3,361 (1,490-7,424)	1,190 (501-2,970)	2,172 (989-4,454)

表 15 全国推定延べ患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	66,690 (63,298-70,082)	23,746 (22,301-25,191)	42,944 (40,996-44,892)
10-19	11,922 (10,359-13,486)	3,709 (3,080-4,338)	8,213 (7,278-9,148)
20-29	7,603 (6,468-8,739)	2,426 (1,973-2,878)	5,178 (4,495-5,861)
30-39	12,061 (10,597-13,524)	4,691 (4,051-5,332)	7,369 (6,546-8,192)
40-49	11,549 (9,987-13,110)	5,076 (4,352-5,800)	6,473 (5,636-7,310)
50-59	13,008 (10,962-15,054)	3,564 (2,816-4,313)	9,444 (8,146-10,741)
60-64	10,700 (8,024-13,377)	5,033 (3,852-6,215)	5,667 (4,172-7,162)
合計	133,534 (119,695-147,372)	48,246 (42,426-54,067)	85,287 (77,269-93,306)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	61,516 (58,174-64,858)	22,984 (21,531-24,436)	38,532 (36,642-40,422)
10-19	10,716 (9,175-12,256)	3,088 (2,488-3,688)	7,628 (6,687-8,568)
20-29	7,496 (6,329-8,663)	2,585 (2,103-3,068)	4,910 (4,226-5,595)
30-39	14,449 (12,788-16,109)	5,856 (5,117-6,595)	8,593 (7,672-9,514)
40-49	11,502 (9,874-13,129)	4,820 (4,086-5,554)	6,681 (5,788-7,575)
50-59	14,622 (12,269-16,974)	5,089 (4,140-6,038)	9,533 (8,130-10,936)
60-64	9,818 (7,066-12,570)	3,538 (2,487-4,588)	6,280 (4,579-7,982)
合計	130,117 (115,675-144,560)	47,959 (41,951-53,967)	82,158 (73,724-90,592)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	65,432 (61,007-69,857)	23,744 (21,840-25,648)	41,688 (39,167-44,209)
10-19	8,624 (6,891-10,357)	2,697 (2,004-3,391)	5,927 (4,887-6,966)
20-29	6,861 (5,589-8,133)	2,024 (1,539-2,509)	4,837 (4,050-5,624)
30-39	10,063 (8,393-11,733)	3,660 (2,948-4,371)	6,403 (5,445-7,362)
40-49	11,155 (9,198-13,113)	3,599 (2,803-4,396)	7,556 (6,395-8,717)
50-59	14,348 (11,585-17,110)	4,871 (3,750-5,991)	9,477 (7,834-11,120)
60-64	8,783 (5,880-11,685)	4,359 (3,065-5,653)	4,424 (2,815-6,033)
合計	125,266 (108,543-141,989)	44,953 (37,948-51,958)	80,312 (70,595-90,030)

表 16 全国推定延べ患者数のうち疾患部位を特定できる患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	25,492 (23,387-27,598)	9,405 (8,495-10,315)	16,087 (14,892-17,282)
10-19	6,042 (4,926-7,157)	1,935 (1,481-2,390)	4,106 (3,445-4,768)
20-29	2,073 (1,485-2,661)	575 (354-795)	1,499 (1,131-1,866)
30-39	5,531 (4,545-6,517)	1,916 (1,507-2,326)	3,615 (3,039-4,192)
40-49	4,176 (3,239-5,114)	1,718 (1,297-2,139)	2,458 (1,942-2,974)
50-59	5,656 (4,342-6,971)	1,069 (659-1,479)	4,587 (3,682-5,492)
60-64	4,274 (2,580-5,968)	1,888 (1,164-2,611)	2,386 (1,416-3,356)
合計	53,245 (44,504-61,986)	18,506 (14,957-22,055)	34,739 (29,547-39,930)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	24,081 (21,982-26,181)	9,402 (8,472-10,332)	14,679 (13,510-15,848)
10-19	5,005 (3,964-6,046)	1,235 (855-1,615)	3,770 (3,109-4,431)
20-29	2,605 (1,911-3,299)	1,088 (775-1,402)	1,516 (1,136-1,897)
30-39	5,840 (4,785-6,895)	2,328 (1,862-2,794)	3,512 (2,923-4,101)
40-49	4,744 (3,699-5,789)	1,945 (1,479-2,411)	2,799 (2,221-3,377)
50-59	5,447 (4,007-6,886)	2,009 (1,412-2,605)	3,438 (2,595-4,281)
60-64	3,037 (1,511-4,562)	943 (401-1,486)	2,093 (1,111-3,076)
合計	50,759 (41,860-59,658)	18,951 (15,257-22,646)	31,808 (26,604-37,012)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	23,548 (20,872-26,223)	9,729 (8,509-10,949)	13,819 (12,363-15,274)
10-19	3,560 (2,449-4,671)	1,079 (640-1,518)	2,481 (1,808-3,153)
20-29	2,806 (1,985-3,627)	968 (632-1,304)	1,838 (1,353-2,323)
30-39	3,534 (2,545-4,523)	1,255 (838-1,671)	2,279 (1,707-2,851)
40-49	4,035 (2,873-5,196)	1,066 (633-1,500)	2,968 (2,241-3,696)
50-59	4,595 (3,042-6,147)	1,364 (771-1,957)	3,231 (2,271-4,190)
60-64	2,932 (1,246-4,618)	1,162 (494-1,831)	1,770 (752-2,787)
合計	45,009 (35,013-55,005)	16,623 (12,517-20,730)	28,386 (22,496-34,276)

表 17 全国推定延べ患者数のうち疾患部位を特定できない患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	41,198 (38,532-43,864)	14,341 (13,217-15,465)	26,857 (25,314-28,399)
10-19	5,881 (4,784-6,977)	1,774 (1,339-2,209)	4,106 (3,445-4,768)
20-29	5,530 (4,559-6,501)	1,851 (1,456-2,247)	3,679 (3,103-4,255)
30-39	6,529 (5,449-7,609)	2,775 (2,283-3,268)	3,754 (3,167-4,342)
40-49	7,373 (6,124-8,621)	3,358 (2,769-3,947)	4,015 (3,355-4,675)
50-59	7,352 (5,795-8,909)	2,495 (1,869-3,121)	4,857 (3,926-5,788)
60-64	6,427 (4,355-8,499)	3,146 (2,212-4,080)	3,281 (2,143-4,419)
合計	80,289 (69,598-90,980)	29,740 (25,145-34,336)	50,549 (44,453-56,644)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	37,435 (34,828-40,041)	13,581 (12,464-14,699)	23,853 (22,364-25,342)
10-19	5,710 (4,577-6,844)	1,853 (1,388-2,318)	3,858 (3,189-4,526)
20-29	4,891 (3,954-5,827)	1,497 (1,130-1,864)	3,394 (2,825-3,963)
30-39	8,609 (7,326-9,891)	3,528 (2,954-4,101)	5,081 (4,372-5,790)
40-49	6,758 (5,510-8,006)	2,875 (2,308-3,442)	3,882 (3,202-4,563)
50-59	9,175 (7,314-11,036)	3,080 (2,341-3,819)	6,095 (4,973-7,217)
60-64	6,781 (4,492-9,070)	2,594 (1,695-3,494)	4,187 (2,797-5,577)
合計	79,358 (68,001-90,716)	29,008 (24,279-33,737)	50,350 (43,721-56,979)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	41,884 (38,356-45,412)	14,015 (12,551-15,478)	27,869 (25,805-29,934)
10-19	5,064 (3,734-6,394)	1,618 (1,081-2,156)	3,446 (2,653-4,238)
20-29	4,055 (3,085-5,025)	1,056 (705-1,407)	2,999 (2,379-3,618)
30-39	6,529 (5,183-7,876)	2,405 (1,828-2,982)	4,124 (3,355-4,894)
40-49	7,120 (5,547-8,693)	2,533 (1,864-3,201)	4,588 (3,683-5,492)
50-59	9,753 (7,469-12,037)	3,507 (2,556-4,457)	6,246 (4,912-7,580)
60-64	5,851 (3,496-8,205)	3,196 (2,088-4,305)	2,654 (1,408-3,901)
合計	80,257 (66,871-93,643)	28,330 (22,674-33,986)	51,927 (44,196-59,657)

表 18 全国推定延べ患者数のうち、リンパ管腫関連疾患の患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	2,141 (1,533-2,750)	1,401 (1,049-1,752)	740 (484-997)
10-19	886 (463-1,309)	242 (81-403)	644 (382-906)
20-29	932 (533-1,332)	319 (155-483)	613 (378-848)
30-39	626 (386-1,109)	0 (0-244)	626 (386-866)
40-49	558 (215-901)	312 (133-492)	246 (83-409)
50-59	1,166 (549-1,783)	356 (120-593)	809 (429-1,190)
60-64	1,226 (323-2,129)	629 (211-1,047)	597 (111-1,082)
合計	7,535 (4,002-11,312)	3,260 (1,749-5,014)	4,275 (2,253-6,298)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	2,173 (1,538-2,808)	1,114 (794-1,435)	1,059 (744-1,373)
10-19	791 (368-1,214)	265 (89-440)	526 (279-773)
20-29	633 (291-975)	272 (116-429)	361 (175-547)
30-39	1,685 (1,123-2,248)	564 (335-794)	1,121 (788-1,454)
40-49	626 (287-978)	85 (0-182)	542 (287-796)
50-59	1,942 (1,095-2,790)	536 (228-844)	1,406 (867-1,946)
60-64	1,169 (218-2,121)	472 (88-855)	698 (130-1,265)
合計	9,020 (4,920-13,133)	3,308 (1,649-4,979)	5,713 (3,271-8,154)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	2,319 (1,485-3,152)	1,506 (1,025-1,986)	813 (459-1,166)
10-19	1,232 (575-1,889)	405 (136-673)	827 (439-1,215)
20-29	290 (97-808)	0 (0-325)	290 (97-483)
30-39	1,182 (621-1,743)	314 (105-522)	868 (515-1,221)
40-49	805 (270-1,339)	400 (134-665)	405 (136-674)
50-59	2,697 (1,495-3,899)	974 (473-1,475)	1,723 (1,022-2,424)
60-64	733 (0-1,576)	291 (0-625)	442 (0-951)
合計	9,257 (4,543-14,406)	3,889 (1,874-6,272)	5,369 (2,669-8,135)

表 19 全国推定延べ患者数のうちリンパ管腫関連疾患を持ち疾患部位を特定できる患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	535 (230-841)	334 (162-505)	202 (68-336)
10-19	403 (137-681)	81 (0-173)	322 (137-507)
20-29	0 (0-487)	0 (0-235)	0 (0-251)
30-39	139 (26-496)	0 (0-244)	139 (26-252)
40-49	0 (0-590)	0 (0-288)	0 (0-302)
50-59	135 (0-728)	0 (0-438)	135 (0-290)
60-64	419 (78-1,861)	419 (78-761)	0 (0-1,100)
合計	1,632 (471-5,684)	834 (240-2,645)	798 (231-3,039)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	350 (97-604)	209 (70-348)	141 (26-256)
10-19	176 (0-378)	88 (0-190)	88 (0-189)
20-29	68 (0-413)	68 (0-146)	0 (0-266)
30-39	369 (127-623)	71 (0-152)	299 (127-471)
40-49	90 (0-506)	0 (0-312)	90 (0-194)
50-59	290 (0-624)	134 (0-288)	156 (0-336)
60-64	349 (0-1,620)	0 (0-870)	349 (0-750)
合計	1,693 (223-4,767)	570 (70-2,305)	1,123 (153-2,462)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	347 (117-1,007)	347 (117-578)	0 (0-428)
10-19	0 (0-1,006)	0 (0-498)	0 (0-508)
20-29	0 (0-681)	0 (0-325)	0 (0-357)
30-39	217 (41-779)	0 (0-386)	217 (41-394)
40-49	133 (0-784)	133 (0-287)	0 (0-498)
50-59	195 (0-1,213)	195 (0-419)	0 (0-795)
60-64	291 (0-2,257)	291 (0-625)	0 (0-1,632)
合計	1,183 (157-7,728)	966 (117-3,117)	217 (41-4,612)

表 20 全国推定延べ患者数のうちリンパ管腫関連疾患を持ち疾患部位を特定できない患者数<性・年齢階級別> (1年期間)

1年期間有病率をもとにした推定

2011年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,606 (1,080-2,132)	1,067 (760-1,374)	538 (319-757)
10-19	483 (167-800)	161 (30-292)	322 (137-507)
20-29	932 (533-1,332)	319 (155-483)	613 (378-848)
30-39	487 (275-942)	0 (0-244)	487 (275-698)
40-49	558 (215-901)	312 (133-492)	246 (83-409)
50-59	1,031 (447-1,615)	356 (120-593)	675 (328-1,022)
60-64	806 (111-1,533)	210 (0-451)	597 (111-1,082)
合計	5,903 (2,829-9,254)	2,426 (1,198-3,930)	3,477 (1,631-5,324)
2010年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,823 (1,241-2,404)	905 (617-1,194)	917 (625-1,210)
10-19	615 (246-984)	176 (33-320)	438 (213-664)
20-29	565 (244-886)	204 (69-340)	361 (175-547)
30-39	1,316 (816-1,816)	494 (279-709)	822 (537-1,107)
40-49	536 (219-866)	85 (0-182)	451 (219-684)
50-59	1,652 (877-2,427)	402 (135-669)	1,250 (742-1,759)
60-64	821 (88-1,606)	472 (88-855)	349 (0-750)
合計	7,327 (3,731-10,989)	2,738 (1,220-4,268)	4,589 (2,511-6,720)
2009年	男女 (95%CI)	男性 (95%CI)	女性 (95%CI)
0-9	1,971 (1,196-2,746)	1,158 (737-1,580)	813 (459-1,166)
10-19	1,232 (575-1,889)	405 (136-673)	827 (439-1,215)
20-29	290 (97-808)	0 (0-325)	290 (97-483)
30-39	965 (451-1,479)	314 (105-522)	651 (345-957)
40-49	671 (186-1,157)	267 (50-483)	405 (136-674)
50-59	2,502 (1,353-3,651)	779 (331-1,227)	1,723 (1,022-2,424)
60-64	442 (0-2,023)	0 (0-1,072)	442 (0-951)
合計	8,074 (3,858-13,753)	2,922 (1,359-5,882)	5,152 (2,499-7,870)

## Appendix 標準病名リスト

### 1) 【解析対象 疾患部位の特定が可能な疾病 (リスト1)】

ICD10細分類	標準病名
D180(血管腫, 全ての部位)	咽頭血管腫
	陰のう血管腫
	下口唇血管腫
	下腿血管腫
	下咽頭血管腫
	外陰部血管腫
	環指血管腫
	眼瞼血管腫
	眼窩内血管腫
	顔面血管腫
	頸部血管腫
	肩部血管腫
	口唇血管腫
	喉頭血管腫
	項部血管腫
	腰部血管腫
	示指血管腫
	手掌血管腫
	手背血管腫
	手部血管腫
	小指血管腫
	上眼瞼血管腫
	上口唇血管腫
	上腕血管腫
	舌血管腫
	前胸部血管腫
	前腕血管腫
	足底血管腫
	足部血管腫
	体幹血管腫
	大腿血管腫
	中指血管腫
	殿部血管腫
	背部血管腫
	腹部血管腫
	母指血管腫
	頬部血管腫
	腋窩血管腫
	頬粘膜血管腫