


Supplemental file A

Supplemental file B

AUTHOR QUERY FORM

	Journal: YAJEM Article Number: 54213	Please e-mail or fax your responses and any corrections to: Elsevier E-mail: corrections.esi@elsevier.spitech.com Fax: +1 619 699 6721
---	---	---

Dear Author,

Please check your proof carefully and mark all corrections at the appropriate place in the proof (e.g., by using on-screen annotation in the PDF file) or compile them in a separate list. Note: if you opt to annotate the file with software other than Adobe Reader then please also highlight the appropriate place in the PDF file. To ensure fast publication of your paper please return your corrections within 48 hours.

For correction or revision of any artwork, please consult <http://www.elsevier.com/artworkinstructions>.

Any queries or remarks that have arisen during the processing of your manuscript are listed below and highlighted by flags in the proof. Click on the 'Q' link to go to the location in the proof.

Location in article	Query / Remark: click on the Q link to go Please insert your reply or correction at the corresponding line in the proof
<u>Q1</u>	Please confirm that given names and surnames have been identified correctly.
<u>Q2</u>	Please check if the expanded form provided for "echo" is appropriate.
<u>Q3</u>	Please check if the expanded form provided for "ECG" is appropriate. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> Please check this box if you have no corrections to make to the PDF file. <input type="checkbox"/> </div>

Thank you for your assistance.

救命データベースシステム

救急トリアージ
共通
管理

ログインユーザ： SDT 太郎 ログアウト

担当医

ERリーダー ▽選択してください

担当後期研修医 ▽選択してください
担当後期研修医 ER1さん
担当後期研修医 ER2さん
担当後期研修医 ER3さん
担当後期研修医 ER4さん

担当初期研修医 ▽選択してください
担当初期研修医 ER1さん
担当初期研修医 ER2さん
担当初期研修医 ER3さん
担当初期研修医 ER4さん

経路

外来直来

救急車 3次 2次 1次

院内急変(コードブルー含む)

他院からの転院

その他

受付

診察時刻

ID

初診/再診 初診 再診

名前

名前カナ

不明

ID

年齢 歳

か月

不明

性別 男 女 不明

連絡者 本人 家族 指令センター その他

主訴

既往歴

高血圧 高脂血症 糖尿病 喘息 COPD 胃・十二指腸潰瘍 心疾患
 その他

バイタル

血圧 / mmHg
脈拍 /min
呼吸回数 /min
SpO2 % ルームエアー 酸素
 鼻カニューラ /min
 マスク /min
 リザーバー /min
意識 JCS 0 1 2 3 10 20 30 100 200 300
瞳孔 mm mm

+
±
-

+
±
-

体温 °C

トリアージレベル

- レベル1(蘇生レベル)
- レベル2(緊急)
- レベル3(準緊急)
- レベル4(低緊急)
- レベル5(非緊急)

受け入れ

可 救急部診察 受診予定 分後来院
 不可 他科診察 ▾
 ベッド満床
 処置中
 根本治療医(内視鏡医、外科医等)不在
 手術室使用不可
 その他の理由

救急隊

救急隊
隊長

警察

リセット

登録終了

登録して救急外来カルテへ

Copyright © 2011 University of Tokyo Hospital All Rights Reserved.

救命データベースシステム

救急トリアージ

共通

管理

ログインユーザ：SDT 大郎

▶ 診察開始
▶ Primary survey
▶ 現病歴/既往歴/内服歴/アレルギー/嗜好歴/その他
▶ 主訴/受診理由
内科系 (全身/頭部・顔面/眼/耳/鼻・副鼻腔/咽頭・歯/頸部/呼吸器/心血管系/消化器/ ▶ 泌尿系/生殖器/筋骨格系/精神系/乳房/ その他(一般的問題・社会的問題・新生児小児の特殊病態))
▶ 中毒
▶ 環境因子
▶ 外傷
▶ 熱傷
▶ 処置
▶ 身体所見
▶ 神経学的所見
▶ 緊急度評価
▶ 鑑別疾患
▶ 検査、コンサルト/その他検査/処置
▶ 血液データ
▶ 鑑別疾患
▶ 最終診断
▶ フラン
▶ 退室時バイタル
▶ 病状説明
▶ 転帰
▶ 上級医サイン
▶ 手技(専門医申請用)

Primary survey

軽症 心肺停止

Appearance 落ち着いている 苦悶様 不穏 反応なし
処置⇒ 初療室 観察室 外来

Airway
会話 可 単語のみ 不可
明らかな気道閉塞 有 無
嘔声 有 無
処置⇒ 用手気道確保 ネーザルエアウェイ オーラルエアウェイ

Breathing
努力様呼吸 有 無
左右差 有 無
呼吸回数 /min
SpO2 % ルームエア 酸素
 鼻カニューラ /min
 マスク /min
 リザーバー /min
 酸素投与
処置⇒ 気管挿管
 輪状甲状靭帯穿刺 輪状甲状靭帯切開
 胸腔穿刺 胸腔ドレーン挿入

Circulation
血圧 血圧右 / mmHg
血圧左 / mmHg
橈骨動脈触知 有 無
大腿動脈触知 有 無
頸動脈触知 有 無
Tilt test 陽性 陰性
四肢 warm cold wet dry
脈拍 /min
 輸液 輸血 アルブミン製剤
 FAST レントゲン
 圧迫止血
処置⇒ 緊急内視鏡 緊急IVR 緊急手術
 同期電気ショック 緊急ペーシング
 心臓マッサージ IABP PCPS
 心嚢穿刺・心嚢開窓術 開胸心臓マッサージ

Dysfunction of CNS

ICS 0 1 2 3 10 20 30 100 200 300

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

GCS E GCS V GCS M

瞳孔 mm mm

± ↑
 - ↓

± ↑
 - ↓

明らかな麻痺 有 無

処置⇒ 血液ガス 血糖値

Exposure

明らかな外傷 有 無

体温 °C

処置⇒ 復温 冷却 低体温療法

重症度評価

重篤 重症 中等症 軽症 無症

▼ 現病歴/既往歴/内服歴/アレルギー/嗜好歴/その他

現病歴

患者の話の信頼性 あり 曖昧で、詳細が明確でない 全くない 意識がない

性状を表す7つの特徴

部位

性質

量や重症度

時期

状況

寛解因子、憎悪因子

関連情報

既往歴

高血圧 高脂血症 糖尿病 喘息 COPD

胃・十二指腸潰瘍 心疾患(NYHA II 度以上) てんかん

その他

感染症関連 最近の感冒様症状 抗菌薬暴露歴あり(4か月以内)

脾臓摘出 膠原病 肝疾患 腎病変(透析・腎不全)

担癌状態 化学療法中 移植患者 HIV/AIDS

DVT関連 意識消失の既往 最近(<4週間以内)の手術歴 DVTの既往

その他 最近の外傷 アルコール依存 精神科通院歴

その他

APACHE II score用

慢性併存疾患は

無し

慢性併存疾患を有する非手術患者または緊急手術患者

慢性併存疾患を有する予定手術患者

慢性併存疾患の定義

肝臓	生検で肝硬変、門脈圧亢進、肝不全・肝性昏睡の既往あり
心血管系	NYHA IV 度
	N慢性の拘束性、閉塞性疾患、血管疾患による重度の運動障害(家事不能など)、

呼吸器系	慢性の低酸素血症、高炭酸ガス血症、2次性多血症、重症(40mmHg)肺高圧症、人工呼吸依存状態
腎臓	維持透析
免疫不全	免疫抑制剤や長期または大量ステロイド投与、化学療法、照射療法、白血病、リンパ腫、AIDS

内服歴

無し ホルモン剤の内服 ピルの内服 抗血小板薬 抗凝固薬

アレルギー

無し 有り _____

嗜好歴

タバコ：吸わない 吸う _____本 × _____年 = _____(pack-years)

お酒：全く飲まない 機会飲酒 _____

その他

家族歴 突然死 癌 _____

海外渡航歴 無 有 _____

動物飼育 無 有 _____

妊娠の可能性 無 有

最終月経 _____

同期 規則的 不規則

期間 先月と同じ 長い 短い

出血 普段と同じ 普段より多い 普段より少ない

妊娠歴 _____ P _____ G

閉経年齢 _____歳

職業 _____

精神疾患 無 有 _____

日常生活動作(activities of daily living: ADL)

日常の活動度 _____

Hugh-Jones分類

I	同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者なみにできる
II	同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並には出来ない
III	平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル(1.6km)以上歩ける
IV	休み休みでなければ50m以上歩けない
V	会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない

NYHA分類 _____

NYHA分類

I	心疾患はあるが、通常の身体活動では症状なし
II	普通の身体活動で、疲労・呼吸困難などが出現、通常の身体活動がある程度制限される
III	普通以下の身体活動で愁訴出現。通常の身体活動が高度に制限される
IV	安静時にも呼吸困難を示す

その他 _____

主訴/受診理由

主訴/受診理由 _____

内科系

(全身/頭部・顔面/眼/耳/鼻・副鼻腔/咽頭・歯/頸部/呼吸器/心血管系/消化器/尿路系/生殖器/筋骨格系/精神系/乳房/その他(一般的問題・社会的問題・新生児小児の特殊病態))

全身

- 発熱 意識レベルの変化(傾眠、嗜眠、意識障害) 不隠 痙攣 全身倦怠感
- 全身性浮腫 衰弱 食欲不振 高血圧 最近の体重変化 寝汗・盗汗
- 顔面不良・貧血 不定愁訴

頭部・顔面

- 頭痛 浮遊性めまい 回転性めまい
- 失神、失神様の徴候(near syncope or presyncope)・立ちくらみ 顔面痛

眼

- 眼痛 充血 視力障害 眼窩周囲の腫脹 羞明 複視 飛蚊症 霧視
- 眼脂 視力の再検査

耳

- 耳痛 耳鳴 聴力障害 耳だれ 耳内異物 浮遊性めまい
- 回転性めまい 失神、失神様の徴候(near syncope or presyncope)・立ちくらみ

鼻・副鼻腔

- 鼻閉 鼻水 鼻血 鼻内異物

咽頭(口腔内と咽頭)・歯

- 咽頭痛 嗄声 開口障害 口腔・食道異物 歯肉の出血 歯の痛み
- 舌の痛み

頸部

- 頸部腫脹・頸部痛 咽頭痛 嚥下痛 嚥下困難・嚥下障害 リンパ節腫脹

呼吸器

- 咳嗽 喀痰 鼻閉 喀血 呼吸困難、息切れ 吸気時喘鳴 呼気時喘鳴
- 過換気 アレルギー反応 気道異物 呼吸停止(無呼吸)

心血管系

- 胸痛 胸部不快感 動悸・不整脈
- 失神、失神様の徴候(near syncope or presyncope) 安静時呼吸困難
- 労作性呼吸困難 発作性夜間呼吸困難 両側下肢腫脹・浮腫
- 片側性下肢腫脹・浮腫 全身性浮腫 高血圧 片側性に発赤、熱感のある四肢

消化器

- 腹痛 嘔気・嘔吐 吐血 黒色便またはタール便 血便・下血 黄疸 便秘
- 下痢 側腹部痛 胸やけ 食欲低下・食欲不振 腹部膨隆・腫瘤
- 鼠径部痛・腫瘤 しゃっくり 直腸・会陰部痛 嚥下痛 嚥下困難・嚥下障害

尿路系

- 尿路感染に関する症状 血尿 多飲 多尿 乏尿 側腹部痛 尿閉
- 失禁・失便

生殖器

男性

- 陰嚢痛・腫脹 性器分泌物・性器病変 陰茎膨張 性的暴行

女性

- 月経期以外の出血または性交後出血 性器分泌物・性器病変 外陰部痛・掻痒

膣内異物 陰毛脱落 月経異常 妊娠に関する問題(分娩)

膈内異物 陰容腫脹 月経異常 妊娠に関する問題<20週

妊娠に関する問題>20週 性的暴行

皮膚

- 皮疹 限局性腫脹・発赤 腫瘤・瘤・胼胝 自然にできる皮下出血(紫斑)
他の皮膚異常 掻痒 [(疥癬・シラミ等の)寄生の確認] チアノーゼ 皮膚異物
血液や体液への曝露

筋骨格系

- 上肢痛 下肢痛 関節痛・関節腫脹 頸部痛 腰・背部痛 筋力低下
しびれや感覚障害 浮腫 歩行障害・歩行時痛 ギプスの確認

精神系、神経系

- 意識レベルの変化(傾眠、嗜眠、意識障害) 四肢の脱力・脳血管障害の症状
痙攣 不隠 異常行動、奇異な行動 不安、状況的危機 幻覚、妄想 不眠
自殺企図・希死念慮 抑うつ傾向・自殺行為・自傷行為
振戦やその他の不随意運動 歩行障害・失調歩行・感覚障害(しびれ)
知覚麻痺・知覚異常 浮遊性めまい 回転性めまい
失神、失神様の徴候(near syncope or presyncope)・立ちくらみ

乳房

- 乳房の発赤・圧痛

その他

一般的問題

- 検査値異常 専門医への紹介受診 包帯交換 感染性疾患への曝露
高血糖 低血糖 画像診断目的 医療機器の問題
手術後の合併症 処方箋・投薬希望 [(抜けなくなった)指輪はずし]

社会的問題

- 社会的問題 暴力的・殺人的行為 福祉の問題

新生児・小児の特殊病態

- 新生児の哺乳障害 新生児黄疸 乳児無呼吸発作
フロッピーチャイルド(筋緊張低下児) あやしても泣き止まない乳児
小児の先天性疾患の問題 小児の歩行障害・歩行時痛 小児の破壊的行動

▼ 身体所見

体臭と口臭

- アルコール臭 アセトン臭・ケトン臭 腐息 アーモンド臭
- _____

頭部、顔面、眼、耳、鼻、咽喉

頭部

- 頭部圧痛 前頭部 側頭部(右 左) 頭頂部 後頭部)
活動出血 打撲 擦過傷/創 裂創 刺創 挫滅創 熱傷
Battle's sign バンダの眼サイン
圧痛 腫脹
- _____

顔面

- Horner症候群(眼瞼下垂、縮瞳、無汗) 顔面痙攣 眉毛の外側部が薄い
口唇腫脹
活動出血 打撲 擦過傷/創 裂創 刺創 挫滅創 熱傷

Battle's sign パンダの眼サイン

圧痛 腫脹

眼

瞳孔

瞳孔 mm mm 卵円形・西洋梨型の瞳孔(右 左)



眼瞼、結膜

黄染 貧血様

分泌物(膿性 水溶性)

眼瞼浮腫(右 左) 眼瞼下垂(右 左)

結膜充血(右 左) 結膜下出血(右 左)

角膜輪辺縁の充血(右 左) 感性羞明(右 左)

角膜混濁・浮腫(右 左)

求心性瞳孔障害(APD: afferent pupillary defect) (右 左)

眼球突出(右 左)

熱傷

⇒手技 Seidel Sign(右 左)

眼周囲

疼痛(右 左) 発赤(右 左) 腫脹(右 左)

耳

外耳道

腫脹(右 左) 圧痛(右 左)

発赤(右 左) 出血性小水疱(右 左)

顎関節部圧痛(右 左) 牽引試験して疼痛の憎悪

出血

⇒手技 double ring sign

鼓膜

穿孔(右 左) 漿液性滲出液(右 左) 化膿性滲出液(右 左)

感音性難聴(右 左) 伝音性難聴(右 左)

乳突部

耳介後部の圧痛・発赤・腫脹(右 左) 耳介の前外方変位(右 左)

耳介の熱傷(右 左) Battle's sign

鼻・副鼻腔

鼻

鼻汁(膿性) 鼻汁(水溶性) 鼻茸

鼻出血(右 左)

⇒手技 double ring sign

副鼻腔

前頭洞の圧痛・叩打痛 上顎洞の圧痛・叩打痛(右 左)

篩骨洞の圧痛・叩打痛

前屈時疼痛増強

咽喉(口腔内と咽頭)

口腔内

- 口腔内乾燥 流涎
- 口腔咽頭潰瘍 口腔内の裂傷/挫傷

咽頭

- 発赤(軽度) 発赤(中等度) 発赤(重度)
- 扁桃腺滲出物 点状出血 小水疱
- Fordyce斑 Koplik斑 白苔 敷石状変化
- 咽後後壁の膨隆

⇒手技

- 気道熱傷

口蓋垂

- midline shift

顎

- 開口障害 顎下部腫脹・圧痛 顎の圧痛
- 顎部の疼痛性運動障害(jaw claudication)

歯・歯肉

- 歯の欠損 歯肉からの出血 歯肉発赤・腫脹
- 潰瘍 歯肉増殖 歯牙動揺

舌

- アフタ性潰瘍 筋線維束攣縮

その他

痰

- 膿性 漿液性 ピンク泡沫状 血性
- 透明 白色 黄色 褐色 緑色 さび色

頸部

前頸部

- 呼吸補助筋の使用 吸気時に鎖骨上窩の陥凹
- 項部硬直 Brudzinski徴候
- Kernig徴候 Jolt accentuation
- 咽頭反射 頸部運動制限 斜頸
- 気管偏移(右 左) 皮下気腫 広頸筋を貫く創
- 活動出血 打撲 擦過傷/創
- 裂創 刺創 挫滅創 熱傷
- 圧痛 腫脹
- Zone I Zone II Zone III

リンパ節

前頸部リンパ節

- 腫脹 圧痛

後頸部リンパ節

- 腫脹 圧痛

甲状腺

- 圧痛 びまん性腫脹 単結節 多結節 血管雑音

甲状軟骨の可動時痛

血管

頸動脈雑音(右 左)

頸静脈怒張 頸静脈圧(jugular venous pressure:JVP) cm

後頸部

正中部位圧痛

胸部(肺-骨格)

胸郭

尋麻疹

Frail chest 皮下気腫

活動出血 打撲 擦過傷/創

裂創 刺創 挫滅創 熱傷

圧痛 腫脹

呼吸・呼吸音

頻呼吸 徐呼吸

肋間の吸気時陥凹 片側の胸郭運動の異常 腹式呼吸

呼吸音減弱(右 左)

呼吸音異常(右 左)

Hamman徴候

⇒手技

打診にて鼓音

乳房, 腋窩, 内側上顆リンパ節

腋窩リンパ節触知(右 左)

内側上顆リンパ節触知(右 左)

乳房・乳頭の異常(右 左)

胸部(心血管系)

心臓

頻脈 徐脈

不整

心雑音

収縮期雑音 拡張期雑音(最強点: 大動脈弁領域 肺動脈弁領域 三尖弁領域 僧帽弁領域)

Levine

心膜摩擦音

心音減弱

胸骨上縁の血管雑音

その他

頸静脈怒張

⇒手技

肝頸静脈逆流

頸静脈圧(jugular venous pressure:JVP) cm

腹部

視診

- 腹部膨隆 拍動性腹部腫瘤
- 臍部の膨隆 手術瘢痕の膨隆 鼠径部の膨隆
- 陰嚢内の膨隆 大腿部の膨隆 閉鎖筋部の膨隆
- 皮静脈の拡張 皮疹
- シートベルトサイン
- 活動出血 打撲 擦過傷/創
- 裂創 刺創 挫滅創 熱傷

聴診

- 腸雑音異常(亢進 低下 聴取せず 金属音)
- 血管雑音

触診

- 圧痛 反跳痛 筋性防御
 - 右季肋部 心窩部 左季肋部
 - 右側腹部 臍部 左側腹部
 - 右下腹部 下腹部正中 左下腹部
 - びまん性腹部圧痛
 - 説明のつかない激しい腹痛(腹部所見は比較的正常)

- 脾腫大 肝腫大
- 鼠径リンパ節腫大の腫脹・圧痛
- 腹水
- 胎動 子宮底の高さ cm

⇒手技

- Murphy徴候
- Rovsing徴候 腸腰筋徴候 閉鎖筋徴候
- 肋骨脊柱角の叩打痛(CVA tenderness)

骨盤

- 骨盤の変形 骨盤動揺
- 骨盤の圧痛(恥骨部 大転子部 仙腸関節)

生殖器・会陰部

男性生殖器

- 尿道からの血液 尿道分泌物
- 陰嚢腫脹(右 左) 陰嚢圧痛(右 左)
- 陰嚢上部の圧痛(右 左) blue dot sign
- 陰茎の異常
- 皮下気腫 悪臭の滲出液

⇒手技

- プレーン徴候
- 球海綿体反射 Anal Wink

女性生殖器

- 外陰部病変(潰瘍 発赤)
- 尿道からの血液 膣からの出血
- 尿道分泌物 膣分泌物

⇒手技

子宮頸部動揺痛

肛門・会陰部

失禁 失便

肛門周囲の知覚 肛門周囲の疼痛 肛門周囲の発赤

膀胱直腸障害

活動出血 打撲 擦過傷/創

裂創 刺創 挫滅創 熱傷

⇒手技

直腸診

腫瘍 肛門括約筋の緊張 鮮血便 黒色便

前立腺の高位浮動 前立腺の圧痛 前立腺の熱感

上肢

浮腫(右 左) 冷感(右 左) 疼痛(右 左)

説明のつかない激しい痛み

損傷部位より末梢の運動・知覚・循環障害

活動出血 打撲 擦過傷/創

裂創 刺創 挫滅創 熱傷 手指熱傷

圧痛 腫脹

変形

開放骨折

(Gustilo分類 Grade I Grade II Grade III a Grade III b Grade III c)

関節

圧痛 熱感 発赤 腫脹

可動域制限

動脈

橈骨動脈触知の左右差

橈骨動脈の拍動

上腕動脈の拍動

下肢

浮腫(右 左) 冷感(右 左) 疼痛(右 左)

説明のつかない激しい痛み

損傷部位より末梢の運動・知覚・循環障害

活動出血 打撲 擦過傷/創

裂創 刺創 挫滅創 熱傷 足背熱傷

圧痛 腫脹 変形

開放骨折

(Gustilo分類 Grade I Grade II Grade III a Grade III b Grade III c)

関節

圧痛 熱感 発赤 腫脹

可動域制限

動脈

大腿動脈の拍動 膝窩動脈の拍動 足背動脈の拍動

背部

- 褥瘡
活動出血 打撲 擦過傷/創
裂創 刺創 挫滅創 熱傷
圧痛 腫脹

脊椎

- アライメント異常 叩打痛

Frankel分類

- A B C D E

皮膚

- 発汗 乾燥 温感 冷感
チアノーゼ
圧迫にて退色する発疹 圧迫にて退色しない発疹 境界明瞭な発疹
尋麻疹 硬結(induration) 軟結(fluctuance) 有痛性紅斑
説明がつかない強い疼痛

肺塞栓のリスク評価

年齢(65歳以上)	<input type="text"/>
最近の手術歴(4週間以内)	<input type="text"/>
DVTの既往	<input type="text"/>
最近の外傷	<input type="text"/>
担癌状態	<input type="text"/>
片側の下肢疼痛	<input type="text"/>
喀血	<input type="text"/>
心拍数	<input type="text"/>
下肢疼痛もしくは下肢腫脹	<input type="text"/>
肺塞栓のスコア	<input type="text"/>
肺塞栓のリスク	<input type="text"/>

CURB-65

意識障害	<input type="text"/>
BUN \geq 21mg/dl	<input type="text"/>
呼吸数 \geq 30/min	<input type="text"/>
SpO2 \leq 90%	<input type="text"/>
収縮期血圧(SBP) < 90mmHg	<input type="text"/>
拡張期血圧(DBP) \leq 60mmHg	<input type="text"/>
性別	<input type="text"/>
年齢 \geq 65歳(男性 \geq 70歳、女性: \geq 75歳)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

TRISS

AIS頭頸部(Head)	<input type="text"/>
AIS顔(face)	<input type="text"/>

AIS胸部(Chest)	
AIS腹部(Abdomen)	
AIS四肢(Extremity)	
AIS体表(External)	
ISS	
収縮期血圧(SBP)	
呼吸回数	
意識レベル(GCS)	
RTS	
年齢	
Probability of Survival: Blunt(%)	
Probability of Survival: Penetrating(%)	
SIRS	
体温の変動(38度以上、または、36度以下)	
脈拍数増加(90回/分以上)	
呼吸数増加(20回/分以上)	
PaCO2が32 Torr以下	
白血球数が12,000/μl以上または4,000/μl以下	
SIRSスコア	

▼ 検査、コンサルト/その他検査/処置

検査、コンサルト

- 血液ガス 血算 生化学 凝固(PT,APTT,DIC検査) 赤沈
電解質
肝機能(AST,ALT,T-bil,リパーゼ,ALP) アンモニア濃度
腎機能(BUN,Cre,CK)
甲状腺機能
コルチゾール検査
コリンエステラーゼ
血中ケトン体 有 無
血中インプロバノール濃度
- 尿検査 所見(テストテープ検査含む)
 白血球 有 無
 赤血球 3+ 2+ + ± -
 NIT + ± -
- トリエージ PCP BZO COC AMP THC OPI BAR TCA
妊娠反応 結果 陽性 陰性
便潜血 結果 陽性 陰性
心電図
 1回目取る際に胸痛が 有 無 以前の心電図との変化 有 無
 取った時間 所見
 2回目取る際に胸痛が 有 無 1回目の心電図との変化 有 無

取った時間 所見

3回目取る際に胸痛が 有 無 2回目の心電図との変化 有 無

取った時間 所見

超音波検査 (心エコー、FAST含む) 所見1回目 有 無
所見2回目 有 無
所見3回目 有 無

レントゲン (胸部・腹部等) 所見 有 無

腰椎穿刺 所見: 初圧 cmH2O
終圧 cmH2O

胸腔穿刺 所見

単純CT 所見 有 無

造影CT 所見 有 無

MRI 所見 有 無

造影MRI 所見 有 無

脳波

Gram染色 所見 有 無

迅速抗酸菌検査 ガフキー 号

眼底検査 所見 有 無

眼圧

その他検査

他科コンサルト 無 有

- CCU
- 循環器内科
- 整形外科・脊椎外科
- 脳神経外科
- 呼吸器内科

その他検査

- 血清クリプトコッカス
- 髄液クリプトコッカス抗原検査
- 真菌培養
- 血清トキソプラズマ原虫抗体
- 脳脊髄液細胞診

処置

胃管挿入 (経鼻 経口)

破傷風トキソイド

破傷風免疫グロブリン 250U 500U 1500U

抗生剤

種類 量

血液データ

退室時バイタル

血圧 / mmHg

脈拍 /min

呼吸回数 /min

SpO2 % ルームエアー

酸素

酸素消費量 /min

呼吸器用 _____ /min

マスク _____ /min

リザーバー _____ /min

JCS 0 1 2 3 10 20 30 100 200 300

GCS E GCS V GCS M

体温 _____ °C