



- E 章旗開始

• Primary survey

• 現病歴 / 既往歴 / 内服歴 / アレルギー / 嗜好歴 / その他

• 主訴 / : 妥協理由

内將 Ji洋

{ 全身 / 望書部額面 / 眼 / 耳 / 鼻孟H尋 / h. / 咽湾齒 / 頸部 / 呼吸器 / 心血管系 / 沼化器 / 線路系 / 生殖器 / 'MJ 骨格系 / 精神系 / 乳房 / その他 { 鍛的問題社会的問題新生児小児の特殊病態) }

中画

環境因子

外傷

理性儀

処置

• 身体所見

、 神主要学的所見

• 緊急 AHf 価

• 鑑gll 疾患

• 後査、コザルト / その他検査 / : 処置

、 血濠データ

争 鑑gll 疾患

、 巖終 & 断

• プツン

• 退 m 時バイタル

• 病状 m 明

伝帰

• 上級医ザ イン

• 手量産 { 専門医申筋周 }

仁豆E 記

Appearance 落ち着いている 苦悶様 不穏 反応なし
 処置 初需要室 観察室 外来

Airway 会話 可 言語のみ 不可
 明らかな気道閉塞 有 無
 声 有 無
 処置 用手気道確保 経ザルエアウェイ オラルエアウェイ

Breathing 有 無
 努力様呼吸 有 無
 左右差 有 無
 呼吸回数 〃 〃
 SpO2 〃 〃% レムエアー
 酸素
 鼻カニユラ 〃 / min
 マスク 〃 / min
 ザハ 〃 / min

処置 酸素投与
 気管持管
 給状甲状朮帯穿車 輪状甲状朮帯切開
 胸腔穿車 胸腔ドレ ン挿入

Circulation 血圧右 〃 〃 mmHg

4. 桡骨動脈触東 有 無
 大 腿 動 脈 触 東 有 無
 頸 動 脈 触 東 有 無

Tilt test 陽性 陰性
 四肢 warm cold wet dry
 JJK 拍 〃 〃 min

処置 輸夜 輸血 アルブミン製剤
 FAST レントゲ
 ン 圧迫止血
 緊急内視鏡 緊急 IVR 緊急手術 〃
 同期電気ショック 緊急ペ シンク
 心臓マッサージ DIA BP PCPS
 心臓穿刺 心5露開窓 開胸心臓マッサージ

Dysfunction of CNS 仁豆 E 記 1 門 フ 門 1 門 10 門 フ の 門 '10 門 100 門 フ 00 門 ' \00

GCS E GCS V GCS M
 E mm mm

明らかな廓痔 有 無
 処置 = 血液ガス 白血球

Exposure

明らかな外傷 有 無
 体 E
 処置 D 表置 冷却 低体温療法

重注鹿野 f 晶

重篤 重症 軽症 無症

E 現病問往 慶州 他

現病歴

急者の 頼性 あり 曖昧で、詳細が明確でない 全くない 窓織がない

性状を表す Y つの符徴

部位
 性質
 量や重震度
 時期
 状況
 寛解因子、憎悪因子
 関連情報

既往歴

高血圧 高脂血症 糖尿病 指息 COPD
胃・十二指腸 貧霧 心疾患 (NYHA II 度以上) てんかん
 その他
 感染症関連 最近の感冒様症状 抗菌薬暴露歴あり (4 か月以内)
腎臓摘出 雲原病 肝疾患 管病変 (透析・W 不全)
担癌状態 化学療法中 移植患者 H V/AIDS
 DVT 関連 意識消失の既往 最近 (< 4 週間以内) の手術歴 DVT の既往
 往 その他 最近の外傷 アルコ ル依存 精神科通院歴
 その他

APACHE I score 周

慢性併存疾患立

無し

慢性併存疾患を有する非手術患者または緊急手術患者

慢性併存疾患を有する予定手術患者

慢性併存疾患の定義

月 障で肝硬変、門脈圧亢進、肝不全 肝性雑の既往あり

下市官 - NYHA I V 度

N 慢性の拘束性、閉塞性疾患、血管疾患による重度の運動隊司 (J (事不能など))、

呼吸線系 慢性の低酸素血症、高炭菌室ガス血症、2次性多血症、重症（40mmHg）市南庄症、
仏工呼吸依存悠

「前」f 一戸待透析

免疫不全 夜蚕抑制 J や長期または大量ステロイト投与、化学療法、照射療法、
包血病リバ艦、AIDS

内服歴

無し ルモン剤の内服 ロルの内服 抗血小板薬 抗凝固

アレルギー

無し 有り

嗜好歴

タバコ 吸わない 吸う 本 × 年 包 (pack-years)

お酒 : 全く飲まない 機会飲酒

その他

家族歴 突然死 癌

海外渡航歴 無 有

動物飼育 無 有

妊娠の可能性 無 有

経閉終月経

周期 正常 不規則

期間 先月と同じ 長い 短い

量 普段と同じ 普段より多い 普段より少ない

国馬区 p G
閉経年齢 歳

●●

精神疾患 無 有

日常生活動作 (activities of daily living:AOL)



日常の活動度

Hugh- Jones 分類

「ア」因研夜康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者なみに行ける

「ケ」同様の健康者と同様に歩行できるが、坂道、階段は健康者並には行けない

「田」肘も健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル (1.6km) 以上行ける

「内」阿研育所 11.f50m 以上歩けない

「γ」同 替えにも息切れがす 切れの為抽できない

NYHA 分類

NYHA 分級

「I」L 疾患はあるが、通常の身体活動では症状なし

「II」問研体活動で疲労明困難などが時通常の身体活動がある li.11:制限桁吉

「III」向研耐体活動で低陽時通常の身体活動精度時服される

「N」同前研幅緩を示す

その他

F

主訴 / 抑制

主脈 / 受修理由

内科,

(全身/墨聖書官 録画/暇/:耳/鼻 副鼻腔/ 貫 歯 / 頭部/呼吸墨/心血管系/滑化器/ 尿路系/生殖器/筋骨絡系/精神系/乳房/ その他{一般的問題 社会的問題 新生児小児の特殊痛態})

全身

□発揮在 □意織レベルの変化(傾眠、略眠、意識障害) □不隠 □痘怨 □全身倦怠感 □全身性 芋臆 □衰弱 □食欲不振 □高血圧 □最近の体重変化 □寝干盗干 □行面不良 貧血 □不定愁訴

阿部. III 面

□C 痛 □浮遊性めまい □回転性めまい □失神、失神様の徴候 (near syncope or presyncope) □立ちくらみ □顔窃痛

眼

□DR 痛 □充血 □視力障害 □眼禽周囲の腫脹 □差明 □複視 □飛蚊症 □鱗視 □DU 旨 □視力の再検査

耳

□耳痛 □耳鳴 □聴力障害 □耳だれ □耳内異物 □浮遊性めまい □回転性めまい □失神、失神様の徴候 (near syncope or presyncope) □立ちくらみ

興 副鼻腔

□鼻問 □局水 □a 而 □鼻内異効

咽報 □口腔内と咽量的・菌

□E 母 Sllt □D 复声 □現月 □障害 □口腔 食道異効 □歯肉の鼻出 □歯の痛み □舌の痛み

頸部

□現 56 綾 fl □殺害陷 □咽頭痛 □暖下箔 □瞬下因 II □嘆下障害 □DJ : /バ筋腫 a

呼吸器

□咳嚇 □事 □鼻閉 □事血 □呼吸困要量、息切れ □吸気自音嶋鳴 □呼気自音嶋鳴 □過換気 □アレルギー 反応 □氣道異物 □呼吸停止 (無呼吸)

心血管系

□胸痛 □胸部不快感 □動降 不笠脈 □失神、失神様の徴候 (near syncope or presyncope) □安勝目呼吸困総 □労作性呼吸困総 □発作性夜間呼吸困難 □両 fl 下般腫脹 浮腫 □片 fl 性下肢腫脹・芋腫 □全身 性浮腫 □高血圧 □片側性に発赤、熱砲のある図版

消化器

□腹痛 □唱気 □Jli 吐 □吐血 □黒色便またはタ ル便 □血便・下血 □貸痘 □便秘 □下痢 □for 腹部痛 □胸やけ □食欲低下・食欲不振 □腹部 B 隠・腫沼 □鼠 f 歪音 Bli・雄高 i0., ゆっくり □直腸・会陰部痛 □瞬下 1高 □時下困鱗・軍下陣害

尿路系

□尿 § 惑徐に関する症状 □血尿 □多飲 □多尿 □乏尿 □刺服部 1富 □尿閉 □共禁 失使

生殖器

男性

□印章表痛 □鍵脹 □生殖器分泌物 □性器病変 □白董茎膨張 □性的暴行

女性

□月経期以外の出血または性交後出血 □生殖器分泌物 □性器病変 □外陰昔日盲 搔痔 , , , 関機..... む 「r」 a 器問盤 「r」 晶 「r」 , , , ず術開 . , , -a 7 eaca , , m

Jn 圏内異例 L 除雪腹版 L 付 給異吊 L 吐 蠅置い関9 包向走! !<...LUIII

妊娠に関する問題 > 20 週 性的暴行

皮膚

口 J 事 民局性経 Hi 発赤 口腫完 : * ii 餅艇 口自然にできる皮下出血 (祭斑)

口他の皮膚異常 口疥癬 口(続 ii シラミ等の) 寄生の 認 口チアノ ゼ 口皮膚異物 白血液や体液への曝露

筋骨格系

口上級痛 E 下級痛 口関節痛 関節腫 痛 fia 8B 痛 口腹部痛 E 筋力低下

Q_ ひれや感覚障害 口芽腫 口歩行障害 歩行時痛 口ギプスの磁 .

精神系、得経系

口認知レベルの変化 (傾眠、8 番眠、意識障害) 口四肢の脱力脳血管障害の症状

口 m 経 口不隠 口異常行動、奇異な行動 口不安、状況的危機 口幻覚、妄想 口不眠 口

自殺企図 特死念慮 口抑うつ傾向 自殺行為自傷行為

口被戦やその他の不随意運動 口歩行障害 失調歩行 忍覚障害 (しびれ) 口知覚麻

滞 知覚異常 口浮遊性めまい 口回転性めまい

口失神、失神様の徴候 (near syncope or presyncope) 立ちくらみ

口乳房の発赤・圧痛

その他

一般的問題

口検査値異常 口専門医への紹介受 口包帯交換 口感染性疾患への UI

口高血縛 口低血穩 E 画像 断目的 E 医療機器の問題

口手術後の合併症 口処方妥 投薬希望 口(抜けなくなった) 指輪はずし

社会的問題

口社会的問題 口暴力的 殺人的行為 口福祉の問題

新生児小児の特殊病態

口新生児の 哺乳陣害 口新生児黄疸 口乳児無呼吸発作

口ロロピ チャイルド (筋緊張低下児) 仁協やしても泣き止まない乳児

口小児の先天性疾患の問題 口小児の歩行障害 歩行時痛 口小児の破犠的行動

E 開

体臭と口臭

口アルコール臭 口アセトン臭 ケトン臭 口腐息 口アモンド臭

!! 部 顔面、眼 耳 鼻 咽喉

頭部

口 E 里郡庄 11 口前 E 里郡 口刺頭部 (口右 口左) 口顳 I 貴郡 口後頭部)

白 血 口打撲 目標毒 I 口裂 11 口利 fl) 口投 ' " ti 口司

口 tie 5 51gn 口ベンダの 眠ザイン

口 口鍾 fl!

顔面

口 Horner 症候群 (口眼自由下蓋、縮瞳、無汗) 口顔面窪笑 口眉毛の外債 II 音 E が薄い 口容

臆 fl!

口苗劃 1 品血 口 T 撲 口探過傷 / 富 1) 口裂書 1) 口刺書 1) 口挫滅書 1) 口脱傷

title sog ハン賓の6 ワイン

1百 種

眼

III

瞳孔 一三 mm 仁二二 mm 四 円形 E 芋梨型の町

固

大

眼 結膜

質検 貧血様

分泌物 (膿性 水溶性)

眼 浮腫 (右 左) 眼 投下垂 (右 左)

結膜充血 (右 左) 結膜下出血 (右 左)

角膜輪辺縁の充血 (右 左) 感性差明 (右 左)

角膜混濁 浮腫 (右 左)

求心性瞳孔障害 (APO :afferent pupillary defect) (右 左) 眼突出 (右 左)

換 f 鞅

手筏 eidel Sign 古 左) 蛾周

困

事痛 (右 左) 発赤 (右 左) 腫脹 (右 左)

耳

外耳逃

腫 .II (右 左) 圧箔 (右 左)

発若年 (右 左) 富血性小水泡 (右 左)

顎関節 aBJ王痛 (右 左) 牽引試験して疹痛の憎悪 出血

手技 double ring sign

E 削真

穿孔 (右 左) 殺 夜性 善也液 (右 左) 化膿性 毒.t 液 (右 左) 感管性 総聴 (右 左) 伝音性 難聴 (右 左)

事し突昔日

耳介後部の圧痛・発赤・腫脹 { 右 左 } 耳介の前外方変位 (惜 ; £)

耳川の終傷 右 左) Battle's sign

し

向副鼻腔

鼻 t(II 性) 鼻汁 (水溶性) 鼻茸

右 左

手筏 D vuble rmg sign

III JJ空

前 ! II 洞の圧箔 叩打箔 上顎洞の圧箔 ONn 痛 (右 左) 筋骨洞の圧痛 叩打痛

前厄 事痛増強

咽喉 (口腔内と咽頭)

- 線内
- 胞内乾燥 泌
- 股咽 E 費 宣痕 腔内の裂傷 / 鏡傷
- 咽 eft
- 赤 (健康) 赤 (中等度) 赤 (重度)
- 扁桃腺 書出物 点状鼻血 小水泡
- Fordyce 斑 Koplik 斑 白舌 敷石状変化
- 咽後後笠の膨隆

手技

- 氣曹熱傷
- 靨童垂
- midline shift 顎
- 開陣害 顎下部腫脹・圧力高 顎の圧痛
- 頰昔印の事 痛性運動障害 (jaw claudication)
- llm. 齲肉
- 齒の欠損 齒肉からの出血 齒肉発赤・腫脹 置
- 錫 齒肉増殖 齒牙動揺
- 舌
- アフト性治療 筋纖維束筆箱 その他
- fi
- 服 f 主 穀液性 ロンク泡京状 白血性
- 透明 白色 黄色 褐色 緑色 E 陰び色

頰部

- HUB
- 呼吸補助筋の使用 吸気時に鎖骨上窩の陥凹 貢
- 郡硬直 Brudzinski 徴候
- Kernig 徴候 Jolt accentuation
- 咽開反射 頰部運動制限 斜顎
- 氣箭移 (右 左) 皮下気腫 広重量筋を貫く書 1]
- 6 納品血 打撲 際過傷害 1]
- ト:llll 利 41] 澄減書 1] 勢傷
- 径llt ' 札
- Zone E Zone ill
- リンパ節 前頰部リンパ
- 節
- 目重 II 庄
- 痛 後頰部リン
- パ節 緩股
- 圧痛 甲 1 犬 1
- 車
- 庄 1 百 嚙ん性腹自長 単結節 新吉節 血管雑音

服部 豊 拍動性服部錘簿
艇部の 豊 手術療痕の 1郡豊 趾部の 豊
胎産内の 豊 大腿部の膨隠 閉鎖筋部の 豊 皮静脈の拡張 皮疹
トベルトサイン
活動出血 打撲 擦過傷 / 書 1)
裂書 1) 刺草 1) 挫見書 1) 完全
 傷 聴
脇雑音異常 (亢進 低下 聴取せず 金属音) 血管雑音
 員宅
圧 1高 反跳痛 筋性防御
右季肋部 心窩部 左季肋部
右 IJ服部 脂部 左 IJ服部
右下服部 下服部正中 左下服部
F まん性服部圧痛
説明のつかない激しい腹痛 (服部所見は比較的正常)
 牌錘大 肝艦大
リンパ節錘大の錘脹 圧痛 服
 水
胎動 子宮底の前 11-12cm
手技
Murphy 徴候
Rovsing 徴候 脇腹筋徴候 閉鎖筋徴候 肋骨脊柱
 角の叩打痛 (CVA tenderness)

骨盤

骨皇室の変形 骨盤動揺
骨盤の圧痛 (恥骨部 大転子部 山脇関節)

生殖器 陸古 ?

男性生殖器
尿からの血液 尿道分泌物
陰量産錘脹 (右 左) 陰嚢圧痛 (右 左)
陰量産上部の圧痛 (右 左) blue dot sign
陰茎の異常
皮下気腫 悪臭の 幸也 夜
手技
プレ ン徴候
球 毎綿体反射 Anal Wink
 女性生殖器
外陰部病変 (貧疹 発赤)
尿からの血液 膣からの出血
尿道分泌物 膣分泌物

昌子夜

子宮聖書官 6 動揺痛

門会限額

失禁 失便

肛門周囲の主目覚 肛門周囲の第筋 肛門周囲の発赤

脇蹴直腸障害

叫 白H主 擦過傷 / 舎 I

制書 J 控 j 貧富 J 急傷

手技

直腸 !

緩沼 U 門括約筋の緊張 鮮血便 黒色便

前立腺の志位浮動 前立腺の圧痛 前立腺の湾葱

上肢

事臆 (右 左) 冷感 (右 左) 疹痛 (右 左)

脱明のつかない激しい痛み

損傷昔日位より末梢の運動 長目覚 循環障害

吾釣出血 打撲 擦過傷 / 富 U

3I J 利害 J 坐局書 U 勢傷 手指鋭傷

圧 1 高 睡肱 変

1t

明徴骨折

(Gustilo 分 ; , OGrade I C並: >rade II OGrade ma OG de D de Ei)

関節

圧痛 熱感 発赤 腫緩 可動

犠制限

動脈

UI 骨動脈触知の左右差 11 骨

動脈の拍動

上腕動脈の拍動

仁

下肢

浮腫 (右 左) 冷感 (右 左) 疹痛 (右 左)

脱明のつかない激しい痛み

真 f 甥吉川位より末梢の運動・長目覚・循環障

害 6 凱出血 打撲 擦過傷 / : 富 J

!!JJ 利 it! 證減書 U 勢傷 足背殺傷

' + IY 重服 変形

腔骨折

Hilo 令 C 均 rade I E 焰 rade II E 泊 rade ma OG de D ade mc.)

関節

圧痛 由民感 発赤 腫 fi 可

可動級制限

動脈

大腿動脈の拍動 膝窩動脈の拍動 足背動脈の拍動

背部

偶乙

..... Ht話 嚔寄書

利害I 径崎龜 II 脱傷

種目表

市F干量

.ト異常田打痛

F rankel 分対

A B C D E

皮膚

癢干 乾燥 量感 冷感

チアノゼ

圧迫にて退色する発疹 圧迫にて退色しない発疹 境界明瞭な発疹

尊麻疹 硬結 (induration) 軟骨疔 (fluctuance) 有痛性紅斑

脱因がつかない強い疹痛

肺塞栓のリスク評価

年齢 (65歳以上)

ft 近の手術箇 (4週間以内)

DVT の既往

ft 近の外傷

館員 E 状態

片側 | の下般 | 事痛

喀血

心的臣賞

下肢疼痛もしくは下般腫 H

H市 Z事後のスコア

月市 強のリスク

CURB-65

意識障害

BUN 孟 mg/dl

呼吸数孟 30/min

SpO2 孟 90%

収 S事期血压 (SBP) <90mmHg

鉞張費用血压 (DBP) 孟 60mmHg

1生男 II

AIS 創 (face)

AIS 胸部 (Chest)	<input type="text"/>
AIS 腹部 (Abdomen)	<input type="text"/>
AIS 図版	<input type="text"/>
(Extremity) AIS 体	<input type="text"/>
表 (External)	<input type="text"/>
SS	<input type="text"/>
収縮期血圧 (SBP)	<input type="text"/>
呼吸回数 呼吸レベル	<input type="text"/>
グロ (GCS) RTS	<input type="text"/>
年齢	<input type="text"/>
Probability of Survival: Blunt(%)	<input type="text"/>
Probability of Survival: Penetrating(%)	<input type="text"/>
<hr/>	
体温の変動 (38 度以上、または、36 度以下)	<input type="text"/>
脈拍数増加 (90 回/分以上)	<input type="text"/>
呼吸数増加 (20 回/分以上)	<input type="text"/>
PaCO2 が 32 Torr 以下	<input type="text"/>
白血球数が 12,000/ μ I 以上または 4,000/ μ I 以下	<input type="text"/>
SIRS スコア	<input type="text"/>

【. 句コラ の他鯖 / 処置

後査、コザルト

血液ガス 血算 生化学 凝固 (PT,APTT,DIC 検査) 赤沈
電解質
肝機能 (AST,ALT,T-bil リバゼALP) アンモニア濃度 腎機能 (BUN,Cre,CK)
甲状腺機能
ルチゾル検査 リン
エステラゼ
血中ケトン体 有 無
印刷ソプロパノール濃度 尿
検査 所見 (テステ プ検査含む)
 白血球 有 無
 赤血球 3+ 2+ + ± -
 NIT + ± -
エイジ PCP BZO Coc AMP THC OPI BAR TCA
帰反応 結果 陽性 陰性 便潜
血 結果 陽性 陰性 心電図
1 回目取る際に胸痛が 有 無 以前の心電図との変化 有 無
 取った時間 所 ri
2 回目取る除に胸痛が 有 無 1 回目の心電図との変化 有 無

取った時間 仁コ所見 _____

3回目取る際に胸痛が 有 無 2回目の心電図との変化 有 無

取った時間 仁二 所見 _____

Z 管波検査
(心工コ、FAST 含む)

所見 1回 B 有 _____

無

所見 2回目 有 _____

無

所見 3回目 有 _____

無

Q ノトゲン
(胸部 服部等)

所見 有 仁二 _____ 無

腹縫穿車
U

所見：初圧 仁 _____ cmH20

終圧 仁 _____ cmH20

胸 N 穿車 U

所見 _____

単純 CT

所見 _____ 有 _____ 無

量影 CT

所見 _____ 有 _____ 無

MRI

所見 _____ 有 _____ 無

影 MRI

所見 有 _____ 無

脳波

Gram 染色

所見 有 | _____ | 無

迅速抗酸菌縮 印フキ 仁号

良底検査

所見 有 | _____ | 集

直庄 _____

その絶後査

染料コンサルト

無 有

その他検査

呼	環
器内	并
幅形	外科 脊縫 外科
立	并
脳	器内
器内	并
血清	クリプトコッカス
髄液	クリプトコッカス 抗原検査
真菌	培養
血清	トキソプラズマ 原虫抗体
脳脊髄液	細胞診

処置

胃管挿入 (経鼻 経口)

破傷風トキソイド

破傷風免疫タロプリン 250v 500v 1500v

抗生別

種類 「 _____ 」 量 _____

・血 iii デ タ

退掛バイタル

血圧 _____ / _____ mm Hg

IH9 _____ n

呼吸回数 _____ min

SpO2 _____ % レ ムエアー

酸素

Pa 拘二号 「 _____ 」 /min

コト山 J -

マスク L _____ }/min

DJザパ — - }/min

JCS 0 1 2 3 10 20 30 100 200 300

GCS E GCSV GCS M

体 _____

内
外
内
外
内
外