

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
桂枝加苓朮附湯(ケイシカリヨウジュツブトウ)		
桂枝加苓朮附湯 ■ クラシエ ■ オースギ ■ クラシエ 〔含有生薬〕ケイヒ、シャクヤク、タイソウ、ブクリョウ、ビャクジツ、ショウキョウ、カンゾウ、加工ブシ末	関節痛、神経痛 ⇒ ■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服、■ 1日9g、食前又は食間2～3回～3回に分服、■ 1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
〔医学管理〕〔ブシ含有〕小児には慎重投与〔併用時注意〕カンゾウ2g/日のPoint 〔組成違い〕② ブシ末 ④ 加工ブシ末(錠あり)②		
桂枝人參湯(ケイシニンジントウ)		
桂枝人參湯 ■ クラシエ ■ ツムラ(TJ-82)1g ￥141 〔含有生薬〕ケイヒ、カンゾウ、ソウジツ、ニンジン、カンキョウ	頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー(胃腸の弱いもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	〔重複〕アルドステロン症、ミオバチー、低K血症 〔重複〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系利尿薬、トリクロルメチアジド
〔医学管理〕〔併用時注意〕カンゾウ3g/日のPoint		
桂枝茯苓丸(ケイシブクリヨウガン)		
桂枝茯苓丸 ■ クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ、東洋 ■ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-25)1g￥92、テイコク、(東亜製品)、本草、マツウラ ■ クラシエ 〔含有生薬〕ケイヒ、ブクリョウ、シャクヤク、ボタンビ、トイニン 〔医学管理〕〔三引〕肝機能(錠あり)②	子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月經困難、帶下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎(体格はしっかりしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	〔重複〕肝機能障害、黄疸 〔重複〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
〔医学管理〕婦人用3大漢方の1つ、更年期障害の冷え・のぼせに用いる、分娩促進作用があるので妊娠中は使用しないPoint 〔医学管理〕〔三引〕肝機能(錠あり)②		
桂枝茯苓丸加薏苡仁(ケイシブクリヨウガンカヨクイニン)		
桂枝茯苓丸加薏苡仁	月經不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ(比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷え等を訴えるもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
ツムラ(TJ-125)1g ￥10.7 〔含有生薬〕ケイヒ、ブクリョウ、ボタンビ、トイニン、シャクヤク、ヨクイニン		
桂芍知母湯(ケイシャクチモトウ)		
桂芍知母湯 ■ 三和 〔含有生薬〕ケイヒ、マオウ、チモ、ハマボウフウ、シャクヤク、カンゾウ、ビャクジツ、加工ブシ、ショウキョウ	神経痛、関節リウマチ(関節痛み、身体やせ、脚部腫脹し、めまい、悪心あるもの) ⇒ 1日9g、食前又は食間2～3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔併用〕マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
〔医学管理〕〔マオウ含有〕循環器系障害の患者等で注意〔ブシ含有〕小児には慎重投与〔併用時注意〕カンゾウ1.5g/日のPoint		
啓脾湯(ケイヒトウ)		
啓脾湯 ■ 東洋 ■ ツムラ(TJ-128)1g ￥22 〔含有生薬〕ソウジツ、ブクリョウ、サンヤク、ニンジン、レンニク、タクシャ、チンピ、サンザシ、カンゾウ	胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢(やせて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるもの) ⇒ ■ 1回7.5g、空腹時3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
〔医学管理〕〔併用時注意〕カンゾウ1g/日のPoint		
桂麻杏半湯(ケイマカクハントウ)		
桂麻杏半湯 ■ 東洋 〔含有生薬〕ケイシ、シャクヤク、生ショウキョウ、カンゾウ、マオウ、トイニン、キョウニン	感冒、咳、かゆみ ⇒ 1日4.5g、空腹時3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔併用〕マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤
〔医学管理〕〔マオウ含有〕循環器系障害の患者等で注意〔併用時注意〕カンゾウ2g/日のPoint		
香蘇散(コウソサン)		
香蘇散 ■ コタロー	風邪の初期(胃腸虚弱で神経質なもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
ツムラ(TJ-70)1g×76 テイコク 〔含有生薬〕コウブン、ソヨ ウ、テンビ、カンゾウ、ショ ウキョウ	【処方】軽度のうつ症状に用いる。感冒や食事性荨麻疹にも有効。 【Point】服用しやすく女性・高齢者に適している 【医学管理】併用時注意 カンゾウ 1~1.5g/日 (組成量) 違い 添付文書 のPoint 参照	
五虎湯(ゴコトウ)		
五虎湯 クラシエ ツムラ(TJ-95)1g×71 オスギ 〔含有生薬〕マオウ、キョウ ニン、カンゾウ、セッコウ、 ソウハクヒ	咳、気管支喘息 ⇒ 1日6g、食前又は食間 2~3回に分服、1日7.5g。 【併用】マオウ含有製剤、エフェ ドリン類含有製剤、MAO阻害 剤、1日9錠、食前又は 食間2~3回に分服	【重】偽アルドステロン症、 ミオバチー 【併用】マオウ含有製剤、エフェ ドリン類含有製剤、MAO阻害 剤、甲状腺製剤、カテコラミン 製剤、キサンチン系薬、カンゾ ウ含有製剤、グリチルリチン 酸含有製剤
【医学管理】マオウ含有 循環器系障害の患者等で注意 (併用時注意) カンゾウ2g/日 (組成量) のPoint		
五積散(ゴシャクサン)		
五積散 コタロー ツムラ(TJ-63)1g×90 テイコク 〔含有生薬〕ソウジュツ、チ ンピ、トウキ、ハンゲ、ブク リョウ、カンゾウ、キキョウ、 キジツ、ケイヒ、コウボク、 シャクヤク、ショウキョウ、 センキュウ、タイソウ、ビャ クシン、マオウ	胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月 経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、 感冒(慢性に経過し、症状の激し くないもの) ⇒ 1日9g、食前又は食間 2~3回に分服、1日7.5g、 食前又は食間2~3回に分服 (②)	【重】偽アルドステロン症、 ミオバチー 【併用】マオウ含有製剤、エフェ ドリン類含有製剤、MAO阻害 剤、甲状腺製剤、カテコラミン 製剤、キサンチン系薬、カンゾ ウ含有製剤、グリチルリチン 酸含有製剤
【医学管理】マオウ含有 循環器系障害の患者等で注意 (併用時注意) カンゾウ1g/日 (組成量) キジツは②のみ		
牛車腎氣丸(ゴシャキンギカン)		
牛車腎氣丸 ツムラ(TJ-107)1g ×118 〔含有生薬〕ジオウ、ゴシツ、 サンシュユ、サンヤク、シャ ゼンシ、タクシャ、ブクリョ ウ、ボタンビ、ケイヒ、修治 ブシ末	下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかす み目、かゆみ、排尿困難、頻尿、む くみ(疲れやすくて、四肢が冷え やすく尿量減少又は多尿で、とき に口渴があるもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~ 3回に分服	【重】間質性肺炎、肝機能障 害、黄疸
【処方】老化に関連する諸症状・諸臓器の疾患に有効で、多くの診 療科で応用される。糖尿病性末梢神経障害、腰痛、下肢痛 やしびれ、夜間尿等下半身に関連した症状に有効		

漢方薬

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
		【医学管理】モニタ 肝機能 酶活性異常の報告 ジオウ含有 胃腸 のPoint 虚弱者注意 (マシ含石) 小児には慎重投与 (他) タキサン系 抗癌剤による末梢神経障害に使用されることあり
吳茱萸湯(ゴシュユトウ)		
吳茱萸湯 コタロー、ジュンコウ 太虎堂、ツムラ(TJ-31) 1g×112 〔含有生薬〕ゴシュユ、タイ ソウ、ニンジン、ショウキヨ ウ	習慣性片頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、 脚気、銜心(手足の冷えやすい中等度以下の体力のもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服 (①), 1日 7.5g、食前又は食間2~3回に分服 (②) 【医学管理】組成量) 違い 添付文書 のPoint 参照	
五淋散(ゴリンサン)		
五淋散 東洋 ツムラ(TJ-56)1g ×119 〔含有生薬〕ブクリョウ、オ ウゴン、カンゾウ、ジオウ、 シャゼンシ、タクシャ、トウ キ、モクツウ、カッセキ、サ ンシ、シャクヤク	頻尿、排尿痛、残尿感 ⇒ 1回6g、空腹時3回に分 服、1日7.5g、食前又は食間 2~3回に分服	【重】アルドステロン症、ミオバ チー、低K血症 【併用】間質性肺炎、偽アルド ステロン症、ミオバチー 【併用】カンゾウ含有製剤、グリ チルリチン酸含有製剤、ルー プ系利尿薬、トリクロルメチ アジド
【医学管理】ジオウ含有 胃腸虚弱者注意 (併用時注意) カンゾウ3g/日 のPoint		
五苓散(ゴレイサン)		
五苓散 クラシエ、コタロー、三 和、ジュンコウ、東洋 JPS.太虎堂、ツムラ (TJ-17)1g×151、ティコ ク、本草、マツウラ クラシエ 〔含有生薬〕タクシャ、ブク リョウ、チョレイ、ソウジュ ツ、ケイヒ	浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃 腸カタル、下痢、恶心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑氣 あたり、猪尿病(口渴、尿量減少するもの) ⇒ 1日6g、食前又は食間2~3回に分服 (②), 1日7.5g、 食前又は食間2~3回に分服 (②), 1日18錠、食前又は食 間2~3回に分服	【医学管理】組成量) ② はソウジュツ、② はビヤクジツ のPoint 錠あり) ②
紫陷湯(サイカントウ)		
紫陷湯 コタロー	咳、咳による胸痛 ⇒ 1日7.5g、食前又は食間 2~3回に分服 (①), 1日 7.5g、食前又は食間2~3回に 分服 (②)	【重】偽アルドステロン症、 ミオバチー 【併用】カンゾウ含有製剤、グリ チルリチン酸含有製剤

漢方薬

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
太虎堂, ツムラ(TJ-73) 1g×34袋 〔含有生薬〕サイコ, ハンゲ, オウゴン, タイソウ, カロニン, ニンジン, オウレン, カンゾウ, ショウキョウ		
	处方の水滌(水毒)の病態による諸症状(頭痛, 浮腫等)により Point	〔Point〕(併用時注意) カンゾウ1.5g~2g/日
柴胡加竜骨牡蠣湯(サイコカリュウツボレイトウ)		
柴胡加竜骨牡蠣湯 〔クラシエ, コタロー, ジュンコウ, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-12)〕1g×22袋, テイコク, 本草, マツウラ 〔クラシエ, 〔含有生薬〕サイコ, ハンゲ, ケイヒ, ブクリョウ, オウゴン, タイソウ, ニンジン, ポレイ, リュウコツ, ショウキョウ〕	高血圧症, 動脈硬化症, 慢性腎臓病, 神經衰弱症, 神經性心悸亢進症, てんかん, ヒステリー, 小児夜泣き症, 陰萎(比較的体力があり, 心悸亢進, 不眠, いらだち等の精神症状のあるもの) ⇒ 〔Point〕1日6g 食前又は食間2~3回に分服(②), 〔Point〕1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②), 〔Point〕1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	〔正大〕間質性肺炎, 肝機能障害, 黄疸 〔Point〕不眠, イライラ感を伴う諸症状により, 動悸, 腹部大動脈拍動の亢進がポイント 〔Point〕(正三才)肝機能(指標)間質性肺炎の報告(組成違い)②②はダイオウ含有量あり②
柴胡桂枝湯(サイコケイシトウ)		
柴胡桂枝湯 〔クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-10)〕1g×20袋, テイコク, (東亜薬品), マツウラ 〔クラシエ, 〔含有生薬〕サイコ, ハンゲ, オウゴン, カンゾウ, ケイヒ, シャクヤク, タイソウ, ニンジン, ショウキョウ〕	感冒, 流感, 肺炎, 肺結核等の熱性疾患, 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 胆囊炎, 胆石, 肝機能障害, 膀胱炎等の心下部緊張疼痛(發熱汗出で, 悪寒し, 身体痛み, 頭痛, 吐き気のあるもの) ⇒ 〔Point〕1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②), 〔Point〕1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②), 〔Point〕1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	〔正大〕間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオバチー, 肝機能障害, 黄疸 〔Point〕慢性肺炎に保険適応あり, 基礎的エビデンスもある. 肝庇護作用, 胃粘膜防御作用もあり, 膀胱治療効果と合わせてこの1剤で飲酒家のフォローが可能 〔Point〕(正三才)肝機能(指標)間質性肺炎の報告(併用時注意)カンゾウ1.5~2g/日(量あり)②
柴胡桂枝乾姜湯(サイコケイシカンキョウトウ)		
柴胡桂枝乾姜湯	更年期障害, 血の道症, 不眠症, 神	〔正大〕間質性肺炎, 偽アルド

漢方薬

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
コタロー 太虎堂, ツムラ(TJ-11) 1g×20袋, テイコク, 本草 〔含有生薬〕サイコ, オウゴン, カロコン, ケイヒ, ポレイ, カンキョウ, カンゾウ		経症(体力が弱く, 冷え症, 貧血氣味で, 動悸, 息切れがあり, 神經過敏のもの) ⇒ 〔Point〕1日6g, 食前又は食間2~3回に分服, 〔Point〕1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)
	〔Point〕間質性肺炎(98年3月:146) 〔Point〕(正三才)肝機能(指標)間質性肺炎の報告(併用時注意)カンゾウ2g/日	
柴胡清肝湯(サイコセイカントウ)		
柴胡清肝湯 〔クラシエ, 〔含有生薬〕サイコ, トウキ, センキュウ, シャクヤク, ジオウ, オウレン, オウゴン, オウバク, サンシン, キキョウ, レンギョウ, ハッカ, カロコン, ゴボウシ, カンゾウ〕	神經症, 慢性扁桃腺炎, 湿疹(かんの強い傾向のある小児) ⇒ 〔Point〕1日9g, 食前又は食間2~3回に分服, 〔Point〕1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	〔正大〕偽アルドステロン症, ミオバチー 〔Point〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔Point〕(ジョウ含有)胃腸虚弱者注意(併用時注意)カンゾウ1.5g/日	
柴朴湯(サイボクトウ)		
柴朴湯 〔クラシエ, 〔含有生薬〕サイコ, ハンゲ, ブクリョウ, ウコボク, オウゴン, タイソウ, ニンジン, カンゾウ, ソヨウ, ショウキョウ〕	小児喘息, 気管支喘息, 気管支炎, 咳, 不安神經症(気分がふさいで, 咽喉, 食道部に異物感があり, ときに動悸, めまい, 嘔気等を伴うもの) ⇒ 〔Point〕1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服, 〔Point〕1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	〔正大〕間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオバチー, 肝機能障害, 黄疸等 〔Point〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔Point〕間質性肺炎(98年3月:146) 〔Point〕(正三才)肝機能(指標)間質性肺炎の報告(併用時注意)カンゾウ2g/日	
柴苓湯(サイレイイトウ)		
柴苓湯 〔クラシエ〕	水滌性下痢, 急性胃腸炎, 呕氣あたり, むくみ(吐き気, 食欲不振, 喉の渇き, 排尿が少ないもの) ⇒ 〔Point〕1日8.1g, 食前又は食間2~3回に分服, 〔Point〕1日9g, 食前又は食間2~3回に分服	〔正大〕間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオバチー, 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸 〔Point〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤

漢方薬

1454 ◆ 漢方薬

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
■ツムラ(TJ-114)1g ￥40.3 〔含有生薬〕サイコ、タクシヤ、ハンゲ、オウゴン、ソウジュツ、タイソウ、チヨレイニンジン、ブクリョウ、カンゾウ、ケイヒ、ショウキョウ	【Point】小柴胡湯と五苓散の合方、胃・肝疾患に広く応用可能で「漢方のステロイド」のように免疫調整作用あり	〔重複〕間質性肺炎(99年3月:146) 〔医学管理〕モニタ 肝機能【指標】間質性肺炎の報告【併用時注意】カンゾウ2g/日(?)シスプラチンによる腎障害に使用されることがあります。
三黄瀉心湯(サンオウシャントウ)		
■三黄瀉心湯 ■クラシエ、コトロー、JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-113)1g￥14.7 〔含有生薬〕オウゴン、オウレン、ダイオウ	高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴、頭重、不眠、不安)、鼻血、黄疸 痔出血、便秘、更年期障害、血の道 症(比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2~3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(?)、■ 1日3カプセル、食前又は食間2~3回に分服	〔重複〕間質性肺炎、肝機能障害、黄疸 〔Point〕【医学管理】(ダイオウ含有)妊娠等で注意(カプセルあり)(?)
酸棗仁湯(サンソウニントウ)		
■酸棗仁湯 ■オースギ、ツムラ(TJ-103)1g￥11.7、マツウラ 〔含有生薬〕サンソウニン、ブクリョウ、センキュウ、チモ、カンゾウ	心身が疲れ、弱って眠れないもの ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(?)	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤 〔医学管理〕【Point】(含有生薬)【併用時注意】カンゾウ1g/日
三物貞苓湯(サンモツオウゴントウ)		
■三物貞苓湯 ■ツムラ(TJ-121)1g ￥7.9 〔含有生薬〕ジオウ、オウゴン、クジン	手足のほてり ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	〔重複〕間質性肺炎、肝機能障害、黄疸 〔Point〕【医学管理】(モニタ)肝機能【指標】間質性肺炎の報告【ジオウ含有】胃腸虚弱者注意
滋陰降火湯(ジンコウカトウ)		
■滋陰降火湯 ■ツムラ(TJ-93)1g ￥11.4 〔含有生薬〕ソウジュツ、ジオウ、シャクヤク、チンピ、トウキ、バクモンドウ、テンモンドウ、オウバク、カンゾウ、チモ	喉にうるおいがなく痰が出なくて咳き込むもの ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(?)	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤 〔医学管理〕(ジオウ含有)胃腸虚弱者注意【併用時注意】カンゾウ1.5g/日

その他 ◆ 1455

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
滋陰至宝湯(ジンシホウトウ)		
■滋陰至宝湯 ■ツムラ(TJ-92)1g ￥16.3 〔含有生薬〕コウブシ、サイコ、シャクヤク、チモ、チンピ、トウキ、バクモンドウ、ビャクジュツ、ブクリョウ、ジコッピ、カンゾウ、ハッカバイモ	慢性の咳・痰(虚弱なもの) ⇒ 1日9g、食前又は食間2~3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤 〔医学管理〕【併用時注意】カンゾウ1g/日
紫雲膏(シウンコウ)		
■紫雲膏 ■ツムラ(TJ-501)1g ￥12.6(?)500g)、マルイシ(?)500g) 〔総成〕ガマ油、シンコン、トウキ、サラシミツロウ、豚脂	火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷 ⇒ 1日数回塗布あるいはガーゼに延ばして貼付(?)	〔重複〕(重症)の熱傷・外傷、化膿性の創傷で高熱のある患者、患部のひどい湿潤やただれ
四逆散(シギャクサン)		
■四逆散 ■ツムラ(TJ-35)1g ￥18.2 〔含有生薬〕サイコ、シャクヤク、キジツ、カンゾウ	胆囊炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー(比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中间証を表すもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
四君子湯(シクンシトウ)		
■四君子湯 ■東洋 ■ツムラ(TJ-75)1g ￥19.8 ■オースギ 〔含有生薬〕ソウジュツ、ニンジン、ブクリョウ、カンゾウ、ショウキョウ、タイソウ	胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のものたれ、嘔吐、下痢(やせて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいもの) ⇒ ■ 1回6g、空腹時3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服、■ 1日10錠、食前又は食間2~3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤 〔医学管理〕【併用時注意】カンゾウ1~1.5g/日(?)
梔子柏皮湯(シシハクヒトウ)		
■梔子柏皮湯	黄疸、皮膚瘙痒症、宿醉(肝臓部に圧迫感があるもの)	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー

1456 ◆ 漢方藥

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
■コタロー 〔含有生薬〕サンシン、オウバク、カンゾウ	■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服	〔併説〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
漢学管理 (併用時注意) カンゾウ1g/日		
七物降下湯(シチモツコウカトウ)		
七物降下湯 ■東洋 ■オースギ、ツムラ (TJ-46)1g×4, マツウラ 〔含有生薬〕オウギ、ジオウ、センキュウ、チョウトウコウ、シャクヤク、トウキ、オウバク	高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴、頭重)(身体虚弱の傾向のあるもの) ■ 1日7.5g, 空腹時3回に分服, ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	〔併説〕ジオウ含有 胃腸虚弱者注意
漢学管理 (併用時注意) ジオウ含有 胃腸虚弱者注意		
四物湯(シモツトウ)		
四物湯 ■クラシエ、コタロー、ジユンコウ ■太虎堂、ツムラ(TJ-71) 1g×8, テイコク、本草 ■クラシエ 〔含有生薬〕ジオウ、センキュウ、シャクヤク、トウキ	産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症(皮膚が枯燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの) ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ■ 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	〔併説〕ジオウ含有 胃腸虚弱者注意 (無あり)②
漢学管理 (併用時注意) ジオウ含有 胃腸虚弱者注意		
炙甘草湯(シャガンゾウカトウ)		
炙甘草湯 ■コタロー ■ツムラ(TJ-64)1g×10 〔含有生薬〕ジオウ、パクモンドウ、ケイヒ、タイソウ、ニンジン、マシニン、シャカソウ、アキヨウ、ショウキョウ	動悸、息切れ(体力が衰えて、疲れやすいもの) ■ 1日15g, 食前又は食間2~3回に分服, ■ 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	〔併説〕アルドステロン症、ミオバチー、低K血症 〔補注〕アルドステロン症、ミオバチー、低K血症 〔併説〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系・チアジド系利尿薬
漢学管理 (併用時注意) カンゾウ3g/日		
芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウカトウ)		
芍薬甘草湯 ■クラシエ、コタロー、ジユンコウ、東洋	急激に起こる筋肉の痙攣を伴う疼痛 ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に	〔併説〕アルドステロン症、ミオバチー、低K血症 〔補注〕間質性肺炎、偽アルドステロン症、うっ血性心不全、心室細動、心室頻拍(TdP)を含

その他 ◆ 1457

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
■ツムラ(TJ-68)1g×4, テイコク、本草、マツウラ 〔含有生薬〕カンゾウ、シャクヤク	分服(②)	〔併説〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系・チアジド系利尿薬 〔補注〕このむら返りの第一選択。あらゆる筋収縮による症状に有効。カンゾウの含有量が多いので1日常用量の長期連用を避ける
漢学管理 (併用時注意) カンゾウ5~6g/日 (無成) 177		
芍薬甘草附子湯 ■三和 〔含有生薬〕シャクヤク、カンゾウ、加工ブシ	慢性神経痛、慢性的関節炎、関節リウマチ、筋肉リウマチ、五十肩、肩こり(冷症で関節や筋肉が痛み、麻痺感があって四肢の屈伸が困難なもの) ■ 1日4.5g, 食前又は食間3回に分服	〔併説〕アルドステロン症、ミオバチー、低K血症 〔補注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系利尿薬、トリクロルメチアジド
漢学管理 (併用時注意) カンゾウ5g/日		
十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ)		
十全大補湯 ■クラシエ、コタロー、三和、ジユンコウ、東洋 ■オースギ、ツムラ (TJ-48)1g×20, テイコク、本草 〔含有生薬〕オウギ、ケイヒ、ジオウ、シャクヤク、センキュウ、ソウジツ、トウキ、ニンジン、ブクリョウ、カンゾウ	病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、痰汗、手足の冷え、貧血 ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	〔併説〕偽アルドステロン症、ミオバチー、肝機能障害、黄疸 〔補注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
漢学管理 (併用時注意) カンゾウ1~1.5g/日 (無成) 177		
十味敗毒湯(ジュウミハイドクトウ)		
十味敗毒湯 ■クラシエ、コタロー、三和、東洋	化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、荨麻疹、急性湿疹、水虫 ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ■ 1日	〔併説〕偽アルドステロン症、ミオバチー 〔補注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
漢学管理 (併用時注意) カンゾウ1~1.5g/日 (無成) 177		

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
JPS. オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-6) 1g ¥15.5, テイコク, (東亜薬品), 本草, マツウラ	7.5g, 食前又は食間 2~3回に分服(②), 1日 18錠, 食前又は食間 2~3回に分服	
クラシエ 〔含有生葉〕キヨウ, サイコ, センキュウ, ブクリョウ, ポクソク, ドクカツ, ポウフウ, カンゾウ, ケイガイ, シヨウキヨウ	<small>薬学管理のPoint</small> 併用時注意 カンゾウ 1~1.5g/日 組成通り添付文書参照 〔錠あり〕②	
潤腸湯(ジュンチョウトウ)		
潤腸湯 〔太虎堂, ツムラ(TJ-51) 1g ¥9.3 〔含有生葉〕ジオウ, トウキ, オウゴン, キヅツ, キヨウニン, コウボク, ダイオウ, トウニン, マンニン, カンゾウ	便秘 ⇒ 1日 7.5g, 食前又は食間 2~3回に分服(②)	〔重複〕間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
漢方のPoint 高齢者の便秘状の便によい		
〔参考〕間質性肺炎(07年10月:234) 〔薬学管理のPoint〕虚弱者注意(ダイオウ含有)妊娠等で注意(併用時注意) カンゾウ1.5g/日		
小建中湯(ショウケンチュウトウ)		
小建中湯 〔コタロー 〔オースギ, ツムラ (TJ-99) 1g ¥7.5 〔含有生葉〕シャクヤク, ケイヒ, タイソウ, カンゾウ, シヨウキヨウ	小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜泣き(体質虚弱で疲労しやすく、色が優れず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿及び多尿等のいずれかを伴うもの) ⇒ 1日 27g, 食前又は食間 2~3回に分服, 1日 15g, 食前又は食間 2~3回に分服(②)	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
〔薬学管理のPoint〕併用時注意 カンゾウ2g/日		
小柴胡湯(ショウサイコトウ)		
小柴胡湯 〔クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 〔JPS. オースギ, サカモト, 太虎堂, ツムラ(TJ-9) 1g ¥31.4, テイコク, (東亜薬品), 本草, マツウラ	諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、感冒、胸膜炎・肺結核等の結核性諸疾患の補助療法、リンパ節炎、慢性胃腸障害、産後回復不全(体力中等度で上腹部がはって苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、ときにより微熱、悪心等のあ	○ 投与により、間質性肺炎が起こり、死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)、胸部X線異常等が現れた場合には、直ちに本剤を中止、発熱、咳嗽、呼吸困難

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
オースギ, クラシエ 〔含有生葉〕サイコ, ハング, オウゴン, ニンジン, タイソウ, カンゾウ, シヨウキヨウ	るもの), 慢性肝炎における肝機能障害の改善 ⇒ 1日 6g, 食前又は食間 2~3回に分服(②), 1日 7.5g, 食前又は食間 2~3回に分服(②), 1日 18錠, 食前又は食間 2~3回に分服(②)	等が現れた場合には、本剤を中止し、直ちに連絡するよう患者に注意 〔肝硬変、肝癌、慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が10万/mm ³ 以下(併用)インターフェロン製剤 〔重複〕間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系アジド系利尿薬
〔参考〕間質性肺炎(98年3月:146, 00年1月:158) 〔薬学管理のPoint〕〔モニタ〕肝機能(指標)間質性肺炎の報告〔角谷恭司〕インターフェロン製剤(併用時注意) 〔錠あり〕カンゾウ2g/日		
小柴胡湯加桔梗石膏(ショウサイコトウカキヨウセッコウ)		
小柴胡湯加桔梗石膏 〔ツムラ(TJ-109) 1g 〔含有生葉〕セッコウ, サイコ, ハング, オウゴン, キヨウ, タイソウ, ニンジン, カンゾウ, シヨウキヨウ	扁桃炎、扁桃周囲炎(喉がはれて痛むもの) ⇒ 1日 7.5g, 食前又は食間 2~3回に分服	〔重複〕偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 〔併用〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
〔薬学管理のPoint〕〔モニタ〕肝機能(併用時注意) カンゾウ2g/日		
小青竈湯(ショウセイリュウトウ)		
小青竈湯 〔クラシエ, コタロー, 三和 〔JPS. オースギ, サカモト, 太虎堂, ツムラ(TJ-19) 1g ¥14.1, テイコク, (東亜薬品), 本草 〔含有生葉〕ハング, マオウ, ケイヒ, ゴミシ, シャクヤク, サイシン, カンキヨウ, カンゾウ	気管支喘息・鼻炎・アレルギー性鼻炎・アレルギー性結膜炎・感冒における水様の痰・水様鼻汁・鼻閉・くしゃみ・喘鳴・咳嗽・流涕・気管支炎 ⇒ 1日 6g, 食前又は食間 2~3回に分服(②), 1日 9g, 食前又は食間 2~3回に分服(②), 1日 18錠, 食前又は食間 2~3回に分服	〔重複〕マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系利尿薬、トリクロルメチアジド
〔参考〕水様性の喀痰や鼻汁、くしゃみに用いる、花粉症時期の前から予防的に服用する 〔Point〕よい、眠気がないので受験生やドライバーに適している 〔薬学管理のPoint〕〔モニタ〕肝機能(指標)間質性肺炎の報告〔マオウ含有〕循環器系障害の患者等で注意 〔錠あり〕カンゾウ3g/日		

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
小半夏加茯苓湯(ショウハンダカブクリヨウトウ)		
小半夏加茯苓湯 ■ クラシエ、コタロー ■ オースギ、ツムラ (TJ-21) 1g×112袋、テイコク、本草 〔含有生薑〕ハング、ブクリ ヨウ、ショウキョウ	妊娠嘔吐(つわり), その他の諸病 の嘔吐(急性胃腸炎, 湿性胸膜炎, 肺腫性胸気, 脓膿症)(体力中等度のもの) ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②). ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	
消風散(ショウフウサン)		
消風散 ■ コタロー ■ オースギ、ツムラ (TJ-22)1g×13袋 〔含有生薑〕ハップコウ、ジオウ、トウキ、ソウジュツ、ボウフウ、モクツウ、ゴボウシモ、ゴマ、カンゾウ、クジン、ケイガイ、センタイ	分泌物が多く、かゆみの強い慢性的皮膚病(湿疹, 莖麻疹, 水虫, あせも, 皮膚瘙痒症) ⇒ ■ 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服. ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	創(重火) 偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤 <small>薬学管理 (Point)</small> [併用時注意] カンゾウ1g/日
升麻葛根湯(ショウウマカッコントウ)		
升麻葛根湯 ■ ツムラ(TJ-101)1g ■ 1g×2袋 〔含有生薑〕カッコン、シャクヤク、ショウウマ、カンゾウ、ショウキョウ	感冒の初期, 皮膚炎 ⇒ ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	創(重火) 偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤 <small>薬学管理 (Point)</small> [併用時注意] カンゾウ1.5g/日
四蒂湯(シレイトウ)		
四蒂湯 ■ オースギ 〔含有生薑〕タクシャ末, ソウジュツ末, ブクリヨウ末, チヨレイ末	暑氣あたり, 急性胃腸炎, むくみ (喉が熱いて水を飲んでも尿量が少なく, 吐き気, 嘔吐, 腹痛, むくみ等のいずれかを伴うもの) ⇒ ■ 1日1回1g, (2歳)1/4, (2~3歳)1/3, (4~6歳)1/2, (7~14歳)2/3, 食前又は食間3回に分服	
辛夷清肺湯(シンイセイハイトウ)		
辛夷清肺湯 ■ クラシエ、コタロー ■ オースギ、ツムラ (TJ-104)1g×17袋 〔含有生薑〕シンイ, ピワヨウ, オウゴン, ピャクゴウ, サンシ, チモ, ショウウマ, セックウ, バクモンドウ	鼻づまり, 蓄膿症, 慢性鼻炎 ⇒ ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②). ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	創(重火) 間質性肺炎, 肝機能障害, 黄疸, 長期投与(腸間膜靜脈硬化症) <small>薬学管理 (Point)</small> [モニタ] 肝機能 [指標] 間質性肺炎の報告

漢方薬

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
參蘇飲(ジンソイン)		
參蘇飲 ■ 太虎杖、ツムラ (TJ-66) 1g×13袋 〔含有生薑〕ハング、ブクリヨウ、カッコン、キヨウ、チンピ、ゼンコ、タイソウ、ニンジン、カンゾウ、キジツヨウ、ショウキョウ	感冒, 咳 ⇒ ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	創(重火) 偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併用〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤 <small>薬学管理 (Point)</small> [併用時注意] カンゾウ1g/日
神祕湯(シンピトウ)		
神祕湯 ■ クラシエ、コタロー、東洋 ■ オースギ、ツムラ (TJ-85)1g×16袋、本草 〔含有生薑〕マオウ、キヨウニン、カンゾウ、サイコ、ソヨウ、チンピ、コウボク	小児喘息, 気管支喘息, 気管支炎 ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②). ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	創(重火) 偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併用〕マオウ含有製剤, エフェドリン類含有製剤, MAO阻害薬, 甲状腺製剤, カテコラミン製剤, キサンチン系薬, カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
真武湯(シンブトウ)		
真武湯 ■ 三和、コタロー ■ JPS、ツムラ (TJ-30)1g ■ 1g×4袋 〔含有生薑〕ブクリヨウ、ソウジュツ、シャクヤク、ショウキョウ、修治ブズ末	胃腸疾患, 胃腸虚弱症, 慢性腸炎, 消化不良, 腹アトニー症, 腹下垂症, ネフローゼ, 腹膜炎, 脳溢血, 脊髄疾患による運動並びに知覚麻痺, 神経衰弱, 高血压症, 心臓弁膜症, 心不全で心悸亢進, 半身不隨, リウマチ, 老人性蕩瘡症(新陳代謝の沈廻しているもの) ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②). ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	〔①、③の分包品及び②除く〕 〔併用〕カシキ含有 <small>薬学管理 (Point)</small> [モニタ] 小児には慎重投与 [組成違い] ②はソウジュツ, ③②はビャクジュツ
清上防風湯(セイジョウボウウトウ)		
清上防風湯 ■ オースギ、ツムラ (TJ-58)1g×16袋 〔含有生薑〕オウゴン、キヨウ、サンシ、センキュウ、ハマボウフウ、ビャクシ、レンギョウ、オウレン、カンゾウ、キジツ、ケイガイ、ハッカ	にきび ⇒ ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	創(重火) 偽アルドステロン症, ミオバチー, 肝機能障害, 黄疸 〔併用〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤 <small>薬学管理 (Point)</small> [モニタ] 肝機能 [併用時注意] カンゾウ1g/日

漢方薬

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
清暑益氣湯(セイショエッキトウ)		
清暑益氣湯 ツムラ(TJ-136)1g ×23 2	暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身倦怠、夏やせ ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	【重】偽アルドステロン症、ミオパチー 【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	漢学管理 [併用時注意] カンゾウ1g/日 のPoint	
清心蓮子飲(セイシンレンシイン)		
清心蓮子飲 ジンコウ、東洋 ツムラ(TJ-111)1g ×20 7	残尿感、頻尿、排尿痛(全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しうるもの) ⇒ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②), 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	【重】間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	【重】間質性肺炎(01年8月:169) 漢学管理 [モニタ] 肝機能 [指導] 間質性肺炎の報告 [併用時注意] カンゾウ1.5～2g/日 のPoint	
漢方薬 清肺湯(セイハイイトウ)		
清肺湯 ツムラ(TJ-90)1g ×11 1	痰の多く出る咳 ⇒ 1日9g、食前又は食間2～3回に分服	【重】間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	【重】間質性肺炎(98年3月:146)、肝機能障害、黄疸(07年3月:234) 漢学管理 [モニタ] 肝機能 [指導] 間質性肺炎の報告 [併用時注意] カンゾウ1g/日 のPoint	
川芎茶調散(センキュウチャチョウサン)		
川芎茶調散 オースギ、ツムラ (TJ-124)1g×8 7	風邪、血の道症、頭痛 ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	【重】偽アルドステロン症、ミオパチー 【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	漢学管理 [併用時注意] カンゾウ1.5g/日 のPoint	
疎經活血湯(ソケイカッケトウ)		
疎經活血湯	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛 ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	【重】偽アルドステロン症、ミオパチー

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
大黄甘草湯(ダイオウカンゾウトウ)	3回に分服(②)	【重】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	漢学管理 [モニタ] ジオウ含有 胃腸虚弱者注意 [併用時注意] カンゾウ1g/日 のPoint	
大黃甘草湯(ダイオウカンゾウトウ)	便秘症	【重】偽アルドステロン症、ミオパチー
大黄甘草湯 オースギ、ツムラ (TJ-84)1g×5 3	⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②), 1日6錠、食前又は食間2～3回に分服	【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	漢学管理 [モニタ] ダイオウ含有 妊婦等で注意 [併用時注意] カンゾウ1～2g/日(袋あり)②	
大黃牡丹皮湯(ダイオウボタンピトウ)		
大黃牡丹皮湯 コタロー ツムラ(TJ-33)1g×8 4, ティコク 〔含有生薬〕トウニン、ボタンビ、ダイオウ、トウガシ、無水ポウショウ	月経不順、月経困難、便秘、痔疾 (比較的体力があり、下腹部痛があるて、便秘しがちなもの) ⇒ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服, 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)	【重】偽アルドステロン症、肝機能障害、黄疸 【併用】ダイオウ含有 妊婦等で注意
	漢学管理 [モニタ] ダイオウ含有 妊婦等で注意 のPoint	
大建中湯(ダイケンチュウトウ)		
大建中湯 コタロー ツムラ(TJ-100)1g ×9 7	腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの ⇒ 1日27g、食前又は食間2～3回に分服, 1日15g、食前又は食間2～3回に分服	【重】間質性肺炎、肝機能障害、黄疸
	汉方の Point イレウス予防の特効薬で、開腹手術後の服用が勧められる。消化管運動亢進作用あり、特に虚証の例によい	
	【重】間質性肺炎(12年2月:288) 漢学管理 [モニタ] 肝機能 [指導] 間質性肺炎の報告 のPoint	
大柴胡湯(ダイサイコトウ)		
大柴胡湯 クラシエ、コタロー、三和、ジョンコウ、東洋	胆石症、胆囊炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、薄麻疹、胃酸過多症、急性胃腸カタル、恶心、嘔吐	【重】間質性肺炎、肝機能障害、黄疸

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
JPS オースギ, サカモト, 太虎堂, ツムラ(TJ-8) 1g ¥25, テイコク(東亜薬品), 本草, マツウラ	食欲不振, 痢疾, 糖尿病, ノイローゼ, 不眠症(比較的体力のある人で, 便秘がちで, 上腹部が張って苦しく, 耳鳴, 肩こり等を伴うもの) ⇒ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②), 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②), 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	
オースギ, クラシエ(含有生薬)サイコ, ハンゲ, オウゴン, シャクヤク, タイソウ, キジツ, ショウキョウ, ダイオウ	処方の実証の脂肪肝, 胆石の患者で不眠等を伴う例によい Point	
間質性肺炎(98年3月:146) 医学管理のPoint (モニタ肝機能強制間質性肺炎の報告(ダイオウ含有)妊娠等で注意(併用時注意))		
大柴胡湯去大黃(ダイサイコトウキヨダイオウ)		
大柴胡湯玄大黃 コタロー, 三和(含有生薬)サイコ, ハンゲ, ショウキョウ, キジツ, オウゴン, シャクヤク, タイソウ	高血圧, 動脈硬化, 胃腸病, 気管支喘息, 黄疸, 胆石症, 胆囊炎, 不眠症, 神經衰弱, 隙癆, 腹膜炎, 痢疾, 半身不隨(みぞおちが硬く張って, 胸や脇腹あるいは肝臓部等に痛みや圧迫感があるもの, 耳鳴, 肩こり, 疲労感, 食欲減退等を伴うものもあり, 便秘しないもの) ⇒ 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	
大承気湯(ダイジョウキトウ)		
大承気湯 コタロー ツムラ(TJ-133)1g ¥64 (含有生薬)コウボク, キジツ, ダイオウ, 無水ボウショウ	常習便秘, 急性便秘, 高血圧, 神経症, 食あたり(腹部が硬くつかえて, 便秘するもの, あるいは肥満体質で便秘するもの) ⇒ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服, 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	
漢方薬	【医学管理のPoint】(ダイオウ含有)妊娠等で注意	
大防風湯(ダイボウフウトウ)		(②のみ)
大防風湯 三和 ツムラ(TJ-97)1g ¥135 (含有生薬)オウギ, ジオウ, シャクヤク, ソウジュツ, トウキ, ボウフウ, トチュウ, センキュウ, カンゾウ, ゴシツ, タイソウ, ニンジン, キョウカツ, カンキョウ, 修治ブシ末	下肢の関節リウマチ, 慢性関節炎, 痛風(関節がはれて痛み, 麻痺, 強直して屈伸したいもの) ⇒ 1日9g, 食前又は食間3回に分服, 1日10.5g, 食前又は食間2~3回に分服	(②)偽アルドステロン症, ミオパチー 併注 カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
漢方薬	【医学管理のPoint】(ジオウ含有)胃腸虚弱者注意(フシ含有)小兒には慎重投与(併用時注意)カンゾウ1.5g/日	
竹茹温胆湯	インフルエンザ, 風邪, 肺炎等の	(②)偽アルドステロン症,

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
ツムラ(TJ-91)1g ¥207 (含有生薬)ハング, サイコ, パクモンドウ, ブクリョウ, チクジョウ, キキョウ, キジツ, コウブ, チンピ, オウレン, カンゾウ, ショウキョウ, ニンジン	回復期に熱が長びいたり, 又, 平熱になってしまふと気分がさっぱりせず, 咳や痰が多くて安眠ができないもの ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	ミオパチー 併注 カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
漢方薬	【医学管理のPoint】(併用時注意)カンゾウ1g/日	
治療擴一方(デダボクイッポウ)		
治療擴一方 ツムラ(TJ-89)1g ¥88 (含有生薬)ケイヒ, センキユウ, センコツ, ボクソク, カンゾウ, ダイオウ, チョウジ	打撲によるはれ及び痛み ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	(②)偽アルドステロン症, ミオパチー 併注 カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
漢方薬	【医学管理のPoint】(ダイオウ含有)妊娠等で注意(併用時注意)カンゾウ1.5g/日	
治頭瘡一方(デヅソウイッポウ)		
治頭瘡一方 ツムラ(TJ-59)1g ¥82 (含有生薬)センキュウ, ソウジュツ, レンギョウ, ボウフウ, ニンドウ, カンゾウ, ケイガイ, コウカ, ダイオウ	湿疹, くさ, 乳幼児の湿疹 ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	(②)偽アルドステロン症, ミオパチー 併注 カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
漢方薬	【医学管理のPoint】(ダイオウ含有)妊娠等で注意(併用時注意)カンゾウ1g/日	
調胃承氣湯(チョウイジョウキトウ)		
調胃承氣湯 ツムラ(TJ-74)1g ¥62 (含有生薬)ダイオウ, カンゾウ, 無水ボウショウ	便秘 ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	(②)偽アルドステロン症, ミオパチー 併注 カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
漢方薬	【医学管理のPoint】(ダイオウ含有)妊娠等で注意(併用時注意)カンゾウ1g/日	
釣藤散(チョウトウサン)		
釣藤散 ツムラ(TJ-47)1g ¥15.5, マツウラ (含有生薬)セッコウ, チンピ, パクモンドウ, ハング, ブクリョウ, チョウトウコウ, ニンジン, ボウフウ, キクカ, カンゾウ, ショウキョウ	慢性に続く頭痛で中年以降, 又は高血圧の傾向のあるもの ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	(②)偽アルドステロン症, ミオパチー 併注 カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
漢方薬	【医学管理のPoint】(併用時注意)カンゾウ1g/日	

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
腸癌湯(チョウヨウトウ)		
腸癌湯 ■コタロー 〔含有生薬〕ヨクイニン、トウガシ、トウニン、ボタンビ	盲腸部に急性又は慢性の痛みがあるもの、あるいは月経痛のあるもの ⇒ 1日6g、食前又は食間2~3回に分服	
猪苓湯(チヨレイトウ)		
猪苓湯 ■クラシエ、コタロー、三和、東洋 ■JPS、オースギ、太祝堂、ツムラ(TJ-40)1g×15.1、ティコク、本草、マツウラ 〔含有生薬〕チョレイ、ブクリョウ、タクシャ、アキヨウ、カッセキ	尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢(尿量減少、小便難、口渴を訴えるもの) ⇒ 1日6g、食前又は食間2~3回に分服(②)、1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②)	
漢方のPoint	尿路結石症の外来フォローに有用	
		【医学管理】組成違いアキヨウは④⑤のみ
猪苓湯合四物湯(チヨレイトウゴウシモツトウ)		
猪苓湯合四物湯 ■ツムラ(TJ-112)1g ￥24.8 〔含有生薬〕ジオウ、シャクヤク、センキュウ、タクシャ、チョレイ、トウキ、ブクリョウ、アキヨウ、カッセキ	排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿(皮膚が枯燥し、色つやの悪い体质で胃腸障害のないもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	
漢方のPoint	【オウ含有】胃腸虚弱者注意	
通導散(ツウドウサン)		
通導散 ■コタロー ■太虎堂、ツムラ (TJ-105)1g×9.5 〔含有生薬〕ジヅ、ダイオウ、トウキ、カンゾウ、コウカ、コウボク、チンピ、モクヅウ、ソボク、無水ボウショウ	月經不順、月經痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)(比較的体力があり下腹部に圧痛があつて便秘しがちななもの) ⇒ 1日12g、食前又は食間2~3回に分服、1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②)	
漢方のPoint	【オウ含有】妊婦等で注意【併用時注意】カンゾウ2g/日	
桃核承氣湯(トウカクジョウキトウ)		
桃核承氣湯	月經不順、月經困難症、月經時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血 ミオバチー	

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
クラシエ、コタロー、ジョンコウ	尿の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)(比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなもの)	【オウ含有】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
JPS、オースギ、ツムラ(TJ-61)1g×9.1、ティコク、本草	⇒ 1日6g、食前又は食間2~3回に分服、1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②)、1日10錠、食前又は食間2~3回に分服	
【医学管理】 【オウ含有】妊婦等で注意【併用時注意】カンゾウ1.5g/日 のPoint		
当帰湯(トウキトウ)		
当帰湯 ■ツムラ(TJ-102)1g ￥33.5 〔含有生薬〕トウキ、ハンゲ、ケイヒ、コウボク、シャクヤク、ニンジン、オウギ、サンショウ、カンキョウ、カンゾウ	背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	【オウ含有】偽アルドステロン症、ミオバチー【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
【医学管理】 【併用時注意】カンゾウ1g/日 のPoint		
当帰飲子(トウキインシ)		
当帰飲子 ■ツムラ(TJ-86)1g ￥13.4 〔含有生薬〕トウキ、ジオウ、シャクヤク、センキュウ、ボウフウ、シツリシ、カシュウ、オウギ、ケイガイ、カンゾウ	分泌物の少ない慢性湿疹、かゆみ(冷え症のもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	【オウ含有】偽アルドステロン症、ミオバチー【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
【医学管理】 【オウ含有】胃腸虚弱者注意【併用時注意】カンゾウ1g/日 のPoint		
当帰連中湯(トウキケンチュウトウ)		
当帰連中湯 ■ツムラ(TJ-123)1g ￥9.5 〔含有生薬〕シャクヤク、ケイヒ、タイソウ、トウキ、カンゾウ、ショウキョウ	月經痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み(疲労しやすく血色のすぐれないもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	【オウ含有】偽アルドステロン症、ミオバチー【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
【医学管理】 【併用時注意】カンゾウ2g/日 のPoint		
当帰四逆加吳茱萸生薑湯(トウキシギャクカゴシュユショウキョウトウ)		
当帰四逆加吳茱萸生薑湯 ■クラシエ、コタロー	しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛(手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなりやすいもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②)、1日	【オウ含有】偽アルドステロン症、ミオバチー【併用】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系・チアジド系利尿薬

品名	規格単位	適応用法用量	警告・禁忌・副作用等
■ オースギ、ツムラ (TJ-38)1g×11.3 〔含有生薬〕タゾイソウ、ケイヒ、シャクヤク、トウキ、モクツウ、カンゾウ、ゴシュユ、サイン、ショウキョウ		7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②) 〔医学管理のPoint〕併用時注意 カンゾウ2g/日	
当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)			
■ 当帰芍薬散 ■ 太虎堂 ■ クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ、東洋 ■ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-23)1g×9.7、ティコク、(東亜薬品)、本草、マツウラ ■ オースギ 〔含有生薬〕トウキ、センキュウ、シャクヤク、ソウジュツ、ブクリョウ、タクシャ		貧血、倦怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病(浮腫、習慣性流産、痔、腹痛)、脚気、半身不隨、心臓弁膜症(筋肉が一塊に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間3回に分服、1日6g、食前又は食間2~3回に分服(②)、1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②)、1日18錠、食前又は食間2~3回に分服	〔医学的Point〕婦人科3大漢方の1つ、「当芍美人」は、この処方の適応が華奢で色白の虚弱気味の女性であることに由来 〔組成通り〕②はソウジュツ、③④はビャクジュツ 〔医学管理のPoint〕錠あり④
■ 漢方薬 ■ 当帰芍薬散加附子(トウキシャクヤクサンカブシ)		婦人の冷え症、月経痛、神経痛、慢性腎炎、更年期障害、妊娠中の障害(浮腫、習慣性流産の予防、痔疾、腹痛)、産後の肥立不良(血色悪く貧血症で足腰が冷えやすく、頭痛、頭重で小便頻数を訴え、ときにめまい、肩こり、耳鳴、動悸あるもの) ⇒ 1日9g、食前又は食間3回に分服	〔医学管理のPoint〕小児には慎重投与
■ 二朮湯(ニジュツトウ)		五十肩 ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	〔医学的Point〕間質性肺炎(10年12月:275) 〔医学管理のPoint〕肝機能(腎)間質性肺炎の報告(併用時注意)カンゾウ1g/日
■ 二陳湯		恶心、嘔吐	〔医学的Point〕偽アルドステロン症、

品名	規格単位	適応用法用量	警告・禁忌・副作用等
■ 東洋 ■ ツムラ(TJ-81)1g ■ 10.7 〔含有生薬〕ハング、ブクリヨウ、チンピ、カンゾウ、シヨウキョウ		1回6g、空腹時3回に分服、1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	ミオバチー 〔併用時注意〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
女神散(ニヨシンサン)			
■ 女神散 ■ ツムラ(TJ-67)1g ■ 23.7 〔含有生薬〕コウブン、センキュウ、ソウジュツ、トウキ、オウゴン、ケイヒ、ニンジン、ビンロウジ、オウレン、カンゾウ、チョウジ、モッコウ		産前産後の神經症、月經不順、血の道症(のぼせとめまいのあるもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服	〔併用時注意〕偽アルドステロン症、ミオバチー、肝機能障害、黄疸 〔併用時注意〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
■ 漢方薬 ■ 人參湯		肝機能障害、黄疸(07年2月:239) 〔医学管理のPoint〕モニタ 肝機能(併用時注意)カンゾウ1g/日	〔医学管理のPoint〕モニタ 肝機能(併用時注意)カンゾウ1g/日
■ 人參湯 ■ クラシエ、コタロー、東洋、本草 ■ オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-32)1g×15、ティコク、マツウラ 〔含有生薬〕カンゾウ、ソウジュツ、ニンジン、カンキョウ		急性・慢性胃腸カタル、胃アトニ症、胃拡張、悪阻、萎縮脛(体質虚弱、あるいは虚弱により体力低下した人) ⇒ 1日6g、食前又は食間2~3回に分服(②)、1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②)	〔医学管理のPoint〕偽アルドステロン症、ミオバチー、低K血症 〔併用時注意〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系・チアジド系利尿薬
■ 人參養榮湯(ニンジンヨウエイトウ)		〔医学管理のPoint〕肝機能(併用時注意)カンゾウ3g/日 〔組成通り〕②はソウジュツ、④⑤はビャクジュツ	〔医学管理のPoint〕肝機能(併用時注意)カンゾウ3g/日 〔組成通り〕②はソウジュツ、④⑤はビャクジュツ
■ 人參養榮湯 ■ クラシエ、コタロー ■ オースギ、ツムラ ■ (TJ-108)1g×21.7 〔含有生薬〕ニンジン、ビャクジュツ、トウキ、ブクリョウ、ジオウ、ケイヒ、チンピ、シャクヤク、オウレン、ゴミシ、カンゾウ、オウキ		病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、寝汗、手足の冷え、貧血 ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2~3回に分服(②)、1日9g、食前又は食間2~3回に分服(②)	〔併用時注意〕偽アルドステロン症、ミオバチー、肝機能障害、黄疸 〔併用時注意〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
■ 排膿散及湯(ハイノウサンキュウトウ)		〔医学的Point〕3大補剤の1つ。術後あるいは慢性疾患で疲労感が目立つ例によい。呼吸器症状、貧血症状がポイント 〔医学管理のPoint〕モニタ 肝機能(オウ含有)胃腸虚弱者注意(併用時注意)力ンゾウ1g/日	
■ 排膿散及湯 ■ コタロー		排膿散及湯 患部が発赤、腫脹して疼痛を伴った化膿症、蕁、癰、疖、疖疔、その他痼疾、低K血症	〔医学管理のPoint〕アルドステロン症、ミオバチー、低K血症

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
ツムラ(TJ-122)1g ￥86 〔含有生薬〕キヨウ, カンゾウ, キヅツ, シャクヤク, タイソウ, ショウキョウ	腫症 ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2～3回に分服	【Point】① 偽アルドステロン症, ミオバチー 【併用】カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド
漢方管理 [併用時注意] カンゾウ3g/日		
麦門冬湯(パクモンドウトウ)		
麦門冬湯 ■コタロー, ジュンコウ ■JPS, ツムラ(TJ-29)1g ￥183, テイコク, マツウラ 〔含有生薬〕パクモンドウ, ハング, コウベイ, タイソウ, カンゾウ, ニンジン	痰の切れにくい咳, 気管支炎, 気管支喘息 ⇒ ■ 1日15g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日9g, 食前又は食間2～3回に分服(②)	【Point】① 間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオバチー, 肝機能障害, 黄疸 【併用】カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
〔処方のPoint〕「乾燥」がキーワード, 乾性咳嗽, 咽頭の乾燥感, 嘔声等に、咳感受性を低下させ, 咳き込みの原因となるC線維の過度の興奮を抑制, 咳だけが残ったような感冒にもよい		
漢方管理 [モニタ] 肝機能 [併用] 間質性肺炎の報告 [併用時注意] カンゾウ2g/日		
八味地黄丸(ハチミジオウガン) ■■■ (②)以外の分包, ②顆粒除く)		
八味地黄丸 ■クラシエ, コタロー, 三和 ■JPS, オースギ, ツムラ(TJ-7)1g￥107, テイコク, (東亜薬品), 本草 ■オースギ, クラシエ ■ウチダ 〔含有生薬〕ジオウ, サンショユ, サンヤク, タクシャ, ブクリョウ, ポタンビ, ケイヒ, 修治ブシ末	腎炎, 糖尿病, 隙萎, 坐骨神経痛, 腹痛, 脚気, 膀胱カタル, 前立腺肥大, 高血圧(疲労, 悩怠感著しく, 尿量減少又は頻数, 口渴し, 手足に交差的に冷感と熱感のあるもの) ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日7.5g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日10錠, 食前又は食間2～3回に分服, ■ 1回20丸を1日3回, 食前又は食間に服用	〔処方のPoint〕ジオウ含有 胃腸虚弱者注意 [モニタ] 小児には慎重投与 [併用] 離乳食(②)ジオウ(②:6g, ②:5g, ②:5g), ポタンビ(②:2.5g, ②:3g, ②:3g), ブシ(②:0.5g, ②:1g, ②:1g) [並あり] ①(内服あり)②
漢方薬		
半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)		
半夏厚朴湯 ■クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ■JPS, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-16)1g￥102, テイコク, 本草	不安神経症, 神経性胃炎, つわり, 咳, しわがれ声, 神経性食道狭窄症, 不眠症(気分がふさいで, 嘔吐, 食道部に異物感があり, ときに動悸, めまい, 嘘気等を伴うもの) ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日7.5g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日12錠, 食前又は食間2～3回に分服	

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
オースギ, クラシエ 〔含有生薬〕ハンゲ, ブクリョウ, コウボク, シヨウキョウ	喉のつかえ感(咽喉頭異常感症)の特効薬。他にうつ症状	【処方のPoint】がないか注意
漢方管理 [並あり] ②②		
半夏瀉心湯(ハンゲシャントウ)		
半夏瀉心湯 ■クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ■JPS, オースギ, サカモト, 太虎堂, ツムラ(TJ-14)1g￥243, テイコク, (東亜薬品), 本草, マツウラ ■クラシエ 〔含有生薬〕ハンゲ, カンゾウ, オウゴン, カンキョウ, ニンジン, タイソウ, オレン	急・慢性胃腸カタル, 発酵性下痢, 消化不良, 胃下垂, 神経性胃炎, 胃弱, 二日酔, げっぷ, 胸やけ, 口内炎, オーラルヘルニア, 假性肺炎, みぞおちがつかえ, ときにも悪心, 嘔吐があり, 食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるもの) ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日7.5g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日18錠, 食前又は食間2～3回に分服	【Point】① 偽アルドステロン症, ミオバチー, 低K血症 【併用】カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系・チアジド系利尿薬
〔処方のPoint〕腹鳴, 口内炎, 下痢がキーワード, イリノテカンによる遅発性下痢に予防的に用いる, 下痢型過敏性腸症候群に頻用される		
漢方薬		
半夏白朮天麻湯(ハンゲピャクジュツテンマトウ)		
半夏白朮天麻湯 ■クラシエ, コタロー, 三和 ■ツムラ(TJ-37)1g ￥252 〔含有生薬〕テンピ, ハング, ピャクジュツ, ブクリョウ, オウギ, タクシャ, ニンジン, オウバク, カンキョウ, シヨウキョウ, テンマ, パクガ	胃腸虚弱で下肢が冷え, めまい, 頭痛等があるもの ⇒ ■ 1日7.5g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日7.5g, 食前又は食間2～3回に分服	【処方のPoint】組成違い添付文書参照
漢方薬		
白虎加入参湯(ビヤッコカニンジントウ)		
白虎加入参湯 ■クラシエ, コタロー, 三和 ■ツムラ(TJ-34)1g ￥191, テイコク	喉の渇きとほりのあるもの ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日9g, 食前又は食間2～3回に分服(②), ■ 1日12錠, 食前又は食間2～3回に分服	【Point】① 偽アルドステロン症, ミオバチー

品名・規格・単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
■ クラシエ 〔含有生薬〕セッコウ, チモ, カンゾウ, ニンジン, コウベイ	口渴の原因を取り除いても口渴を訴える例によい、 腹泻管理のPoint 【併用時注意】カンゾウ2g/日	口渴の原因を取り除いても口渴を訴える例によい、 シーゲレン症候群に応用可能 【併用時注意】カンゾウ2g/日
茯苓飲(ブクリョウイン)		
茯苓飲 ■ コタロー ■ ツムラ(TJ-69)1g ￥15.4 〔含有生薬〕ブクリョウ, ソウジュツ, チンピ, ニンジン, キジツ, ショウキョウ	胃炎, 胃アトニー, 溜飲(吐き気や胸やけがあり尿量が減少するもの) ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服 ■ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	【薬学管理のPoint】組成違い②はソウジュツ, ③はビャクジュツ
茯苓飲合半夏厚朴湯(ブクリョウインゴウハンゴウボクトウ)		
茯苓飲合半夏厚朴湯 ■ ツムラ(TJ-116)1g ￥20.6 〔含有生薬〕ハング, ブクリョウ, ソウジュツ, コウボク, チンピ, ニンジン, ソウキジツ, ショウキョウ	不安神経症, 神経性胃炎, つわり, 溜飲, 胃炎(気分がふさいで, 咽喉, 食道部に異物感があり, ときに動悸, めまい, 嘔気, 胸やけ等があり, 尿量の減少するもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	
附子人參湯(別名: 附子理中湯)(ブシニンジントウ(ブシリチュウトウ))		
附子人參湯 (別名: 附子理中湯) ■ 三和 〔含有生薬〕ニンジン, カンゾウ, ビャクジュツ, カンキヨウ, 加上ブシ	慢性的胃腸カタル, 胃アトニー症(胃腸虚弱で血色悪く, 顔に生氣なく, 尿量多く手足に冷感あり, 下痢の傾向あり, しばしば吐き気, めまい, 頭重, 胃痛を訴えるもの) ⇒ 1日4.5g, 食前又は食間3回に分服	■ アルドステロン症, ミオパチー, 低K血症 ■ (重大)偽アルドステロン症, ミオパチー 【併用注意】カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメタジド
■ 薬学管理のPoint 【併用時注意】小児には慎重投与	【併用時注意】カンゾウ3g/日	
平胃散(ヘイイサン)		
平胃散 ■ コタロー	急・慢性的胃カタル, 胃アトニー, 消化不良, 食欲不振(胃がもたれ消化不良の傾向のあるもの) ⇒ ■ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服, ■ 1日7.5g,	■ (重大)偽アルドステロン症, ミオパチー 【併用注意】カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤

品名、規格単位	主成分・用法・用量	効能・効果・副作用
■ オースギ、ツムラ (TJ-79) 1g × 79、ティコク、本草 〔含有生薬〕ソウジュツ、コウボク、チンビ、カンゾウ、タイソウ、ショウキョウ	食前又は食間 2~3回に分服 (②) 【医学管理のPoint】併用時注意 カンゾウ 1g/日	
防己黄耆湯(ボウイオウギトウ)		
防己黄耆湯	腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰囊水腫、肥満症、関節炎、よう、癲、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順 (色白で筋肉軟らかく水ぶどうりの体質) で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するもの)	【併用】間質性肺炎、偽アルステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 【注意】カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
■ クラシエ、コタロー、ジョンコウ ■ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-20) 1g × 10.5、ティコク、本草、マツウラ ■ クラシエ 〔含有生薬〕ボウイ、オウギ、ソウジュツ、タイソウ、ショウキョウ、カンゾウ	➡ 1 日 7.5g、食前又は食間 2~3 回分服 (②)。 食前又は食間 2~3 回に分服 (②)。 ➡ 1 日 18 錠、食前又は食間 2~3 回に分服	➡ 1 日 7.5g、食前又は食間 2~3 回分服 (②)。 食前又は食間 2~3 回に分服 (②)。 ➡ 1 日 18 錠、食前又は食間 2~3 回に分服
漢方の Point	变形性膝関節症を伴う肥満中高年女性がよい適応	
漢方の Point	〔医学管理のPoint〕(毛三引) 肝機能 間質性肺炎の報告 併用時注意 カンゾウ 1.5~2g/日 錠成量 (毛三引) はソウジュツ、(日) (イ) はピャクジュツ (錠あり) (2)	
防風通聖散(ボウフウツウショウサン)		
防風通聖散	高血圧の随伴症状(動悸、肩こり、のぼせ)、肥満症、むくみ、便秘(腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちななもの)	【併用】間質性肺炎、偽アルステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 【注意】マオウ含有製剤、エフドリン類含有製剤、MAO阻害、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンテン系蒸発、カンウ含有製剤、グリチルリチウム含有製剤
■ クラシエ、コタロー、三和、東洋 ■ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-62) 1g × 9.1、ティコク、本草、マツウラ ■ クラシエ 〔含有生薬〕オウゴン、カンゾウ、キョウウ、セッコウ、ピャクジュツ、ダイオウ、ケイガイ、サンシシ、シャクヤク、センキュウ、トウキ、ハッカ、ボウフウ、マオウ、レンギョウ、ショウキョウ、ガッセキ、無水ボウショウウ	➡ 1 日 7.5g、食前又は食間 2~3 回に分服 (②)。 ➡ 1 日 7.5g、食前又は食間 2~3 回に分服 (②)。 ➡ 1 日 27 錠、食前又は食間 2~3 回に分服	【併用】メタボリック症候群の諸症状に有用。18の雑成生薬があり、他の漢方と併用しない 【注意】(毛三引) 肝機能 間質性肺炎の報告 (毛) オウサウ 錠成量 (毛三引) 器系障害の患者等で注意 (ダイオウ含有) 妊婦等で注意 【併用時注意】カンゾウ 2g/日 (錠あり) (2)
補中益気湯(ホチュエイキトウ)		
補中益気湯	夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不隨、多汗症 (消化機能が衰え、四肢倦怠感著)	【併用】間質性肺炎、偽アルステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 【注意】カンゾウ含有製剤、グリチルリチウム含有製剤
■ 太虎堂 ■ クラシエ、コタロー、三和、ジョンコウ、東洋		

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
■ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-41)1g×25包、テイコク、(東亜薬品)、本草 〔含有生薬〕オウギ、ソウジユツ、ニンジン、トウキ、サイコ、タイソウ、チンピ、カンゾウ、ショウマ、ショウギョウ	しい虚弱体質者) ⇒ ■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)	チルリテン酸含有製剤
处方方のPoint 3大補剤の1つ、「医王湯」の別名を持つ補剤の王者で「気虚」の病態に広く使用、飲みやすい味で、がん患者の治療中に用いられる。夏バテや食欲不振時にも用いられる		
医師 間質性肺炎(05年8月:216) 漢学管理 (モニタ) 肝機能 指導 間質性肺炎の報告(併用時注意) カンゾウ1.5g/日(組成) ②はソウジユツ、③④はビャクジユツ		
漢方薬 麻黄湯(マオウトウ)		
■ 麻黄湯 ■ クラシエ、コタロー、ジョンコウ ■ ツムラ(TJ-27)1g×8包、テイコク、本草 〔含有生薬〕マオウ、キョウニン、ケイヒ、カンゾウ	感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難(悪寒、發熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)	〔並大〕偽アルドステロン症、ミオパチー (併用) マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
漢学管理 (マオウ含有) 循環器系障害の患者等で注意(併用時注意) カンゾウ1.5g/日 のPoint		
漢方薬 麻黄附子細辛湯(マオウブシサイシントウ)		
■ 麻黄附子細辛湯 ■ 三和 ■ ツムラ(TJ-127)1g×19包 ■ コタロー 〔含有生薬〕マオウ、サイシン、修治ブンネ	感冒、気管支炎(悪寒、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるもの) ⇒ ■ 1日4.5g、食前又は食間3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服、■ 1日6カプセル、食前又は食間2～3回に分服	〔並大〕肝機能障害、黄疸 (併用) マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬
漢学管理 (モニタ) 肝機能(マオウ含有) 循環器系障害の患者等で注意(シ含有) 小児には慎重投与(カプセルあり) のPoint		
漢方薬 麻杏甘石湯(マキョウカンセキトウ)		
■ 麻杏甘石湯 ■ コタロー、ジョンコウ	小児喘息、気管支喘息 ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	〔並大〕偽アルドステロン症、ミオパチー (併用) マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
■ オースギ、ツムラ(TJ-55)1g×60包、テイコク、本草、マツウラ 〔含有生薬〕セッコウ、キョウニン、マオウ、カンゾウ	分服(②)	薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
漢学管理 (マオウ含有) 循環器系障害の患者等で注意(併用時注意) カンゾウ2g/日 のPoint		
漢方薬 麻杏薏甘湯(マキョウヨクカントウ)		
■ 麻杏薏甘湯 ■ クラシエ、コタロー、三和 ■ JPS、オースギ、ツムラ(TJ-78)1g×9包、(東亜薬品) 〔含有生薬〕マオウ、キョウニン、ヨクイニン、カンゾウ	関節痛、神経痛、筋肉痛 ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)	〔並大〕偽アルドステロン症、ミオパチー (併用) マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
漢学管理 (マオウ含有) 循環器系障害の患者等で注意(併用時注意) カンゾウ2g/日 のPoint		
漢方薬 麻子仁丸(マシニンガン)		
■ 麻子仁丸 ■ コタロー ■ オースギ、ツムラ(TJ-126)1g×71包 〔含有生薬〕マシニン、コウボク、キジツ、シャクヤク、キョウニン、ダイオウ	便秘 ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)	(併用) ダイオウ含有 妊婦等で注意
漢学管理 (マシニン含有) 妊婦等で注意 のPoint		
漢方薬 木防己湯(モクボウイトウ)		
■ 木防己湯 ■ コタロー、三和 ■ ツムラ(TJ-36)1g×14包 〔含有生薬〕モウイ、ケイヒ、ニンジン、セッコウ	心臓、あるいは腎臓に基づく疾患、浮腫、心臓性喘息(顔色がえず、咳を伴う呼吸困難があり、心臓下部に緊張性重感があるもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	
漢学管理 (モクボウ含有) 妊婦等で注意 のPoint		
漢方薬 意苡仁湯(ヨクイニントウ)		
■ 意苡仁湯 ■ クラシエ、ジョンコウ、東洋 ■ オースギ、ツムラ(TJ-52)1g×10包、本草、マツウラ	関節痛、筋肉痛 ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	〔並大〕偽アルドステロン症、ミオパチー (併用) マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
■ クラシエ 〔含有生薑〕マオウ, トウキ, ソウジュツ, ヨクイニン, ケイヒ, シャクヤク, カンゾウ		酸含有製剤
	〔薬学管理〕マオウ含有 循環器系障害の患者等で注意 [併用時注意] カンゾウ2g/日 (組成違い) ② ⑦ のみソウジュツ, 他はビャクジュツ 錠あり ②	
抑肝散(ヨクカンサン)		
■ 抑肝散 ■ オースギ, ツムラ (TJ-54) 1g ¥11.8 〔含有生薑〕ソウジュツ, ブクリョウ, センキュウ, チョウトウコウ, トウキ, サイコ, カンゾウ	神経症, 不眠症, 小児夜泣き, 小児疳症(虚弱な体质で神經が高ぶるもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	〔重火〕間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオバチー, 肝機能障害, 黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔処方〕イライラ感, 興奮, 不眠等の際に用いる。認知症にもよく用いられる 〔成因〕間質性肺炎, 肝機能障害, 黄疸(10年7月:271) 〔薬学管理〕モニタ 肝機能 [指導] 間質性肺炎の報告 [併用時注意] カンゾウ1.5g/日	
抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ)		
■ 抑肝散加陳皮半夏 ■ クラシエ, コタロー ■ ツムラ(TJ-83) 1g ¥15.9 〔含有生薑〕ハンゲ, ソウジユツ, ブクリョウ, センキュウ, チンピ, トウキ, チョウトウコウ, サイコ, カンゾウ	神経症, 不眠症, 小児夜泣き, 小児疳症(虚弱な体质で神經が高ぶるもの) ⇒ ② 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ③ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	〔重火〕偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔薬学管理〕[併用時注意] カンゾウ1.5g/日 (組成違い) ② ⑦ はソウジュツ, ② ⑦ はビャクジュツ	
六君子湯(リックンシトウ)		
■ 六君子湯 ■ クラシエ, コタロー, 三和, 東洋 ■ オースギ, ツムラ (TJ-43) 1g ¥20.1, テイコク, 本草, マツウラ 〔含有生薑〕ソウジュツ, ニンジン, ハンゲ, ブクリョウ, タイソウ, チンピ, カンゾウ, ショウキョウ	胃炎, 胃アトニー, 胃下垂, 消化不良, 食欲不振, 胃痛, 嘔吐(胃腸の弱いもので, 食欲がなく, みぞおちがつかえ, 疲れやすく, 貧血性で手足が冷えやすいもの) ⇒ ② 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ③ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	〔重火〕偽アルドステロン症, ミオバチー, 肝機能障害, 黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔処方〕シスプラチンによる食欲不振に対して, グレリンを介した食欲増進効果あり 〔薬学管理〕モニタ 肝機能 [併用時注意] カンゾウ1~1.5g/日 (組成違い) ② ⑦ はソウジュツ, ② ⑦ はビャクジュツ	

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
立効散(リッコウサン)		
■ 立効散 ■ ツムラ(TJ-110) 1g ¥10.9 〔含有生薑〕サイシン, ショウマ, ポウフウ, カンゾウ, リュウタン	抜歯後の疼痛, 齒痛 ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	〔重火〕偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔薬学管理〕[併用時注意] カンゾウ1.5g/日	
電胆瀉肝湯(リュウタンシャカントウ)		
■ 電胆瀉肝湯 ■ 太虎堂 ■ コタロー, 三和, ジュンコウ, 太虎堂, 東洋 ■ 太虎堂, ツムラ(TJ-76) 1g ¥11.7 〔含有生薑〕トウキ, ジオウ, モクツウ, オウゴン, タクシャ, シャゼンシ, カンゾウ, サンシシ, リュウタン	排尿痛, 残尿感, 尿の渦り, こしき(比較的体力があり, 下腹部筋肉が緊張する傾向があるもの) ⇒ ② 1日7.5g, 食前又は食間3回に分服, ③ 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ④ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(②)	〔重火〕間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオバチー, 肝機能障害, 黄疸 〔主〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔成因〕肝機能障害, 黄疸(10年12月:275), 間質性肺炎(13年2月:299) 〔薬学管理〕モニタ 肝機能 [指導] 間質性肺炎の報告 [ジオウ含有] 胃腸虚弱者注意 [併用時注意] カンゾウ1~1.5g/日	
苓甘姜味辛夏仁湯(リョウカンキョウミシングニントウ)		
■ 苓甘姜味辛夏仁湯 ■ コタロー ■ ツムラ(TJ-119) 1g ¥21.4 〔含有生薑〕ブクリョウ, キョウニン, ハンゲ, サイシン, カンキョウ, カンゾウ, ゴミシ	気管支炎, 気管支喘息, 心臓衰弱, 腎臓病(貧血, 冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	〔重火〕偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔薬学管理〕[併用時注意] カンゾウ2g/日	
苓養朮甘湯(リョウキョウジュツカントウ)		
■ 苓養朮甘湯 ■ コタロー, 三和 ■ ツムラ(TJ-118) 1g ¥9.3, 本草 〔含有生薑〕ブクリョウ, ビヤクジュツ, カンキョウ, カンゾウ	腰痛, 腰の冷え, 夜尿症(腰に冷えと痛みがあって, 尿量が多いもの) ⇒ ② 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(②), ③ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	〔重火〕偽アルドステロン症, ミオバチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
	〔薬学管理〕[併用時注意] カンゾウ2g/日	

1478 ◆ 漢方薬

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
苓桂朮甘湯(リョウケイジュツカントウ)		
苓桂朮甘湯 ■ クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ、東洋 ■ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-39)1g ¥73、本草、マツウラ 〔含有生薬〕ブクリョウ、ケイヒ、ソウジュツ、カンゾウ	神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、 <small>神(近) 偽アルドステロン症、</small> 息切れ、頭痛(めまい、ふらつきが あり、又は動悸があり尿量が減少 するもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間 2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に 分服(②) 〔医学管理のPoint〕併用時注意 カンゾウ2g/日	ミオバチー
六味丸(ロクミガン)		
六味丸 ■ クラシエ、ジュンコウ、東洋 ■ ツムラ(TJ-87)1g ¥89 〔含有生薬〕ジオウ、サンシユコ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンビ	排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ (疲れやすくて尿量減少又は多尿で、とき口渴があるもの) ⇒ ■ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(②)、■ 1日7.5g、 食前又は食間2～3回に分服 〔医学管理のPoint〕ジオウ含有 胃腸虚弱者注意	
ブシ		④(■のみ)
加工ブシ末 ■ 1g	鎮痛、強心、利尿(炮附子末:新陳代謝機能の衰えたものに用いる) ⇒ ■ 1日0.5～1.5g、他剤と配合、■ 1日9錠、3回に分服	
炮附子末 ■ 1g		
アコニンサン ■ 166.67mg	〔医方のPoint〕ブシ末はトリカブトの根を加工処理して毒性を減じ、粉末にしたもの、ブシには新陳代謝を高めて身体を温める。痛みやむくみをとる作用があり、鎮痛や温熱作用等を強めたい場合に漢方処方に加味して使用する。冷えを伴う虚弱な人向けであり、体力が充実し暑がりでのぼせのある人には心悸亢進、のぼせ、舌のしづれ、恶心などの副作用が出現しやすい 〔医学管理のPoint〕併用時注意 ブシを含む他製剤〔原〕相対湿度50%以上で吸湿によりケーキング	
コウジン		
コウジン ■ 1g	漢方処方の調剤に用いる 〔医方のPoint〕(帝國)重症高血圧症、体力の充実していく不眠や煩躁症状のある患者	
〔医方のPoint〕コウジン末は強壮・強精作用のある薬用ニンジンを蒸して乾燥し粉末にしたもの、精神を安定させ、胃腸など体の機能を高める、食欲不振や胃もたれ、病中・病後で体の弱っている時に、効果を増強させる目的で漢方処方に加味して使用する 〔医学管理のPoint〕(モニタ)(継続投与)頭痛、不眠、動悸、血圧上昇等(併用時注意)コウジンを含む他製剤〔原〕相対湿度60%以上で吸湿によりケーキング		

漢方薬

その他 ◆ 1479

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
ヨクイニンエキス ■ 1g ■ 1錠	青年性扁平疣質、尋常性疣質 ⇒ ■ 1日1～2g(本剤3～6g)、3回に分服、■ 1日9～18錠、 3回に分服	

〔医学管理のPoint〕温氣を帯びた手で触ると褐色に変色することあり(保)グラン紙で分包した場合は冷暗所に保管(保)あり(3)

その他

“治せる”医師をめざす

はじめての
漢方治療

—原典条文と最新エビデンスに基づいた漢方医学実践—

後山 尚久
大阪医科大学健康科学クリニック



診断と治療社

執筆者一覧

永嶺宏一	千葉大学柏の葉診療所
西川実徳	西川クリニック
西田慎二	日本赤十字社和歌山医療センター 心療内科
福富 恒	医療法人社団英集会 福富医院
藤原祥子	大阪医科大学健康科学クリニック
前田 学	岐阜県総合医療センター 皮膚科
南澤 潔	医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター 東洋医学診療科
峯 尚志	峯クリニック
宮原 誠	医療法人 入間川病院
元雄良治	金沢医科大学 腫瘍内科学／集学的がん治療センター
柳 裕一郎	やなぎ耳鼻咽喉科クリニック
柳堀 厚	医療法人社団厚友会 露仙堂クリニック
山川淳一	金沢医科大学 総合内科学
山口孝二郎	鹿児島大学病院 口腔外科

目 次

序 文	後山尚久	iii
執筆者一覧		v

“治せる”医師をめざす医療実践における漢方の役割

.....	後山尚久	2
-------	------	---

内 科

呼吸器科

1 風邪(ひきはじめの風邪)	峯 尚志	12
2 気管支喘息	菊地和彦	16
3 慢性閉塞性肺疾患	加藤土郎	20
4 気管支炎・咳・痰	加藤土郎	26

循環器科

5 高血圧症	向坂直哉	30
6 低血圧症	永嶺宏一, 喜多敏明	34

消化器科

7 腹痛・疝痛	西田慎二	38
8 下痢(過敏性腸症候群)	西田慎二	42
9 便秘	堤 英雄	46
10 吐き気(恶心)・嘔吐	山川淳一, 小林淳二	50
11 胃痛	藤原祥子	54
12 胃食道逆流症	入江祥史	58
13 機能性ディスペプシア	入江祥史	62

神経科

14 頭痛	河野恵子	66
-------------	------	----

47

咽喉頭異常感症

pharyngo-laryngo-esophageal neurosis : PLEN

方剤	構成生薬	条文
半夏厚朴湯 (金匱要略)	半夏、厚朴、茯苓、蘇葉、生姜	婦人、咽中炎癥アルガ如キハ半夏厚朴湯之ヲ主ル。
柴朴湯 (本朝經験方)	柴胡、黃芩、半夏、厚朴、茯苓、蘇葉、人参、大棗、生姜、甘草	小柴胡湯と半夏厚朴湯を合方した方剤で、いわゆる経験方として知られており、出典は明らかでない。 小柴胡湯（傷寒論）は、「傷寒五、六日、中風、往来寒熱胸脇苦満、默々トシテ飲食欲セズ」あるいは「咳スル者ハ小柴胡湯之ヲ主ル」。 半夏厚朴湯（金匱要略）は上記。
香蘇散 (和剤局方)	香附子、蘇葉、陳皮、甘草、生姜	四時ノ温疫、傷寒ヲ治ス。

● 疾患概念と背景

咽喉頭異常感症(PLEN)は、咽頭・喉頭に器質的に異常がないにもかかわらず、喉のつかえ感を自覚する病態である。古典では咽中炎癥(あぶった肉がへばりついている)、あるいは梅核氣(梅の種がひっかかっている、飲み込もうとしてもできないし、吐き出したくてもできない)、ヒステリー球とよばれる。感冒後やうつ状態などのときに出現しやすい。耳鼻咽喉科を受診することが多いが、食道がんを心配して消化器科を受診することもある。喉頭アレルギーの関与も指摘されている。

● 処方ガイド

一般的には半夏厚朴湯が用いられる。中枢性の気鬱が明らかであれば香蘇散がよい¹⁾。柴朴湯は小柴胡湯と半夏厚朴湯の合方であり、胸脇苦満・心下痞鞕などの身体所見、精神不安や抑うつ傾向、喘鳴や咳嗽、食欲不振・全身倦怠感・動悸・めまい、そしてこの項の主題である咽喉・



ピット
フォール

咽喉頭異常感を呈する原因の2~4%を占める悪性腫瘍(甲状腺がん・喉頭がん・下咽頭がん・食道がんなど)を見逃さないことが最も重要である。十分な検査をせずにがんを見逃して漢方を使うことは許されない。

また局所所見はないが、自律神経機能異常による咽頭粘膜血流量低下や、更年期のエストロゲン欠乏、加齢による唾液分泌能低下などにより、咽喉頭の乾燥感や異物感が生じている場合があるので²⁾、丁寧な診療が求められる。胃食道逆流症や甲状腺疾患、心肺疾患の除外も重要である。

食道部の異物感などが使用目標となる。柴朴湯では140例以上の本疾患患者で50%以上の有効率が示されている²⁾。特に咽喉頭粘膜が発赤し、神経症的傾向を認める例で有効率が高い²⁾。

症例 42歳の女性、喉のつかえ感を主訴に来院。父親が食道がんで死亡しており、自分も食道がんかと心配していた。上部消化管内視鏡・血液生化学検査では異常なし。不眠傾向・不安神経症的症状あり、気鬱と診断し、香蘇散を処方。2週後の再診時には主訴は消失していた。問診では1週間後より症状は軽快し始めたとのこと。4週間の服用にて廃薬、再発はしていない。

● 漢方薬の作用機序

咽喉頭異常感症(PLEN)には、不安神経症・咽喉頭の炎症・同部位のアレルギーなどが関与しており³⁾、半夏厚朴湯には抗不安作用、小柴胡湯には抗炎症作用、香蘇散には抗うつ作用があるので、このような作用機序により薬効を示すと考えられる。

花輪⁴⁾は中枢性には香蘇散、末梢性には半夏厚朴湯という明快な治療指針を提示している(図1)⁴⁾。




図1 香蘇散と半夏厚朴湯の鑑別
(文献4より引用、一部改変)

文献

- 1) Motoo Y, Taga H, Su SB et al : Effect of Koso-san on globus pharyngeus. Am J Chin Med 27 : 283-288, 1999
- 2) 萩野 敏：耳鼻咽喉科医が知っておきたい漢方薬のイロハ 咽喉頭異常感症. MB Entoni 110 : 43-46, 2010
- 3) 内藤健晴：最新の漢方診療 咽喉頭異常感症. 耳鼻頭頸 84 : 289-292, 2012
- 4) 花輪壽彦：漢方診療のレッスン 増補版. 金原出版, 東京, 408, 2003
- 5) 川内秀之：外来診療のワンポイントアドバイス 咽喉頭異常感症. 診断と治療 98 : 1179-1182, 2010

(元雄良治)