

# 71 漢方薬

## 治療に使用するポイント

- 自覚症状を詳しく問診し、舌や腹部の診察を行い、情報を集めてから処方決定する
- 2~4週間を過ぎても症状に改善のみられないときには、処方を変更する
- 併用は2剤までとし、他医からも漢方薬が処方されていないか注意する
- 芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ)などの甘草を多く含む漢方薬の長期連用は避ける

## 基本知識

漢方薬は1967年に初めて6品目が、次いで1976年以降に多くの品目が健康保険に収載され、現在日常診療に広く応用されているが、医師・コメディカル・患者とも漢方薬についての理解度は低いのが現状である。有効に、かつ安全に漢方薬を使用するための基本知識を修得することは、臨床に携わるすべての医療者に必須となっている。特に有効性と同時に副作用についての情報は知らないではすまされない問題である。今後、漢方薬を西洋薬と併用することがさらに多くなると、これまで知られていなかったような副作用(相互作用)が発生するかもしれないので、漢方薬にも副作用があることを肝に銘じて、診療にあたる必要がある。

漢方処方、診察時点で患者に認められる漢方医学的所見である「証」に応じて行う「随証治療」が基本であるので、処方する前には必ず当該処方の基本的作用に目を通しておく習慣を身に付けたい。患者の前で本を開くことをためらう必要はなく、「このような薬ですよ」と説明することは患者にとっても有益であり、満足度は向上するであろう。

## 治療薬の分類

漢方薬の分類としては、補剤、理気剤、利水剤、瘀滯血剤などの作用機序で分類されることが多い(表1)。これらの分類は、気・血・水、陰陽・虚実、五臓などの漢方理論に基づくものであるが、まず図のように陰陽・虚実の2次元で考えて、ゼロ点である中庸の状態に作用ベクトルが向くような処方を考えるのがよいであろう。そして気滞(気うつ)、瘀血、水滞(水毒)など、具体的な

表1 主な漢方薬の分類と処方名

解表剤	桂枝湯(ケイシトウ)、麻黄湯(マオウトウ)、葛根湯(カクコントウ)、小青竜湯(ショウセイリウトウ)
和解剤	小柴胡湯(ショウサイコトウ)、柴胡桂枝湯(サイコケイシトウ)、柴苓湯(サイレイトウ)、芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ)、半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)
瀉下剤	大承気湯(ダイジョウキトウ)、大黃甘草湯(ダイオウカンゾウトウ)、麻子仁丸(マシニンガン)、潤腸湯(ジュンチョウトウ)
清熱剤	白虎加人参湯(ビャッコカニンジントウ)、黄連解毒湯(オウレンゲドクトウ)、温清飲(ウンセイイン)、消風散(ショウフウサン)、清心蓮子飲(セイシンレンシイン)
温裏補陽剤	人参湯(ニンジントウ)、大建中湯(ダイケンチュウトウ)、桂枝加芍薬湯(ケイシカシャクヤクトウ)、温経湯(ウンケイトウ)、真武湯(シンブトウ)、牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)
補気剤	六君子湯(リクンシトウ)、補中益気湯(ホチュウエッキトウ)、啓脾湯(ケイヒトウ)
補血剤	四物湯(シモツトウ)、当帰飲子(トウキインシ)
気血双補剤	十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ)、人参養榮湯(ニンジンヨウエイトウ)、加味帰脾湯(カミキヒトウ)
滋陰剤	麦門冬湯(バクモンドウトウ)、滋陰降火湯(ジンコウカトウ)、清暑益気湯(セイショエッキトウ)
理気剤	半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)、香蘇散(コウソサン)、釣藤散(チョウトウサン)、抑肝散(ヨクカンサン)
安神剤	甘麦大棗湯(カンバクタイソウトウ)、酸棗仁湯(サンソウニントウ)、柴胡加竜骨牡蛎湯(サイコカリウウコツボレイトウ)
利水剤	五苓散(ゴレイサン)、当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)、防己黄耆湯(ボウイオウギトウ)
瘀滯血剤	桃核承気湯(トウカクジョウキトウ)、桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)、通導散(ツウドウサン)




図 中庸をめざす漢方医学

気・血・水の異常が明らかな場合には、それを是正する処方を選択する。上記病態の診断には、寺澤の気うつスコア(表2)、血虚スコア(表3)などを参照するとわかりやすく、またそのスコアの変化を治療効果の指標にできる<sup>1)</sup>。

### 治療薬の使用にあたって

まず各漢方薬の基本的な薬効、特に「攻める薬」か「守る(補う)薬」かを知る必要がある。特に上述の2次元の病態認識で述べたように、虚証の患者に攻める薬を投与することは、中庸に向かうのとは逆方向に作用するので、有害事象を生む危険性がある。

また肝機能障害、間質性肺炎の発生に注意して、適切な経過観察が必要であり、患者にも、投与前にそのような副作用の存在を知らせ、何か異常があれば連絡するように伝える。これまでに漢方薬を服用したことがあるかなども問診しておくで参考になる。

### 適応外の使用

漢方薬の保険適応はしばしば西洋医学的病名とは異なることがあり、自覚症状などを記載する場合が多い。主訴にとらわれずに、他に保険適応になる症候がないか、丹念に診察すべきである。

### 服薬指導

- 漢方薬は腸内細菌で分解され体内に吸収されるので、食前に服用することが原則です。ただしどうしても食前服薬が難しい方は、起床時、就寝前などに服薬してよいです

表2 寺澤の気うつスコア

抑うつ傾向	18
喉のつかえ感	12
頭重・頭痛	8
胸のつまった感じ	8
季肋部のつかえ感	8
腹部膨満感	8
時間により症状が動く	8
朝起きにくく、調子が出ない	8
腹部の鼓音	8
排ガスが多い	6
げっぷ	4
残尿感	4

寺澤捷年：症例から学ぶ和漢診療学 第3版、医学書院、24、2011より一部改変

表3 寺澤の血虚スコア

皮膚の乾燥と荒れ、赤ざれ	14
眼精疲労	12
こむらがえり	10
顔色不良	10
めまい感	8
頭髪が抜けやすい	8
爪の異常	8
集中力低下	6
不眠、睡眠障害	6
過少月経・月経不順	6
知覚障害	6
腹直筋痙攣	6

寺澤捷年：症例から学ぶ和漢診療学 第3版、医学書院、43、2011より一部改変

- もし味やにおいが気になるようでしたら、オブラートに包んだり、それを水に浮かべるなどすると薬に依めます。しかし、漢方薬は体に合う場合は、おいしいと感じるそうですので、最初はできるだけそのままお湯などで服用してください

### Topics

- 牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)が抗癌剤バクリタキセルによる末梢神経障害に用いられている
- 大建中湯(ダイケンチュウトウ)や六君子湯(リクンシトウ)は米国の消化器病学会で発表されるような科学的データがわが国から発信されており、六君子湯では食欲関連バイオマーカーであるグレリンを中心に作用機序のさらなる解明が進んでいる。六君子湯によりグレリン受容体の発現増加が実験的に認められ、臨床的にも効果が確認されている<sup>2)</sup>
- 2011年3月31日の時点で、東邦大学医学メディアセンターのホームページに収録されていた1,117件の診療ガイドライン(CPG)のうち、外国のCPG・倫理ガイドライン・動物実験や治験のガイドライン・一般患者向けなどを除外した584件中58件(9.9%)に漢方に関連する記載が認められた。しかし、引用論文が存在し、エビデンスと推奨のグレードがあり、その記載を含むものは11件しかなかった。具体例は「漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン(KCPG)Appendix2011」(<http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/cpg/index.html>)を参照されたい。今後CPG作成時のキーワード設定の工夫や、漢方処方名のローマ字表記法(日本薬局方で採用)の周知徹底が重要であろう<sup>3,4)</sup>

### ◆ 文献

- 寺澤捷年：症例から学ぶ和漢診療学 第3版、医学書院、2011
- Ohno T, et al : Rikkunshito, a traditional Japanese medicine, suppresses cisplatin-induced anorexia in humans. Clin Exp Gastroenterol, 4 : 291-296, 2011
- Motoo Y, et al : Current status of Kampo (Japanese herbal) medicines in Japanese clinical practice guidelines. Complementary Therapies in Medicine, 17(3) : 147-154, 2009
- 津谷喜一郎、他：漢方処方名ローマ字表記法 Standard Kampo Formula Nomenclature. 日本東洋医学雑誌、56(4) : 611-622, 2005

(元雄 良治)

表 主な漢方薬の製品番号

No: 代表的な製品番号(メーカー名が付いていないものは各社共通の製品番号を示す)  
 ㊦: クラシエ, ㊧: ツムラ, ㊨: コタロー, ㊩: 三和生薬, ㊪: 東洋薬行

No	薬剤名	No	薬剤名
1	葛根湯(カクコントウ)	31	呉茱萸湯(ゴシュウトウ)
2	葛根湯加川芎辛夷(カクコントウカセンキュウシンイ)	32	人参湯(ニンジンツトウ)
3	乙字湯(オツジツトウ)	33	大黃牡丹皮湯(ダイオウボタンピトウ)
5	安中散(アンチュウサン)	34	白虎加人参湯(ビャッコカニンジンツトウ)
6	十味敗毒湯(ジュウミハイドクトウ)	35	四逆散(シギャクサン)㊦
7	八味地黄丸(ハチミジオウガン)	36	黄芩湯(オウゴントウ)㊨
8	大柴胡湯(ダイサイコトウ)	37	木防己湯(モクボウイトウ)
9	小柴胡湯(ショウサイコトウ)	38	半夏白朮天麻湯(ハンゲバクジュツテンマトウ)㊦, ㊧, ㊨
10	柴胡桂枝湯(サイコケイシツトウ)	39	桂麻各半湯(ケイマカクハントウ)㊪
11	柴胡桂枝乾姜湯(サイコケイシカンキョウトウ)	40	当帰四逆加呉茱萸生薑湯(トウキシキヤクカゴシュウショウキョウトウ)
12	柴胡加竜骨牡蛎湯(サイコカリョウコツボレイトウ)	41	苓桂朮甘湯(リョウケイジュツカントウ)
13	三黄瀉心湯(サンオウシャシントウ)㊦	42	猪苓湯(チョレイトウ)
14	半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)	43	補中益気湯(ホチュウエッキトウ)
15	黄连解毒湯(オウレンゲドクトウ)	44	六君子湯(リクンシツトウ)
16	半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)	45	桂枝湯(ケイシツトウ)
17	五苓散(ゴレイサン)	46	七物降下湯(シチモツコウカトウ)
18	桂枝加朮附湯(ケイシカジュツブトウ)㊦, ㊧	47	七物降下湯(シチモツコウカトウ)
18	桂枝加芍朮附湯(ケイシカリョウジュツブトウ)㊦	48	十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ)
19	小青龙湯(ショウセイリョウトウ)	49	加味帰脾湯(カミキヒトウ)㊦
20	防己地黄湯(ボウイオウギトウ)	50	荊芥連翹湯(ケイガイレンギョウトウ)
21	小半夏加茯苓湯(ショウハンゲカブクリョウトウ)	51	潤腸湯(ジュンチョウトウ)
22	消風散(ショウフウサン)	52	葱豉仁湯(ユクイニントウ)
23	当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)	53	疎経活血湯(ソケイカクケツトウ)
24	加味逍遙散(カミショウヨウサン)	54	抑肝散(ヨクカンサン)
25	桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)	55	麻杏甘石湯(マキョウカンセキトウ)
26	桂枝加竜骨牡蛎湯(ケイシカリョウコツボレイトウ)㊦, ㊧, ㊨	56	五淋散(ゴリンサン)
26	桂枝加黄耆湯(ケイシカオウギトウ)㊦	57	漏瀉散(ウンセイイン)
27	麻黄湯(マオウトウ)㊦, ㊧, ㊨	58	滑上防風湯(セイジョウボウフウトウ)
27	桂枝加葛根湯(ケイシカカクコントウ)㊦	59	治頭瘡一方(チツソウイッポウ)
28	越婢加朮湯(エツピカジュツトウ)㊦, ㊧	60	桂枝加芍薬湯(ケイシカシャクヤクトウ)
28	桂枝加厚朴杏子湯(ケイシカコウボクキョウニントウ)㊦	61	桃核承気湯(トウカクジョウキトウ)
29	麦門冬湯(バクモンドウトウ)㊦, ㊧	62	防風通聖散(ボウフウツウショウサン)
29	当帰芍薬散加附子(トウキシャクヤクサンカブシ)㊦	63	五積散(ゴシヤクサン)
30	真武湯(シンブトウ)	64	炙甘草湯(シャカンゾウトウ)
		65	帰脾湯(キヒトウ)
		66	参蘇飲(ジンソイン)
		67	女神散(ニョジンサン)
		68	芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ)

No	薬剤名	No	薬剤名
69	茯苓飲(ブクリョウイン)	111	清心蓮子飲(セイシンレンシイン)
70	香蘇散(コウソサン)	112	猪苓湯合四物湯(チョレイトウゴウシモツトウ)
71	四物湯(シモツトウ)	113	三黄瀉心湯(サンオウシャシントウ)㊦, ㊧
72	甘麦大棗湯(カンバクタイソウトウ)	114	紫菀湯(サイレイトウ)
73	柴陷湯(サイカントウ)	115	胃苓湯(イレイトウ)
74	調胃承気湯(チョウイジョウキトウ)	116	茯苓飲合半夏厚朴湯(ブクリョウインコウハンゲコウボクトウ)
75	四君子湯(シクンシツトウ)	117	茵陳五苓散(インチンゴレイサン)
76	竜胆瀉肝湯(リュウタンシャカントウ)	118	苓養朮甘湯(リョウキョウジュツカントウ)
77	芍薬膠艾湯(キョウキョウガイトウ)	119	苓甘姜味辛夏仁湯(リョウカンキョウミシゲニントウ)
78	麻杏薤甘湯(マキョウヨクカントウ)	120	黄連湯(オウレントウ)
79	平胃散(ハイイサン)	121	三物黄芩湯(サンモツオウゴントウ)
80	柴胡清肝湯(サイコセイカントウ)	122	排膿散及湯(ハイノウサンキュウトウ)
81	二陳湯(ニチントウ)	123	当帰建中湯(トウキケンチュウトウ)
82	桂枝人参湯(ケイシニンジンツトウ)	124	川芎茶調散(センキュウチャチョウサン)
83	抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ)	125	桂枝茯苓丸料加薤苡仁(ケイシブクリョウガンリョウカヨクイニン)
84	大甘甘草湯(ダイオウカンゾウトウ)	126	麻子仁丸(マシニンガン)
85	神祕湯(シンピトウ)	127	麻黄附子細辛湯(マオウブシサイシントウ)
86	当帰飲子(トウキインシ)	128	啓脾湯(ケイヒトウ)
87	六味丸(ロクミガン)	129	大承気湯(ダイジョウキトウ)
88	二朮湯(ニジュツトウ)	130	桂枝加芍薬大黃湯(ケイシカシャクヤクダイオウトウ)
89	治打撲一方(チダボクイッポウ)	131	茵陳蒿湯(インチンコウトウ)㊦, ㊧
90	清肺湯(セイハイトウ)	132	清暑益気湯(セイショエッキトウ)
91	竹茹温胆湯(チクジョウウンタントウ)	133	加味帰脾湯(カミキヒトウ)㊦
92	滋陰至宝湯(ジインシホウトウ)	134	桔梗湯(キキョウトウ)
93	滋陰降火湯(ジインコウカトウ)	135	四苓湯(シレイトウ)
95	五虎湯(ゴコトウ)	136	葛根加朮附湯(カクコンカジュツブトウ)
96	柴朴湯(サイボクトウ)	137	桂芍知母湯(ケイシャクチモトウ)
97	大防風湯(ダイボウフウトウ)	138	芍薬調血飲(キョウキチョウケツイン)
98	黄耆建中湯(オウギケンチュウトウ)	139	九味檳榔湯(クミビシロウトウ)
99	小建中湯(ショウケンチュウトウ)	140	梔子柏皮湯(シハクヒトウ)
100	大建中湯(ダイケンチュウトウ)	141	大柴胡湯去大黃(ダイサイコトウダイオウ)
101	升麻葛根湯(ショウマカクコントウ)	142	腸癰湯(チョウウヨウトウ)
102	当帰湯(トウキトウ)	143	桔梗石膏(キキョウセッコウ)
103	酸棗仁湯(サンソウニンツトウ)	144	甘草湯(カンゾウトウ)
104	辛夷清肺湯(シンイセイハイトウ)	145	茵陳蒿湯(インチンコウトウ)㊦
105	通導散(ツウドウサン)	146	附子人参湯(別名: 附子理中湯) (ブシニンジンツトウ(ブシリチュウトウ))
106	温経湯(ウンケイトウ)	501	紫雲膏(シウンコウ)
107	牛車腎気丸(ゴシヤジンギガン)	05	芍薬甘草附子湯(シャクヤクカンゾウブシトウ)
108	人参養榮湯(ニンジンヨウエイトウ)		
109	小柴胡湯加桔梗石膏(ショウサイコトウカキキョウセッコウ)		
110	立効散(リッコウサン)		



品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
ツムラ(TJ-98)1g×53 〔含有生薬〕シャクヤク、オウギ、ケイヒ、タイソウ、カンゾウ、ショウキョウ	2～3回に分服 <b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ2g/日	
黄芩湯(オウゴントウ)		
黄芩湯 三和 〔含有生薬〕オウゴン、タイソウ、カンゾウ、シャクヤク	腸カタル、消化不良、嘔吐、下痢 ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服 <b>併注</b> カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系利尿薬、トリクロルメチアジド	アルドステロン症、ミオパチー、低K血症 偽(大)アルドステロン症、ミオパチー
<b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ3g/日		
黄連湯(オウレントウ)		
黄連湯 コタロー、東洋 太虎堂、ツムラ(TJ-120)1g×34.5 〔含有生薬〕オウレン、カンゾウ、カンキョウ、ニンジン、ケイヒ、タイソウ、ハンゲ	急性胃炎、二日酔、口内炎(胃部の停滞感や重圧感、食欲不振のあるもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊞)	アルドステロン症、ミオパチー、低K血症 偽(大)アルドステロン症、ミオパチー <b>併注</b> カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系利尿薬、トリクロルメチアジド
<b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ3g/日		
黄連解毒湯(オウレンジドクトウ)		
黄連解毒湯 クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ、東洋 JPS、オースギ、サカモト、太虎堂、ツムラ(TJ-15)1g×15.3、テイコク(東亜薬品)、本草 オースギ、クラシエ コタロー 〔含有生薬〕オウゴン、オウレン、サンシシ、オウバク	咯血、吐血、下血、脳溢血、高血圧、心悸亢進、ノイローゼ、皮膚癢痒症、胃炎(比較的体力があり、のぼせ気味で、いらいらする傾向のあるもの) ⇒ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊞)、1日10錠、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日6カプセル、食前又は食間2～3回に分服	偽(大)間質性肺炎、肝機能障害、黄疸
<b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ2g/日、オウレン(㊞)2g、(㊟)1.5g、(㊟)1.5g (カプセルあり) (㊟)		
乙字湯(オツジトウ)		
乙字湯 クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ	切れ痔、イボ痔(病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないもの)	偽(大)間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-3)1g×16.5、テイコク(東亜薬品)、本草 〔含有生薬〕トウキ、サイコ、オウゴン、カンゾウ、ショウマ、ダイオウ	⇒ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊞)、1日15錠、食前又は食間2～3回に分服 <b>併注</b> カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤 <b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ2～3g/日	
葛根湯(カッコントウ)		
葛根湯 クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ、東洋 JPS、オースギ(販売療法)、太虎堂、ツムラ(TJ-1)1g×9、テイコク(東亜薬品)、本草、マツウラ オースギ、クラシエ 〔含有生薬〕カクコン、タイソウ、マオウ、カンゾウ、ケイヒ、シャクヤク、ショウキョウ	感冒、鼻風邪、熱性疾患の初期、炎症性疾患(結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃炎、乳腺炎、リンパ節炎)、肩こり、上半身の神経痛、荨麻疹(自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊞)、1日10錠、食前又は食間2～3回に分服(㊟)	偽(大)アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 <b>併注</b> マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
<b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ2g/日、(㊟)2g		
葛根加朮附湯(カクコンカジュツプトウ)		
葛根加朮附湯 三和 〔含有生薬〕カクコン、マオウ、タイソウ、ソウジュツ、ケイヒ、シャクヤク、カンゾウ、ショウキョウ、加工ブシ	肩こり、肩甲部の神経痛、上半身の関節リウマチ(悪寒発熱して、頭痛があり、項部・肩背部に緊張感あるもの) ⇒ 1日7.5g、食前又は食間3回に分服	偽(大)アルドステロン症、ミオパチー <b>併注</b> マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
<b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ2g/日		
葛根湯加川芎辛夷(カクコントウカセンキョウシンイ)		
葛根湯加川芎辛夷	鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎 ⇒ 1日7.5g、食前又は食間	偽(大)アルドステロン症、ミオパチー

品名, 規格単位	適応, 用法, 用量	警告, 禁忌, 副作用等
<p>㊦ クラシエ, コタロー, 東洋</p> <p>㊦ JPS, オースギ, ツムラ (TJ-2)1g×11, テイコク, (東亜薬品), 本草</p> <p>㊦ クラシエ</p> <p>[含有生薬]カッコン, タイソウ, マオウ, カンゾウ, ケイヒ, シャクヤク, センキョウ, シンイ, ショウキョウ</p>	<p>2〜3回に分服(㊦), ㊦ 1日7.5g, 食前又は食間2〜3回に分服(㊦), ㊦ 1日18錠, 食前又は食間2〜3回に分服</p>	<p>㊦(併注) マオウ含有製剤, エフェドリン類含有製剤, MAO阻害薬, 甲状腺製剤, カテコラミン製剤, キサンチン系薬, カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤</p>
臨床情報	<p>㊦(処方Point) 鼻の通りをよくする辛夷(シンイ)を含み, 鼻づまりに有効</p> <p>㊦(薬学管理Point) マオウ含有 循環器系障害の患者等で注意 (併用時注意) カンゾウ2g/日 (錠あり)㊦</p>	
加味帰脾湯(カミキヒトウ)		
<p>加味帰脾湯</p> <p>㊦ クラシエ, 東洋</p> <p>㊦ オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-137)1g×20g</p> <p>㊦ クラシエ</p> <p>[含有生薬]オウギ, サイコ, ソウジュツ, ニンジン, ブクリョウ, サンソウニン, リュウガンニク, オンジ, サンシシ, タイソウ, トウキ, カンゾウ, ショウキョウ, モッコウ</p>	<p>貧血, 不眠症, 精神不安, 神経症(虚弱体質で血色の悪い人)</p> <p>⇒ ㊦ 1日7.5g, 食前又は食間2〜3回に分服(㊦), ㊦ 1日7.5g, 食前又は食間2〜3回に分服(㊦), ㊦ 1日27錠, 食前又は食間2〜3回に分服</p>	<p>㊦(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー</p> <p>㊦(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤</p>
臨床情報	<p>㊦(薬学管理Point) (併用時注意) カンゾウ1g/日 (錠あり)㊦</p>	
加味逍遙散(カミショウヨウサン)		
<p>加味逍遙散</p> <p>㊦ 太虎堂</p> <p>㊦ クラシエ, コタロー, ジュンコウ, 東洋</p> <p>㊦ JPS, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-24)1g×17g, テイコク, 本草, マツウラ [含有生薬]サイコ, シャクヤク, ソウジュツ, トウキ, ブクリョウ, サンシシ, ボタンビ, ショウキョウ, ハッカ, カンゾウ</p>	<p>冷え症, 虚弱体質, 月経不順, 月経困難, 更年期障害, 血の道症(体質虚弱な婦人で, 肩がこり, 疲れやすく, 精神不安等の精神神経症状, ときに便秘傾向のあるもの)</p> <p>⇒ ㊦ 1日6g, 食前又は食間3回に分服, ㊦ 1日6g, 食前又は食間2〜3回に分服(㊦), ㊦ 1日7.5g, 食前又は食間2〜3回に分服(㊦)</p>	<p>㊦(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸</p> <p>㊦(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤</p>
臨床情報	<p>㊦(処方Point) 婦人用3大漢方の1つ, 虚弱で精神神経症状の強い女性が訴える諸症状に, 症状がさまよう(遷延する)のが特徴的, 他に上熱下寒, 発作性頭痛, 更年期障害等が処方ポイント</p> <p>㊦(薬学管理Point) モニタ 肝機能 (併用時注意) カンゾウ1.5〜2g/日 腫脹速い㊦:ソウジュツ, ㊦㊦:ピャクジュツ</p>	

品名, 規格単位	適応, 用法, 用量	警告, 禁忌, 副作用等
甘草湯(カンゾウトウ)		
<p>甘草湯</p> <p>㊦ クラシエ</p> <p>[含有生薬]カンゾウ</p>	<p>激しい咳, 咽喉痛の緩解</p> <p>⇒ 1日6g, 食前又は食間2〜3回に分服</p>	<p>㊦(重大) アルドステロン症, ミオパチー, 低K血症</p> <p>㊦(併注) 偽アルドステロン症, ミオパチー</p> <p>㊦(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド</p>
臨床情報	<p>㊦(薬学管理Point) (併用時注意) カンゾウ8g/日</p>	
甘麦大棗湯(カンバクタイソウトウ)		
<p>甘麦大棗湯</p> <p>㊦ コタロー</p> <p>㊦ オースギ, ツムラ (TJ-72)1g×7g</p> <p>[含有生薬]タイソウ, カンゾウ, ショウバク</p>	<p>夜泣き, ひきつけ</p> <p>⇒ ㊦ 1日9g, 食前又は食間2〜3回に分服, ㊦ 1日7.5g, 食前又は食間2〜3回に分服(㊦)</p>	<p>㊦(重大) アルドステロン症, ミオパチー, 低K血症</p> <p>㊦(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー</p> <p>㊦(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド</p>
臨床情報	<p>㊦(処方Point) 急迫症状を鎮静化させるが, 眠気を来さない</p> <p>㊦(薬学管理Point) (併用時注意) カンゾウ5g/日</p>	
桔梗湯(キキョウトウ)		
<p>桔梗湯</p> <p>㊦ ツムラ(TJ-138)1g×57</p> <p>[含有生薬]カンゾウ, キキョウ</p>	<p>扁桃炎, 扁桃周囲炎(咽喉がはれて痛むもの)</p> <p>⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2〜3回に分服</p>	<p>㊦(重大) アルドステロン症, ミオパチー, 低K血症</p> <p>㊦(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー</p> <p>㊦(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド</p>
臨床情報	<p>㊦(薬学管理Point) (併用時注意) カンゾウ3g/日</p>	
桔梗石膏(キキョウセッコウ)		
<p>桔梗石膏</p> <p>㊦ コタロー</p> <p>[含有生薬]セッコウ, キキョウ</p>	<p>咳嗽あるいは化膿するもの</p> <p>⇒ 1日6g, 食前又は食間2〜3回に分服</p>	
帰脾湯(キヒトウ)		
<p>帰脾湯</p> <p>㊦ ジュンコウ</p>	<p>貧血, 不眠症(虚弱体質で血色の悪いもの)</p>	<p>㊦(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー</p>

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
ツムラ(TJ-65)1g Y21.6 〔含有生薬〕オウギ,ニンジン,ビャクジュツ,ブクリョウ,サンソウニン,リュウガンニク,オンジ,タイソウ,トウキ,カンゾウ,ショウキョウ,モッコウ	⇒ ④ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服, ⑤ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(☺)	〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
芍薬艾湯(キュウキキョウガイトウ)		
芍薬艾湯 ④ コタロー, ジュンコウ ツムラ(TJ-77)1g×88 〔含有生薬〕ジオウ,シャクヤク,トウキ,カンゾウ,センキュウ,ガイヨウ,アキヨウ	痔出血 ⇒ ④ 1日15g,食前又は食間2~3回に分服(☺), ⑤ 1日9g,食前又は食間2~3回に分服	④ アルドステロン症,ミオパチー,低K血症 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤,ループ系利尿薬,トリクロルメチアジド
薬価 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
芍薬調血飲(キュウキキョウケツイン)		
芍薬調血飲 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔含有生薬〕トウキ,センキュウ,ジオウ,ビャクジュツ,ブクリョウ,チンピ,コウブシ,ボタンビ,ウヤク,タイソウ,ヤクモソウ,ショウキョウ,カンゾウ	産後の神経症,体力低下,月経不順 ⇒ 1日6g,食前又は食間3回に分服	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬価 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
丸味横櫛湯(クミンロウトウ)		
丸味横櫛湯 ④ コタロー 〔含有生薬〕ビンロウジ,ソヨウ,ブクリョウ,ケイヒ,コウボク,キツビ,ダイオウ,モッコウ,カンゾウ,ゴシュユ,ショウキョウ	脚気,高血圧,動脈硬化及びこれらに伴う頭痛(心悸亢進,肩こり,倦怠感があり,便秘傾向がある) ⇒ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬価 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
荊芥連翹湯(ケイガイレンギョウトウ)		
荊芥連翹湯	蓄膿症,慢性鼻炎,慢性扁桃炎,にきび	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
オースギ,太虎堂,ツムラ(TJ-50)1g×20.5,テイコク 〔含有生薬〕トウキ,シャクヤク,センキュウ,ジオウ,オウレン,オウゴン,オウバク,サンシシ,レンギョウ,ケイガイ,ボウフウ,ハッカ,キジツ,ビャクシ,キキョウ,サイコ,カンゾウ	⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(☺)	能障害,黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
桂枝湯(ケイシトウ)		
桂枝湯 ④ コタロー ⑤ JPS,オースギ,ツムラ(TJ-45)1g×71,テイコク,本草,マツウラ 〔含有生薬〕ケイヒ,シャクヤク,タイソウ,カンゾウ,ショウキョウ	体力が衰えた時の風邪の初期 ⇒ ④ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服, ⑤ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(☺)	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬価 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
桂枝加黄耆湯(ケイシカオウギトウ)		
桂枝加黄耆湯 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔含有生薬〕ケイシ,シャクヤク,タイソウ,生ショウキョウ,カンゾウ,オウギ	寝汗,あせも(体力が衰えているもの) ⇒ 1日6g,空腹時3回に分服	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬価 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
桂枝加葛根湯(ケイシカカクコントウ)		
桂枝加葛根湯 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔含有生薬〕ケイシ,シャクヤク,タイソウ,生ショウキョウ,カンゾウ,カクコン	風邪の初期で肩こり,頭痛(身体虚弱なもの) ⇒ 1日6g,空腹時3回に分服	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬価 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
桂枝加厚朴杏仁湯(ケイシカクボクキョウニントウ)		
桂枝加厚朴杏仁湯 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔含有生薬〕ケイシ,シャクヤク,タイソウ,生ショウキョウ,コウボク,キョウニン,カンゾウ	咳(身体虚弱なもの) ⇒ 1日7.5g,空腹時3回に分服	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔併注〕カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬価 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
<b>桂枝加芍薬湯(ケイシカシャクヤクトウ)</b>		
<b>桂枝加芍薬湯</b> ④ クラシエ, コタロー, ジュンコウ, 東洋 ④ オースギ, ツムラ (TJ-60)1g×83, テイコク, 本草 ④ クラシエ 〔含有生薬〕シャクヤク, ケイヒ, タイソウ, カンゾウ, ショウキョウ	しぶり腹, 腹痛(腹部膨満感のあるもの) ⇒ ④ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ④ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ④ 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	④(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー ④(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報	④(Point) 若年者の下痢型過敏性腸症候群に用いられる ④(Point) 併用時注意) カンゾウ2g/日(錠あり)㊟	
<b>桂枝加芍薬大黃湯(ケイシカシャクヤクダイオウトウ)</b>		
<b>桂枝加芍薬大黃湯</b> ④ ツムラ(TJ-134)1g×93 〔含有生薬〕シャクヤク, タイソウ, ケイヒ, カンゾウ, ダイオウ, ショウキョウ	急性腸炎, 大腸カタル, 常習便秘, 宿便, しぶり腹(比較的体力のない人で, 腹部膨満し, 腸内の停滞感あるいは腹痛等を伴うもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	④(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー ④(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報	④(Point) (ダイオウ含有) 妊婦等で注意(併用時注意) カンゾウ2g/日	
<b>桂枝加朮附湯(ケイシカジュツプトウ)</b> ④(重) 及び ④(重) 以外の分包除く)		
<b>桂枝加朮附湯</b> ④ コタロー, 三和 ④ JPS, ツムラ(TJ-18)1g×107, テイコク, マツウラ〔含有生薬〕ケイヒ, シャクヤク, ソウジュツ, タイソウ, カンゾウ, ショウキョウ, 修治ブシ末	関節痛, 神経痛 ⇒ ④ 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ④ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟)	④(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー ④(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報	④(Point) プシ含有) 小児には慎重投与(併用時注意) カンゾウ2g/日(錠あり)㊟ ㊟ 修治ブシ末, ㊟ プシ末	
<b>桂枝加竜骨牡蛎湯(ケイシカリュウコツボレイトウ)</b>		
<b>桂枝加竜骨牡蛎湯</b> ④ クラシエ, コタロー ④ オースギ, ツムラ (TJ-26)1g×91, テイコク〔含有生薬〕ケイヒ, シャクヤク, タイソウ, ボレイ, リュウコツ, カンゾウ, ショウキョウ	小児夜尿症, 神経衰弱, 性的神経衰弱, 遺精, 陰萎(下腹直筋に緊張のある比較的体力の衰えているもの) ⇒ ④ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ④ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟)	④(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー ④(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報	④(Point) 併用時注意) カンゾウ2g/日	

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
<b>桂枝加苓朮附湯(ケイシカリョウジュツプトウ)</b> ④(2.5g分包, ㊟除く)		
<b>桂枝加苓朮附湯</b> ④ クラシエ ④ オースギ ④ クラシエ 〔含有生薬〕ケイヒ, シャクヤク, タイソウ, ブクリョウ, ビャクジュツ, ショウキョウ, カンゾウ, 加工ブシ末	関節痛, 神経痛 ⇒ ④ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服, ④ 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服, ④ 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	④(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー ④(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報	④(Point) プシ含有) 小児には慎重投与(併用時注意) カンゾウ2g/日(錠あり)㊟ ㊟ プシ末(㊟) 加工ブシ末(㊟) ㊟	
<b>桂枝人参湯(ケイシニンジントウ)</b>		
<b>桂枝人参湯</b> ④ クラシエ ④ ツムラ(TJ-82)1g×141 〔含有生薬〕ケイヒ, カンゾウ, ソウジュツ, ニンジン, カンキョウ	頭痛, 動悸, 慢性胃腸炎, 胃アトニー(胃腸の弱いもの) ⇒ ④ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服, ④ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	④(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー, 低K血症 ④(重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー ④(併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド
臨床情報	④(Point) 併用時注意) カンゾウ3g/日	
<b>桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)</b>		
<b>桂枝茯苓丸</b> ④ クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ④ JPS, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-25)1g×92, テイコク, (東亜薬品), 本草, マツウラ ④ クラシエ 〔含有生薬〕ケイヒ, ブクリョウ, シャクヤク, ボタンビ, トウニン	子宮並びにその付属器の炎症, 子宮内膜炎, 月経不順, 月経困難, 帯下, 更年期障害(頭痛, めまい, のぼせ, 肩こり等), 冷え症, 腹膜炎, 打撲症, 痔疾患, 嚢丸炎(体格はしっかりしていて赤ら顔が多く, 腹部は大体充実, 下腹部に抵抗のあるもの) ⇒ ④ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ④ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ④ 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	④(重大) 肝機能障害, 黄疸
臨床情報	④(Point) 婦人用3大漢方の1つ. 更年期障害の冷え・のぼせに用いる. 分娩促進作用があるので妊娠中は使用しない ④(Point) モニタ) 肝機能(錠あり)㊟	
<b>桂枝茯苓丸加薏苡仁(ケイシブクリョウガンカクイニン)</b>		
<b>桂枝茯苓丸加薏苡仁</b>	月経不順, 血の道症, にきび, しみ, 手足のあれ(比較的体力があり, ときに下腹部痛, 肩こり, 頭重, めまい, のぼせて足冷え等を訴えるもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
ツムラ(TJ-125)1g ¥107 〔含有生薬〕ケイヒ,ブクリョウ,ボタンビ,トウニン,シャクヤク,ヨクイニン		
桂芍知母湯(ケイシャクチモトウ) ㊦		
桂芍知母湯 ㊦ 三和 〔含有生薬〕ケイヒ,マオウ,チモ,ハマボウフウ,シャクヤク,カンゾウ,ビャクジュツ,加工ブシ,ショウキョウ	神経痛,関節リウマチ(関節痛み,身体やせ,脚部腫脹し,めまい,悪心あるもの) ⇒ ㊦ 1日9g,食前又は食間2~3回に分服	㊦(重大) 偽アルドステロン症,ミオパチー 併注) マオウ含有製剤,エフェドリン類含有製剤,MAO阻害薬,甲状腺製剤,カテコラミン製剤,キサンチン系薬,カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬学管理のPoint 〔マオウ含有〕併用時注意	循環器系障害の患者等で注意 カンゾウ1.5g/日	〔ブシ含有〕小児には慎重投与
啓脾湯(ケイヒトウ)		
啓脾湯 ㊦ 東洋 ツムラ(TJ-128)1g ¥22 〔含有生薬〕ソウジュツ,ブクリョウ,サンヤク,ニンジン,レンニク,タクシャ,チンピ,サンザシ,カンゾウ	胃腸虚弱,慢性胃腸炎,消化不良,下痢(やせて顔色が悪く,食欲がなく,下痢の傾向があるもの) ⇒ ㊦ 1回7.5g,空腹時3回に分服,㊦ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	㊦(重大) 偽アルドステロン症,ミオパチー 併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬学管理のPoint 〔マオウ含有〕併用時注意	循環器系障害の患者等で注意 カンゾウ1g/日	
桂麻各半湯(ケイマカクハントウ)		
桂麻各半湯 ㊦ 東洋 〔含有生薬〕ケイシ,シャクヤク,生ショウキョウ,カンゾウ,マオウ,タイソウ,キョウニン	感冒,咳,かゆみ ⇒ ㊦ 1日4.5g,空腹時3回に分服	㊦(重大) 偽アルドステロン症,ミオパチー 併注) マオウ含有製剤,エフェドリン類含有製剤,MAO阻害薬,甲状腺製剤,カテコラミン製剤,キサンチン系薬,カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬学管理のPoint 〔マオウ含有〕併用時注意	循環器系障害の患者等で注意 カンゾウ2g/日	
香蘇散(コウソサン)		
香蘇散 ㊦ コタロー	風邪の初期(胃腸虚弱で神経質なもの) ⇒ ㊦ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服,㊦ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊦)	㊦(重大) 偽アルドステロン症,ミオパチー 併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
ツムラ(TJ-70)1g ¥76, テイコク 〔含有生薬〕コウブシ,ソヨウ,チンピ,カンゾウ,ショウキョウ	軽度のうつ症状に,感冒や食事性蕁麻疹にも有効.服用しやすく女性・高齢者に適している 併用時注意) カンゾウ1~1.5g/日(組成(真)違) 添付文書参照	
五虎湯(ゴコトウ)		
五虎湯 ㊦ クラシエ ツムラ(TJ-95)1g ¥71 ㊦ オースギ 〔含有生薬〕マオウ,キョウニン,カンゾウ,セッコウ,ソウハクヒ	咳,気管支喘息 ⇒ ㊦ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服,㊦ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊦),㊦ 1日9錠,食前又は食間2~3回に分服	㊦(重大) 偽アルドステロン症,ミオパチー 併注) マオウ含有製剤,エフェドリン類含有製剤,MAO阻害薬,甲状腺製剤,カテコラミン製剤,キサンチン系薬,カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬学管理のPoint 〔マオウ含有〕併用時注意	循環器系障害の患者等で注意(併用時注意) カンゾウ2g/日(組成(真)あり) ㊦	
五積散(ゴシャクサン)		
五積散 ㊦ コタロー ツムラ(TJ-63)1g ¥96, テイコク 〔含有生薬〕ソウジュツ,チンピ,トウキ,ハンゲ,ブクリョウ,カンゾウ,キキョウ,キジツ,ケイヒ,コウボク,シャクヤク,ショウキョウ,センキョウ,タイソウ,ビャクシ,マオウ	胃腸炎,腰痛,神経痛,関節痛,月経痛,頭痛,冷え症,更年期障害,感冒(慢性に経過し,症状の激しくないもの) ⇒ ㊦ 1日9g,食前又は食間2~3回に分服,㊦ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊦)	㊦(重大) 偽アルドステロン症,ミオパチー 併注) マオウ含有製剤,エフェドリン類含有製剤,MAO阻害薬,甲状腺製剤,カテコラミン製剤,キサンチン系薬,カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
薬学管理のPoint 〔マオウ含有〕併用時注意	循環器系障害の患者等で注意(併用時注意) カンゾウ1g/日(組成(真)違) キジツは(㊦)のみ	
牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)		
牛車腎気丸 ツムラ(TJ-107)1g ¥118 〔含有生薬〕ジウ,ゴシツ,サンシュユ,サンヤク,シャゼンシ,タクシャ,ブクリョウ,ボタンビ,ケイヒ,修治ブシ末	下肢痛,腰痛,しびれ,老人のかすみ目,かゆみ,排尿困難,頻尿,むくみ(疲れやすくて,四肢が冷えやすく尿量減少又は多尿で,ときに口渴があるもの) ⇒ ㊦ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	㊦(重大) 間質性肺炎,肝機能障害,黄疸
薬学管理のPoint 〔処方〕併用時注意	老化に関連する諸症状・膵臓器の疾患に有効で,多くの診療科で応用される.糖尿病性末梢神経障害,腰痛・下肢痛やしびれ・夜間尿等下半身に関連した症状に有効	

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
		臨床情報 薬学管理のPoint 〔モミタ〕肝機能(脂連)間質性肺炎の報告(ジオウ含有)胃腸弱者注意(ブシ含有)小児には慎重投与(ト)タキサン系抗癌剤による末梢神経障害に使用されることがあり
呉茱萸湯(ゴシュユトウ)		
呉茱萸湯 コタロー、ジュンコウ 太虎堂、ツムラ(TJ-31) 1g×112 〔含有生薬〕ゴシュユ、タイソウ、ニンジン、ショウキョウ	習慣性片頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気、衝心(手足の冷えやすい中等度以下の体力のもの) ⇒ ① 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(⊖)、② 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)	
	臨床情報 薬学管理のPoint 組成(量)違い 添付文書参照	
五淋散(ゴリンサン)		
五淋散 東洋 ツムラ(TJ-56)1g×119 〔含有生薬〕ブクリョウ、オウゴン、カンゾウ、ジオウ、シャゼンシ、タクシャ、トウキ、モクツウ、カッセキ、サンシシ、シャクヤク	頻尿、排尿痛、残尿感 ⇒ ① 1回6g、空腹時3回に分服、② 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	① アルドステロン症、ミオパチー、低K血症 ② (重) 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系利尿薬、トリクロルメチアジド
	臨床情報 薬学管理のPoint ジオウ含有 胃腸弱者注意(併用時注意) カンゾウ3g/日	
五苓散(ゴレイサン)		
五苓散 クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ、東洋 JPS、太虎堂、ツムラ(TJ-17)1g×151、テイコク、本草、マツウラ クラシエ 〔含有生薬〕タクシャ、ブクリョウ、チョレイ、ソウジュツ、ケイヒ	浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病(口渴、尿量減少するもの) ⇒ ① 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)、② 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)、③ 1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	① (重) 間質性肺炎
	臨床情報 薬学管理のPoint 組成違い ①はソウジュツ、②③はピャクジュツ 錠あり(⊙)	
柴陥湯(サイカントウ)		
柴陥湯 コタロー	咳、咳による胸痛 ⇒ ① 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(⊖)、② 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)	① (重) 偽アルドステロン症、ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
太虎堂、ツムラ(TJ-73) 1g×346 〔含有生薬〕サイコ、ハンゲ、オウゴン、タイソウ、カロニン、ニンジン、オウレン、カンゾウ、ショウキョウ	臨床情報 処方Point 水滯(水毒)の病態による諸症状(頭痛、浮腫等)により 薬学管理のPoint (併用時注意) カンゾウ1.5g～2g/日	
柴胡加竜骨牡蛎湯(サイコカリユコツボレイトウ)		
柴胡加竜骨牡蛎湯 クラシエ、コタロー、ジュンコウ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-12)1g×224、テイコク、本草、マツウラ クラシエ 〔含有生薬〕サイコ、ハンゲ、ケイヒ、ブクリョウ、オウゴン、タイソウ、ニンジン、ボレイ、リュウコツ、ショウキョウ	高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜泣き症、陰萎(比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるもの) ⇒ ① 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)、② 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)、③ 1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	① (重) 間質性肺炎、肝機能障害、黄疸
	臨床情報 処方Point 不眠、イライラ感を伴う諸症状により、動悸、腹部大動脈拍動の亢進がポイント 薬学管理のPoint 〔モミタ〕肝機能(脂連)間質性肺炎の報告(組成違い)⊖ ②はダイオウ含有(錠あり)⊙	
柴胡桂枝湯(サイコケイシトウ)		
柴胡桂枝湯 クラシエ、コタロー、三和、ジュンコウ JPS、オースギ、太虎堂、ツムラ(TJ-10)1g×261、テイコク、(東亜薬品)、マツウラ クラシエ 〔含有生薬〕サイコ、ハンゲ、オウゴン、カンゾウ、ケイヒ、シャクヤク、タイソウ、ニンジン、ショウキョウ	感冒・流感・肺炎・肺結核等の熱性疾患、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆嚢炎・胆石・肝機能障害・膵臓炎等の心下部緊張疼痛(発汗出て、悪寒し、身体痛み、頭痛、吐き気のあるもの) ⇒ ① 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)、② 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(⊙)、③ 1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	① (重) 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	臨床情報 処方Point 慢性肺炎に保険適応あり、基礎的エビデンスもある。肝臓作用、胃粘膜防御作用もあり、肺炎治療効果と合わせてこの1剤で飲酒家のフォローが可能 薬学管理のPoint 〔モミタ〕肝機能(脂連)間質性肺炎の報告(併用時注意) カンゾウ1.5～2g/日(錠あり)⊙	
柴胡桂枝乾姜湯(サイコケイシカンキョウトウ)		
柴胡桂枝乾姜湯	更年期障害、血の道症、不眠症、神	① (重) 間質性肺炎、偽アルド

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>コタロー</b> <b>④</b> 太虎堂,ツムラ(TJ-11) 1g×204, テイコク, 本草 [含有生薬]サイコ, オウゴン, カロコン, ケイヒ, ボレイ, カンキョウ, カンゾウ	経症(体力が弱く, 冷え症, 貧血気味で, 動悸, 息切れがあり, 神経過敏のもの) ⇒ <b>④</b> 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服, <b>④</b> 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服 (㊟)	ステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> 安全性情報 間質性肺炎(98年3月:146) 薬学管理のPoint (モニタ) 肝機能 (指導) 間質性肺炎の報告 (併用時注意) カンゾウ2g/日		
柴胡清肝湯(サイコセイカントウ)		
<b>柴胡清肝湯</b> <b>④</b> コタロー <b>④</b> ツムラ(TJ-80)1g×227, テイコク [含有生薬]サイコ, トウキ, センキュウ, シャクヤク, ジオウ, オウレン, オウゴン, オウバク, サンシシ, キキョウ, レンギョウ, ハッカ, カロコン, ゴボウシ, カンゾウ	神経症, 慢性扁桃腺炎, 湿疹(かんの強い傾向のある小児) ⇒ <b>④</b> 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服, <b>④</b> 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服 (㊟)	<b>④</b> (重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> 薬学管理のPoint (ジオウ含有) 胃腸虚弱者注意 (併用時注意) カンゾウ1.5g/日		
柴朴湯(サイボクトウ)		
<b>柴朴湯</b> <b>④</b> クラシエ <b>④</b> ツムラ(TJ-96)1g×37 [含有生薬]サイコ, ハンゲ, ブクリョウ, コウボク, オウゴン, タイソウ, ニンジン, カンゾウ, ソヨウ, ショウキョウ	小児喘息, 気管支喘息, 気管支炎, 咳, 不安神経症(気分がふさいで, 咽喉, 食道部に異物感があり, とときに動悸, めまい, 嘔気等を伴うもの) ⇒ <b>④</b> 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服, <b>④</b> 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服 (㊟)	<b>④</b> (重大) 間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸等 (併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> 安全性情報 間質性肺炎(98年3月:146) 薬学管理のPoint (モニタ) 肝機能 (指導) 間質性肺炎の報告 (併用時注意) カンゾウ2g/日		
柴苓湯(サイレイトウ)		
<b>柴苓湯</b> <b>④</b> クラシエ	水瀉性下痢, 急性胃腸炎, 暑気あたり, むくみ(吐き気, 食欲不振, 喉の渇き, 排尿が少ないもの) ⇒ <b>④</b> 1日8.1g, 食前又は食間2~3回に分服, <b>④</b> 1日9g, 食前又は食間2~3回に分服	<b>④</b> (重大) 間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオパチー, 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>ツムラ(TJ-114)1g×493</b> [含有生薬]サイコ, タクシャ, ハンゲ, オウゴン, ソウジュツ, タイソウ, チョレイ, ニンジン, ブクリョウ, カンゾウ, ケイヒ, ショウキョウ	小柴胡湯と五苓散の合方, 腎・肝疾患に広く応用可能 「漢方のステロイド」のように免疫調整作用あり (併注) 間質性肺炎(98年3月:146) (モニタ) 肝機能 (指導) 間質性肺炎の報告 (併用時注意) カンゾウ2g/日 (併注) シスプラチンによる腎障害に使用されることあり	<b>臨床情報</b> 薬学管理のPoint (重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
三貫瀉心湯(サンオウシャシントウ)		
<b>三貫瀉心湯</b> <b>④</b> クラシエ, コタロー <b>④</b> JPS, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-113)1g×14, テイコク, 本草, マツウラ <b>④</b> コタロー [含有生薬]オウゴン, オウレン, ダイオウ	高血圧の随伴症状(のぼせ, 肩こり, 耳鳴, 頭重, 不眠, 不安), 鼻血, 痔出血, 便秘, 更年期障害, 血の道症(比較的体力があり, のぼせ気味で, 顔面紅潮し, 精神不安で, 便秘の傾向のあるもの) ⇒ <b>④</b> 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服, <b>④</b> 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服 (㊟), <b>④</b> 1日3カプセル, 食前又は食間2~3回に分服	<b>④</b> (重大) 間質性肺炎, 肝機能障害, 黄疸
<b>臨床情報</b> 薬学管理のPoint (ダイオウ含有) 妊婦等で注意 (カプセルあり)㊟		
酸臍仁湯(サンソウニントウ)		
<b>酸臍仁湯</b> <b>④</b> オースギ, ツムラ(TJ-103)1g×117, マツウラ [含有生薬]サンソウニン, ブクリョウ, センキュウ, チモ, カンゾウ	心身が疲れ, 弱って眠れないもの ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服 (㊟)	<b>④</b> (重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> 薬学管理のPoint (併用時注意) カンゾウ1g/日		
三物黄芩湯(サンモツオウゴントウ)		
<b>三物黄芩湯</b> <b>④</b> ツムラ(TJ-121)1g×79 [含有生薬]ジオウ, オウゴン, クジン	手足のほてり ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	<b>④</b> (重大) 間質性肺炎, 肝機能障害, 黄疸
<b>臨床情報</b> 薬学管理のPoint (モニタ) 肝機能 (指導) 間質性肺炎の報告 (ジオウ含有) 胃腸虚弱者注意		
滋陰降火湯(ジンコウカトウ)		
<b>滋陰降火湯</b> <b>④</b> ツムラ(TJ-93)1g×114 [含有生薬]ソウジュツ, ジオウ, シャクヤク, チンピ, トウキ, バクモンドウ, テンモンドウ, オウバク, カンゾウ, チモ	喉にうるおいがなく痰が出なくて咳き込むもの ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服 (㊟)	<b>④</b> (重大) 偽アルドステロン症, ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> 薬学管理のPoint (ジオウ含有) 胃腸虚弱者注意 (併用時注意) カンゾウ1.5g/日		

品名、規格単位	適応、用法、用量	警告、禁忌、副作用等
<b>滋陰至宝湯(ジンシホウトウ)</b>		
<b>滋陰至宝湯</b> ツムラ(TJ-92)1g ¥163 〔含有生薬〕コウブシ、サイコ、シャクヤク、チモ、チンピ、トウキ、バクモンドウ、ビャクジュツ、ブクリョウ、ジコッピ、カンゾウ、ハッカ、バイモ	慢性の咳・痰(虚弱なもの) ▶ 1日9g、食前又は食間2～3回に分服	制(重)大 偽アルドステロン症、ミオパチー 併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	薬学管理のPoint 併用時注意) カンゾウ1g/日	
<b>紫雲膏(シウンコウ)</b>		
<b>紫雲膏</b> ツムラ(TJ-501)1g ¥128(㊟)500g、マルイシ(㊟)500g 〔組成〕ゴマ油、シコン、トウキ、サラシミツロウ、豚脂	火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷 ▶ 1日数回塗布あるいはガーゼに延ばして貼付(㊟)	制 重度(重症)の熱傷・外傷、化膿性の創傷で高熱のある患者、患部のひどい湿潤やただれ
	薬学管理のPoint 特異なお、衣類に付着すると赤紫色に着色し、脱色しにくいので注意	
<b>四逆散(シギャクサン)</b>		
<b>四逆散</b> ツムラ(TJ-35)1g ¥182 〔含有生薬〕サイコ、シャクヤク、キジツ、カンゾウ	胆嚢炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー(比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表すもの) ▶ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	制(重)大 偽アルドステロン症、ミオパチー 併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	薬学管理のPoint 併用時注意) カンゾウ1.5g/日	
<b>四君子湯(シクンシトウ)</b>		
<b>四君子湯</b> 東洋 ツムラ(TJ-75)1g ¥198 オースギ 〔含有生薬〕ソウジュツ、ニンジン、ブクリョウ、カンゾウ、ショウキョウ、タイソウ	胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢(やせて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいもの) ▶ 1回6g、空腹時3回に分服、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服、1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	制(重)大 偽アルドステロン症、ミオパチー 併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	薬学管理のPoint 併用時注意) カンゾウ1～1.5g/日(錠あり)㊟	
<b>梔子柏皮湯(シシハクヒトウ)</b>		
<b>梔子柏皮湯</b>	黄疸、皮膚痒痒症、宿酔(肝臓部に圧迫感があるもの)	制(重)大 偽アルドステロン症、ミオパチー

品名、規格単位	適応、用法、用量	警告、禁忌、副作用等
制(重)大 偽アルドステロン症、ミオパチー 〔含有生薬〕サンシシ、オウバク、カンゾウ	▶ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服	併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
薬学管理のPoint 併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>七物降下湯(シチモツコウカトウ)</b>		
<b>七物降下湯</b> 東洋 オースギ、ツムラ(TJ-46)1g¥94、マツウラ 〔含有生薬〕オウギ、ジオウ、センキョウ、チョウトウコウ、シャクヤク、トウキ、オウバク	高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴、頭重)(身体虚弱の傾向のあるもの) ▶ 1日7.5g、空腹時3回に分服、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	併注) ジオウ含有 胃腸虚弱者注意
	薬学管理のPoint	
<b>四物湯(シモツトウ)</b>		
<b>四物湯</b> クラシエ、コタロー、ジュンコウ 太虎堂、ツムラ(TJ-71)1g¥88、テイコク、本草 クラシエ 〔含有生薬〕ジオウ、センキョウ、シャクヤク、トウキ	産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症(皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの) ▶ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日18錠、食前又は食間2～3回に分服	併注) ジオウ含有 胃腸虚弱者注意(錠あり)㊟
	薬学管理のPoint	
<b>炙甘草湯(シヤカンゾウトウ)</b>		
<b>炙甘草湯</b> コタロー ツムラ(TJ-64)1g¥19 〔含有生薬〕ジオウ、バクモンドウ、ケイヒ、タイソウ、ニンジン、マシニン、シャカンゾウ、アキョウ、ショウキョウ	動悸、息切れ(体力が衰えて、疲れやすいもの) ▶ 1日15g、食前又は食間2～3回に分服、1日9g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)	制) アルドステロン症、ミオパチー、低K血症 制(重)大 偽アルドステロン症、ミオパチー 併注) カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤、ループ系利尿薬、トリクロルメチアジド
	薬学管理のPoint 併用時注意) カンゾウ3g/日	
<b>芍薬甘草湯(シヤクヤクカンゾウトウ)</b>		
<b>芍薬甘草湯</b> クラシエ、コタロー、ジュンコウ、東洋	急激に起こる筋肉の痙攣を伴う疼痛 ▶ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	制) アルドステロン症、ミオパチー、低K血症 制(重)大 間質性肺炎、偽アルドステロン症、うっ血性心不全、心室細動、心室期拍(TdP)を含む

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
④ ツムラ(TJ-68)1g×74, テイコク, 本草, マツウラ 〔含有生薬〕カンゾウ, シャクヤク	分服(㊟) 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド	む), ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸
<b>臨床情報</b> 〔処方Point〕 こむら返りの第一選択, あらゆる筋収縮による症状に有効. カンゾウの含有量が多いので1日常用量の長期連用を避ける 〔安全点〕 ①ラッ血性心不全, 心室細動, 心室頻拍(02年5月:177) 〔薬学管理Point〕 〔モニタ〕肝機能〔併用時注意〕カンゾウ5~6g/日〔組成違い〕シャクヤク(㊟):6g, ②:5g, ③:6g, カンゾウ(㊟):6g, ③:5g, ④:6g. シャッキリに有効		
<b>芍薬甘草附子湯(シャクヤクカンゾウブシトウ)</b> ㊟		
芍薬甘草附子湯 ④三和 〔含有生薬〕シャクヤク, カンゾウ, 加工アジド	慢性神経痛, 慢性関節炎, 関節リウマチ, 筋肉リウマチ, 五十肩, 肩こり(冷症で関節や筋肉が痛み, 麻痺感があって四肢の屈伸が困難なもの) ➡1日4.5g, 食前又は食間3回に分服	④アルドステロン症, ミオパチー, 低K血症 ④〔重天〕偽アルドステロン症, ミオパチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド
<b>薬学管理Point</b> 〔アジド含有〕小児には慎重投与〔併用時注意〕カンゾウ5g/日		
<b>十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ)</b>		
十全大補湯 ④クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ④オースギ, ツムラ(TJ-48)1g×202, テイコク, 本草 〔含有生薬〕オウギ, ケイヒ, ジョウ, シャクヤク, センキョウ, ソウジュツ, トウキ, ニンジュ, ブクリョウ, カンゾウ	病後の体力低下, 疲労倦怠, 食欲不振, 多汗, 手足の冷え, 貧血 ➡④1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ⑤1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟) 〔処方Point〕 3大補剤の1つ, 四物湯と四君子湯をあわせた八珍湯が基本, 主に「気血両虚」の病態に, 皮膚枯燥, 貧血症状等が処方の決め手. 癌にも腫瘍免疫能賦活化・抗癌剤の副作用軽減を目的に用いられるが, 検証が必要 〔薬学管理Point〕 〔モニタ〕肝機能〔シオウ含有〕胃腸虚弱者注意〔併用時注意〕カンゾウ1~1.5g/日〔組成違い〕②はソウジュツ, ③④はヒャクジュツ	④〔重天〕偽アルドステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>薬学管理Point</b> 〔併用時注意〕カンゾウ2g/日		
<b>十全大補湯</b>		
十全大補湯 ④クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ④オースギ, ツムラ(TJ-99)1g×75 〔含有生薬〕シャクヤク, ケイヒ, タイソウ, カンゾウ, ショウキョウ	小児虚弱体質, 疲労倦怠, 神経質, 慢性胃腸炎, 小児夜尿症, 夜泣き(体質虚弱で疲労しやすく, 血色が優れず, 腹痛, 動悸, 手足のほてり, 冷え, 頻尿及び多尿等のいずれかを伴うもの) ➡④1日27g, 食前又は食間2~3回に分服, ⑤1日15g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟)	④〔重天〕偽アルドステロン症, ミオパチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>小建中湯(ショウケンチュウトウ)</b>		
小建中湯 ④コタロー ④オースギ, ツムラ(TJ-99)1g×75 〔含有生薬〕シャクヤク, ケイヒ, タイソウ, カンゾウ, ショウキョウ	小児虚弱体質, 疲労倦怠, 神経質, 慢性胃腸炎, 小児夜尿症, 夜泣き(体質虚弱で疲労しやすく, 血色が優れず, 腹痛, 動悸, 手足のほてり, 冷え, 頻尿及び多尿等のいずれかを伴うもの) ➡④1日27g, 食前又は食間2~3回に分服, ⑤1日15g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟)	④〔重天〕偽アルドステロン症, ミオパチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>小柴胡湯(ショウサイコトウ)</b>		
小柴胡湯 ④クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ④JPS, オースギ, サカモト, 太虎堂, ツムラ(TJ-9)1g×314, テイコク, (東亜薬品), 本草, マツウラ	諸種の急性熱性病, 肺炎, 気管支炎, 感冒, 胸膜炎・肺結核等の結核性諸疾患の補助療法, リンパ節炎, 慢性胃腸障害, 産後回復不全(体力中等度で上腹部がはって苦しく, 舌苔を生じ, 口中不快, 食欲不振, ときにより微熱, 悪心等のあ	④投与により, 間質性肺炎が起り, 死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので, 発熱, 咳嗽, 呼吸困難, 肺音の異常(捻発音), 胸部X線異常等が現れた場合には, 直ちに本剤を中止. 発熱, 咳嗽, 呼吸困難

品名・規格単位	適応・用法・用量	警告・禁忌・副作用等
④ JPS, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-6)1g×155, テイコク, (東亜薬品), 本草, マツウラ ④クラシエ 〔含有生薬〕キキョウ, サイコ, センキョウ, ブクリョウ, ボクソク, ドクカツ, ポウフウ, カンゾウ, ケイガイ, ショウキョウ	分服(㊟), ④1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	
<b>臨床情報</b> 〔処方Point〕 こむら返りの第一選択, あらゆる筋収縮による症状に有効. カンゾウの含有量が多いので1日常用量の長期連用を避ける 〔安全点〕 ①ラッ血性心不全, 心室細動, 心室頻拍(02年5月:177) 〔薬学管理Point〕 〔モニタ〕肝機能〔併用時注意〕カンゾウ5~6g/日〔組成違い〕シャクヤク(㊟):6g, ②:5g, ③:6g, カンゾウ(㊟):6g, ③:5g, ④:6g. シャッキリに有効		
<b>潤腸湯(ジュンチョウトウ)</b>		
潤腸湯 ④太虎堂, ツムラ(TJ-51)1g×93 〔含有生薬〕ジョウ, トウキ, オウゴン, キジツ, キョウニン, コウボク, ダイオウ, トウニン, マシニン, カンゾウ	便秘 ➡1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟) 〔処方Point〕 高齢者の栄養状の便によい 〔安全点〕 ①間質性肺炎(07年10月:234) 〔薬学管理Point〕 〔モニタ〕肝機能〔併用時注意〕カンゾウ1.5g/日	④〔重天〕間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>小建中湯(ショウケンチュウトウ)</b>		
小建中湯 ④コタロー ④オースギ, ツムラ(TJ-99)1g×75 〔含有生薬〕シャクヤク, ケイヒ, タイソウ, カンゾウ, ショウキョウ	小児虚弱体質, 疲労倦怠, 神経質, 慢性胃腸炎, 小児夜尿症, 夜泣き(体質虚弱で疲労しやすく, 血色が優れず, 腹痛, 動悸, 手足のほてり, 冷え, 頻尿及び多尿等のいずれかを伴うもの) ➡④1日27g, 食前又は食間2~3回に分服, ⑤1日15g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟)	④〔重天〕偽アルドステロン症, ミオパチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
<b>小柴胡湯(ショウサイコトウ)</b>		
小柴胡湯 ④クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ④JPS, オースギ, サカモト, 太虎堂, ツムラ(TJ-9)1g×314, テイコク, (東亜薬品), 本草, マツウラ	諸種の急性熱性病, 肺炎, 気管支炎, 感冒, 胸膜炎・肺結核等の結核性諸疾患の補助療法, リンパ節炎, 慢性胃腸障害, 産後回復不全(体力中等度で上腹部がはって苦しく, 舌苔を生じ, 口中不快, 食欲不振, ときにより微熱, 悪心等のあ	④投与により, 間質性肺炎が起り, 死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので, 発熱, 咳嗽, 呼吸困難, 肺音の異常(捻発音), 胸部X線異常等が現れた場合には, 直ちに本剤を中止. 発熱, 咳嗽, 呼吸困難



品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
<b>参蘇飲(ジンソイン)</b>		
<b>参蘇飲</b> ④ 太虎堂、ツムラ(TJ-66) 1g×134 〔含有生薬〕ハング、ブクリョウ、カクコン、キキョウ、チンピ、ゼンコ、タイソウ、ニンジン、カンゾウ、キジツ、ソウオウ、ショウキョウ	感冒、咳 ▶ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)	④(重) 偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
	臨床情報 薬学管理のPoint 〔併用時注意〕カンゾウ1g/日	
<b>神秘湯(シンピトウ)</b>		
<b>神秘湯</b> ④ クラシエ、コタロー、東洋 ④ オースギ、ツムラ(TJ-85)1g×16、本草〔含有生薬〕マオウ、キョウニン、カンゾウ、サイコ、ソウオウ、チンピ、コウボク	小児喘息、気管支喘息、気管支炎 ▶ ④ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、④ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)	④(重) 偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併注〕マオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、MAO阻害薬、甲状腺製剤、カテコラミン製剤、キサンチン系薬、カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報 薬学管理のPoint 〔マオウ含有〕循環器系障害の患者等々注意〔併用時注意〕カンゾウ2g/日		
<b>真武湯(シンブトウ)</b> ④(㊟の分包品及び㊟除く)		
<b>真武湯</b> ④ 三和、コタロー ④ JPS、ツムラ(TJ-30)1g×94 〔含有生薬〕ブクリョウ、ソウジュツ、シャクヤク、ショウキョウ、修治ブシ末	胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー症、胃下垂症、ネフローゼ、腹膜炎、脳溢血、脊髄疾患による運動並びに知覚麻痺、神経衰弱、高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不随、リウマチ、老人性癩痒症(新陳代謝の沈衰しているもの) ▶ ④ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、④ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	
臨床情報 薬学管理のPoint 〔ブシ含有〕小児には慎重投与〔組成違い〕㊟はソウジュツ、㊟㊟はビャクジュツ		
<b>清上防風湯(セイジョウボウフウトウ)</b>		
<b>清上防風湯</b> ④ オースギ、ツムラ(TJ-58)1g×136 〔含有生薬〕オウゴン、キキョウ、サンシシ、センキョウ、ハマボウフウ、ビャクシ、レンギョウ、オウレン、カンゾウ、キジツ、ケイガイ、ハッカ	にきび ▶ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	④(重) 偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報 薬学管理のPoint 〔モニタ〕肝機能〔併用時注意〕カンゾウ1g/日		

品名、規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
<b>清暑益気湯(セイショエッキトウ)</b>		
<b>清暑益気湯</b> ④ ツムラ(TJ-136)1g×232 〔含有生薬〕ソウジュツ、ニンジン、バクモンドウ、オウギ、チンピ、トウキ、オウバク、カンゾウ、ゴモシ	暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身倦怠、夏やせ ▶ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	④(重) 偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報 薬学管理のPoint 〔併用時注意〕カンゾウ1g/日		
<b>清心蓮子飲(セイシンレンシイン)</b>		
<b>清心蓮子飲</b> ④ ジュンコウ、東洋 ④ ツムラ(TJ-111)1g×207 〔含有生薬〕バクモンドウ、ブクリョウ、レンニク、オウゴン、シャゼンシ、ニンジン、オウギ、ジコッピ、カンゾウ	残尿感、頻尿、排尿痛(全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるもの) ▶ ④ 1日6g、食前又は食間2～3回に分服(㊟)、④ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	④(重) 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報 安全性情報 間質性肺炎(01年8月:169) 薬学管理のPoint 〔モニタ〕肝機能〔指測〕間質性肺炎の報告〔併用時注意〕カンゾウ1.5～2g/日		
<b>清肺湯(セイハイトウ)</b>		
<b>清肺湯</b> ④ ツムラ(TJ-90)1g×111 〔含有生薬〕トウキ、バクモンドウ、ブクリョウ、オウゴン、キキョウ、キョウニン、サンシシ、ソウハクヒ、タイソウ、チンピ、チクジョ、テンモンドウ、バイモ、カンゾウ、ゴモシ、ショウキョウ	痰の多く出る咳 ▶ 1日9g、食前又は食間2～3回に分服	④(重) 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸 〔併注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報 安全性情報 間質性肺炎(98年3月:146)、肝機能障害、黄疸(07年3月:234) 薬学管理のPoint 〔モニタ〕肝機能〔指測〕間質性肺炎の報告〔併用時注意〕カンゾウ1g/日		
<b>川芎茶調散(センキョウチャチョウサン)</b>		
<b>川芎茶調散</b> ④ オースギ、ツムラ(TJ-124)1g×87 〔含有生薬〕コウブシ、センキョウ、ケイガイ、ハッカ、ビャクシ、ボウフウ、キョウカツ、カンゾウ、チャョウ	風邪、血の道症、頭痛 ▶ 1日7.5g、食前又は食間2～3回に分服	④(重) 偽アルドステロン症、ミオパチー 〔併注〕カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸含有製剤
臨床情報 薬学管理のPoint 〔併用時注意〕カンゾウ1.5g/日		
<b>疎経活血湯(ソケイカクケツトウ)</b>		
<b>疎経活血湯</b>	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛 ▶ 1日7.5g、食前又は食間2～	④(重) 偽アルドステロン症、ミオパチー

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>㊦</b> オースギ,太虎堂,ツムラ(TJ-53)1g×104 [含有生薬]シャクヤク,ジオウ,センキュウ,ソウジュツ,トウキ,トウニン,ブクリョウ,ゴシツ,チンピ,ボウイ,ボウフウ,リュウタン,イレイセン,キョウカツ,カンゾウ,ビャクシ,ショウキョウ	3回に分服(㊶)	<b>㊦</b> (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
	薬学管理のPoint ジオウ含有 胃腸虚弱者注意(併用時注意) カンゾウ1g/日	
大黃甘草湯(ダイオウカンゾウトウ)		
<b>大黃甘草湯</b> <b>㊦</b> オースギ,ツムラ(TJ-84)1g×53 <b>㊦</b> オースギ [含有生薬]ダイオウ,カンゾウ	便秘症 ⇒ <b>㊦</b> 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊶), <b>㊦</b> 1日6錠,食前又は食間2~3回に分服	<b>㊦</b> (重天) 偽アルドステロン症,ミオパチー <b>㊦</b> (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
	薬学管理のPoint ダイオウ含有 妊婦等で注意(併用時注意) カンゾウ1~2g/日(錠あり)㊶	
大黃牡丹皮湯(ダイオウボタンピトウ)		
<b>大黃牡丹皮湯</b> <b>㊦</b> コタロー <b>㊦</b> ツムラ(TJ-33)1g×84,テイコク [含有生薬]トウニン,ボタンピ,ダイオウ,トウガシ,無水ボウショウ	月経不順,月経困難,便秘,痔疾(比較的体力があり,下腹部痛があって,便秘しがちなもの) ⇒ <b>㊦</b> 1日6g,食前又は食間2~3回に分服, <b>㊦</b> 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊶)	
	薬学管理のPoint ダイオウ含有 妊婦等で注意	
大建中湯(ダイケンチュウトウ)		
<b>大建中湯</b> <b>㊦</b> コタロー <b>㊦</b> ツムラ(TJ-100)1g×97 [含有生薬]サンショウ,ニンジン,カンキョウ	腹が冷えて痛み,腹部膨満感のあるもの ⇒ <b>㊦</b> 1日27g,食前又は食間2~3回に分服, <b>㊦</b> 1日15g,食前又は食間2~3回に分服	<b>㊦</b> (重天) 間質性肺炎,肝機能障害,黄疸
	処方Point イレウス予防の特効薬で開腹手術後の服用が勧められる。消化管運動亢進作用あり,特に虚証の例による。	薬学管理のPoint 間質性肺炎(12年2月:288) 三才肝機能(振速) 間質性肺炎の報告
大柴胡湯(ダイサイコトウ)		
<b>大柴胡湯</b> <b>㊦</b> クラシエ,コタロー,三和,ジュンコウ,東洋	胆石症,胆嚢炎,黄疸,肝機能障害,高血圧症,脳溢血,蕁麻疹,胃酸過多症,急性胃腸カタル,悪心,嘔吐。	<b>㊦</b> (重天) 間質性肺炎,肝機能障害,黄疸

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>㊦</b> JPS,オースギ,サカモト,太虎堂,ツムラ(TJ-8)1g×24,テイコク,(東薬製品),本草,マツウラ <b>㊦</b> オースギ,クラシエ [含有生薬]サイコ,ハンゲ,オウゴン,シャクヤク,タイソウ,キジツ,ショウキョウ,ダイオウ	食欲不振,痔疾,糖尿病,ノイローゼ,不眠症(比較的体力のある人で,便秘がちで,上腹部が張って苦しく,耳鳴,肩こり等を伴うもの) ⇒ <b>㊦</b> 1日6g,食前又は食間2~3回に分服(㊶), <b>㊦</b> 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊶), <b>㊦</b> 1日18錠,食前又は食間2~3回に分服	
	処方Point 実証の脂肪肝,胆石の患者で不眠等を伴う例による。	臨床情報 間質性肺炎(98年3月:146) 三才肝機能(振速) 間質性肺炎の報告(ダイオウ含有) 妊婦等で注意(錠あり)㊶
大柴胡湯去大黃(ダイサイコトウキョウダイオウ)		
<b>大柴胡湯去大黃</b> <b>㊦</b> コタロー,三和 [含有生薬]サイコ,ハンゲ,ショウキョウ,キジツ,オウゴン,シャクヤク,タイソウ	高血圧,動脈硬化,胃腸病,気管支喘息,黄疸,胆石症,胆嚢炎,不眠症,神経衰弱,陰萎,胸膜炎,痔疾,半身不随(みぞおちが硬く張って,胸や脇腹あるいは肝臓部等に痛みや圧迫感があるもの。耳鳴,肩こり,疲労感,食欲減退等を伴うこともあり,便秘しないもの) ⇒ 1日9g,食前又は食間2~3回に分服(㊶)	
大承気湯(ダイジョウキトウ)		
<b>大承気湯</b> <b>㊦</b> コタロー <b>㊦</b> ツムラ(TJ-133)1g×64 [含有生薬]コウボク,キジツ,ダイオウ,無水ボウショウ	常習便秘,急性便秘,高血圧,神経症,食あたり(腹部が硬くつかえて,便秘するもの,あるいは肥満体質で便秘するもの) ⇒ <b>㊦</b> 1日6g,食前又は食間2~3回に分服, <b>㊦</b> 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	
	薬学管理のPoint ダイオウ含有 妊婦等で注意	
大防風湯(ダイボウフウトウ) ㊦(細のみ)		
<b>大防風湯</b> <b>㊦</b> 三和 <b>㊦</b> ツムラ(TJ-97)1g×135 [含有生薬]オウギ,ジオウ,シャクヤク,ソウジュツ,トウキ,ボウフウ,トチュウ,センキュウ,カンゾウ,ゴシツ,タイソウ,ニンジン,キョウカツ,カンキョウ,修治ブシ末	下肢の関節リウマチ,慢性関節炎,痛風(関節がはれて痛み,麻痺,強直して屈伸しがたいもの) ⇒ <b>㊦</b> 1日9g,食前又は食間3回に分服, <b>㊦</b> 1日10.5g,食前又は食間2~3回に分服	<b>㊦</b> (重天) 偽アルドステロン症,ミオパチー <b>㊦</b> (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
	薬学管理のPoint ジオウ含有 胃腸虚弱者注意(ブシ含有) 小児には慎重投与(併用時注意) カンゾウ1.5g/日	
竹節温胆湯(チクジョウタンントウ)		
<b>竹節温胆湯</b>	インフルエンザ,風邪,肺炎等の	<b>㊦</b> (重天) 偽アルドステロン症,

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>ツムラ(TJ-91)1g</b> ¥307 [含有生薬]ハンゲ,サイコ,バクモンドウ,ブクリョウ,チクジョ,キキョウ,キジツ,コウブシ,チンピ,オウレン,カンゾウ,ショウキョウ,ニンジン	回復期に熱が長びいたり,又,平熱になっても気分がさっぱりせず,咳や痰が多くて安眠ができないもの ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
<b>治打撲一方(チダボクイッポウ)</b> 打撲によるはれ及び痛み ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服		
<b>ツムラ(TJ-89)1g</b> ¥88 [含有生薬]ケイヒ,センキョウ,センコツ,ボクソク,カンゾウ,ダイオウ,チョウジ	打撲によるはれ及び痛み ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
(薬学管理のPoint) (併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>治頭痛一方(チソソウイッポウ)</b> 湿疹,くさ,乳幼児の湿疹 ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服		
<b>ツムラ(TJ-59)1g</b> ¥82 [含有生薬]センキョウ,ソウジュツ,レンギョウ,ボウフウ,ニンドウ,カンゾウ,ケイガイ,コウカ,ダイオウ	湿疹,くさ,乳幼児の湿疹 ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
(薬学管理のPoint) (ダイオウ含有) 妊婦等注意 (併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>調胃承気湯(チョウエイジョウキトウ)</b> 便秘 ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服		
<b>ツムラ(TJ-74)1g</b> ¥62 [含有生薬]ダイオウ,カンゾウ,無水ボウショウ	便秘 ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
(薬学管理のPoint) (ダイオウ含有) 妊婦等注意 (併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>約藤散(チョウトウサン)</b> 慢性に続く頭痛で中年以降,又は高血圧の傾向のあるもの ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服		
<b>ツムラ(TJ-47)1g</b> ¥155,マツウラ [含有生薬]セッコウ,チンピ,バクモンドウ,ハンゲ,ブクリョウ,チョウトウコウ,ニンジン,ボウフウ,キクカ,カンゾウ,ショウキョウ	慢性に続く頭痛で中年以降,又は高血圧の傾向のあるもの ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
(薬学管理のPoint) (併用時注意) カンゾウ1g/日		
(処方Point) 脳血管性認知症に対する有効性が示されている		

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>腸癰湯(チョウヨウトウ)</b> 盲腸部に急性又は慢性の痛みがあるもの,あるいは月経痛のあるもの ⇒ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服		
<b>ツムラ(TJ-40)1g</b> ¥151, テイコク,(東亜薬品),本草,マツウラ [含有生薬]チョレイ,ブクリョウ,タクシャ,アキョウ,カッセキ	尿道炎,腎臓炎,腎石症,淋炎,排尿痛,血尿,腰以下の浮腫,残尿感,下痢(尿量減少,小便難,口渴を訴えるもの) ⇒ 1日6g,食前又は食間2~3回に分服(㊟), 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊷)	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
(薬学管理のPoint) (併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>猪苓湯(チョレイトウ)</b> 尿路結石症の外来フォローに有用 (薬学管理のPoint) (組成違い) アキョウは(㊷)(㊟)のみ		
<b>猪苓湯合四物湯(チョレイトウゴウシモツトウ)</b> 排尿困難,排尿痛,残尿感,頻尿(皮膚が乾燥し,色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの) ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服		
<b>ツムラ(TJ-112)1g</b> ¥248 [含有生薬]ジオウ,シャクヤク,センキョウ,タクシャ,チョレイ,トウキ,ブクリョウ,アキョウ,カッセキ	排尿困難,排尿痛,残尿感,頻尿(皮膚が乾燥し,色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの) ⇒ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
(薬学管理のPoint) (ジオウ含有) 胃腸虚弱者注意		
<b>通導散(ツウドウサン)</b> 月経不順,月経痛,更年期障害,腰痛,便秘,打ち身(打撲),高血圧の随伴症状(頭痛,めまい,肩こり)(比較的体力があり下腹部に圧痛があって便秘しがちなもの) ⇒ 1日12g,食前又は食間2~3回に分服, 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊷)		
<b>ツムラ(TJ-105)1g</b> ¥95 [含有生薬]キジツ,ダイオウ,トウキ,カンゾウ,コウカ,コウボク,チンピ,モクツウ,ソボク,無水ボウショウ	月経不順,月経痛,更年期障害,腰痛,便秘,打ち身(打撲),高血圧の随伴症状(頭痛,めまい,肩こり)(比較的体力があり下腹部に圧痛があって便秘しがちなもの) ⇒ 1日12g,食前又は食間2~3回に分服, 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊷)	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
(薬学管理のPoint) (ダイオウ含有) 妊婦等注意 (併用時注意) カンゾウ2g/日		
<b>桃核承気湯(トウカクジョウキトウ)</b> 月経不順,月経困難症,月経時や産後の精神不安,腰痛,便秘,高血		
<b>ツムラ(TJ-74)1g</b> ¥62 [含有生薬]ダイオウ,カンゾウ,無水ボウショウ	月経不順,月経困難症,月経時や産後の精神不安,腰痛,便秘,高血	(副)(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー

品名 規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
㊟ クラシエ, コタロー, ジュンコウ ㊟ JPS, オースギ, ツムラ (TJ-61) 1g×9, テイコク, 本草 ㊟ クラシエ [含有生薬] トウニン, ケイヒ, ダイオウ, カンゾウ, 無水ボウショウ	圧の随伴症状(頭痛, めまい, 肩こり)(比較的体力があり, のぼせて便秘しがちなもの) ⇒ ㊟ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服, ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰湯(トウキトウ)	背中に寒冷を覚え, 腹部膨満感や腹痛のあるもの ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰湯 ㊟ ツムラ(TJ-102) 1g ¥33.5 [含有生薬] トウキ, ハンゲ, ケイヒ, コウボク, シャクヤク, ニンジン, オウギ, サンショウ, カンキョウ, カンゾウ	背中に寒冷を覚え, 腹部膨満感や腹痛のあるもの ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰飲子(トウキインシ)	分泌物の少ない慢性湿疹, かゆみ(冷え症のもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰飲子 ㊟ ツムラ(TJ-86) 1g ¥13.4 [含有生薬] トウキ, ジオウ, シャクヤク, センキョウ, ボウフウ, シツリシ, カシュウ, オウギ, ケイガイ, カンゾウ	分泌物の少ない慢性湿疹, かゆみ(冷え症のもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰建中湯(トウキケンチュウトウ)	月経痛, 下腹部痛, 痔, 脱肛の痛み(疲労しやすく血色のすぐれないもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰建中湯 ㊟ ツムラ(TJ-123) 1g ¥9.5 [含有生薬] シャクヤク, ケイヒ, タイソウ, トウキ, カンゾウ, ショウキョウ	月経痛, 下腹部痛, 痔, 脱肛の痛み(疲労しやすく血色のすぐれないもの) ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰四逆加呉茱萸生姜湯(トウキシギヤクカゴシュウショウキョウトウ)	しもやけ, 頭痛, 下腹部痛, 腰痛(手足の冷えを感じ, 下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなりやすいもの) ⇒ ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 ㊟ クラシエ, コタロー	しもやけ, 頭痛, 下腹部痛, 腰痛(手足の冷えを感じ, 下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなりやすいもの) ⇒ ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤, ループ系利尿薬, トリクロルメチアジド

品名 規格単位	適応、用法・用量	警告、禁忌、副作用等
㊟ オースギ, ツムラ (TJ-38) 1g×11.3 [含有生薬] タイソウ, ケイヒ, シャクヤク, トウキ, モクツウ, カンゾウ, ゴシュユ, サイシン, ショウキョウ	7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟) 併用時注意 カンゾウ2g/日	㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)	貧血, 倦怠感, 更年期障害(頭痛, 頭痛, めまい, 肩こり等), 月経不順, 月経困難, 不妊症, 動悸, 慢性腎炎, 妊娠中の諸病(浮腫, 習慣性流産, 痔, 腹痛), 脚気, 半身不随, 心臓弁膜症(筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく, 腰脚の冷えやすいもの) ⇒ ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間3回に分服, ㊟ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰芍薬散 ㊟ 太虎堂 ㊟ クラシエ, コタロー, 三和, ジュンコウ, 東洋 ㊟ JPS, オースギ, 太虎堂, ツムラ(TJ-23) 1g×9.7, テイコク, (東薬薬品), 本草, マツウラ ㊟ オースギ [含有生薬] トウキ, センキョウ, シャクヤク, ソウジュツ, ブクリョウ, タクシャ	貧血, 倦怠感, 更年期障害(頭痛, 頭痛, めまい, 肩こり等), 月経不順, 月経困難, 不妊症, 動悸, 慢性腎炎, 妊娠中の諸病(浮腫, 習慣性流産, 痔, 腹痛), 脚気, 半身不随, 心臓弁膜症(筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく, 腰脚の冷えやすいもの) ⇒ ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間3回に分服, ㊟ 1日6g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日18錠, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰芍薬散加附子(トウキシャクヤクサンカブシ)	婦人の冷え症, 月経痛, 神経痛, 慢性腎炎, 更年期障害, 妊娠中の障害(浮腫, 習慣性流産の予防, 痔疾, 腹痛), 産後の肥立不良(血色悪く貧血症で足腰が冷えやすく, 頭痛, 頭重で小便頻数を訴え, ときにめまい, 肩こり, 耳鳴, 動悸あるもの) ⇒ 1日9g, 食前又は食間3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
当帰芍薬散加附子 ㊟ 三和 [含有生薬] トウキ, センキョウ, シャクヤク, ブクリョウ, ピャクジュツ, タクシャ, 加工ブシ	婦人の冷え症, 月経痛, 神経痛, 慢性腎炎, 更年期障害, 妊娠中の障害(浮腫, 習慣性流産の予防, 痔疾, 腹痛), 産後の肥立不良(血色悪く貧血症で足腰が冷えやすく, 頭痛, 頭重で小便頻数を訴え, ときにめまい, 肩こり, 耳鳴, 動悸あるもの) ⇒ 1日9g, 食前又は食間3回に分服	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
二朮湯(ニジュツトウ)	五十肩 ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸 ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
二朮湯 ㊟ ツムラ(TJ-88) 1g ¥12.7 [含有生薬] ハンゲ, ソウジュツ, オウゴン, コウブシ, チンピ, ピャクジュツ, ブクリョウ, イレイセン, テンナンショウ, ワキョウカツ, カンゾウ, ショウキョウ	五十肩 ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~3回に分服	㊟ (重) 間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 黄疸 ㊟ ㊟ カンゾウ含有製剤, グリチルリチン酸含有製剤
二陳湯(ニチントウ)	悪心, 嘔吐	㊟ (重) 偽アルドステロン症, ミオパチー

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>東洋</b> <b>ツムラ(TJ-81)1g</b> ¥107 [含有生薬]ハング,ブクリョウ,チンピ,カンゾウ,シヨウキョウ	▶ <b>①</b> 1回6g,空腹時3回に分服, <b>②</b> 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
<b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>女神散(ニョシンサン)</b>		
<b>女神散</b> <b>ツムラ(TJ-67)1g</b> ¥237 [含有生薬]コウブシ,センキュウ,ソウジュツ,トウキ,オウゴン,ケイヒ,ニンジン,ピンロウジ,オウレン,カンゾウ,チョウジ,モッコウ	産前産後の神経症,月経不順,血の道症(のぼせとめまいのあるもの) ▶ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー,肝機能障害,黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> (併用時注意) 肝機能障害,黄疸(07年2月:233) (モニタ) 肝機能(併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>人参湯(ニンジントウ)</b>		
<b>人参湯</b> クラシエ,コタロー,東洋,本草 オースギ,太虎堂,ツムラ(TJ-32)1g ¥15, テイコク,マツウラ [含有生薬]カンゾウ,ソウジュツ,ニンジン,カンキョウ	急性・慢性胃腸カタル,胃アトニー症,胃拡張,悪阻,萎縮腎(体質虚弱,あるいは虚弱により体力低下した人) ▶ ① 1日6g,食前又は食間2~3回に分服(㊟), ② 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊞)	(重) アルドステロン症,ミオパチー,低K血症 (重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤,ループ系利尿薬,トリクロルメチアジド
<b>臨床情報</b> (併用時注意) カンゾウ3g/日 (組成適い) ㊞はソウジュツ, ㊟㊞はビヤクジュツ		
<b>人参養栄湯(ニンジンヨウエイトウ)</b>		
<b>人参養栄湯</b> クラシエ,コタロー オースギ,ツムラ(TJ-108)1g ¥217 [含有生薬]ニンジン,ビヤクジュツ,トウキ,ブクリョウ,ジオウ,ケイヒ,チンピ,シャクヤク,オンジ,ゴミン,カンゾウ,オウギ	病後の体力低下,疲労倦怠,食欲不振,寝汗,手足の冷え,貧血 ▶ ① 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊟), ② 1日9g,食前又は食間2~3回に分服(㊞)	(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー,肝機能障害,黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> (併用時注意) 3大補剤の1つ,術後あるいは慢性疾患で疲労感が目立つ例により,呼吸器症状,貧血症状がポイント (併用時注意) 肝機能(ジオウ含有) 胃腸虚弱者注意 (併用時注意) カンゾウ1g/日		
<b>排膿散及湯(ハイノウサンキョウトウ)</b>		
<b>排膿散及湯</b> コタロー	患部が発赤,腫脹して疼痛を伴った化膿症,癰,癩,面疔,その他癩	(重) アルドステロン症,ミオパチー,低K血症

品名,規格単位	適応,用法,用量	警告,禁忌,副作用等
<b>ツムラ(TJ-122)1g</b> ¥86 [含有生薬]キキョウ,カンゾウ,キジツ,シャクヤク,タイソウ,シヨウキョウ	腫症 ▶ 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服	(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤,ループ系利尿薬,トリクロルメチアジド
<b>薬学管理のPoint</b> (併用時注意) カンゾウ3g/日		
<b>寒門冬湯(バクモンドウトウ)</b>		
<b>寒門冬湯</b> コタロー,ジュンコウ JPS,ツムラ(TJ-29)1g ¥183, テイコク,マツウラ [含有生薬]バクモンドウ,ハング,コウベイ,タイソウ,カンゾウ,ニンジン	痰の切れにくい咳,気管支炎,気管支喘息 ▶ ① 1日15g,食前又は食間2~3回に分服(㊟), ② 1日9g,食前又は食間2~3回に分服(㊞)	(重) 間質性肺炎,偽アルドステロン症,ミオパチー,肝機能障害,黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> (併用時注意) 「乾燥」がキーワード. 乾性咳嗽,咽頭の乾燥感,嘔声等に,咳感受性を低下させ,咳き込みの原因となるC線維の過度の興奮を抑制. 咳だけが残ったような感にもよい (併用時注意) 肝機能(併注) 間質性肺炎の報告(併用時注意) カンゾウ2g/日		
<b>八味地黄丸(ハチミジヨウガン)</b> (㊟㊞(㊟以外の分包), ㊞顆粒除く)		
<b>八味地黄丸</b> クラシエ,コタロー,三和 JPS,オースギ,ツムラ(TJ-7)1g ¥107, テイコク, (東亜薬品), 本草 オースギ,クラシエ ウチダ [含有生薬]ジオウ,サンシユウ,サンヤク,タクシヤ,ブクリョウ,ボタンビ,ケイヒ,修治ブシ末	腎炎,糖尿病,陰萎,坐骨神経痛,腰痛,脚気,膀胱カタル,前立腺肥大,高血圧(疲労,倦怠感著しく,尿利減少又は頻数,口渴し,手足に交互的に冷感と熱感のあるもの) ▶ ① 1日6g,食前又は食間2~3回に分服(㊟), ② 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊞), ③ 1日18錠,食前又は食間2~3回に分服, ④ 1回20丸を1日3回,食前又は食間に服用	(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー,肝機能障害,黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤
<b>臨床情報</b> (併用時注意) (ジオウ含有) 胃腸虚弱者注意 (併注) 小児には慎重投与 (組成適い) ジオウ(㊟:6g, ㊞:5g, ㊞:5g), ボタンビ(㊟:2.5g, ㊞:3g, ㊞:3g), ブシ(㊟:0.5g, ㊞:1g, ㊞:1g) (減あり) (㊟)		
<b>半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)</b>		
<b>半夏厚朴湯</b> クラシエ,コタロー,三和,ジュンコウ,東洋 JPS,オースギ,太虎堂,ツムラ(TJ-16)1g ¥107, テイコク,本草	不安神経症,神経性胃炎,つわり,咳,しわがれ声,神経性食道狭窄症,不眠症(気分がふさいで,咽喉,食道部に異物感があり,ときに動悸,めまい,嘔気等を伴うもの) ▶ ① 1日6g,食前又は食間2~3回に分服(㊟), ② 1日7.5g,食前又は食間2~3回に分服(㊞), ③ 1日12錠,食前又は食間2~3回に分服	(重) 偽アルドステロン症,ミオパチー,肝機能障害,黄疸 (併注) カンゾウ含有製剤,グリチルリチン酸含有製剤

品名, 規格単位	適応, 用法・用量	警告, 禁忌, 副作用等
<p>㊟ オースギ, クラシエ 〔含有生薬〕ハンゲ, ブクリ ョウ, コウボク, ソヨウ, シ ョウキョウ</p>	<p><b>臨床情報</b>                      処方Point 喉のつかえ感(咽喉腫痛異常感症)の特効薬。他にうつ症                      状態がないか注意                      薬学管理Point 錠あり(㊟)</p>	
<p>半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)</p>		
<p>半夏瀉心湯                      ㊟ クラシエ, コタロー, 三                      和, ジュンコウ, 東洋                      ㊟ JPS, オースギ, サカモ                      ト, 太虎堂, ツムラ(TJ-14)                      1g×243, テイコク, (東亜                      薬品), 本草, マツウラ                      ㊟ クラシエ                      〔含有生薬〕ハンゲ, カンゾ                      ウ, オウゴン, カンキョウ,                      ニンジン, タイソウ, オウレ                      ン</p>	<p>急・慢性胃腸カタル, 発酵性下痢,                      消化不良, 胃下垂, 神経性胃炎, 胃                      弱, 二日酔, げっぷ, 胸やけ, 口内                      炎, 神経症(みぞおちがつかえ, と                      きに悪心, 嘔吐があり, 食欲不振                      で腹が鳴って軟便又は下痢の傾                      向のあるもの)                      ⇒ ㊟ 1日6g, 食前又は食間                      2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日                      7.5g, 食前又は食間2~3回に                      分服(㊟), ㊟ 1日18錠, 食前                      又は食間2~3回に分服</p>	<p>㊟ アルドステロン症, ミオパ                      チー, 低K血症                      ㊟ (重大) 間質性肺炎, 偽アルド                      ステロン症, ミオパチー, 肝機                      能障害, 黄疸                      (併注) カンゾウ含有製剤, グリ                      チルリチン酸含有製剤, ルー                      プ系利尿薬, トリクロルメチ                      アジド</p>
<p><b>臨床情報</b>                      処方Point 腹鳴, 口内炎, 下痢がキーワード。イリノテカンによる遷延性下痢に予防的に用                      いる。下痢型過敏性腸症候群に頻用される                      薬学管理Point (モ三夕) 肝機能障害(間質性肺炎)の報告(併用時注意) カンゾウ2.5~3g/日(錠あり)                      ㊟ ㊟ イリノテカンの下痢に対して使用されることあり</p>		
<p>半夏白朮天麻湯(ハンゲビャクジュツテンマトウ)</p>		
<p>半夏白朮天麻湯                      ㊟ クラシエ, コタロー, 三                      和                      ㊟ ツムラ(TJ-37)1g                      ¥252                      〔含有生薬〕チンピ, ハンゲ,                      ビャクジュツ, ブクリョウ,                      オウギ, タクシャ, ニンジン,                      オウバク, カンキョウ, ショ                      ウキョウ, テンマ, バクガ</p>	<p>胃腸虚弱で下肢が冷え, めまい,                      頭痛等があるもの                      ⇒ ㊟ 1日7.5g, 食前又は食間                      2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日                      7.5g, 食前又は食間2~3回に                      分服</p>	<p><b>薬学管理</b>                      Point (組成違い) 添付文書参照</p>
<p>白虎加人参湯(ビャッコカニンジントウ)</p>		
<p>白虎加人参湯                      ㊟ クラシエ, コタロー                      ㊟ ツムラ(TJ-34)1g                      ¥191, テイコク</p>	<p>喉の渇きとほてりのあるもの                      ⇒ ㊟ 1日6g, 食前又は食間                      2~3回に分服(㊟), ㊟ 1日                      9g, 食前又は食間2~3回に分                      服(㊟), ㊟ 1日12錠, 食前又                      は食間2~3回に分服</p>	<p>㊟ (重大) 偽アルドステロン症,                      ミオパチー                      (併注) カンゾウ含有製剤, グリ                      チルリチン酸含有製剤</p>

品名, 規格単位	適応, 用法・用量	警告, 禁忌, 副作用等
<p>㊟ クラシエ                      〔含有生薬〕セッコウ, チモ,                      カンゾウ, ニンジン, コウバ                      イ</p>	<p><b>臨床情報</b>                      処方Point 口渇の原因を取り除いても口渇を訴える例によい。シ                      ェーグレン症候群に應用可能                      薬学管理Point (併用時注意) カンゾウ2g/日(錠あり)㊟</p>	
<p>茯苓飲(ブクリョウイン)</p>		
<p>茯苓飲                      ㊟ コタロー                      ㊟ ツムラ(TJ-69)1g                      ¥154                      〔含有生薬〕ブクリョウ, ソ                      ウジュツ, チンピ, ニンジン,                      キジツ, ショウキョウ</p>	<p>胃炎, 胃アトニー, 溜飲(吐き気や                      胸やけがあり尿量が減少するも                      の)                      ⇒ ㊟ 1日6g, 食前又は食間                      2~3回に分服, ㊟ 1日7.5g,                      食前又は食間2~3回に分服</p>	<p><b>臨床情報</b>                      薬学管理Point (組成違い) ㊟ はソウジュツ, ㊟ はビャクジュツ</p>
<p>茯苓飲合半夏厚朴湯(ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ)</p>		
<p>茯苓飲合半夏厚朴湯                      ㊟ ツムラ(TJ-116)1g                      ¥206                      〔含有生薬〕ハンゲ, ブクリ                      ョウ, ソウジュツ, コウボク,                      チンピ, ニンジン, ソヨウ,                      キジツ, ショウキョウ</p>	<p>不安神経症, 神経性胃炎, つわり,                      溜飲, 胃炎(気分がふさいで, 咽喉                      食道部に異物感があり, ときに動                      悸, めまい, 嘔気, 胸やけ等があり,                      尿量の減少するもの)                      ⇒ 1日7.5g, 食前又は食間2~                      3回に分服</p>	
<p>附子人參湯(別名:附子理中湯)(ブシニンジントウ(ブシリチュウトウ))</p>		
<p>附子人參湯                      (別名:附子理中湯)                      ㊟ 三和                      〔含有生薬〕ニンジン, カン                      ソウ, ビャクジュツ, カンキ                      ョウ, 加工ブシ</p>	<p>慢性の胃腸カタル, 胃アトニー症                      (胃腸虚弱で血色悪く, 顔に生氣                      なく, 尿量多く手足に冷感あり,                      下痢の傾向あり, しばしば吐き気,                      めまい, 頭重, 胃痛を訴えるもの)                      ⇒ 1日4.5g, 食前又は食間3回                      に分服</p>	<p>㊟ アルドステロン症, ミオパ                      チー, 低K血症                      ㊟ (重大) 偽アルドステロン症,                      ミオパチー                      (併注) カンゾウ含有製剤, グリ                      チルリチン酸含有製剤, ルー                      プ系利尿薬, トリクロルメチ                      アジド</p>
<p><b>臨床情報</b>                      薬学管理Point (ブシ含有) 小児には慎重投与(併用時注意) カンゾウ3g/日</p>		
<p>平胃散(ハイイサン)</p>		
<p>平胃散                      ㊟ コタロー</p>	<p>急・慢性胃カタル, 胃アトニー, 消                      化不良, 食欲不振(胃がもたれて                      消化不良の傾向のあるもの)                      ⇒ ㊟ 1日6g, 食前又は食間                      2~3回に分服, ㊟ 1日7.5g,</p>	<p>㊟ (重大) 偽アルドステロン症,                      ミオパチー                      (併注) カンゾウ含有製剤, グリ                      チルリチン酸含有製剤</p>