





Q 6 4. いままでに食中毒や食品によるアレルギー反応などの健康被害を受けたことがありますか。

- 1. ある
- 2. ない

Q 6 5. 現在もその後遺症で継続して治療を受けていますか。

- 1. はい
- 2. いいえ

## (2)医療に関するアンケート

このアンケートにおける医療にともなう健康被害（リスク）には、下記の項目が含まれます。

- 医療診断のためのテストや医療行為に関連するリスク
- 医療行為や投薬の結果が期待した通りにならない可能性
- 医療行為や投薬にともなう副作用・副反応、合併症などできるだけ避けたい事象やその重大性（疾病、傷害、医学的に検知できない症状や死亡など）

### A. あなたが医療にともなうリスクについてどのように考えているのかを伺います。

問1. あなたは治療を受ける時、いつも治療の利益と不利益（リスク）を比較しますか。

- 1. 必ず比較する
- 2. 比較する
- 3. 少し比較する
- 4. あまり比較しない
- 5. 比較しない
- 6. 全く比較しない

問2. 治療にともなうリスクについて、それぞれあなたの感覚に最も近いものを1つずつお答えください。

		1	2	3	4	5	6
		とてもそう思う	そう思う	少しそう思う	あまりそう思わない	そう思わない	全くそう思わない
1.	治療にともなうリスクを知りたい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	科学的なデータを使って説明されれば、治療にともなうリスクを受け入れられる	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	医師がリスクの可能性と対策を説明することによって安心感が増す	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	リスクは患者ではなく医師が考えるべきことである	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	治療のリスクを理解するのは難しい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	専門家間の異なる意見を知りたい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	治療にともなうリスクの度合いを知りたい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	治療にともなうリスクでわからない事はわからないと知らせて欲しい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

問3. 治療には常に不確定要素があります。あなたがそのリスクを受け入れていくために、以下の項目は大切だと思いますか？

		1	2	3	4	5	6
		とてもそう思う	そう思う	少しそう思う	あまりそう思わない	そう思わない	全くそう思わない
1.	あなたが持つ医師への信頼	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	医師のデータに基づいた詳細な説明	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	あなたに選択肢があること	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	医師の共感の姿勢	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	あなたの要望が治療に反映されること	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	医師のかみくだいた説明	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	あなたの話をよく聞いてくれること	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	医師の経験年数	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**B. 医療にともなうリスクについて、病状ごとにどのように対応されるのか、得られる情報によってどのように対応されるのかを伺います。**

あなたは、風邪を引き 38 度の発熱と筋肉痛があります。栄養のあるものを取り、休養をしようとは思いますが、発熱や咳などの症状を和らげてくれる市販の風邪薬が家にありました。

問4. その市販の風邪薬を飲みますか。

- 1. 必ず飲む
- 2. 飲む
- 3. 多分飲む
- 4. 多分飲まない
- 5. 飲まない
- 6. 絶対飲まない

問5. その市販の風邪薬を飲みますか。

- 1. はい (知っている)
- 2. いいえ (知らない)

問 6. 市販の風邪薬を飲む前に、リスクについて使用上の注意を読みますか。

- 1. 必ず読む
- 2. 読む
- 3. 多分読む
- 4. 多分読まない
- 5. 読まない
- 6. 絶対読まない

問 7. その市販の風邪薬の使用上の注意に胃潰瘍や間質性肺炎（階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、持続したりする）、その他、肝臓や腎臓障害などのリスクが書かれていました。ただし、あなたが過去にどの風邪薬でも副作用を起こしたことがなければ問題はありません。あなたは、その市販の風邪薬を飲みますか。

- 1. 必ず飲む
- 2. 飲む
- 3. 多分飲む
- 4. 多分飲まない
- 5. 飲まない
- 6. 絶対飲まない

問 8. どの風邪薬にもリスクはつきものです。風邪薬は症状を和らげてくれます。服用しなければ、発熱、頭痛、鼻みず、鼻づまり、咽頭痛、せき、たんなどの風邪症状に加え、嘔吐、下痢、腹痛などを起こすこともあります。あなたは、その市販の風邪薬を飲みますか。

- 1. 必ず飲む
- 2. 飲む
- 3. 多分飲む
- 4. 多分飲まない
- 5. 飲まない
- 6. 絶対飲まない

問 9. その市販の風邪薬の注意書きにライエル症候群（高熱をともない、全身が広範囲にわたって赤くなり、全身の 10%以上をやけどのような水ぶくれ、皮膚のはがれ、ただれなどが認められる重症の皮膚障害）を起こす可能性が書かれていました。この病気は 100 万人あたり年間 1 人の割合で発症し、死亡率は 20~30%です。あなたは、その市販の風邪薬を飲みますか。

- 1. 必ず飲む
- 2. 飲む
- 3. 多分飲む
- 4. 多分飲まない
- 5. 飲まない
- 6. 絶対飲まない

問 10. あなたの母が、風邪薬よりも暖かくして生姜湯でも飲んで寝たほうがいいといいます。あなたは、市販の風邪薬を飲みますか。

- 1. 必ず飲む
- 2. 飲む
- 3. 多分飲む
- 4. 多分飲まない
- 5. 飲まない
- 6. 絶対飲まない

問 11. 友人が、少しは楽になるから風邪薬は飲んでから寝たほうがいいといいました。あなたは、市販の風邪薬を飲みますか。

- 1. 必ず飲む
- 2. 飲む
- 3. 多分飲む
- 4. 多分飲まない
- 5. 飲まない
- 6. 絶対飲まない

問 12. あなたが 12 歳児の親だとして、その子供が風邪を引いた場合、市販の風邪薬を飲ませますか。

- 1. 必ず飲む
- 2. 飲む
- 3. 多分飲む
- 4. 多分飲まない
- 5. 飲まない
- 6. 絶対飲まない

風疹は「3 日はしか」と呼ばれ、発熱や全身の発疹、リンパ節腫脹による顎周辺の痛みが主な症状です。(全問、男女ともにご回答ください)

問 13. あなたは、風疹の予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 14. 風疹の予防接種によるリスクについて知っていますか。

- 1. はい (知っている)
- 2. いいえ (知らない)

問 15. 市販の風邪薬を飲む前に、リスクについて使用上の注意を読みますか。

- 1. 必ず調べる
- 2. 調べる
- 3. 多分調べる
- 4. 多分調べない
- 5. 調べない
- 6. 絶対調べない

問 16. 風疹の予防接種によって無菌性髄膜炎（首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等の症状）を起こす可能性は、数千人に1人（0.05%程度）です。風疹の予防接種が原因ではなく無菌性髄膜炎になる可能性は100人に2人（2%）です。あなたは、風疹の予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 17. 風疹に免疫のない女性が妊娠初期に感染すると、赤ちゃんに難聴や白内障、心臓の形の異常などが起こりやすいとされています。その頻度は、10万人当たり1.8～7.7人（0.002～0.008%）です。母親が感染した妊娠月別で見ると、妊娠1カ月で50%以上、2カ月で35%程度の割合です。あなたは、風疹の予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 18. 風疹の予防接種後、血小板減少性紫斑病を発症することがあります。これは、末梢の細血管が血小板血栓で閉塞され、出血や腎機能障害、発熱、精神神経症状など全身性の深刻な疾患です。平成17年度には2例（1例回復、1例回復していない例）が報告されています。あなたは、風疹の予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない



6. 絶対受けない

問 19. あなたは、最近結婚した兄夫婦と同居しています。あなたは、風疹の予防接種を受けますか。

1. 必ず受ける  
 2. 受ける  
 3. 多分受ける  
 4. 多分受けない  
 5. 受けない  
 6. 絶対受けない

問 20. あなたの母が、「子供のとき風疹にかかったことがあるので予防接種は受けなくてもいい」といいました。あなたは、風疹の予防接種を受けますか。

1. 必ず受ける  
 2. 受ける  
 3. 多分受ける  
 4. 多分受けない  
 5. 受けない  
 6. 絶対受けない

問 21. あなたの友人が、「子供のとき風疹にかかったといわれても、親の記憶違いということもあるし受けた方がいい」といいました。あなたは、風疹の予防接種を受けますか。

1. 必ず受ける  
 2. 受ける  
 3. 多分受ける  
 4. 多分受けない  
 5. 受けない  
 6. 絶対受けない

インフルエンザの季節になり今年も猛威を振るうことが予想されます。インフルエンザの予防摂取は、発熱やのどの痛みなどの症状を抑える効果が期待できます。

問 22. あなたはインフルエンザ予防接種を受けますか。

1. 必ず受ける  
 2. 受ける  
 3. 多分受ける  
 4. 多分受けない  
 5. 受けない  
 6. 絶対受けない

問 23. あなたはインフルエンザ予防接種を受けますか。

- 1. はい (知っている)
- 2. いいえ (知らない)

問 24. インフルエンザ予防接種の前にリスクについて自分で調べますか。

- 1. 必ず調べる
- 2. 調べる
- 3. 多分調べる
- 4. 多分調べない
- 5. 調べない
- 6. 絶対調べない

問 25. インフルエンザ予防接種による湿疹などの副作用は、接種を受けた部分のみの湿疹などが受けた人の 10～20%、2～3 日で引く全身の湿疹などが 5～10%にみられます。あなたは、インフルエンザの予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 26. インフルエンザ予防接種を受けない場合、非常にまれですが、持病がある方には、気管支炎と肺炎の併発や、脳炎や心不全を起こすことがあります。あなたは、インフルエンザの予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 27. インフルエンザ予防接種後、数日から 2 週間ほどの間で、発熱や頭痛、痙攣、運動障害、意識障害などの症状ショックやじんましん、呼吸困難など重篤で死に至るような副反応が起こる可能性があります。あなたは、インフルエンザの予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 28. あなたの母が「インフルエンザになっても数日寝ていたら治るから、予防接種はいらない」といいます。あなたは、インフルエンザの予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 29. あなたの友人が、「インフルエンザ予防接種で症状の緩和ができるならインフルエンザの予防接種を受ける」といいます。あなたは、インフルエンザの予防接種を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 30. インフルエンザ予防接種で、小児の発熱も緩和されると聞きました。あなたが 6 歳児の親だとして、子供にインフルエンザの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

あなたはここ数年、日中の光の反射や夜間の車の運転でまぶしさに悩まされてきました。眼科に行ったところ白内障と診断され、手術が提案されました。手術がうまくいけば、視力の回復が期待できます。

問 31. あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 32. 白内障手術のリスク内容を知っていますか。

- 1. はい (知っている)
- 2. いいえ (知らない)

問 33. 白内障手術のリスクについて自分で調べますか。

- 1. 必ず調べる
- 2. 調べる
- 3. 多分調べる
- 4. 多分調べない
- 5. 調べない
- 6. 絶対調べない

問 34. 白内障手術の合併症について説明を受けました。眼底（特に黄斑）や視神経に別の病気が隠れている場合は、手術がうまくいっても視力が思うように回復しないことがあります。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 35. 手術は局所麻酔で痛みもなく、数時間で終わり血圧が手術中に少し上がる程度で、ほとんどの人が見やすくなりますし、仕事での運転もしやすくなります。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 36. 白内障手術の重篤な合併症としては細菌感染による眼内炎があります（2,000 件に 1 件の割合で起こる）。手術後数日で適切な処置がなければ、失明に至る場合があります。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 37. あなたの母が、「知り合いで白内障の手術を受け、片方の目は視力が回復したが、もう片方の目は合併症を起こしてあまりよく物が見えない人がいるので、手術は受けなくてもいいのではないか」といいます。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 38. あなたの友人が、「リスクはなくならないけれど、まれにしか起こらないし、視力が回復して快適に過ごしている人が多いから大丈夫じゃない」といいました。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 39. あなたに祖母がいるとして、あなたはその祖母の後見人となっています。祖母が「白内障の手術を受けて快適に毎日を通じたい」といいます。あなたは、祖母に白内障の手術を受けさせますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

(女性の方のみご回答ください)

あなたの子供に、子宮頸がんの予防ワクチン接種のお知らせがきました。あなたは、子宮頸がんワクチンの適齢期（小学校 6 年生～高校 1 年生相当）の子供がいる母親だとしてご回答ください。

問 40. あなたは、子供に子宮頸がんの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受けさせる
- 2. 受けさせる
- 3. 多分受けさせる
- 4. 多分受けさせない
- 5. 受けさせない
- 6. 絶対受けさせない

問 41. あなたは、子宮頸がんの予防接種によるリスクを知っていますか。

- 1. はい (知っている)
- 2. いいえ (知らない)


問 42. 子宮頸がんの予防接種を受けさせるかどうか決める前に、あなたはリスクを自分で調べますか。

- 1. 必ず調べる
- 2. 調べる
- 3. 多分調べる
- 4. 多分調べない
- 5. 調べない
- 6. 絶対調べない

問 43. 子宮頸がんの予防接種は失神するほど痛みが強く、腕が驚くほど腫れたと聞きました。あなたは、子供に子宮頸がんの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受けさせる
- 2. 受けさせる
- 3. 多分受けさせる
- 4. 多分受けさせない
- 5. 受けさせない
- 6. 絶対受けさせない

図:子宮頸がんの罹患率と死亡率(日本人女性)<sup>2)</sup>



国立がんセンターがん対策情報センター

1) 祖父江友季ほか「がん・死亡動向の実態把握の研究(平成18年度)

2) 厚生労働省科学研究費補助費第3次対がん総合戦略研究事業「がん罹患・死亡動向の実態把握の研究(平成18年度) 総括・分担研究報告書(主任研究者 祖父江友季), 2007年4月公開

問 44. 子宮頸がんになる患者数は年間約1万人で、20代から増え始め、30代がピークです。このワクチンは子宮頸がんを80%防ぐことができ、子宮頸がんの検診に行く回数を減らすことができます。一方、子宮頸がんの検診を年1回は必ず受けることで、万が一子宮頸がんにかかっても早期発見ができ、大事にいたらないこともあります。あなたは、子供に子宮頸がんの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受けさせる
- 2. 受けさせる
- 3. 多分受けさせる
- 4. 多分受けさせない
- 5. 受けさせない
- 6. 絶対受けさせない

問 45. 子宮頸がんの予防接種で、体の複数部分に慢性的な痛みや発熱、アナフィラキシーショックなどの重い副作用が、約328万人のうち1000人(約0.03%)から報告されました。あなたは、子供に子宮頸がんの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受けさせる
- 2. 受けさせる
- 3. 多分受けさせる
- 4. 多分受けさせない
- 5. 受けさせない
- 6. 絶対受けさせない

問 46. あなたの母から、「子宮頸がんの予防接種は受けなくても、婦人科検診を受けたいので受けさせる必要はない」といわれました。あなたは、子供に子宮頸がんの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受けさせる
- 2. 受けさせる
- 3. 多分受けさせる
- 4. 多分受けさせない
- 5. 受けさせない
- 6. 絶対受けさせない

問 47. あなたは友人から、「子宮頸がんの予防接種を受けたら子宮頸がんになる心配が少なくなるので、うちの家では子供に受けさせる」と聞きました。あなたは、子供に子宮頸がんの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受けさせる
- 2. 受けさせる
- 3. 多分受けさせる
- 4. 多分受けさせない
- 5. 受けさせない
- 6. 絶対受けさせない

問 48. あなたの子供が、「友達も受けるので子宮頸がんの予防接種を受けたい」といいました。あなたは、子供に子宮頸がんの予防接種を受けさせますか。

- 1. 必ず受けさせる
- 2. 受けさせる
- 3. 多分受けさせる
- 4. 多分受けさせない
- 5. 受けさせない
- 6. 絶対受けさせない

あなたが、健康診断を受けたところ、がんが見つかりました。精密検査の結果、進行性がんという診断を受け、放置しておくとも余命半年です。手術が提案され、その手術の成功率は 97%で、5年後の生存率は約 80%です。

問 49. あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない



問 50. あなたは、手術を受けることによる一般的なリスクを知っていますか。

- 1. はい (知っている)
- 2. いいえ (知らない)

問 51. 手術を決める前に、リスクについて自分で調べますか。

- 1. 必ず調べる
- 2. 調べる
- 3. 多分調べる
- 4. 多分調べない
- 5. 調べない
- 6. 絶対調べない

問 52. その手術を受けると肛門からの排便が出来なくなり人工肛門が必要になります。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 53. 手術は受けず、化学療法を受けると、5年後の生存率は50%で、化学療法の期間は3~5ヶ月(一定の期間治療をし、休む期間をとり、また治療をするという合計の期間)です。その間は気分が悪く、食欲減退し、白血球の減少がおきると肺炎や敗血症などの感染やそれによって死亡したりする(2%)とされています。しかし、人工肛門が必要にはなりません。あなたは、化学療法ではなく手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 54. 手術は受けず、放射線治療を受けると5年後の生存率は40%で、放射線治療の期間は3ヶ月です。その間は疲労感があり、気分が悪く、食欲も減退しますが人工肛門が必要にはなりません。あなたは、放射線治療ではなく手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 55. その放射線治療を受けると、女性は閉経症状となり、妊娠はあきらめなければなりません。あなたが、出産可能な年齢なら、あなたは、放射線治療ではなく手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 56. あなたは母から、「以前に進行性がんの手術を受け、その後に合併症を起こして後遺症がある人を知っているので、手術には賛成ではない」と言われました。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 57. あなたの友人から、「進行性がんの手術を受け、その後に合併症を起こし、後遺症が出る人はいるが、自分なら成功の確率が高いほうを選ぶ」と言われました。あなたは、手術を受けますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない

問 58. あなたの祖母が進行性がんを患い、治療として手術が提案されました。あなたが後見人で、受けるかどうかを決断しなければなりません。あなたは、祖母に手術を受けさせますか。

- 1. 必ず受ける
- 2. 受ける
- 3. 多分受ける
- 4. 多分受けない
- 5. 受けない
- 6. 絶対受けない



問 61. あなたは、進行性がんの診断を受け、治療として手術が提案されました。次のような場合、あなたは手術を受けますか。

		1	2	3	4	5	6
		必ず受ける	受ける	多分受ける	多分受けない	受けない	絶対受けない
1.	成功率は 97%で、医師 A は懸念されるリスク (3%) についても数値やグラフなどを示し、写真や絵、図などを使って説明してくれたので、治療内容とリスクについてはよくわかりました。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	あなたと同じがんの手術について新聞記事を読みました。内容は医師 A から聞いたことと同じで、成功率は 97%、リスクは 3%でした。ただし、リスクについてはもっと詳細に書かれていました。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	あなたと同じがんの手術に関する健康テレビ番組を観ました。内容は医師 A から聞いたことと同じで、成功率は 97%、リスクは 3%でした。ただし、リスクについてはもっと詳細に説明していました。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	あなたはインターネットで治療情報を調べました。医師 A と同じ治療を推奨するものや、他の治療法を推奨するものなど、様々な情報が得られました。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

問 62. 引続きお伺いします。

		1	2	3	4	5	6
		必ず受ける	受ける	多分受ける	多分受けない	受けない	絶対受けない
1.	その医師 A は説明もわかりやすく、テレビにもよく出ています。あなたは、医師 A の治療を受けますか。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	医師 A は説明もわかりやすいのですが、話しがしづらく、あなたの希望や意見、質問が伝えづらいついています。あなたは、医師 A の治療を受けますか。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	あなたはセカンドオピニオンを受けました。医師 B も懸念されるリスク (3%) についても数値やグラフなどを示し、写真や絵、図などを使って説明してくれたので、治療内容とリスクについてはよくわかりました。ただし、治療法は最初の医師 A から聞いたことと少し違って、腹腔鏡を使った手術を勧められました。あなたは、医師 A の治療をそのまま受けますか。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	あなたはセカンドオピニオンを受けました。診断と治療方法は医師 A と同じでしたが、医師 B は話がしやすく、あなたの希望や意見、質問をよく聞いてくれました。あなたは、予定通り医師 A の治療を受けますか。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>