


## AIFM1 KO by disruption of exon3

(chicken DT40 exon 3 region)


*intron2*

AGACAATCGGTTCTGCAGCCAAAGACCAAATGTATGCAGAAAGCTTCATTGCTCATGGAAAGCAATCGGTCTGCT  
GAGTCCCACCTATCATAAGTAGAGCAGGTAGTTCTGAGTGCATTCCCTACAGCTATGTATACATCCCCAGGTGCT  
TTTAAACTCAGGTATCTGGTTGTTGCTTAGTGAAGCACATGCCTTCTGAGCAAGT**AGG**ATAGACAAAAG  
TGTGTGGGAACAGAAGCAGAATGATGCCTTGATGCTGTAAACACATACAAGGTGAATGTCTTCCGTCTGTGCCAG



GGGGTACTTGCCTGCCGGTTCTGGGTTGGAGCTGTTTCGTGAGCTGCTAACCTGAGACATCCAAAACAGATAGAACG  
GAGCCTGCATGAAAACACAGTGGTAAAGGAGGAGGGCCCTGCTTGGCTGTACCTTTCCCAGCCTTGGCAAAGAAG  
CAGTCAGTCCCAGCACAAATCCTCAGTGTGCCATGTCCTGTTCCATTCAAGGAGCUCACAGAGGGAGAAATG  
AGGACAAAGTAGCAAAGCTCTTGATAATTCTTGAGACTGTATGTGGACCACAGGTCACTCACTGAAGGTTAAGTGATT  
GTGCAGATCTAGCTTAGAGAAACCATTGCTGCAGTGTGGCACTTGAGTCGTGCATGGAGCAGGCTTCAAGAGAAGGAG  
GGTCTTAGGAAATACAGTGGGGAGAAGGGAGGAGAACGTATTGGAGTGCTGTGCCAAAGGAGGTCCGTACA  
TGAAAAGATCTGGTACACACTCTGT

*intron3*




(px330: *Streptococcus pyogenes* Cas9,  
Nm3: *Neisseria meningitidis* Cas9)

surveyor nuclease assay

Fig.18 AIFM1遺伝子exon3-intron3にデザインしたsgRNA シークエンスと  
切断活性(SURVEYOR Assay)



### sequencing 結果



**Fig.19** *AIFM1*遺伝子exon3内部にデザインしたsgRNA シークエンスと切斷活性(SURVEYOR Assay)とターゲット領域のシークエンス結果

Church's group, *Nature Biotech*, 31, 833 (2013)

## *PPP1R12C* gene

cell type: HEK293 (Human Embryonic Kidney 293)

target: AAVS1 locus *PPP1R12C* (protein phosphatase 1, regulatory subunit 12C)

(UCSC genome browser, GRCh37/hg19)



Joung's group, *Nature Biotech*, 31, 822 (2013) and *Nature Biotech*, 32, 279 (2014)

## *VEGFA* gene

cell type: HEK293 (Human Embryonic Kidney 293)

target: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)

(UCSC genome browser, GRCh37/hg19)

target-1 indel 24%

target-3 indel 54%





Fig.20 ENCODEデータからみた各遺伝子標的部位のゲノム構造 (continued)

Joung's group, *Nature Biotech*, advanced online doi:10.1038/nbt.2908 (2014)

## *FANCF* gene


cell type: HEK293& (Human Embryonic Kidney 293)  
target: FANCF (Fanconi anemia, complementation group F)



Joung's group, *Nature Biotech*, advanced online doi:10.1038/nbt.2908 (2014)

## *RARA* gene

cell type: HEK293& (Human Embryonic Kidney 293)  
target: RARA(retinoic acid receptor, alpha)



Joung's group, *Nature Biotech*, advanced online doi:10.1038/nbt.2908 (2014)

## *EMX1* gene

cell type: HEK293& (Human Embryonic Kidney 293)  
target: EMX1 (empty spiracles homeobox 1)




Fig.21 ENCODEデータからみた各遺伝子標的部位のゲノム構造 (continued)

# *AIFM1* gene



Fig.22 ENCODEデータからみた*AIFM1*遺伝子exon3周辺のゲノム構造)

## 組換えウシ

カテゴリ	導入あるいは改変遺伝子	研究内容	開発国	遺伝子改変法	備考	文献
1	$\alpha$ -ラクトアルブミン、ラクトフェリン、リゾチーム	トランシジェニックウシの牛乳の成分を調べた	中国	-		1
	ヒトラクトフェリン	鉄貧血を起こしたラットにトランシジェニックウシの牛乳を飲ませた	中国	-		2
	ヒトラクトフェリン	鉄を結合させたヒトラクトフェリンをトランシジェニックウシの牛乳から調製して、鉄貧血を起こしたラットに与えた	中国	体細胞核移植		3
	ヒトラクトフェリン	GMウシの牛乳を新生児ブタに飲ませて腸内細菌叢を調べた	中国	-		4
2	ラクトフェリン、インターフェロン $\alpha$	線維芽細胞に導入。細胞は乳腺炎と口蹄疫に耐性	中国	トランスフェクション	細胞の実験	5
	口蹄疫ウイルスの遺伝子に対するshRNA	口蹄疫に耐性のウシを作ることを目指す	中国	体細胞核移植		6
	ウシウイルス性下痢のウイルスに対するshRNA	ウイルスの複製を抑制することを目的とする	中国	トランسفォーメーション	細胞の実験	7
	$\beta$ -ディフェンシン3	乳腺において発現させた	中国	体細胞核移植		8
	lysostaphin	ぶどう球菌の感染からウシを守ることを目指す	中国	-		9
	インテグリンavサブユニット、ノックアウト	口蹄疫の感染効率が低下した	中国	体細胞核移植		10
	インテグリンb6サブユニット、ダブルノックアウト	口蹄疫に耐性になった	中国	体細胞核移植		11
	ウシラクトフェリン、ヒトイントフェロン $\alpha$	インターフェロン $\alpha$ の発現を検出した	中国	トランスフェクション	細胞の実験	12
	Ipri	ウシ型結核菌に耐性になった	中国	体細胞核移植		13
	FMDVに由来するカブシドをコードする領域	アデノウイルスベクターの性質を調べた	米国	アデノウイルス		14
3	線虫Fat1	不飽和脂肪酸の含量が増えた	中国	トランスフェクション	細胞の実験	15
	線虫mfat-1	組織と牛乳中で不飽和脂肪酸が大きく増えた	中国	-		16
	線虫fat-1	ゲノムに組み込まれ、タンパクが発現する胚を作った	中国	-		17
4	ミオスタチン遺伝子にフレームシフトを導入	肉の量を増やす、質を良くすることを目指す	中国	トランスフェクション	細胞の実験	18
	ミオスタチン遺伝子に対するshRNA	筋肉の量を増加させることを目指す	米国	体細胞核移植		19
	ミオスタチン遺伝子に対するmiRNA	筋肉量が2倍になった	中国	体細胞核移植		20
5	ヒトラクトフェリン、ヒトラクトアルブミン $\alpha$	GM製品から外來遺伝子を検出できた	中国	-		21
	$\beta$ -ラクトグロブリンに対するmiRNA	$\beta$ -ラクトグロブリンの発現を抑制した	ニュージーランド	-		22
	ブリオン	ウシ細胞で発現させた。狂牛病にならないウシの開発を目指す	中国	トランスフェクション	細胞の実験	23
	リバーゼ	低脂肪牛乳を作るために利用できる	中国	-		24
	ヒトトランスフェリン	導入遺伝子が染色体に導入されたことをFISH法で検出した	中国	-		25
	線虫Fat1	3通りにニドンを最適化して異なる触媒効率が得られた	中国	トランスフェクション	細胞の実験	26
	ブリオン遺伝子に対するshRNA	ブリオンの発現を抑制した	中国	トランスフェクション	細胞の実験	27
	ヒト $\alpha$ -ラクトアルブミン	血液学的、血清の生化学的指標は正常の範囲内だった	中国	-		28
	ヒトコラーゲンcDNA	胚は外來遺伝子を含んでいる	中国	体細胞核移植		29
	ヒトラクトフェリン	導入遺伝子を蛍光定量PCRで検出する方法を作成した	中国	-		30
	ヒトラクトフェリン	導入遺伝子を次世代シーケンサーで調べた	中国	-		31
	ブリオン遺伝子に対するshRNA	mRNA、タンパクの発現を抑制した。	中国	トランスフェクション	細胞の実験	32
カテゴリ						
1.	牛乳に抗菌性タンパクを含ませる	2. 病原菌、ウイルスへの耐性付与	3. 不飽和脂肪酸を作らせる			
4.	筋肉の量を増やす	5. その他				
食用トランシジェニックウシ(2012年)						

## 組換えヤギ

カテゴリ	導入あるいは改変遺伝子	研究内容	開発国	遺伝子改変法	備考	文献
1	ヒトラクトフェリン	マークー1つ、2つで出生率などに差がなかった	中国	体細胞核移植		1
	ヒトリゾチーム	高濃度のリゾチームを含むヤギミルクは腸細胞の損傷の修復を促進した	ブラジル	-		2
	ヒトラクトフェリン	子孫の生殖能力、導入遺伝子発現の安定性に問題なかった	中国	-		3
	$\beta$ -ラクトグロブリンに対するshRNA	線維芽細胞中で $\beta$ -ラクトグロブリンの発現を抑制した	中国	レンチウイルスベクター	細胞の実験	4
	ヒトラクトフェリン	泌乳サイクルの期間すべてで安定に発現した	中国	-		5
	ヒトリゾチーム	ミルクを子豚に飲ませると糞便中の微生物が変わった	米国	-		6
	ヒトラクトフェリン	細胞を正確に選抜するために二重マークーを使用し、悪影響はなかった	中国	体細胞核移植		7
	リバーゼ	低脂肪牛乳を作るために利用できる	中国	-		8
	ヒトリゾチーム	GM胚盤胞を作った	中国	体細胞核移植		9
	ヒギリバーゼ	F1において導入遺伝子が発現した	中国	精巣注入		10
	ヒトラクトフェリン	GM個体作成のためのドナー細胞の調製法と受容側の卵母細胞供給源の効果を調べた	中国	体細胞核移植		11
	ヒトラクトフェリン	組換えタンパクは天然の物と物理、化学的性質が同じだった	ロシア、ペラルーシ	-		12
	ヒトラクトフェリン	ミルク中の組換えタンパクの量を経時に調べた	ペラルーシ	-		13
	ヒトラクトフェリン	細胞を正確に選抜するために二重マークーを使用し、悪影響はなかった	中国	体細胞核移植		14
	ヤギ成長ホルモン	乳腺特異的な発現ベクターを作成した。ミルクの増産を目指す	中国	-		15
	ヒトラクトフェリン	生殖機能に影響はなく、導入遺伝子は次世代に伝達して安定に発現した	中国	-		16
2	fat-1	脂肪組織で特異的に発現させるベクターを作り、線維芽細胞に導入した	中国	トランスフェクション	細胞の実験	17
	ミオスタチン遺伝子に点突然変異を導入	ミオスタチンタンパクの発現量が減少した	中国	エレクトロポーリーション	細胞の実験	18
3	インテグリンb6サブユニット遺伝子	口蹄疫に対する感染率が低かった	中国	体細胞核移植、マイクロインジェクション		19
	ダブルノックアウト		中国	マイクロインジェクション		20
	Toll-like receptor 2	個体に侵入したバクテリアの除去が促進された	中国			
1. ミルクの改良 2. 肉の改良 3. その他						
食用トランシジェニックヤギ(2012年)						

Fig.23-1 遺伝子組換え動物の開発動向調査(2012)

## 組換えブタ

カテゴリー	導入あるいは改変遺伝子	研究内容	開発国	遺伝子改変法	備考	文献
1	SIGLEC1遺伝子不活性化、CD163遺伝子不活性化	ブタ繁殖・呼吸障害症候群ウイルスに耐性のブタの作成を目指す	米国	-	-	1
	O型口蹄疫ウイルスの遺伝子に対するshRNA	トランスジェニックブタの線維芽細胞はウイルスを阻害した	中国	-	-	2
	古典的ブタ熱ウイルスの遺伝子に対するshRNA	細胞においてウイルスの複製を阻害した	中国	トランスフォーメーション	細胞の実験	3
	PBD-2	広い抗菌活性を持つ可能性がある	中国	体細胞核移植	-	4
	インテグリンb6サブユニット遺伝子ダブルノックアウト	口蹄疫に対する感染率が低かった	中国	体細胞核移植、マイクロインジェクション	-	5
	ブタ繁殖・呼吸障害症候群ウイルスの遺伝子に対するshRNA	この疾患に耐性だった	中国	体細胞核移植	-	6
	IFITIM3	ウイルス性疾患に耐性かもしれない	中国	体細胞核移植	-	7
	FUT1遺伝子に対するshRNA	腸管毒素原性大腸菌F18に耐性かもしれない	中国	体細胞核移植	-	8
	古典的ブタ熱ウイルスの遺伝子に対するsiRNA	siRNAの発現を検出した	中国	-	細胞の実験	9
	口蹄疫ウイルスに対するScFv	導入遺伝子を持つ細胞を選抜した 導入遺伝子がF1からF2へ伝わった	中国 中国	レトロウイルス	細胞の実験	10
2	sFat-1	F1において野生型よりも成長ホルモンの発現が多かった	中国	-	-	11
	ブタ成長ホルモン	糞、周辺の土壤、胃腸の微生物相を調べた	中国	-	-	12
	ヒトリゾチーム	糞肉と主要な組織でn-6/n-3比が下がった	中国	-	-	13
	線虫Fat-1	Tet-Onシステムを利用してコンディショナルに発現させた	中国	体細胞核移植	-	14
	ブタ成長ホルモン	導入遺伝子が次世代に伝わった	中国	-	細胞の実験	15
	ブタ成長ホルモン	導入遺伝子キャリアー法	中国	-	-	16
カテゴリー						
1. 病原菌、ウイルスへの耐性付与	2. その他					
食用トランスジェニックブタ(2012年)						

## 組換えヒツジ

導入あるいは改変遺伝子	研究内容	開発国	遺伝子改変法	備考	文献
ミオスタチン、そのRNAi	線維芽細胞でのミオスタチン遺伝子の発現を調べた	中国	レンチウイルスベクター	細胞の実験	1
線虫fat-1	CMVプロモーターを用いたときはサイレンシングを受け、高度なメチル化によるかもしれない	中国	体細胞核移植	-	2
ミオスタチンに対するshRNA	ミオスタチン遺伝子の発現が抑制された	中国	体細胞核移植	-	3
ミオスタチンに対するsiRNA	ミオスタチンの発現を抑制した。GM桑実胚を作った。	中国	体細胞核移植	-	4
ミオスタチンに対するshRNA	筋芽細胞の分化におけるミオスタチンの役割を調べた	中国	-	-	5
食用トランスジェニックヒツジ(2012年)					

## 組換えウサギ

導入あるいは改変遺伝子	研究内容	開発国	遺伝子改変法	備考	文献
ヒトfucosyltransferase 1	乳の分泌期間が短くなった	米国	-	-	1

Fig.23 遺伝子組換え動物の開発動向調査(2012)

## 組換え魚

カテゴリー	魚の種類	導入あるいは変異遺伝子	研究内容	開発国	遺伝子改变法	備考	文献
1	アマゴ	ベニザケ成長ホルモン1	肝において脂肪酸の組成と量が変わった	日本	-	1	
	コイ	成長ホルモン	ラットに食べさせて亜慢性毒性は現れなかった	中国	-	2	
	サケ	成長ホルモン	酸化的ストレスを調べた	スウェーデン	-	3	
	ドジョウ	ドジョウ成長ホルモン	トヨウレクチンプロモーターを使って成長速度を抑制した	韓国	-	4	
	コイ	コイ成長ホルモン	大きくなった	韓国	-	5	
	サケ	サケ成長ホルモン	プロモーターと魚の系統によって成長が異なった	カナダ	-	6	
	コイ	成長ホルモン	子孫の間で成長にはらつきがあった	中国	-	7	
	サケ	成長ホルモン	ウシ成長ホルモンを投与して成長と内分泌効果を調べた	カナダ	-	8	
	不明	コインシュリン様成長因子2b	高い生存率を持った	中国	マイクロインジェクション	9	
	サケ	成長ホルモン?	脳の大きさと構造を調べた	スウェーデン	-	10	
	アマゴ	成長ホルモン1	脳下垂体のiTRAQプロテオーム解析を行った	日本	-	11	
	ニジマス	ミオスタチンノックアウト、ミオスタチン阻害剤	運動の成長への効果を調べた	米国	-	12	
	サケ、マス、ティラピア	成長ホルモン	Aqua Bounty社のサケはFDAの審査を受けている	米国	-	13	
	サケ	成長ホルモン	早熟性の雄の成熟が減少する	カナダ	-	14	
2	サケ	抗凍結タンパク	凍結に耐性的なサケを作ることを試みた	カナダ	-	15	
カテゴリー							
1. 体を大きくする	2. その他						
食用トランスジェニック魚(2012年)							

## 組換えエビ・カニ

導入あるいは変異遺伝子	研究内容	開発国	遺伝子改变法	備考	文献
white spot syndrome virus envelope gene (VP28, VP19)、これらの融合遺伝子	トランスジェニック藻は魚、エビ、カニなどに用いる予防薬、治療薬、餌、添加物に使える	中国	トランスタクション		1

食用トランスジェニックエビ、カニ(2012年)

### 導入遺伝子の説明

#### 1) ラクトフェリン

母乳・涙・汗・唾液などの外分泌液中に含まれる鉄結合性の糖タンパク質である。ラクトフェリンは、強力な抗菌活性を持つことが知られている。鉄を奪い去ることで、細菌の増殖を抑制する。また、グラム陰性菌の細胞膜の主要な構成成分であるリポポリサッカライドと結合することで、細胞膜構造を脆弱化し、抗菌活性を示す。さらに、免疫系に対する効果があることが知られている。

#### 2) ラクトフェリシン

ラクトフェリンをペプシンで分解した部分ペプチドである。細菌の細胞壁に障害を与えることでラクトフェリンよりも 10 倍以上強力な抗菌活性を示す。

#### 3) ラクトアルブミン

乳に含まれ、乳清から得られるアルブミンである。ラクトアルブミンは、多くの哺乳類の乳に含まれる。

#### 4) リゾチーム

真正細菌の細胞壁を構成する多糖類を加水分解する酵素である。ヒトの場合涙や鼻汁、母乳などに含まれている。

#### 5) ミオスタチン

筋肉成長を抑制する因子である。

#### 6) fat-1

$\omega$ -3-脂肪酸サチュラーゼという酵素を作り、 $\omega$ -6-脂肪酸を $\omega$ -3-脂肪酸に変える。動物では不飽和脂肪酸を体内で合成できる量だけでは必要量を満たすことができず、摂取する必要がある。不飽和脂肪酸は主に植物や魚に含有されるが、人の食事では十分に摂取できていないケースがあると考えられている。動物の体内で少量作られる $\omega$ -6-脂肪酸を $\omega$ -3-脂肪酸に変えて、人が肉を食したときに $\omega$ -3 脂肪酸を摂取することを可能にするために GM 動物が作成されている例がある。


Fig.23-3 遺伝子組換え動物の開発動向調査(2012)

## 次世代遺伝子組換え技術を用いた GM 動物



1. Yu S, Luo J, Song Z, Ding F, Dai Y, Li N. Highly efficient modification of beta-lactoglobulin (BLG) gene via zinc-finger nucleases in cattle. *Cell Res.* (2011) 21 (11) 1638-1640
2. Dong Z, Ge J, Li K, Xu Z, Liang D, Li J, Li J, Jia W, Li Y, Dong X, Cao S, Wang X, Pan J, Zhao Q. Heritable targeted inactivation of myostatin gene in yellow catfish (*Pelteobagrus fulvidraco*) using engineered zinc finger nucleases. *PLoS One* (2011) 6 (12) e28897
3. + He, Hongbin; Wu, Jianming; Wang, Hongmei; Liu, Xiao; Liu, Wenhao; Fang, Yongzhi; Zhong, Jifeng. Method for knocking out bovine integrin  $\beta$ 6 subunit gene with zinc finger nuclease. *Faming Zhuanli Shenqing* (2012), CN 102660577 A 20120912.
4. Liu, Xu; Wang, Yongsheng; Guo, Wenjiang; Chang, Bohao; Liu, Jun; Guo, Zekun; Quan, Fusheng; Zhang, Yong . Zinc-finger nickase-mediated insertion of the lysostaphin gene into the beta-casein locus in cloned cows . *Nature Communications* (2013), 4, 3565, 11 pp
5. Liu, Xu; Zhang, Yong; Wang, Yongsheng; Guo, Wenjiang; Quan, Fusheng. A kind of targeting vector for site-directed integration of Lys gene in  $\beta$ -casein locus and its constructed cell. *Faming Zhuanli Shenqing* (2013), CN 103215295 A 20130724.
6. Li, Rongfeng; Li, Xueling; Zhao, Yuhang; Yun, Ting; Liang, Hao. Method for rapidly knocking out myostatin gene and integrating exogenous gene at specific site with zinc finger nuclease. *Faming Zhuanli Shenqing* (2013), CN 103088046 A 20130508.
7. Liu, Mingjun; Zhang, Xuemei; Li, Wenrong; Zhang, Ning; He, Sangang; Liu, Chenxi; Ma, Yila. Method for knocking out ovine myostatin gene with zinc finger nuclease. *Zhuanli Shenqing* (2013), CN 103290045 A 20130911.
8. Yu, Shengli; Luo, Junjie; Ding, Fangrong; Li, Song; Tang, Bo; Li, Ning. Method for knocking out bovine myostatin gene with zinc finger nucleases. *Faming Zhuanli Shenqing* (2011), CN 102260711 A 20111130.

Fig.23-4 次世代遺伝子組換え技術を用いて作製されGM動物に関する論文

## ProTEV PlusによるSpCas9-MBP-His<sub>6</sub>の消化



## Mono Sによる精製



**Fig.24** human-condon optimized SpCas9: 発現と精製

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）  
「次世代バイオテクノロジー技術応用食品等の安全性確保に関する研究」  
分担研究報告書

次世代バイオ技術を応用した生物の表現系解析と検出技術の開発

研究分担者 中村公亮 国立医薬品食品衛生研究所

研究要旨

①次世代バイオ技術によるゲノム構造への影響に関する研究：次世代バイオ技術は、ゲノム上のあらゆる場所を標的に遺伝子の挿入や欠失などの遺伝子組換え（GM）を可能とする一方で、このような遺伝子操作によるゲノムへの影響に関する知見は充分に得られていない。そこで本研究では、次世代バイオ技術を用いてゲノム上の特定の場所を DNA 二本鎖切断（DSB）または様々な配列の遺伝子を導入することによる、ゲノムへの影響及びゲノム改変部位の検知の可能性に関する解析を行った。②次世代シーケンサーを使用した新規未承認 GM 作物検知法の確立：近年、GM 技術が身近なものとなり、次世代バイオ技術のみならず従来のアグロバクテリウム法やパーティクルガン法を用いて主に新興国で開発され規制外に流通した安全性未承認 GM 作物の食品への混入が社会問題となっている。そこで、多種多様な安全性未承認 GM 作物の検知法の確立を目的に、2011 年に国内のパパイヤ加工食品より検出された安全性未承認 GM パパイヤ PRSV-YK 系統の混入した食品をモデルとして次世代シーケンサーで解読した情報を基に GM 配列を解読する手法の開発を行った。

A. 研究目的

①次世代バイオ技術によるゲノム構造への影響に関する研究：

次世代バイオ技術は、ゲノム上のあらゆる場所に変異導入や目的遺伝子の導入などの遺伝子操作を可能とする一方で、技術の安全性を念頭に遺伝子操作による生物への影響については解析が行われていない。そこで本研究では、TALEN を利用してゲノムの特定箇所に二本鎖切断（DSB）及び non-homologous end joining（NHEJ）による DSB 修復、また様々な配列及び配列長の遺伝子をゲノムの標的配列へ特異的に導入（homologous recombination [HR]）することによる、エピゲノムやゲノム構造変化並

びにその変化がもたらす近傍遺伝子の発現への影響について解析を行った。

②次世代シーケンサーを使用した新規未承認 GM 作物検知法の確立：

近年、遺伝子組換え（GM）技術が身近なものとなり、次世代バイオ技術のみならず従来のアグロバクテリウム法やパーティクルガン法を用いて主に新興国で開発され規制外に流通した安全性未承認 GM 作物の食品への混入が社会問題となっている。そのような GM 作物の混入をより迅速・精確に解析し、かつ詳細な情報を得ることが求められている。そこで、2011 年に国内のパパイヤ加工食品より検出された未承認 GM パパイヤ PRSV-YK 系統をモデルとして GM 配列を次世代シーケンサーより

解読する新規な未承認 GM 解析法の確立を試みた。

## B. 研究方法

### ①次世代バイオ技術によるゲノム構造への影響に関する研究：

#### 1) 培養細胞

ニワトリ細胞は、(独)医薬基盤研究所 JCRB 細胞バンクより購入したニワトリ B リンパ細胞株 DT40 (細胞番号:JCRB9130) 及びニワトリ肝細胞 LMH (細胞番号:JCRB0237) を用いた。DT40 細胞は、RPMI 1640 medium、0.05 mM 2-mercaptoethanol、10% (v/v) fetal bovine serum、5% (v/v) chicken serum を含有する培養液で 40°C、5% CO<sub>2</sub> 環境下で培養を行った。LMH 細胞は、Waymouth's MB752/1 medium、10% (v/v) fetal bovine serum を含有する培養液で 37°C、5% CO<sub>2</sub> 環境下で培養を行った。

#### 2) 遺伝子導入と GM 細胞株のクローニング

TAL effector nuclease (TALEN) を用いて培養細胞への GM 操作を行った。TALEN の標的配列は、ニワトリ 14 番染色体のグロビン遺伝子クラスターの非コード DNA 領域 (120,080,385 ~12,080,440) とした。TALEN の DNA 結合ドメイン標的配列は、上流側には、5'-TCTTCATGTTCCACCTAC-3'、下流側には 5'-TAGTGATTCCAACACAC-3' のそれぞれ 18 bp とし、それぞれの配列を認識する TALEN 発現ベクターを細胞へ導入した。TALEN による DSB 導入後の遺伝子挿入配列は SV40 early promoter と SV40 polyA シグナル制御下で発現するカナマイシン/ネオマイシン耐性遺伝子と immediate early promoter of CMV と Herpes simplex virus thymidine kinase polyA シグナル制御下で発現する AcGFP (*Aequorea coerulescens*

green fluorescent protein) 遺伝子を含む全長 4.7 kb の pAcGFP1-N1 プラスミド (Clontech, CA, USA) とした。Targeting ベクターには、導入配列の 5' 及び 3' 側にニワトリゲノムの相同組換え配列 (800 bp) を組み込んだ。DT40 株はエレクトロポレーション法 (Poring pulse 1 回 : 電圧 175 V、パルス幅 5 ms、パルス間隔 50 ms、減衰率 10%、Transfer pulse + 極 5 回 - 極 5 回計 10 回 : 電圧 20 V、パルス幅 50 ms、パルス間隔 50 ms、減衰率 40%)、LMH 株はリポフェクタミン法によりプラスミドを細胞へ導入した。標的配列への GM 操作の確認は、Cell アッセイ法、制限酵素 (HpyAV) 消化試験法、及び PCR 法により行った。

導入した細胞は、G418 を 2 mg/ml 加え、薬剤耐性細胞を選択的に培養し、また GFP を発現する細胞を視覚的に選択することでクローニング細胞を得た。また、細胞のクローニングは、DT40 細胞は 96 穴プレートを使用した限外希釈、LMH 細胞はシングルコロニーをトリプション-EDTA 処理し細胞を剥離する方法により行った。

#### 3) リアルタイム PCR による遺伝子発現の定量

遺伝子導入の標的配列から両側 100 kb 近傍に存在する遺伝子の発現測定には、RT-リアルタイム PCR 法を用いた。80% コンフルエンントに培養した細胞を (5~10×10<sup>7</sup> 個) を回収し、全細胞から RNeasy Mini Kit (Qiagen) を用いて total RNA を精製した。DNA は RNase-free DNase I (Qiagen) を用いて完全に消化させた。500 ng の精製 RNA を逆転写酵素 SuperScript II reverse transcriptase (Invitrogen) と oligo dT20 のプライマーを使用して 20 μl の反応液中で逆転写反応を行い cDNA を作成した。2 μl の

cDNA を鋳型に、exon-intron 間でスプライシング標的境界領域に設定したプライマー対による QuantiTect SYBR® Green PCR (QIAGEN) を用いたリアルタイム PCR 法により遺伝子発現の定量を行った。PCR 反応液は、20 μL /well として調製した。組成は以下のとおりである。2×QuantiTect SYBR® Green PCR master mix 10 μL、対象プライマー対溶液（各プライマー、50 μmol/L）各 0.2 μL を混合し、cDNA 試料液 0.5 μL を添加し滅菌蒸留水で全量 20 μL に調製した。反応条件は、50°Cで 2 分間、95°Cで 10 分間加温し、その後、95°C 15 秒、60°C 1 分を 1 サイクルとして、50 サイクルの增幅反応を行った。

#### 4) Chromosome conformation capture (3C) 解析

10 mL 培養液に懸濁させた  $1 \times 10^7$  細胞を 2% (v/v) ホルムアミドでタンパク質-DNA の架橋固定を行い、0.125 M グリシンを添加することにより反応を停止させた。その後、PBS で細胞を洗浄し、細胞溶解液（10 mM Tris-HCl [pH8.0]、10 mM NaCl, 0.2% NP-40, proteinase inhibitors cocktail [Nacalai, Kyoto, Japan]）を加え細胞を溶解させた。1×制限酵素緩衝液中に 0.3% (w/v) SDS を加え 37°C 1 時間インキュベーションさせタンパク質を変性した後、1.8% (v/v) Triton X-100 を加えさらに 37°C 1 時間反応させた。次に、400 U *Bgl*II/400 U *Bam*H I 又は 400 U *Mbo*I を加え、DNA を 37°C 16 時間消化させた後、65°C 20 分間加熱し、制限酵素を不活化させた。反応液は、7 mL 1xT4DNA ligase buffer と 1% (v/v) TritonX-100 に調製し、37°C 1 時間インキュベーション後、4000 U T4DNA ligase を加え、16°C で 4 時間反応させた。反応後、proteinaseK 及び RNase でタンパク質及び RNA をそれぞれ分

解後、フェノール・クロロホルム処理、エタノール沈殿より DNA の回収・精製を行った。ゲノムの構造解析には、TaqMan Chemistry 法を使用したリアルタイム PCR より定量を行った。

#### ②次世代シーケンサーを使用した新規未承認 GM 作物検知法の確立：

モデル食品には、安全性未承認 GM パパイヤ PSRV-YK 系統の混入したパパイヤ茶から精製した DNA を使用した。DNA は illumina 解析用サンプル識別インデックスタグ配列を含むアダプターをライゲーション後、アガロース電気泳動より 400～500 bp の断片を切り出し精製を行い、アダプターPCR によりゲノム断片を増幅させ、Illumina Hiseq (Illumina, CA, USA) を使用しシーケンシング解析を行った。

### C. 研究結果

#### ①次世代バイオ技術によるゲノム構造への影響に関する研究：

次世代バイオ技術によるゲノム構造への影響を解析するため、ニワトリ染色体 14 番 (GenBank accession no. UCD001) の配列上に存在するグロビン遺伝子クラスターの  $\pi$  グロビン遺伝子と  $\alpha$  グロビン遺伝子の間に存在する非コード DNA 領域 (nt no. 12080385～12080439) を標的に DSB するよう TALEN を設計した (Fig.1)。DSB への HR は、ニワトリゲノムの DSB 標的配列から両側に約 800 bp の配列を利用して、targetting ベクターの設計を行った (Fig.1B)。Fig.2 は、細胞中で発現させる TALEN F/R のアミノ酸配列を示す。DNA 結合ドメインは、18 の反復ドメインからなるものを設計し、それぞれのドメインは特定の 1 塩基への結合性を示すよう設計した。LMH 細胞株

へTALEN F/R 発現ベクター（各 10 µg）をエレクトロポレーション法より導入し、DT40 細胞株へ TALEN F/R 発現ベクター（各 1.6 µg）をリポフェクタミン法より導入し、Cel1 アッセイで DSB を確認した（Fig.3A）。NHEJ させた DT40 細胞株は、限外希釈によりクローン化させた細胞より精製した DNA を HpyAV 制限酵素処理しクローンタイプを判別した。その結果、クローン 1-2 番と 5-4 番はヘテロ、6-5 番はホモであった（Fig.3B）。HR により作成した DT40 細胞株は限外希釈法によりクローン化し、PCR 法により、クローン 1~3 番を得た（Fig.3C）。DSB 標的配列周辺（70 kb）のゲノム構造を解析するため、3C 解析を行った（Fig.4,5）。その結果、CpGislet 配列（配列番号 45000）は、 $\alpha$ D グロビン遺伝子配列（配列番号 50200）に結合しており、 $\alpha$ D グロビン遺伝子配列は  $\alpha$ A グロビン遺伝子配列（配列番号 54000）と結合していることが示唆された。また、 $\alpha$ D グロビン遺伝子配列は、その上流に位置する MRE 及び -9DHS 遺伝子配列（配列番号 26233 と 37000）と結合していることが示された。さらに、DT40 細胞株と LMH 細胞株の同ゲノム領域の 3 次元構造は極めて類似しているものであることが示唆された。

DSB の 100 kb 近傍に存在する内在性遺伝子（TFIIC, Loc425933, RHBDF1, MPG, ggPRX,  $\pi$ ,  $\alpha$ D,  $\alpha$ , TMEM8, P15, Axin1）の発現量の差を、RT-リアルタイム PCR 法により定量した結果、 $\alpha$ A を 1 とした場合、DSB 挿入した両端に存在する  $\pi$ 、 $\alpha$ D、及び MPG の遺伝子発現にて 10 ~100 倍上昇したことを確認した。

#### ②次世代シーケンサーを使用した新規未承認 GM 作物検知法の確立：

PSRV-YK 系統の混入したパパイヤ茶から精

製した DNA（226 ng/µl,  $A_{260\text{nm}}/A_{280\text{nm}} = 1.82$ ,  $A_{260\text{nm}}/A_{230\text{nm}} = 2.12$ ）は、平均 DNA 鎖長 5149 bp に分解されていることが示唆された（Fig.7A,B）。精製した DNA は、ソニケーション（Duty cycle 10%, Intensity 5.0 Bursts per second 200, Duration 40 sec Mode, Frequency sweeping Power 23 W, Temperature 5.5~6°C） illumina 解析用サンプル識別インデックスタグ配列を含むアダプターをライゲーション後、アガロース電気泳動より 400~500 bp の断片を切り出し精製を行った（Fig.7C）。アダプター PCR によりゲノム断片を増幅させ、Illumina Hiseq（Illumina, CA, USA）を使用しシーケンシング解析を行った。その結果、シーケンス解析用インプットデータとして 37,174 Mean quality score で、4,005 Mb、38,747,994（アダプタートリミング後、% of  $\geq 30$  bases: 95.64%）リード数を得た。ゲノム配列遺伝子バンク Plaza にて提供されている全パパイヤゲノム配列（Nature, 452, 991-996, 2008）を使用し、得られたリードのマッピングを行った結果、マップされたリード数は、全リード数の 47.5% 18,406,191 であった。PRSV-YK 系統の既知部分配列 120 bp にヒットするリードは一本も得られなかった。Local Blast で、パパイヤ内在性キモパパイン遺伝子（GenBank no.: AY803756）の contig 番号（contig\_27841）を得た（Fig.8）。

#### D. 考察

##### ①次世代バイオ技術によるゲノム構造への影響に関する研究：

ニワトリ 14 番染色体の  $\alpha$  グロビン遺伝子クラスター（100 kb）に存在する 11 種類の遺伝子（TFIIC, loc425933, RHBDF1, MPG1, CGTHBA,  $\pi$ ,  $\alpha$ D,  $\alpha$ A, TMEM6/8, P15, Axin1）の発現を確認

したところ、DT40 株と LMH 株で異なる発現パターンを示す遺伝子は  $\alpha$ D のみであった。3C 解析法により  $\alpha$  グロビン遺伝子クラスターのゲノム構造の解析を行ったところ、 $\alpha$ D 遺伝子の周辺配列において両細胞間で異なるゲノム構造様式を有していることが示唆された。また、 $\alpha$ D 遺伝子のプロモーターは上流 1 kb に存在する CpG アイランドに非常に強固に結合していることが明らかとなった。そこで、 $\alpha$ D 遺伝子のプロモーターの TATA box と  $\alpha$ D 遺伝子の上流に存在する  $\pi$  グロビン遺伝子の polyA tail の間の配列を DSB する TALEN の設計を行い、ゲノム構造に及ぼす影響について解析を行った。Cell1 アッセイ並びに制限酵素消化試験により調製した TALEN の特異性を確認し、標的配列へターゲティングベクターを導入することに成功した。現在、 $\alpha$  グロビン遺伝子クラスターの遺伝子発現の違いを野生型及び GM 型で調べ、また細胞に導入する配列の長さによるゲノム構造並びに表現型への影響について解析を行っている。

#### ②次世代シーケンサーを使用した新規未承認 GM 作物検知法の確立：

加工食品中の断片化されたゲノムを illumina HiSeq を用いてゲノム配列を解析することに成功した。また、得られた次世代シーケンサーのデータは、公開されているパパイヤゲノム配列をリファレンスとしてマッピング解析を可能とした。しかし、パパイヤ加工食品中の GM パパイヤの含有量が少なく、GM パパイヤ由來の配列をアセンブルできなかった。また、パパイヤゲノム配列とマッピングされなかつた配列の多くが BLASTn 検索よりバクテリア由來のものであることが示唆された。今後、次世代

シーケンサーで解析可能な GM パパイヤの食品中の濃度を調べる予定である。

## E. 結論

### ①次世代バイオ技術によるゲノム構造への影響に関する研究：

ニワトリ染色体 14 番 (GenBank accession no. UCD001) の  $\pi$  グロビン遺伝子と  $\alpha$  グロビン遺伝子の間に存在する非コード DNA 領域 (nt no. 12080385～12080439) を標的に設計した TALEN を使用し、DSB の NHEJ と HR を確認した。NHEJ したクローン株については、ヘテロ株 2 種類とホモ株 1 種類を得た。HR したクローン株については、4.7 kb のインサート配列を挿入した TG 株 3 種類を得た。遺伝子クラスター内の 100 kb 間に存在する内在性遺伝子の発現量を比較したところ、DSB を挟む形でインサートないの遺伝子発現カセットと同じ方向の  $\pi$  遺伝子と  $\alpha$ D グロビン遺伝子で 10～100 倍の発現量の上昇が見られた。また、今後、ゲノム構造変化を解析するに当たり、野生株の細胞を使用し、グロビン遺伝子クラスター周辺の 3C 解析を行った。その結果、DT40 細胞株及び LMH 細胞株において CpGislet と  $\alpha$ D 遺伝子間には、5.2kb と 3.8kb のループを形成していることが明らかとなった。

### ②次世代シーケンサーを使用した新規未承認 GM 作物検知法の確立：

ゲノム解析済みの DNA 配列データをリファレンスとして、加工食品中に存在する断片化された DNA のアッセンブリを行った。モデル実験には安全性未承認 GM パパイヤ PRSV-YK 系統の混入したパパイヤ加工食品（パパイヤ茶）を使用した。その結果、次世代シーケンスで解

読可能なインプットデータとして 37,174 Mean quality score で、4,005 Mb、38,747,994 (アダプタートリミング後、% of  $\geq$ 30 bases: 95.64%) リード数を得た。今後は、導入された全配列を迅速かつ精確に解読する方法を構築する予定である。

## F. 研究発表

論文発表：

1. Nakamura, K., Kondo, K., Kobayashi, T., Noguchi, A., Ohmori, K., Takabatake, R., Kitta, K., Akiyama, H., Teshima, R., Nishimaki-Mogami, T. Identification and detection method for genetically modified papaya resistant to papaya ringspot virus strains in Thailand. *Biological & Pharmaceutical Bulletin*, 37, 1-5, 2014.
2. Nakamura, K., Minamitake, Y., Nakamura, K., Kobayashi, T., Noguchi, A., Takabatake, R., Kitta, K., Hashimoto, H., Kawakami, H., Kondo, K., Teshima, R., Akiyama, H. Development of PCR primers designed for sensitive detection of genetically modified potato DNA in processed foods. *Japanese Journal of Food Chemistry and Safety*, 20, 161-169, 2013.
3. Nakamura, K., Sakagami, H., Asanuma-Date, K., Nagasawa, N., Nakahara, Y., Akiyama, H., Ogawa, H. Immobilized glycosylated Fmoc-amino acid for SPR: comparative studies of lectin-binding to linear or biantennary diLacNAc structures. *Carbohydrate Research*, 382, 77-85, 2013.
4. Nakamura, K., Akiyama, H., Kawano, N., Kobayashi, T., Yoshimatsu, K., Mano, J., Kitta, K., Ohmori, K., Noguchi, A., Kondo, K., Teshima, R. Evaluation of real-time PCR detection methods for detecting rice products contaminated by rice genetically modified with a CpTI-KDEL-T-nos transgenic construct. *Food Chemistry*, 141, 2618-2624, 2013.
5. Nakamura, K., Maeda, Y., Morimoto, K., Katayama, S., Kondo, K., Nakamura, S. Functional expression of amyloidogenic human stefins A and B in *Pichia pastoris* using codon optimization. *Biotechnology and Applied Biochemistry*, 60, 283-288, 2013
6. Nakamura, K., Akiyama, H., Takahashi, Y., Kobayashi, T., Noguchi, A., Ohmori, K., Kasahara, M., Kitta, K., Nakazawa, H., Kondo, K., Teshima, R. Application of a qualitative and quantitative real-time polymerase chain reaction method for detecting genetically modified papaya line 55-1 in papaya products. *Food Chemistry*, 136, 895-901, 2013
7. Takabatake, R., Noritake, H., Noguchi, A., Nakamura, K., Kondo, K., Akiyama, H., Teshima, R., Mano, J., Kitta, K. Comparison of DNA extraction methods for sweet corn and processed sweet corns. *Food Hygiene and Safety Science*, 54, 309-315, 2013.
8. Nakajima, O., Nakamura, K., Kondo, K., Akiyama, H., Teshima, R. Method of detecting genetically modified chicken containing human erythropoietin gene. *Biological & Pharmaceutical Bulletin*, 36, 1454-1459, 2013.
9. Noguchi, A., Nakamura, K., Sakata, K., Kobayashi, T., Akiyama, H., Kondo, K., Ohmori, K., Kasahara, M., Takabatake, R., Kitta, K., Teshima, R. Interlaboratory validation study of an event-specific real-time polymerase

- chain reaction detection method for genetically modified 55-1 papaya. Journal of AOAC International, 96, 1054-1058, 2013.
10. Ohmori, K., Nakamura, K., Kasahara, M., Takabatake, R., Kitta, K., Fujimaki, T., Kondo, K., Teshima, R., Akiyama, H. A novel DNA extraction and purification method using an ion-exchange resin type kit for the detection of genetically modified papaya in processed papaya products. Food Control, 32, 728-735, 2013.
  11. Kasama, K., Inoue, Y., Akiyama, H., Suzuki, T., Sakata, K., Nakamura, K., Ohshima, Y., Kojima, K., Kondo, K., Teshima, R. Proficiency testing of unauthorized genetically modified rice using plasmid DNA test samples. Japanese Journal of Food Chemistry and Safety, 19, 215-222, 2012
  12. Akiyama, H., Minegishi, Y., Makiyama, D., Mano, J., Sakata, K., Nakamura, K., Noguchi, A., Takabatake, R., Futo, S., Kondo, K., Kitta, K., Kato, Y., Teshima, R. Quantification and Identification of Genetically Modified Maize Events in Non-Identity Preserved Maize Samples in 2009 using an Individual Kernel Detection System. Food Hygiene and Safety Science, 53, 157-165, 2012
  13. Nakamura, K., Ohtsuki, T., Mori, H., Hoshino, H., Hoque, A., Oue, A., Kanou, F., Sakagami, H., Tanamoto, K., Ushijima, H., Kawasaki, N., Akiyama, H., Ogawa, H. Novel anti-HIV-1 activity produced by conjugating unsulfated dextran with polyL-lysine. Antiviral Research, 94, 89-97, 2012
  14. Mano, J., Harada, M., Takabatake, R., Furui, S., Kitta, K., Nakamura K., Akiyama, H., Teshima, R., Noritake, H., Hatano, S., Futo, S., Minegishi, Y., Izuka T. Comprehensive GMO detection using real-time PCR array: single-laboratory validation, Journal of AOAC International, 95, 508-516, 2012
- 学会発表 :
1. Kitta, K., Kondo, K., Teshima, R., Nakamura, K., Noguchi, A., Takabatake, R., Mano, J. Novel monitoring scheme for authorized GM maize, GMCC-13, Portugal, 2013 年 11 月.
  2. Ogawa, H., Kano, F., Otsuki, T., Hoshino, H., Nakamura, K., Mori, H., Sakagami, H. Characterization of the anti-HIV-1 mechanism of a pseudoproteoglycan produced by conjugating unsulfated dextran with poly-L-lysine. the 22nd International Symposium on Glycoconjugates, Dalian, China, 2013 年 6 月.
  3. Nakamura, K., Kobayashi, T., Nakamura, S., Kondo, K., Teshima, R. Development of a novel heterogeneous and homogeneous gene screening method for detecting unauthorized genetically modified rice in processed rice products. Pharma-nutrition 2013, Singapore, 2013 年 4 月.
  4. 近藤一成、坂田こずえ、赤星千絵、黒飛希美、中村公亮、野口秋雄、小林友子、手島玲子: 安全性未承認遺伝子組換え食品検知法における感度と精度について(コメの場合)、第 50 回全国衛生化学生技術協議会年会、富山、2013 年 11 月
  5. 中村公亮、近藤一成、小林友子、野口秋雄、坂田こずえ、大森清美、笠原正輝、高畠令王奈、橘田和美、手島玲子: 安全性未承認遺伝子組換えパパイヤ (PRSV-YK) 検知法の試験室間共同試験による妥当性確認、第 50 回全国衛生化学生技術協議会年会、富山、2013 年 11 月

6. 野口秋雄、穂山浩、中村公亮、坂田こずえ、真野潤一、高畠令王奈、峯岸恭孝、布藤 聰、橘田和美、近藤一成、手島玲子: スタック品種混入粉末試料における遺伝子組換えトウモロコシの定量法開発、第 50 回全国衛生化学技術協議会年会、富山、2013 年 11 月
7. 真野潤一、波田野修子、布藤 聰、峯岸恭孝、二宮健二、中村公亮、近藤一成、手島玲子、高畠令王奈、橘田和美: ダイレクトリアルタイム PCR による食品分析の可能性検証、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
8. 野口秋雄、坂田こずえ 真野潤一、中村公亮、高畠令王奈、峯岸恭孝、橘田和美、穂山 浩、手島玲子、近藤一成、最上（西巻）知子: 2010 年度米国産不分別遺伝子組換えトウモロコシ試料中の系統分析、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
9. 中村公亮、小林友子、真野潤一、野口秋雄、橘田和美、手島玲子、近藤一成、最上（西巻）知子: 漂白剤処理されたドライフルーツからの内在性遺伝子の検知について、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
10. 中村公亮、小林友子、野口秋雄、大森清美、高畠令王奈、橘田和美、穂山 浩、手島玲子、近藤一成、最上（西巻）知子: 热帯・亜熱帯地域で開発の進む遺伝子組換えパピヤの加工食品からの検出について、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
11. 菅野陽平、坂田こずえ、野口秋雄、中村公亮、小林友子、福田のぞみ、佐藤正幸、最上（西巻）知子、手島玲子、長澤栄史、近藤一成: ツキヨタケおよび近縁種の PCR-RFLP を用いた迅速同定法の検討、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
12. 近藤一成、中村公亮 野口秋雄、坂田こずえ、小林友子、福田のぞみ、手島玲子、最上（西巻）知子: 毒きのこのドラフトゲノムシークエンス、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
13. 坂田こずえ、小櫃冴未、中村公亮、小林友子、野口秋雄、福田のぞみ、最上（西巻）知子、手島玲子、近藤一成: クサウラベニタケおよび近縁種の PCR-RFLP を用いた迅速同定法（第 2 報）: 加熱、消化処理サンプルへの適用、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
14. 東城雄満、西野浩史、中村公亮、近藤一成、深谷 崇、大平真義、中西和樹: シリカモノリスベースによる複雑系穀物マトリックスから DNA の抽出・精製、第 106 回 日本食品衛生学会学術講演会、沖縄、2013 年 11 月
15. 伊東篤志、田口朋之、田名網健雄、羽田聖治、中村公亮、近藤一成、穂山 浩、手島玲子、佐々木伸大、山口友紀絵、宮原 平、山田晃世、小関良宏: DNA マイクロアレイによる GMO スクリーニング検査法の開発、日本食品化学学会 第 19 回 総会・学術大会、名古屋、2013 年 8 月
16. 中村公亮、穂山 浩、小林友子、野口秋雄、高畠令王奈、橘田和美、橋本博之、川上浩、近藤一成、手島玲子: 加工食品中の遺伝子組換えジャガイモ由来 DNA を高感度に検出するための PCR プライマー設計について、日本食品化学学会 第 19 回 総会・学術大会、名古屋、2013 年 8 月
17. 中村公亮、穂山 浩、河野徳昭、小林友子、吉松嘉代、真野潤一、橘田和美、大森清美、野口秋雄、近藤一成、手島玲子: コメ加工食品に混入した未承認遺伝子組換えコメ由来の遺伝子コピー数の測定、日本食品化学学会 第 19 回 総会・学術大会、名古屋、2013 年 8 月
18. 真野潤一、原田美央子、波田野修子、布藤 聰、峯岸恭孝、則武寛通、飯塚太由、中村

- 公亮、梶山 浩、手島玲子、高畠令王奈、  
古井 聰、橘田和美：遺伝子組換え農産物  
網羅的検知法の単一試験室による妥当性  
確認、2013 年度 AOAC International 日本セ  
クション年次大会、東京、2013 年 6 月。
19. 真野潤一、中村公亮、近藤一成、手島玲子、  
高畠令王奈、橘田和美：デジタル PCR を  
利用した遺伝子組換え農産物の高精度定  
量、日本食品衛生学会第 105 回大会、東京、  
2013 年 5 月。

G. 知的財産権の取得状況

1. 特許取得  
なし
2. 実用新案登録  
なし
3. その他  
なし




Fig.1 TALEN を使用した標的配列 DNA2 本鎖切断

(A)ニワトリ染色体 14 番(GenBank accession no. UCD001, nt no. 12080385~12080439)を標的に DSB するよう設計した。(B)TALEN 標的部位より両端<400bp 及び>800bp の配列を示す。(C)TALEN の DNA 結合ドメインと FokI 切断部位を示す。