



書籍名	いしずえ 10年のあゆみ
著者	10周年記念誌発行委員会編
発行者	財団法人いしずえ
発行年月日	1984年11月11日




書籍名	いしずえ30年の軌跡
著者	財団法人いしずえ
発行者	財団法人いしずえ
発行年月日	2004年10月10日

書籍名	サリドマイド被害児の福祉・健康管理に関する研究
著者	財団法人いしずえ
発行所	東京都社会福祉協議会
発行年月日	1977年
備考	絶版



書籍名	全国のサリドマイド胎芽病患者の健康、生活実態に関する研究 平成23年度総括・分担研究年度終了報告書 (H23-医薬-指定-023)
研究代表者	吉澤篤人
	厚生労働科学研究費補助金
発行年月日	平成24(2012)年5月

13. 関連書籍



書籍名	全国のサリドマイド胎芽病患者の健康、生活実態に関する研究 平成24年度総括・分担研究年度終了報告書 (H23 - 医薬 - 指定 - 023)
研究代表者	吉澤篤人
	厚生労働科学研究費補助金
発行年月日	平成25 (2013) 年5月

DVD 作品



タイトル	典子は、今
監督	松山善三
販売元	紀伊国屋書店
発行年月日	2007年11月22日
ASIN	B000VV9BPS

資料1
サリドマイドの方の
採血のコツ


サリドマイドの方の採血のコツ

- ・「ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット」を用いる
- ・入室前に部屋を暖めておく
- ・これまで、採血に成功した血管と失敗した血管を本人に聞く
- ・採血する部位を温めながら、採血する四肢を下垂しておく
- ・駆血帯は緩めに巻く
- ・血管が見つけない場合は少し拳上してみる
- ・安全型翼状針「セーフタッチPSV」を刺入する
- ・翼状針の両翼は必ずしも皮膚に密着させない
- ・凝固系以外の真空採血管から採血しないようにする

☆どうしても血管が見当たらない場合は鼠径部から採血する

「ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット」を用いた採血の実際

- ・左膝の内側にしか血管がなかった方



標準予防策(スタンダードプレコーション)として通常は手袋を装着しますが器具の持ち方や指先の向きをお見せするため、手袋を装着せず撮影しています

・前腕の内側に血管があった方


・上肢が低形成で、細いので駆血帯は緩めに圧迫します



・安全型翼状針「セーフタッチPSV」の両翼を皮膚に密着させると針先に血管の内壁があたるので、自然な形で真空採血管へ接続



- ・安全型翼状針「セーフタッチPSV」を用いたので、変形した手指に採血管が当たることなく採血できました



- ・手背に最適な血管があった方
- ・採血する部位の皮膚が進展するようにタオルを工夫



- ・安全型翼状針「セーフタッチPSV」を皮膚に密着させると
針先に血管の内壁があたるので、自然な形で真空採血管へ接続



(株) 畿時内管非能器
株式会社

資料2
聴覚障害者
上部消化管内視鏡(経口)
支援資料

*上部消化管内視鏡

のどの麻酔

スプレーします
苦い味がします

のどの麻酔

5秒間
喉の奥に含ませて下さい

のどの麻酔

飲み込んでください

検査中

ツバはたれ流して下さい
むせこみ予防です

検査中(呼吸法)

鼻から吸って
口から吐く

麻酔

これから
眠くなる薬を
注射します

首と肩の力を
抜いてください

検査終了です

これから部屋に
帰ります

とても良いです！

その調子です 😊

*おつかれさまでした

資料3
聽覺障害者
上部消化管内視鏡(經鼻)
支援資料

健診開始時

健診をはじめさせていただきます！

- 本日はご利用いただきありがとうございます。
- 検査を担当させていただきます
看護師 ○○です。
- よろしくお申し上げます。
- お困りの事、わからない事があいましたら、
ご遠慮なくお聞きください。

検査前説明

胃カメラ検査の説明をします！

- ① 胃の中の泡を消すお薬を飲みます。
(お飲みください)
- ② カメラ中のどのが麻酔されるため、唾液が飲めませんだらだら流し出してください。
- ③ 胃の中に空気を入れしわを伸ばして見ます
お腹の張った感じが2~3時間あります
- ④ 検査の後1時間は御飲食できません

検査前説明

どちらの鼻が通りやすいかを調べます！

- 鼻の通りの良い方にカメラを挿入します。
- 右の鼻を押さえて息を吸ったり吐いたりしてください。
- 左の鼻を押さえて息を吸ったり吐いたりしてください。
- 左右どちらの鼻の通りがいいですか？

右 左
にしましょう

検査前説明

経鼻内視鏡検査の説明をします！

- ① 鼻の穴を広げ鼻出血を防止するための薬を鼻から入れます。
(5分お待ちください)
- ② 鼻の痛みを減らすため、ゼリーの麻酔とチューブを入れ1分30秒お待ちください。
(のどの奥に流れてきた麻酔は飲み込んでください)
- ③ チューブを抜き胃カメラ室に行きます。
- ④ カメラの時間は10~15分くらいです。

検査前説明

経鼻内視鏡の観察順序

鼻の中、のど、食道をみて、胃から十二指腸に達し、膵液と胆汁の出口あたりまで観察します。

十二指腸から胃にもどり、胃を詳しく観察してから、内視鏡を抜くときに再度食道と鼻腔をみて終了します。

検査前本人確認

今から胃カメラをします！

- 生年月日
 - お名前
- 確認をさせていただきます。
間違いありませんか？
- はい • いいえ

筋肉注射をします！

胃の動きを緩やかにする
お注射です。

検査中の姿勢

左を下にして横になって
ください。

(左向きで横になれます)

検査中の注意

唾液は飲みません！
むせて大変です。

→出てきた唾液は、飲ま
ずに、流し出してください

検査中の呼吸法

～ゆっくり～

鼻から吸って

口から吐きます

検査中

首と肩の力を、抜き

楽～にします！

検査中

目を開けて～

肩の力を抜きます

ほ～んやり！

目を開けて、楽～にしてく
ださい

検査中

**もっと
力をめきます！**

検査中

お上手です。

その調子です！

検査後

**検査を終わります
ご苦労様でした**

資料4 聴覚障害者 呼吸機能検査 支援資料

肺機能検査の説明

- 1つ目の検査は肺活量をみる検査です。
- マウスピースをくわえて、口だけで呼吸します。
- マウスピースをくわえたら、まず、普段のラクな呼吸を数回してください。
- 合図をしたら、大きく息を吸ったりはいたりを行ってください。

- 次の検査は息をはくときの勢いをみます。
- まずは最初の検査と同じように普段のラクな呼吸を数回してください。
- 合図をしたら、大きく息を吸って、勢いよく息をはききってください。息を全部はききったら、最後に大きく吸ってください。

- 次の検査は普通に呼吸しているときに肺にどれくらい空気が残っているかをみます。
- しばらくの間はずっと普段のラクな呼吸をつづけてください。
- 合図をしたら、大きく息を吸ったりはいたりしてください。

息をすって

息をはいて

資料5
聴覚障害者
眼科検査
支援資料

眼科検査の説明

①屈折(眼の度数)

- * 屈折(眼の度数)を器械で測ります。
- * 痛くありません。
- * 大きな眼でお願いします。

②眼圧(眼の硬さ)

- * 眼圧(眼の硬さ)を器械で測ります。
- * 小さな穴から風が出ます。
- * びっくりしますが、痛みはありません。
- * 大きな眼でお願いします。

③視力測定

- * 視力測定をします。
- * 輪(C)の切れ目の方向を、指さして教えてください。
- * 上下左右の4方向です。

④眼底(眼の奥)写真

- * 眼底(眼の奥)の写真を撮影します。
- * 器械の中の点滅を見ていてください。
- * 大きな眼でお願いします。

聴覚障害者

支援

聴覚障害者に対する支援のあり方に関する調査報告書

聴覚障害者に対する支援のあり方に関する調査報告書（聴覚障害者に対する支援のあり方に関する調査報告書）

聴覚障害者に対する支援のあり方に関する調査報告書

資料6 聴覚障害者 婦人科検診 支援資料

婦人科健診

子宮や卵巣を調べる検査です。

(子宮内膜症、子宮筋腫、癌、卵巣のう腫など)

下着を脱ぎ、内診台に座ります。座ると椅子が上昇し、上半身は横たわり足を開く形になります。リラックスをしてお腹に力を入れず口呼吸をすると楽に早く終了します。ご協力をお願いします。

細胞診：子宮入り口の頸部にポリープや癌がないか調べます。

膈内に金属の器具を入れ、専用器具でこすり粘膜細胞を採取します。

お痛みや出血はありません。



経膈超音波検査：膈内にプローブという細長い探触子を入れ子宮と卵巣を調べます。

