

効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの桂枝茯苓丸	ウチダ和漢薬	ケイブックN「コタロー」	小太郎漢方製薬
オオクサ桂枝茯苓丸	大草薬品	阪本漢法の桂枝茯苓丸 300	阪本漢法製薬
紀伊国屋桂枝茯苓丸	紀伊国屋漢薬局	JPS桂枝茯苓丸料エキス錠N	ジェーピーエス製薬
「クラシ工房」漢方桂枝茯苓丸料エキス錠	クラシ工房	錠剤 桂枝茯苓丸	一元製薬
桂枝茯苓丸料Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒	ツムラ
桂枝茯苓丸料エキス顆粒K-M-2	カーヤ	トチモトの桂枝茯苓丸料	栄本天海堂
桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69	松浦薬業	花扇桂枝茯苓丸	小西製薬
桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕	大晃生薬	ホノミフッケツEX錠	創盛堂薬品
桂枝茯苓丸料エキス散〔勝昌〕	東洋薬行	本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒-M	本草製薬
桂枝茯苓丸料エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	モリ ビーション	大杉製薬
桂枝茯苓丸料「タキザワ」	タキザワ漢方廠	ワクナガ桂枝茯苓丸料エキス細粒	湧永製薬

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

桂皮、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍藥

桂枝茯苓丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	2	2	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ご こ とう 五虎湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に五虎湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬 ** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> せき | <input type="checkbox"/> 気管支ぜんそく |
| <input type="checkbox"/> 気管支炎 | <input type="checkbox"/> 小児ぜんそく |
| <input type="checkbox"/> かぜ | |

↓ 1つ以上「はい」

↓ すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？

↓ すべて「いいえ」

↓ 1つ以上「はい」

平素の体力は虚弱ですか？

↓ 中等度／充実


↓ 虚弱



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください



効能・効果

体力中等度以上で、せきが強くなるものの次の諸症：せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

「クラシエ」五虎湯エキス顆粒A 宝樹（エキス顆粒）	クラシエ漢品 建林松鶴堂
------------------------------	-----------------

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人で軟便下痢になりやすい人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1カ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

麻黄、杏仁、甘草、石膏、桑白皮

五虎湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	1	2	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



安全に
使うための

ご しや じん き がん
牛車腎気丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に牛車腎気丸を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に附子を含む漢方薬 ** を服用して、気持ちが悪くなったり、のぼせたり、動悸がしたり、手足や舌がしびれたりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> しびれ | <input type="checkbox"/> むくみ | <input type="checkbox"/> 腰痛、足の痛み |
| <input type="checkbox"/> 尿が出にくい | <input type="checkbox"/> 頻尿 | <input type="checkbox"/> かすみ目 |
| <input type="checkbox"/> かゆみ | <input type="checkbox"/> 肩こり | <input type="checkbox"/> 頭重 |
| <input type="checkbox"/> 耳鳴り | | |

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？
- 体力が充実していて暑がりですか？

すべて「いいえ」

すべて「いいえ」

- 疲れやすいですか？
- 手足が冷えやすいですか？
- 口や舌が乾きやすいですか？
- 足などがむくみやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません。あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

一元乃錠剤牛車腎気丸	一元製薬	牛車腎気丸エキス〔細粒〕98	松浦薬業
ウロバランス Uro Balance	佐藤製薬	牛車腎気丸料「タキザワ」	タキザワ漢方廠
〔救心漢方〕金匱腎気丸料エキス顆粒	救心製薬	精華牛車腎気丸	イスクラ産業
〔クラシエ〕漢方牛車腎気丸料エキス錠	クラシエ薬品	精華牛車腎気丸	ハツ目製薬
牛車腎気丸料エキス顆粒KM	カーヤ	ロート牛車腎気丸錠II	ロート製薬

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3ヶ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

地黄、山茱萸、山茱萸、沢瀉、茯苓、牡丹皮、桂皮、加工ブシ、牛膝、車前子

牛車腎気丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	1	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

柴胡加竜骨牡蠣湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に柴胡加竜骨牡蠣湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

□ 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？

□ 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

□ 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

□ 現在、授乳中ですか？#

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

□ 以前に大黄を含む漢方薬 ** を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？#

□ 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

□ 精神不安、驚きやすい、イライラ感、不眠、円形脱毛症、神経症

□ 動悸

□ 小児夜泣き

□ 更年期障害

□ 便秘

服用はおすすめできません*

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

下痢をしやすいですか？#

いいえ

はい

平素の体力は虚弱ですか？

充実／中等度

虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

柴胡加竜骨牡蠣湯には大黄が配合されていない商品もありますが、この確認票は大黄を含む商品を念頭に作られています

【参考事項】本剤は、次のいずれかの方に特に適しています。

- ・わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがある
- ・口が苦いとか、口がねばる感じがある
- ・寝返りを打ちにくいほど、身体が重く感じる
- ・よく夢を見る

効能・効果

体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの竜化順清	ウチダ和漢薬	サンワ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒「分包」	三和生薬
オオクサ柴胡加龍骨牡蠣湯エキス錠	大草薬品	JPS柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬
休憩（エキス顆粒）	建林松鶴堂	錠剤 柴胡加竜骨牡蠣湯	一元製薬
「クラシエ」漢方柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒	クラシエ薬品	ツムラ漢方柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒	ツムラ
柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒KM	カーヤ	トチモトの柴胡加竜骨牡蠣湯	栄本天海堂
柴胡加竜骨牡蠣湯エキス〔細粒〕22	松浦薬業	ホノミサイキ錠	創盛堂薬品
柴胡加竜骨牡蠣湯エキス散〔勝昌〕	東洋薬行	本草柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒-M	本草製薬
柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	モリ コーミニ	大杉製薬
柴胡加竜骨牡蠣湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠	ロート柴胡加竜骨牡蠣湯錠	ロート製薬
サイリュンN「コタロー」	小太郎漢方製薬	ワクナガ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒	湧永製薬

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人には服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は
授乳を避けること

相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢
- 1ヵ月位（小児夜泣き、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、茯苓、桂皮、大棗、人参、竜骨、牡蠣、生姜、（大黃、黃芩、甘草）

柴胡加竜骨牡蠣湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	1	2	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

そ けい かっ けつ とう 疎経活血湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に疎経活血湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- しびれ
- 腰痛
- 関節の痛み
- 筋肉痛
- 神経痛

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力はひどく虚弱ですか？

虚弱／中等度以上


ひどく虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません
が、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください



効能・効果

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの疎風定痛湯（分包）	ウチダ和漢薬	疎經活血湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
散痛楽丸	イスクラ産業	ソケーカンS「コタロー」	小太郎漢方製薬
JPS疎經活血湯エキス錠N	ジェーピース製薬	痛絡丸	松浦薬業
疎經活血湯エキス顆粒OM	大峰堂薬品工業	風濕舒筋丸	ハッカ製薬
疎經活血湯エキス細粒〔勝昌〕	東洋薬行	モリハイツウン	大杉製薬
疎經活血湯エキス錠クラシエ	クラシエ薬品		

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。 むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、地黄、川芎、蒼朮または白朮、茯苓、桃仁、芍藥、牛膝、威靈仙、防己、羌活、防風、竜胆、生姜、陳皮、白芷、甘草

疎經活血湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

だい おう かん ぞう とう 大黄甘草湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に大黄甘草湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、または他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

いいえ

はい

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に大黄を含む漢方薬** を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- 便秘
- 便秘に伴う諸症状：頭痛、頭重、のぼせ、湿疹、皮膚炎、ふきでもの、にきび、食欲不振、お腹がはる、腸内異常酵素、痔

はい

いいえ

下痢をしやすいですか？

いいえ

はい



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

5～6日くらい服用しても症状がよくならない場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。