

## 効能・効果

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの大甘丸	ウチダ和漢薬	ダイカーン	大杉製薬
オオクサ大甘丸	大草薬品	大正漢方便秘薬	大正製薬
紀伊国屋大黃甘草湯錠	紀伊国屋漢薬局	タケダ漢方便秘薬	武田薬品
JPS大黃甘草湯（錠剤）	ジェーピーエス製薬	ツムラ漢方大黃甘草湯エキス顆粒	ツムラ
大黃甘草湯Aエキス錠三和生薬	三和生薬	東亜漢方便秘薬小粒	北日本製薬
大黃甘草湯エキス細粒G「コタロー」	小太郎漢方製薬	花扇大甘丸	小西製薬
大黃甘草湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠		

## 使用上の注意

### してはいけないこと

1. 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (5) 高齢者。
  - (6) 次の症状のある人。 むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

大黃、甘草

## 大黃甘草湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	1	2	1	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

# ちょ れい と う 猪苓湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に猪苓湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 尿が出にくい
- 排尿痛
- 残尿感がある
- 頻尿
- むくみ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

ゼラチンに対してアレルギーがありますか？

いいえ

はい



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 【参考事項】

・上記の症状に加え、口渇を感じる方が特に適した処方です。

## 【排尿異常に使用される代表的な処方】

猪苓湯、五淋散、清心蓮子飲、五苓散、牛車腎気丸、八味地黄丸

## ■ 効能・効果

体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ

## ■ 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの猪苓湯エキス散	ウチダ和漢薬	猪苓湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
「クラシエ」漢方猪苓湯エキス錠	クラシエ薬品	猪苓湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
JPS猪苓湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	チョレインV「コタロー」(猪苓湯エキス錠)	小太郎漢方製薬
錠剤 猪苓湯	一元製薬	ツムラ漢方猪苓湯エキス顆粒A	ツムラ
猪苓湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ホノミボウネツ錠	劑盛堂薬品
猪苓湯エキス顆粒KM	カーヤ	本草猪苓湯エキス顆粒-M	本草製薬
猪苓湯エキス〔細粒〕42	松浦薬業	ワクナガ猪苓湯エキス細粒	湧永製薬
猪苓湯エキス散〔勝昌〕	東洋薬行		

## ■ 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■ 処方構成生薬

猪苓、茯苓、滑石、沢瀉、阿膠

## ■ 猪苓湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	1	2	1	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

# とう かく じょう き とう 桃核承気湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に桃核承気湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？  
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？  
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？  
 現在、授乳中ですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に大黃を含む漢方薬\*\* を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？  
 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 月経痛、月経不順           | <input type="checkbox"/> 高血圧に伴う頭痛、めまい、肩こり |
| <input type="checkbox"/> 月経前、月経中、産後のイライラや不安 | <input type="checkbox"/> 腰痛               |
| <input type="checkbox"/> 便秘                 | <input type="checkbox"/> 痔                |
|   | <input type="checkbox"/> 打撲傷、打ち身          |

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめて  
できません\*

下痢をしやすいですか？

↓ いいえ

はい

- のぼせやすいですか？  
 便秘しがちですか？

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの  
体質・症状に合わ  
ないかもしれませんが、あなたの意思に  
より服用可能です

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

↓ 充実/中等度

わからない

虚弱

服用はおすすめて  
できません\*



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 効能・効果

体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

大峰エキス錠桃核承気湯	大峰堂薬品工業	桃核承気湯エキス顆粒KM	カーヤ
「クラシエ」漢方桃核承気湯エキス顆粒	クラシエ薬品	桃核承気湯エキス細粒〔勝昌〕	東洋薬行
更賜（エキス顆粒）	建林松鶴堂	桃核承気湯エキス〔細粒〕47	松浦薬業
JPS桃核承気湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	桃核承気湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
錠剤 桃核承気湯	一元製薬	トーガックV「コタロー」 （桃核承気湯エキス錠）	小太郎漢方製薬
ツムラ漢方桃核承気湯エキス顆粒	ツムラ	トーショキン	大杉製薬
桃核承気丸	ウチダ和漢薬	ホノミツウケツ錠	劑盛堂薬品
桃核承気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬		

## 使用上の注意

### してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して

## 処方構成生薬

桃仁、桂皮、大黃、芒硝、甘草

## 桃核承気湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	1	2	2

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

とう き しゃく やく さん

# 当帰芍薬散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に当帰芍薬散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？  
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 月経不順、月経異常、月経痛
- 頭重、肩こり、腰痛、耳鳴り
- 更年期障害
- 足腰の冷え、しもやけ
- めまい・立ちくらみ
- むくみ、しみ
- 産前産後あるいは流産による諸症状：貧血、疲労倦怠（けんたい）感、めまい、むくみ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめて  
できません\*

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱

充実／わからない

- 冷えを感じやすいですか？
- 貧血ぎみですか？
- 疲れやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの  
体質・症状に合わ  
ないかもしれませんが、あなたの意思に  
より服用可能です



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 効能・効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの当帰芍薬散	ウチダ和漢薬	当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44	松浦薬業
カイケツEP錠	劑盛堂薬品	当帰芍薬散料エキス散〔勝昌〕	東洋薬行
クラシエ当帰芍薬散錠	クラシエ薬品	当帰芍薬散料〔タキザワ〕	タキザワ漢方廠
JPS当帰芍薬散料エキス錠N	ジェーピーエス製薬	トウシャンN〔コタロー〕	小太郎漢方製薬
錠剤 当芍散	一元製薬	トチモトの当帰芍薬散料	栃本天海堂
ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒	ツムラ	本草当帰芍薬散料エキス顆粒-M	本草製薬
当帰芍薬散料エキス顆粒KM-2	カーヤ	モリ エーション	大杉製薬
当帰芍薬散エキス顆粒SA	帝國漢方製薬	涌出（エキス顆粒）	建林松鶴堂
当帰芍薬散料エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	ワクナガ当帰芍薬散料エキス顆粒	湧永製薬
当帰芍薬散料Aエキス細粒〔分包〕 三和生薬	三和生薬		

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

当帰、川芎、芍薬、茯苓、白朮または蒼朮、沢瀉

## 当帰芍薬散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	0	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

どっ かつ かつ こん とう

# 独活葛根湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に独活葛根湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

→ はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

→ 1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬\*\* を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

→ 1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 四十肩、五十肩
- 寝ちがえ
- 肩こり

↓ 1つ以上「はい」

→ すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

- 心臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 汗をかきやすいですか？

↓ すべて「いいえ」

→ 1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？またはひどく虚弱ですか？

↓ 中等度/やや虚弱

→ ひどく虚弱/充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください



## 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

顧痛 (エキス顆粒)	建林松鶴堂	独活葛根湯エキス錠クラシエ	クラシエ薬品
ドカール「コタロー」(独活葛根湯エキス錠)	小太郎漢方製薬	パスタントン顆粒	阪本漢法製薬
		ロート独活葛根湯錠	ロート製薬

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

葛根、桂皮、芍薬、麻黄、独活、生姜、地黄、大棗、甘草

## 独活葛根湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	2	2	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

ばくもんどうとう

# 麦門冬湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に麦門冬湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- からげき
- たんが切れにくいせき
- のどの痛み
- しわがれ声（声がれ）
- 気管支炎・気管支ぜんそく

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

平素の体力は充実していますか？

虚弱／中等度

充実

- 痰（たん）が出にくい、または少ないですか？
- 顔が赤くなるくらい、激しくせき込みますか？
- のどの乾燥感がありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください