

汗関連（汗をかいていない、脂汗、発汗）

胃炎（胃炎、急・慢性胃炎、急性胃炎、神経性胃炎、慢性胃炎）

痛み（足腰の痛み、胃痛、咽喉痛、下肢痛、下腹部痛、関節痛、顔面痛、胸痛、胸背部痛、胸部・みぞおちの痛み、筋肉痛、月経痛、口腔の痛み、五十肩・四十肩、痔核による疼痛、舌の痛み、歯痛、痔痛、神経痛、頭痛、背中の痛み、側胸部痛、脱肛の痛み、打撲の痛み、手足の痛み、手足の屈伸痛、手足の疼痛、手や肩の痛み、乳腺の痛み、のどの痛み、抜歯後の疼痛、排尿痛、腹痛、ふくらはぎの圧痛、ふしぶしの痛み、目の痛み、腰痛）

胃腸炎（胃腸炎、急・慢性胃腸炎、急性胃腸炎、慢性胃腸炎）

顔色関連（顔色赤い、顔色悪い、顔面紅潮、血色がすぐれない、血色が良い、皮膚が浅黒い、皮膚にうるおいがない、皮膚のかさつき、皮膚の乾燥、皮膚の色つやが悪い）

かぜ（かぜ、かぜの後期、かぜの初期、かぜの中期から後期、感冒、感冒の初期、鼻かぜ）

かゆみ（かゆみ、皮膚のかゆみ、目のかゆみ）

渇き・乾き関連（口の乾き、唇のかわき、口渇、舌の乾き、のどの渇き）

気分（いらいら、驚きやすい、気分がすぐれない、気分のふさぎ、興奮しやすい、神経過敏、神経質）

倦怠・疲労（眼精疲労、倦怠感、心身の疲れ、全身倦怠、つかれ目、疲れやすい、疲労回復、疲労感、疲労倦怠）

口腔関連（口の中の炎症、口腔の荒れ、口内炎、歯周炎、舌の荒れ、舌炎）

痔（痔、いぼ痔、きれ痔、痔核）

湿疹・皮膚炎（湿疹・皮膚炎、手足のあれ、手あれ）

出血（痔出血、鼻血、皮下出血、鼻出血）

出産関連（産後、産前、産前産後、流産）

せき（からせき、せき、せきこみ）

ぜんそく（気管支ぜんそく、小児ぜんそく）

はれ（関節のはれ（腫れ）、打撲のはれ、のどのはれ）

尿関連（残尿感、小便がしぶって出にくいもの、多尿、尿が出しぶる、尿のにごり、尿漏れ、尿量減少、排尿困難、頻尿、夜間尿、夜尿症）

冷え（足腰の冷え、足の冷え、背中に冷感、腰の冷え、手足の冷え、冷え症、腹部の冷え）

鼻炎（鼻炎、アレルギー鼻炎、慢性鼻炎）

扁桃炎（扁桃炎、慢性扁桃炎）

ほてり（手足のほてり、ほてり）

目関連（かすみ目、眼精疲労、視力低下、ただれ目、つかれ目、なみだ目、はやり目、目の痛み、目のかゆみ、目の乾燥、目の充血、ものもらい）

図 3 新一般用漢方処方の手引きにおいて設定した主たる索引語及びその関連索引語

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (1/20)

通し番号	処方番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしばり ²⁾					基準分類
						しばり	症状	I	II	III	IV	V	
1	1	安中散	あんちゅうさん	桂皮3-5、延胡索3-4、牡蠣3-4、茴香1.5-2、縮砂1-2、甘草1-2、良姜0.5-1	(1)散:1回1-2g 1日2-3回 (2)湯	体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症	神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱	2	2	1	0	0	新基準(213)
2	1A	安中散加茯苓	あんちゅうさんかぶくりょう	桂皮3-5、延胡索3-4、牡蠣3-4、茴香1.5-2、縮砂1-2、甘草1-2、良姜0.5-1、茯苓5	(1)散:1回1-2g 1日2-3回 (2)湯	体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症	神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱	2	2	1	0	0	新基準(213)
3	2	胃風湯	いふうとう	当帰2.5-3、芍薬3、川芎2.5-3、人参3、白朮3、茯苓3-4、桂皮2-3、粟2-4	湯	体力中等度以下で、顔色悪くて食欲なく、疲れやすいものの次の諸症	急・慢性胃腸炎、冷えによる下痢	1	2	1	0	0	新基準(213)
4	3	胃苓湯	いれいとう	蒼朮2.5-3、厚朴2.5-3、陳皮2.5-3、猪苓2.5-3、沢瀉2.5-3、芍薬2.5-3、白朮2.5-3、茯苓2.5-3、桂皮2-2.5、大棗1-3、生姜1-2、甘草1-2、縮砂2、黄連2(芍薬、縮砂、黄連のない場合も可)	(1)散:1回1-2g 1日3回 (2)湯	体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴うものの次の諸症	食あたり、暑気あたり、冷え性、急性胃腸炎、腹痛	0	1	2	1	0	新基準(213)
5	4	茵陳蒿湯	いんちんこうとう	茵陳蒿4-14、山梔子1.4-5、大黃1-3	湯	体力中等度以上で、口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症	じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	0	0	2	2	1	新基準(213)
6	5	烏薬順気散	うやくじゆんきさん	麻黄2.5-3、陳皮2.5-5、烏薬2.5-5、川芎2-3、白僵蚕1.5-2.5、枳椇1.5-3、白芷1.5-3、甘草1-1.5、桔梗2-3、乾姜1-2.5、生姜1、大棗1-3(生姜・大棗を抜いても可)	湯	体力中等度のものの次の諸症	しびれ、筋力の低下、四肢の痛み、肩こり	0	1	2	1	0	改正(新規27)
7	6	烏苓通気散	うれいつうきさん/うりょうつうきさん	烏薬2-3.5、当帰2-3.5、芍薬2-3.5、香附子2-3.5、山査子2-3.5、陳皮2-3.5、茯苓1-3、白朮1-3、檳榔子1-2、延胡索1-2.5、沢瀉1-2、木香0.6-1、甘草0.6-1、生姜1(ヒネショウガを用いる場合2)	湯	体力に関わらず、使用できる。	下腹部の痛み、乳腺の痛み	1	1	2	1	1	改正(最終31)
8	7	温経湯	うんけいとう	半夏3-5、麦門冬3-10、当帰2-3、川芎2、芍薬2、人参2、桂皮2、阿膠2、牡丹皮2、甘草2、生姜1、呉茱萸1-3	湯	体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症	月経不順、月経困難、こしけ(おりもの)、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ(手の湿疹・皮膚炎)	1	2	2	0	0	新基準(213)
9	8	温清飲	うんせいいん	当帰3-4、地黄3-4、芍薬3-4、川芎3-4、黄連1-2、黄芩1.5-3、山梔子1.5-2、黄柏1-1.5	湯	体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症	月経不順、月経困難、血の道症 ³⁾ 、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎	0	1	2	1	0	新基準(213)
10	9	温胆湯	うんたんとう	半夏4-6、茯苓4-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3)、陳皮2-3、竹茹2-3、枳実1-2、甘草1-2、黄連1、酸棗仁1-3、大棗2(黄連以降のない場合も可)	湯	体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症	不眠症、神経症	1	2	2	1	0	新基準(213)
11	9A	加味温胆湯	かみうんたんとう	半夏3.5-6、茯苓3-6、陳皮2-3、竹茹2-3、生姜1-2、枳実1-3、甘草1-2、遠志2-3、玄参2(五味子3に替えても可)、人参2-3、地黄2-3、酸棗仁1-5、大棗2、黄連1-2(黄連のない場合も可)(遠志、玄参、人参、地黄、大棗のない場合もある)	湯	体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症	神経症、不眠症	1	2	2	1	0	新基準(213)
12	9B	竹茹温胆湯	ちくじょうたんとう	柴胡3-6、竹茹3、茯苓3、麦門冬3-4、陳皮2-3、枳実1-3、黄連1-4.5、甘草1、半夏3-6、香附子2-2.5、生姜1、桔梗2-3、人参1-2	湯	体力中等度のものの次の諸症	かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多くて安眠が出来ないもの	0	1	2	1	0	新基準(213)
13	10	越婢加朮湯	えっぴかじゆつとう	麻黄4-6、石膏8-10、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、大棗3-5、甘草1.5-2、白朮3-4(蒼朮も可)	湯	体力中等度以上で、むくみがあり、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症	むくみ、関節のはれや痛み、関節炎、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み	0	0	2	2	1	改正(新規27)
14	10A	越婢加朮附湯	えっぴかじゆつぶとう	麻黄4-6、石膏8-10、白朮3-4(蒼朮も可)、加エブシ0.3-1、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草1.5-2、大棗3-4	湯	体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症	むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み	0	1	2	2	1	改正(新規27)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (2/20)

通し番号	処方番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしばり ^①					基準分類
						しばり	症状	I	II	III	IV	V	
15	10B	桂枝越婢湯	けいしえっぴとう	桂皮4、芍薬4、甘草2、麻黄5、生姜1(ヒネシヨウガを使用する場合2.5)、大棗3、石膏8、蒼朮4、加工ブシ	湯	体力中等度以下のものの次の諸症	関節のはれや痛み	1	2	2	1	0	改正(新規27)
16	10C	桂枝二越婢一湯	けいしにえっぴいっとう/けいしにえっぴいちとう	桂皮2.5-3.5、芍薬2.5-3.5、麻黄2.5-3.5、甘草2.5-3.5、大棗3-4、石膏3-8、生姜1(ヒネシヨウガを使用する場合2.8-3.5)	湯	体力中等度で、のどが渇き、汗が出るものの次の諸症	感冒、頭痛、腰痛、筋肉痛、関節のはれや痛み	0	1	2	1	0	改正(新規27)
17	10D	桂枝二越婢一湯加朮附	けいしにえっぴいっとうかじゅつぷ/けいしにえっぴいちとうか	桂皮2.5、芍薬2.5、甘草2.5、麻黄2.5、生姜1(ヒネシヨウガを使用する場合3.5)、大棗3、石膏3、白朮3(蒼朮も可)、加工ブシ0.5-1	湯	体力中等度以下で、冷えがあって、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症	関節のはれや痛み、筋肉痛、腰痛、頭痛	1	2	1	1	0	改正(新規27)
18	11	延年半夏湯	えんねはんげとう	半夏3-5、柴胡2-5、別甲2-5、桔梗2-4、檳榔子2-4、人參0.8-2、生姜1-2、枳実0.5-2、呉茱萸0.5-2	湯	体力中等度で、みぞおちに抵抗感がある、肩がこり、足が冷えるものの次の諸症	慢性胃炎、胃痛、食欲不振	0	1	2	1	0	新基準(213)
19	12	黄芩湯	おうごんとう	黄芩4-9、芍薬2-8、甘草2-6、大棗4-9	湯	体力中等度で、腹痛、みぞおちのつかえがあり、ときにさむけ、発熱などがあるものの次の諸症	下痢、胃腸炎	0	1	2	1	0	新基準(213)
20	13	応鐘散(芎黄散)	おうしょうさん/きゅうおうさん	大黃1、川芎2	(1)散:1回に頓服する。 (2)湯:上記量を1日量	体力中等度以上のものの次の諸症	便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり	0	0	1	2	1	新基準(213)
21	14	黄連阿膠湯	おうれんあきょうとう	黄連3-4、芍薬2-2.5、黄芩1-2、阿膠3、卵黄1個	湯	体力中等度以下で、冷えやすくのぼせ気味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症	鼻血、不眠症、かさかさした湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	1	2	1	0	0	新基準(213)
22	15	黄連解毒湯	おうれんげどくとう	黄連1.5-2、黄芩3、黄柏1.5-3、山梔子2-3	(1)散:1回1.5-2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症	鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症 ^② 、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎	0	0	1	2	2	新基準(213)
23	16	黄連湯	おうれんとう	黄連3、甘草3、乾姜3、人參2-3、桂皮3、大棗3、半夏5-8	湯	体力中等度で、胃部の停滞感や重圧感、食欲不振があり、ときにははきけや嘔吐のあるものの次の諸症	胃痛、急性胃炎、二日酔、口内炎	0	1	2	1	0	新基準(213)
24	17	乙字湯	おつじとう	当帰4-6、柴胡4-6、黄芩3-4、甘草1.5-3、升麻1-2、大黃0.5-3	湯	体力中等度以上で、大便がたかく、便秘傾向のあるものの次の諸症	痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘、軽度の脱肛	0	1	2	2	1	新基準(213)
25	17A	乙字湯去大黃	おつじとうきょだいおう	当帰4-6、柴胡4-6、黄芩3-4、甘草1.5-3、升麻1-2	湯	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症	痔核(いぼ痔)、きれ痔、軽度の脱肛	0	2	2	1	0	新基準(213)
26	18	解急蜀椒湯	かいきゅうしよくしょうとう	蜀椒1-2、加工ブシ0.3-1、糯米7-8、乾姜1.5-4、半夏4-8、大棗3、甘草1-2、人參2-3、膠胎20(膠胎はなくても可)	湯	体力中等度以下で、腹部が冷えて痛み、あるいは腹が張って、ときに嘔吐を伴うものの次の諸症	冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	2	2	1	0	0	改正(新規27)
27	19	加減涼膈散(浅田)	かげんりょうかくさん・あさだ	連翹3、黄芩3、山梔子3、桔梗3、薄荷2、甘草1、大黃1、石膏10	湯	体力中等度以上で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症	口内炎、口の中の炎症	0	0	1	2	1	改正(最終31)
28	20	加減涼膈散(裴廷賢)	かげんりょうかくさん・きょうていけん	連翹2-3、黄芩2-3、山梔子1.5-3、桔梗2-3、黄連1-2、薄荷1-2、当帰2-4、地黃2-4、枳実1-3、芍薬2-4、甘草1-1.5	湯	体力中等度で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症	口内炎、口の中の炎症	0	1	2	1	0	改正(最終31)
29	21	藿香正気散	かつこうしょうきさん	白朮3、茯苓3-4、陳皮2-3、白芷1-4、藿香1-4、大棗1-3、甘草1-1.5、半夏3、厚朴2-3、桔梗1.5-3、蘇葉1-4、大腹皮1-4、生姜1	湯	体力中等度以下のものの次の諸症	感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠	1	2	2	1	0	新基準(213)
30	22	葛根黄連黄芩湯	かつこんおうれんおうごんとう	葛根5-6、黄連3、黄芩3、甘草2	湯	体力中等度のものの次の諸症	下痢、急性胃腸炎、口内炎、舌炎、肩こり、不眠	0	1	2	1	0	新基準(213)
31	23	葛根紅花湯	かつこんこうかうとう	葛根3、芍薬3、地黃3、黄連1.5、山梔子1.5、紅花1.5、大黃1、甘草1	湯	体力中等度以上で、便秘傾向のものの次の諸症	あかばな(酒さ)、しみ	0	0	1	2	1	新基準(213)
32	24	葛根湯	かつこんとう	葛根4-8、麻黄3-4、大棗3-4、桂皮2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5	湯	体力中等度以上のものの次の諸症	感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	0	0	2	2	1	新基準(213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (3/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしばり ^①					基準 分類	
						しばり	症状	I	II	III	IV	V		
33	24A	葛根湯加川芎辛夷	かっこんとうかせん きゅうしんい	葛根4-8、麻黄3-4、大棗3-4、桂皮 2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5、 川芎2-3、辛夷2-3	湯	比較的体力があるものの次の諸症	鼻づまり、蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎	0	0	2	2	0	0	新基準 (213)
34	24B	独活葛根湯	どっかつかっこんとう	葛根5、桂皮3、芍薬3、麻黄2、独活 2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用 する場合1-2)、地黄4、大棗1-2、 甘草1-2	湯	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸 症	四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり	0	2	2	0	0	0	新基準 (213)
35	25	加味解毒湯	かみげどくとう	黄連2、黄芩2、黄柏2、山梔子2、柴 胡2、茵陳蒿2、竜胆2、木通2、滑石 3、升麻1.5、甘草1.5、燈心草1.5、 大黄1.5(大黄のない場合も可)	湯	比較的体力があり、血色がよいものの次の 諸症	小便がしぶって出にくいもの、痔疾(いぼ 痔、痔痛、痔出血)	0	0	1	2	0	0	新基準 (213)
36	26	栝楼薤白酒湯	かろうがいはいくはくしゅ とう	栝楼実2-5(栝楼仁も可)、薤白4- 9.6、白酒140-700(日本酒も可)	湯	体力に関わらず、使用できる。	背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸部 の圧迫感	1	1	2	1	1	1	改正(最 終31)
37	26A	栝楼薤白湯	かろうがいはいくとう	栝楼仁2、薤白10、十棗6、甘草2、 桂皮4、防己4	湯	体力に関わらず、使用できる。	背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸部 の圧迫感	1	1	2	1	1	1	改正(最 終31)
38	27	乾姜人参半夏丸	かんきょうにんじんはん げがん	乾姜3、人参3、半夏6	(1)散:1回1.5-5g 1日3 回 (2)湯:上記量を1日量と する。	体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続きみ ぞおちのつかえを感じるものの次の諸症	つわり、胃炎、胃腸虚弱	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
39	28	甘草乾姜湯	かんぞうかんきょうとう	甘草4-8、乾姜2-4	湯	体力虚弱で、手足が冷え、薄い唾液が口に 溜まるものの次の諸症	頻尿、尿もれ、唾液分泌過多、鼻炎、しゃつ くり、めまい	1	2	0	0	0	0	改正(新 規27)
40	29	甘草湯	かんぞうとう	甘草2-8	(1)散:1回0.5g 1日2回 (2)湯:少しずつつくり 飲む。 (3)外用:煎液で患部を 温湿布する。	体力に関わらず、使用できる。	激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ声 外用:痔・脱肛の痛み	2	2	2	2	2	2	新基準 (213)
41	30	甘草附子湯	かんぞうぶしとう	甘草2-3、加工芍薬0.5-2、白朮2- 6、桂皮3-4	湯	体力虚弱で、痛みを伴うものの次の諸症	関節のはれや痛み、神経痛、感冒	2	2	0	0	0	0	改正(最 終31)
42	31	甘麦大棗湯	かんばくたいそうとう	甘草3-5、大棗2.5-6、小麦14-20	湯	体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きや すく、ときにあくびが出るものの次の諸症	不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ	1	2	1	1	0	0	新基準 (213)
43	32	甘露飲	かんろいん	熟地黄2-3、乾地黄2-2.5、麦門冬 2-3、枳椇1-2.5、甘草2-2.5、茵陳 蒿2-2.5、枇杷葉2-2.5、石斛2-2.5、 黄芩2-3、天門冬2-3	湯	体力中等度以下のものの次の諸症	口内炎、舌の荒れや痛み、歯周炎	1	2	2	1	0	0	改正(新 規27)
44	33	桔梗湯	ききょうとう	桔梗1-4、甘草2-8	湯	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛 み、ときにせきがでるものの次の諸症	扁桃炎、扁桃周囲炎	2	2	2	2	2	2	新基準 (213)
45	34	帰脾湯	きひとう	人参2-4、白朮2-4(蒼朮も可)、茯苓 2-4、酸棗仁2-4、竜眼肉2-4、黄 耆2-4、当帰2、遠志1-2、甘草1、木 香1、大棗1-2、生姜1-1.5	湯	体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が 悪いものの次の諸症	貧血、不眠症、神経症、精神不安	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
46	34A	加味帰脾湯	かみきひとう	人参3、白朮3(蒼朮も可)、茯苓3、 酸棗仁3、竜眼肉3、黄耆2-3、当帰 2、遠志1-2、柴胡2.5-3、山梔子2- 2.5、甘草1、木香1、大棗1-2、生姜 1-1.5、牡丹皮2(牡丹皮はなくても 可)	湯	体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が 悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症	貧血、不眠症、精神不安、神経症	1	2	2	0	0	0	新基準 (213)
47	35	芍薬調血飲	きゅうきちょうけつ いん	当帰2-2.5、地黄2-2.5、川芎2-2.5、 白朮2-2.5(蒼朮も可)、茯苓2-2.5、 陳皮2-2.5、烏薬2-2.5、大棗1-1.5、 香附子2-2.5、甘草1、牡丹皮2- 2.5、益母草1-1.5、乾姜1-1.5、生姜 0.5-1.5(生姜はなくても可)	湯	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし 産後の場合は体力に関わらず使用できる。	月経不順、産後の神経症・体力低下	2	2	1	0	0	0	新基準 (213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (4/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしぼり ^{o)}					基準 分類
						しぼり	症状	I	II	III	IV	V	
48	35A	芍婦調血飲第一加減	きゅうきちょうけつじんたいいちかげん	当帰2、川芎2、地黃2、白朮2(蒼朮も可)、茯苓2、陳皮2、烏藥2、香附子2、牡丹皮2、益母草1.5、大黃1.5、甘草1、乾薑1-1.5、生薑0.5-1.5(生薑はなくても可)、芍薬1.5、桃仁1.5、紅花1.5、枳実1.5、桂皮1.5、牛膝1.5、木香1.5、延胡索1.5	湯	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。	血の道症 ^{a)} 、月経不順、産後の体力低下	1	2	2	0	0	新基準 (213)
49	36	響声破笛丸	きょうせいはいてきがん	連翹2.5、桔梗2.5、甘草2.5、大黃1、縮砂1、川芎1、訶子1、阿仙薬2、薄荷葉4(大黃のない場合も可)	(1)散:1回2-3g 1日数回 (2)湯	体力に関わらず、使用できる。	しわがれ声、咽喉不快	2	2	2	2	2	新基準 (213)
50	37	杏蘇散	きょうそさん	蘇葉3、五味子2、大腹皮2、烏梅2、杏仁2、陳皮1-1.5、桔梗1-1.5、麻黄1-1.5、桑白皮1-1.5、阿膠1-1.5、甘草1-1.5、紫苑1	湯(原則として)	体力中等度以下で、気分がすぐれず、汗がなく、ときに顔がむくむものの次の諸症	せき、たん、気管支炎	1	2	1	0	0	新基準 (213)
51	38	苦参湯	くじんとう	(外用) 苦参6-10	水500-600mLで煮て250-300mLとし外用する。		ただれ、あせも、かゆみ	外用処方					新基準 (213)
52	39	驅風解毒散(湯)	くふうげどくさん(とう)	防風3-5、牛蒡子3、連翹5、荊芥1.5、羌活1.5、甘草1.5、桔梗3、石膏5-10	湯(本処方熱ければ冷ましてうがいしながら少しずつゆっくり飲む)	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症	扁桃炎、扁桃周囲炎	1	1	2	2	1	新基準 (213)
53	40	九味檳榔湯	くみびんろうとう	檳榔子4、厚朴3、桔皮3、橘皮3、蘇葉1-2、甘草1、大黃0.5-1、木香1、生薑1(ヒネショウガを使用する場合3)(大黃を去り、呉茱萸1、茯苓3を加えても可)	湯	体力中等度以上で、全身倦怠感があり、とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸症	疲労倦怠感、更年期障害、動悸、息切れ、むくみ、神経症、胃腸炎、関節のはれや痛み	0	1	2	2	1	改正(新規27)
54	41	荊芥連翹湯	けいがいれんぎょうとう	当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黃1.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、荊芥1.5、防風1.5、薄荷葉1.5、枳殼(実)1.5、甘草1-1.5、白芷1.5-2.5、桔梗1.5-2.5、柴胡1.5-2.5(地黃、黄連、黄柏、薄荷葉のない場合も可)	湯	体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症	蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび	0	0	1	2	1	新基準 (213)
55	42	鶏肝丸	けいかんがん	鶏肝1具 鶏肝1具をとりゆでて乾燥し、山薬末(鶏肝の乾燥した量の2-3倍量をめやすとする。)を和しつと細末とし糊丸とする。	丸:1回2g 1日3回	体力虚弱なものの次の症状	虚弱体質	2	1	0	0	0	新基準 (213)
56	43	桂姜棗草黄辛附湯	けいきょうそうそうおうしんぶとう	桂皮3、生薑1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草2、大蘇3-3.5、麻黄2、細辛2、加工ブシ0.3-1	湯	体力中等度以下で、さむけを訴えるものの次の諸症	感冒、気管支炎、関節のはれや痛み、水様性鼻汁を伴う鼻炎、神経痛、腰痛、冷え症	1	2	1	0	0	改正(新規27)
57	44	桂枝加黄耆湯	けいしかおうぎとう	桂皮3-4、芍薬3-4、大蘇3-4、生薑1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、黄耆2-3	湯	体力虚弱なものの次の諸症	ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎	1	2	0	0	0	新基準 (213)
58	44A	黄耆桂枝五物湯	おうぎけいしごもつとう	黄耆3、芍薬3、桂皮3、生薑1.5-2(ヒネショウガを使用する場合5-6)、大蘇3-4	湯	体力中等度以下のものの次の諸症	身体や四肢のしびれ、顔面・口腔内のしびれ、湿疹・皮膚炎	1	2	2	0	0	改正(類方23)
59	45	桂枝加芍薬湯	けいしかしゃくやくとう	桂皮3-4、芍薬6、大蘇3-4、生薑1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2	湯	体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症	しぶり腹 ^{b)} 、腹痛、下痢、便秘	1	2	1	0	0	新基準 (213)
60	45A	桂枝加芍薬生薑人参湯	けいしかしゃくやくしょうきょうにんじんとう	桂皮2.4-4、大蘇2.4-4、芍薬3.2-6、生薑1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5.5)、甘草1.6-2、人参2.4-4.5	湯	体力虚弱なものの次の諸症	みぞおちのつかえ、腹痛、手足の痛み	2	2	0	0	0	新基準 (213)
61	45B	桂枝加芍薬大黃湯	けいしかしゃくやくたいおうとう	桂皮3-4、芍薬4-6、大蘇3-4、生薑1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、大黃1-2	湯	体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛 ^{a)} あり、便秘するものの次の諸症	便秘、しぶり腹 ^{b)}	1	2	2	0	0	新基準 (213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (5/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしびり ^①					基準 分類	
						しびり	症状	I	II	III	IV	V		
62	46	桂枝加朮附湯	けいしかじゆつぶとう	桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工芍0.5-1	湯	体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症	関節痛、神経痛	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
63	46A	桂枝加苓朮附湯	けいしかれいじゆつぶとう	桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工芍0.5-1、茯苓4	湯	体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のびくつきがあるものの次の諸症	関節痛、神経痛	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
64	47	桂枝加竜骨牡蛎湯	けいしかりゆうこつぼれいとう	桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、竜骨3、牡蛎3	湯	体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症	神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
65	48	桂枝芍薬知母湯	けいししゃくやくちもとう	桂皮3-4、芍薬3-4、甘草1.5-2、麻黄2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-5)、白朮4-5(蒼朮も可)、知母2-4、防風3-4、加工芍0.3-1	湯	体力虚弱で、皮膚が乾燥し、四肢あるいは諸関節のはれが慢性に経過して、痛むものの次の諸症	関節のはれや痛み、関節炎、神経痛	2	2	0	0	0	0	改正(新規27)
66	49	桂枝湯	けいしとう	桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2	湯	体力虚弱で、汗が出るものの次の症状	かぜの初期	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
67	49A	桂枝加葛根湯	けいしかかっこんとう	桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2.4-4)、甘草1.6-2、葛根3.2-6	湯	体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるものの次の症状	かぜの初期	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
68	49B	桂枝加厚朴杏仁湯	けいしかこうぼくきょうにんとう	桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草1.6-2、厚朴1-4、杏仁1.6-4	湯	体力虚弱なものの次の諸症	せき、気管支炎、気管支ぜんそく	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
69	50	桂枝茯苓丸	けいしぶくりょうがん	桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍薬4	(1)散:1回1-2g 1日3回 (2)湯	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症 ^② 、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび	0	0	2	2	0	0	新基準 (213)
70	50A	桂枝茯苓丸料加薏苡仁	けいしぶくりょうがんりょうかよくいにん	桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍薬4、薏苡仁10-20	湯	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症	にきび、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)、月経不順、血の道症 ^②	0	0	2	2	0	0	新基準 (213)
71	50B	甲字湯	こうじとう	桂皮3-4、茯苓3-4、牡丹皮3-4、桃仁3-4、芍薬3-4、甘草1.5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)	湯	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症 ^② 、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ	0	0	2	2	0	0	新基準 (213)
72	51	啓脾湯	けいひとう	人參3、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、蓮肉3、山薬3、山査子2、陳皮2、沢瀉2、大棗1、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草1(大棗、生姜はなくても可)	(1)散:1回1-2g 1日3回 (2)湯	体力虚弱で、痩せて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症	胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
73	52	荊防敗毒散	けいぼうはいどくさん	荊芥1.5-2、防風1.5-2、羌活1.5-2、独活1.5-2、柴胡1.5-2、薄荷葉1.5-2、連翹1.5-2、桔梗1.5-2、枳殼(又は枳実)1.5-2、川芎1.5-2、前胡1.5-2、金銀花1.5-2、甘草1-1.5、生姜1	湯	比較的体力があるものの次の諸症	急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎	0	0	2	2	0	0	新基準 (213)
74	53	桂麻各半湯	けいまかくはんとう	桂皮3.5、芍薬2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2)、甘草2、麻黄2、大棗2、杏仁2.5	湯	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症	感冒、せき、かゆみ	0	2	1	0	0	0	新基準 (213)
75	54	鷄鳴散加茯苓	けいめいさんかぶりょう	檳榔子3-4、木瓜3、橘皮2-3、桔梗2-3、茯苓4-6、吳茱萸1-1.5、蘇葉1-2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)	湯	体力中等度のものの次の諸症	下肢の倦怠感、ふくらはぎの緊張・圧痛	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
76	55	外台四物湯加味	げだいしもつとうかみ	桔梗3、紫苑1.5、甘草2、姜門冬9、人參1.5、貝母2.5、杏仁4.5	湯	体力に関わらず、広く用いられる。	のどが痛くて声が出ない感冒	1	1	2	1	1	1	改正(最終31)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (6/20)

通し番号	処方番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしびり ^①					基準分類		
						しびり	症状	I	II	III	IV	V			
77	56	堅中湯	けんちゅうとう	半夏5、茯苓5、桂皮4、大棗3、芍薬3、乾姜3(生姜1でも可)、甘草1-1.5	湯	体力虚弱で、ときに胃部に水がたまる感じのするものの次の諸症	慢性胃炎、腹痛	1	2	0	0	0	0	0	新基準(213)
78	57	香砂養胃湯	こうしゃやういとう	白朮2.5-3、茯苓2.5-3、蒼朮2、厚朴2-2.5、陳皮2-2.5、香附子2-2.5、白豆蔻2(小豆蔻代用可)、人参1.5-2、木香1.5、縮砂1.5-2.5、甘草1.5-2.5、大棗1.5-2.5、生姜0.7-1	湯	体力虚弱なものの次の諸症	胃弱、胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振	1	2	0	0	0	0	0	新基準(213)
79	58	香蘇散	こうそさん	香附子3.5-4.5、蘇葉1-3、陳皮2-3、甘草1-1.5、生姜1-2	(1)散:1回1-2g 1日3回 (2)湯	体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症	かぜの初期、血の道症 ^②	2	1	0	0	0	0	0	新基準(213)
80	59	厚朴生姜半夏人参湯	こうぼくしょうきょうはんげにんじんかんそうとう	厚朴3、ヒネショウガ3(生姜を使用する場合1)、半夏4、人参1.5、甘草2.5	湯	体力虚弱で、腹部膨満感のあるものの次の諸症	胃腸虚弱、嘔吐	1	2	0	0	0	0	0	新基準(213)
81	60	牛膝散	ごしつさん	牛膝3、桂皮3、芍薬3、桃仁3、当帰3、牡丹皮3、延胡索3、木香1	湯	比較的体力があるものの次の諸症	月経困難、月経不順、月経痛	0	0	1	2	0	0	0	新基準(213)
82	61	五積散	ごしゃくさん	茯苓2-3、蒼朮2-3(白朮も可)、陳皮2-3、半夏2-3、当帰1.2-3、芍薬1-3、川芎1-3、厚朴1-3、白芷1-3、枳殼(実)1-3、桔梗1-3、乾姜1-1.5、生姜0.3-0.6(ヒネショウガを使用する場合1-2)、桂皮1-1.5、麻黄1-2.5、大棗1-2、甘草1-1.2、香附子1.2(生姜、香附子のない場合も可)	湯(原則として)	体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症	胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒	0	2	2	1	0	0	0	新基準(213)
83	62	呉茱萸湯	ごしゆゆとう	呉茱萸3-4、大棗2-4、人参2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-6)	湯	体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症	頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり	1	2	1	0	0	0	0	新基準(213)
84	63	五物解毒散	ごもつげどくさん	川芎5、金銀花2、十葉2、大黃1、荆芥1.5	湯	体力中等度以上のものの次の諸症	かゆみ、湿疹・皮膚炎	0	0	1	2	1	0	0	新基準(213)
85	64	五淋散	ごりんさん	茯苓5-6、当帰3、黄芩3、甘草3、芍薬1-2、山梔子1-2、地黄3、沢瀉3、滑石3、車前子3(地黄以下のない場合も可)	湯	体力中等度のものの次の諸症	頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり	0	1	2	1	0	0	0	新基準(213)
86	65	五苓散	ごれいさん	沢瀉4-6、猪苓3-4.5、茯苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3	(1)散:1回1-2g 1日3回 (2)湯	体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症	水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹 ^③)のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔	1	1	2	1	1	0	0	新基準(213)
87	65A	茵陳五苓散	いんちんごれいさん	沢瀉4.5-6、茯苓3-4.5、猪苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3、茵陳蒿3-4	(1)散:散の場合は茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬を湯の場合の1/8量を用いるか、茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬の合計が茵陳蒿の半量となるように用いる。(1回1-2g 1日3回) (2)湯	体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、尿量が少ないものの次の諸症	嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ	1	1	1	2	1	0	0	新基準(213)
88	65B	四苓湯	しれいとう	沢瀉4、茯苓4、蒼朮4(白朮も可)、猪苓4	(1)散:1回1-1.5g 1日2-3回 (2)湯	体力に関わらず使用でき、のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症	暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ	1	1	2	1	1	0	0	新基準(213)
89	66	柴葛解肌湯	さいかつけぎとう	柴胡3-5、葛根2.5-4、麻黄2-3、桂皮2-3、黄芩2-3、芍薬2-3、半夏2-4、生姜1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、甘草1-2、石膏4-8	湯	体力中等度以上で、激しい感冒様症状を示すものの次の諸症	発熱、悪寒、頭痛、四肢の痛み、口渴、不眠、鼻腔乾燥、食欲不振、はきけ、全身倦怠	0	0	1	2	1	0	0	改正(最終31)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (7/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしばり ^{a)}					基準 分類
						しばり	症状	I	II	III	IV	V	
90	66A	柴葛湯加川芎辛夷	さいかつとうかせん きゆうしんい	柴胡6、半夏3.5、黄芩3、桂皮5、芍 薬3、葛根6、麻黄2、竹節人參2、甘 草1、大棗1.2、生姜2.5、川芎3、辛 夷2	湯	体力中等度以上のものの次の諸症	慢性に経過した鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)	0	0	1	2	1	改正(最 終31)
91	67	柴梗半夏湯	さいきょうはんげとう	柴胡4、半夏4、桔梗2-3、杏仁2-3、 栝楼仁2-3、黄芩2.5、大棗2.5、枳 実1.5-2、青皮1.5-2、甘草1-1.5、生 姜1.5(ヒネショウガを使用する場合 2.5)	湯	体力中等度以上で、かぜがこじれたもの 次の症状	腹にひびく強度のせき	0	0	1	2	1	改正(最 終31)
92	68	柴胡加竜骨牡蛎湯	さいこかりゆうこつぽ れいとう	柴胡5、半夏4、茯苓3、桂皮3、大棗 2.5、人參2.5、竜骨2.5、牡蛎2.5、生 姜0.5-1、大黃1、黄芩2.5、甘草2以 内(大黃、黄芩、甘草のない場合 も可)	湯	体力中等度以上で、精神不安があつて、動 悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症	高血圧の随伴症状(動悸、不安、不眠)、神 経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘	0	0	1	2	1	新基準 (213)
93	69	柴胡枳椇湯	さいこききつとう	柴胡4-5、半夏4-5、生姜1(ヒネショ ウガを使用する場合3)、黄芩3、栝 楼仁3、枳椇3、甘草1-2、枳実1.5- 2	湯	体力中等度以上のものの次の諸症	せき、たん	0	0	1	2	1	改正(最 終31)
94	70	柴胡桂枝乾姜湯	さいこけいしかんきよ うとう	柴胡6-8、桂皮3、栝楼根3-4、黄芩 3、牡蛎3、乾姜2、甘草2	湯	体力中等度以下で、冷え症、貧血気味、神 経過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭 部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸 症	更年期障害、血の道症 ^{a)} 、不眠症、神経 症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気 管支炎	1	2	1	0	0	新基準 (213)
95	71	柴胡桂枝湯	さいこけいしとう	柴胡4-5、半夏4、桂皮1.5-2.5、芍 薬1.5-2.5、黄芩1.5-2、人參1.5-2、 大棗1.5-2、甘草1-1.5、生姜1(ヒネ ショウガを使用する場合2)	湯	体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を 伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけな どのあるものの次の諸症	胃腸炎、かぜの中期から後期の症状	0	2	2	1	0	新基準 (213)
96	72	柴胡清肝湯	さいこせいかんとう	散:柴胡2、当帰1.5-2.5、芍薬1.5- 2.5、川芎1.5-2.5、地黄1.5-2.5、黄 連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子 1.5、連翹1.5-2.5、栝楼1.5-2.5、牛 蒡子1.5-2.5、栝楼根1.5-2.5、薄荷 葉1.5-2.5、甘草1.5-2.5 湯:柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎 1.5、地黄1.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄 柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、栝楼 1.5、牛蒡子1.5、栝楼根1.5、薄荷葉 1.5、甘草1.5	(1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度で、瘡の強い傾向(神経過敏) にあるものの次の諸症	神経症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱 児の体質改善	0	1	2	1	0	新基準 (213)
97	73	柴朴湯	さいぼくとう	柴胡7、半夏5-8、生姜1-2(ヒネショ ウガを使用する場合3-4)、黄芩3、 大棗3、人參3、甘草2、茯苓4-5、厚 朴3、蘇葉2-3	湯	体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食 道部に異物感があり、かぜをひきやすく、と きに動悸、めまい、嘔気などを伴うもの 次の諸症	小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、 せき、不安神経症、虚弱体質	0	1	2	1	0	新基準 (213)
98	74	柴芎湯	さいれいとう	柴胡4-7、半夏4-5、生姜1(ヒネショ ウガを使用する場合3-4)、黄芩 2.5-3、大棗2.5-3、人參2.5-3、甘草 2-2.5、沢瀉4-6、猪苓2.5-4.5、茯苓 2.5-4.5、白朮2.5-4.5(蒼朮も可)、 桂皮2-3	湯	体力中等度で、のどが潤いて尿量が少な く、ときにははきけ、食欲不振、むくみなど を伴うもの次の諸症	水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、む くみ	0	1	2	1	0	新基準 (213)
99	75	左突膏	さとつこう	(外用)松脂800、黄蠟220、豚脂 58、ゴマ油1,000	外用		化膿性のはれもの	外用処方					新基準 (213)
100	76	三黄瀉心湯	さんおうしゃしんとう	大黃1-5、黄芩1-4、黄連1-4	湯:(振り出しの場合 1/3量を用いる)	体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅 潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘 傾向などのあるものの次の諸症	高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳な り、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便 秘、更年期障害、血の道症 ^{a)}	0	0	1	2	2	新基準 (213)
101	76A	三黄散	さんおうさん		散:1回0.8g 1日3回	体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅 潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘 傾向などのあるものの次の諸症	高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳な り、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便 秘、更年期障害、血の道症 ^{a)}	0	0	1	2	2	新基準 (213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (8/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしぼり ^①					基準 分類	
						しぼり	症状	I	II	III	IV	V		
102	77	酸棗仁湯	さんそうにんとう	酸棗仁10-18、知母2-3、川芎2-3、 茯苓2-5、甘草1	湯	体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症	不眠症、神経症	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
103	78	三物黄芩湯	さんもつおうごんとう	黄芩1.5-3、蒼朮3、地黄6	湯	体力中等度又はやや虚弱で、手足のほてりがあるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、手足のあれ(手足の湿疹・ 皮膚炎)、不眠	0	2	2	0	0	0	新基準 (213)
104	79	滋陰降火湯	じいんこうかとう	当帰2.5、芍薬2.5、地黄2.5、天門冬 2.5、麥門冬2.5、陳皮2.5、白朮ある いは蒼朮3、知母1-1.5、黄柏1- 1.5、甘草1-1.5、大棗1、生姜1(大 棗、生姜はなくても可)	湯	体力虚弱で、のどにうるおいがなく、たんが 切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥 し、便秘傾向のあるものの次の諸症	気管支炎、せき	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
105	80	滋陰至宝湯	じいんしほうとう	当帰2-3、芍薬2-3、白朮あるいは 蒼朮2-3、茯苓2-3、陳皮2-3、柴胡 1-3、知母2-3、香附子2-3、地骨皮 2-3、麥門冬2-3、貝母1-2、薄荷葉 1、甘草1	湯	体力虚弱なものの次の諸症	慢性のせき、たん、気管支炎	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
106	81	紫雲膏	しうんこう	(外用)紫根100-120、当帰60- 100、豚脂20-30、黄蠟300-400、ゴ マ油1,000	外用		ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせ も、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、 肛門裂傷、湿疹・皮膚炎	外用処方					新基準 (213)	
107	82	四逆散	しぎやくさん	柴胡2-5、芍薬2-4、枳実2、甘草1- 2	(1)散:1回2-2.5g 1日3 (2)湯	体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、 ときに不安、不眠などがあるものの次の 諸症	胃炎、胃痛、腹痛、神経症	0	0	2	2	1	0	新基準 (213)
108	82A	解勞散	かいろうさん	芍薬4-6、柴胡4-6、王別甲2-4、枳 実2-4、甘草1.5-3、茯苓2-3、生姜 1(ヒネショウガを使用する場合2- 3)、大棗2-3	湯	体力中等度又はやや虚弱で、胸腹部に重 苦しさがあり、ときに背中に痛みがあるもの の次の諸症	慢性の発熱、腹痛、胃痛	0	2	2	0	0	0	改正(類 方23)
109	82B	柴胡疎肝湯	さいこそかんと	柴胡4-6、芍薬3-4、枳実2-3、甘草 2-3、香附子3-4、川芎3、青皮2	湯	体力中等度で、胸腹部に重苦しさがあり、 ときに頭痛や肩背がこわばるものの次の諸 症	腹痛、側胸部痛、神経痛	0	1	2	1	0	0	改正(類 方23)
110	83	四逆湯	しぎやくとう	甘草2-4.8、乾姜1.5-3.6、加エブシ 0.3-2.4	湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が 冷えるものの次の諸症	感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ	2	1	0	0	0	0	改正(新 規27)
111	83A	四逆加人参湯	しぎやくかじんじんと	甘草2-4.8、乾姜1.5-3.6、加エブシ 0.5-2.4、人参1-3	湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し、貧血気 味で手足が冷えるものの次の諸症	感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、貧血	2	0	0	0	0	0	改正(新 規27)
112	84	四君子湯	しくんじんと	人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓 4、甘草1-2、生姜0.5-1、大棗1- 2	湯	体力虚弱で、痩せて顔色が悪くて、食欲が なく、疲れやすいものの次の諸症	胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、 下痢、夜尿症	2	1	0	0	0	0	新基準 (213)
113	85	滋血潤腸湯	じけつじゆんちやうとう	当帰4、地黄4、桃仁4、芍薬3、枳実 2-3、薤2-3、大黃1-3、紅花1	湯	体力中等度以下で、皮膚にうるおいがない ものの次の諸症	便秘、のぼせ、肩こり	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
114	86	紫根牡蛎湯	しこんぼれいとう	当帰4-5、芍薬3、川芎3、大黃0.5- 2、升麻1-2、牡蛎3-4、黄芩2、紫根 3-4、甘草1-2、忍冬1.5-2	湯	体力中等度以下のもので、消耗性疾患な どに伴うものの次の諸症	乳腺の痛み、痔の痛み、湿疹・皮膚炎、貧 血、疲労倦怠	1	2	1	0	0	0	改正(新 規27)
115	87	梔子鼓湯	ししじんと	山梔子1.4-3.2、香薷2-9.5	湯	体力中等度以下で、胸がふさがり苦しく、 熱感があるものの次の諸症	不眠、口内炎、舌炎、咽喉炎、湿疹・皮膚 炎	1	2	1	0	0	0	改正(最 終31)
116	88	梔子柏皮湯	ししはくひとう	山梔子1.5-4.8、甘草1-2、黄柏2-4	湯	体力中等度で、冷えはなく、ときにかゆみ があるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、かゆみ、目の充血	0	1	2	1	0	0	改正(最 終31)
117	89	滋腎通耳湯	じじんつうじんと	当帰2.5-3、川芎2.5-3、芍薬2.5-3、 知母2.5-3、地黄2.5-3、黄柏2.5-3、 白芷2.5-3、黄芩2.5-3、柴胡2.5-3、 香附子2.5-3	湯	体力虚弱なものの次の諸症	耳鳴り、聴力低下、めまい	1	2	0	0	0	0	改正(新 規27)
118	90	滋腎明目湯	じじんめいもくとう	当帰3-4、川芎3-4、熟地黄3-4、地 黄3-4、芍薬3-4、桔梗1.5-2、人参 1.5-2、山梔子1.5-2、黄連1.5-2、白 芷1.5-2、蔓荊子1.5-2、菊花1.5-2、 甘草1.5-2、細茶1.5、燈心草1-1.5 (燈心草のない場合も可)	湯	体力虚弱なものの次の諸症	目のかすみ、目の疲れ、目の痛み	1	2	0	0	0	0	改正(新 規27)
119	91	柿蒂湯	していとう	丁子1-1.5、柿蒂5、ヒネショウガ4 (生姜を使用する場合1)	湯	体力に関わらず、使用できる。	しゃっくり	2	2	2	2	2	2	新基準 (213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (9/20)

通し番号	処方番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしばり ¹⁾					基準分類	
						しばり	症状	I	II	III	IV	V		
120	92	四物湯	しもつとう	当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黄3-5	(1)散:1回1.5-2g 1日3回 (2)湯	体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症	月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症 ²⁾ 、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復	1	2	0	0	0	0	新基準(213)
121	92A	加味四物湯	かみしもつとう	当帰2.5-3、川芎2-3、芍薬2-3、地黄3-8、蒼朮3(白朮2.5も可)、婁門冬2.5-5、人參1.5-2.5、牛膝1-2.5、黄柏1.5-2.5、五味子1-1.5、黄連1.5、知母1-1.5、杜仲1.5-2	湯	体力虚弱で、血色がすぐれないものの次の諸症	下肢の筋力低下、神経痛、関節の腫れや痛み	2	2	0	0	0	0	改正(類方23)
122	92B	芎歸膠艾湯	きゅうきぎょうがいたう	川芎3、甘草3、艾葉3、当帰4-4.5、芍薬4-4.5、地黄5-6、阿膠3	湯	体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症	痔出血、貧血、月経異常・月経過多・不正出血、皮下出血	1	2	1	0	0	0	新基準(213)
123	92C	七物降下湯	しちもつこうかとう	当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黄3-5、釣藤鈎3-4、黄耆2-3、黄柏2	湯	体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症	高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)	1	2	1	0	0	0	新基準(213)
124	92D	当帰飲子	とうきいんし	当帰5、芍薬3、川芎3、茯苓子3、防風3、地黄4、荊芥1.5、黄耆1.5、何首烏2、甘草1	湯	体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症	湿疹・皮膚炎(分泌物の少ないもの)、かゆみ	1	2	1	0	0	0	新基準(213)
125	93	炙甘草湯	しゃかんぞうとう	炙甘草3-4、生薬0.8-1(ヒネショウガを使用する場合3)、桂皮3、麻子仁3-4、大棗3-7.5、人參2-3、地黄4-6、婁門冬5-6、阿膠2-3	湯	体力中等度以下で、疲れやすく、ときに手足のほてりなどがあるものの次の諸症	動悸、息切れ、脈のみだれ	1	2	1	0	0	0	新基準(213)
126	94	芍薬甘草湯	しゃくやくかんぞうとう	芍薬3-8、甘草3-8	湯	体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症	こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛	2	2	2	2	2	2	新基準(213)
127	94A	芍薬甘草附子湯	しゃくやくかんぞうぶしとう	芍薬3-10、甘草3-8、加工ゴブシ0.3-1.6	湯	体力中等度以下で、冷えを伴うものの次の諸症	こむらがり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神経痛	2	2	1	0	0	0	改正(類方23)
128	95	鷓鴣菜湯(三味鷓鴣菜湯)	しゃこさいとう/さんみしゃこさいとう	海人草3-5、大黃1-1.5、甘草1-2	湯	体力に関わらず、使用できる。	回虫の駆除	1	1	1	1	1	1	新基準(213)
129	96	蛇床子湯	じゃしょうしとう	(外用)蛇床子10、当帰10、威靈仙10、苦参10	水1,000mLを加えて濃縮し700mLとし外用する。		ただれ、かゆみ、たむし	外用処方					新基準(213)	
130	97	十全大補湯	じゅうぜんたいほとう	人參2.5-3、黄耆2.5-3、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、当帰3-4、芍薬3、地黄3-4、川芎3、桂皮3、甘草1-2	湯(原則として)	体力虚弱なもの次の諸症	病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	2	1	0	0	0	0	新基準(213)
131	98	十味敗毒湯	じゅうみはいどくとう	柴胡2.5-3.5、椴皮(椴楸)2.5-3.5、桔梗2.5-3.5、川芎2.5-3.5、茯苓2.5-4、独活1.5-3、防風1.5-3.5、甘草1-2、生薬1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、荊芥1-2、連翹2-3(連翹のない場合も可)	(1)散:1回1.5-2g 1日3回 (2)湯	体力中等度なもの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫	0	1	2	1	0	0	新基準(213)
132	99	潤腸湯	じゅんちやうとう	当帰3-4、熟地黄・乾地黄 各3-4(又は地黄6)、麻子仁2、桃仁2、杏仁2、枳実0.5-2、黄耆2、厚朴2、大黃1-3、甘草1-1.5	(1)散:1回2-3g 1日3回 (2)湯:上記量を1日量	体力中等度又はやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状	便秘	0	2	2	0	0	0	新基準(213)
133	100	蒸眼一方	じやうがんにっぽう	(外用)白礬(明礬)2、甘草2、黄連2、黄柏2、紅花2	各生薬を混合後、水300mLを加え煎じて200mLとする。洗眼又は温湿布する。		ものもらい、ただれ目、はやり目	外用処方					新基準(213)	
134	101	小建中湯	しょうけんちやうとう	桂皮3-4、生薬1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、大棗3-4、芍薬6、甘草2-3、膠飴20(マルツエキス、滋養糖可、水飴の場合40)	湯	体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症	小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き	1	2	0	0	0	0	新基準(213)
135	101A	黄耆建中湯	おうぎけんちやうとう	桂皮3-4、生薬1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、大棗3-4、芍薬6、甘草2-3、黄耆1.5-4、膠飴20(膠飴はなくても可)	湯	体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症	虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、皮膚のただれ、腹痛、冷え症	2	1	0	0	0	0	新基準(213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (10/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしばり ^{o)}					基準 分類	
						しばり	症状	I	II	III	IV	V		
136	101B	帰春建中湯	きぎけんちゅうとう	当帰3-4、桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2-4)、大棗3-4、芍薬5-6、甘草2-3、黄耆2-4、膠飴20(膠飴はなくても可)	湯	体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症	虚弱体質、病後・術後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、化膿性皮膚疾患	2	1	0	0	0	0	新基準 (213)
137	101 C	当帰建中湯	とうきけんちゅうとう	当帰4、桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、大棗3-4、芍薬5-7.5、甘草2-2.5、膠飴20(膠飴はなくても可)	湯	体力虚弱で、疲労しやすい血色のすぐれないものの次の諸症	月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
138	102	小柴胡湯	しょうさいこうとう	柴胡5-8、半夏3.5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩2.5-3、大棗2.5-3、人参2.5-3、甘草1-3	湯	体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症	食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状	0	0	2	1	0	0	新基準 (213)
139	102A	柴陥湯	さいかんとう	柴胡5-8、半夏5-8、黄芩3、大棗3、人参2-3、甘草1.5-3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、栝楼仁3、黄連1-1.5	湯	体力中等度以上で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振で口が苦く、舌に白苔がつき、強いせきが出たんが切れにくく、ときに胸痛があるものの次の諸症	せき、胸痛、気管支炎	0	0	1	2	1	0	新基準 (213)
140	102B	柴蘇飲	さいそいん	柴胡5、半夏5、黄芩3、人参3、大棗3、香附子4、蘇葉1.5-3、甘草1.5、陳皮2、生姜1	湯	体力中等度で、ときに胸脇(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、やや神経質で気鬱傾向を認めるものの次の諸症	耳鳴り、耳閉感	0	1	2	1	0	0	改正(類 方23)
141	102 C	小柴胡湯加桔梗石膏	しょうさいこうかき きょうせつこう	柴胡7、半夏5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、黄芩3、大棗3、人参3、甘草2、桔梗3、石膏10	湯	比較的体力があり、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつき、のどがはれて痛むものの次の諸症	のどの痛み、扁桃炎、扁桃周囲炎	0	0	2	2	0	0	新基準 (213)
142	102 D	清肌安蛔湯	せいきあんかいとう	柴胡6-7、半夏5-6、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、人参3、黄芩3、甘草2、海人草3、麦門冬3	湯	体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の症	回虫の駆除	0	0	2	1	0	0	新基準 (213)
143	103	小承気湯	しょうじょうきとう	大黃2-4、枳実2-4、厚朴2-3	湯	比較的体力があり、腹部が張って膨満し、ときに発熱するものの次の症状	便秘	0	0	1	2	0	0	新基準 (213)
144	104	小青竜湯	しょうせいりゅうとう	麻黄2-3.5、芍薬2-3.5、乾姜2-3.5、甘草2-3.5、桂皮2-3.5、細辛2-3.5、五味子1-3、半夏3-8	湯	体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症	気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症	0	2	1	0	0	0	新基準 (213)
145	104A	小青竜湯加杏仁石膏 (小青竜湯合麻杏甘 石湯)	しょうせいりゅうとうか きょうにんせつこう/ しょうせいりゅうとう まきしょうかんせきとう	麻黄2-4、芍薬2-3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮2-3、細辛2-3、五味子1.5-3、半夏3-6、杏仁4、石膏5-10	湯	体力中等度で、せきが出て、のどの渇きがあるものの次の諸症	気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
146	104B	小青竜湯加石膏	しょうせいりゅうとうか せつこう	麻黄3、芍薬3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮3、細辛2-3、五味子2-3、半夏6-8、石膏2-5	湯	体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渇きがあるものの次の諸症	気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
147	105	椒梅湯	しょうばいとう	烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川椒子2、厚朴2、甘草2、乾姜2	湯	体力に関わらず、使用できる。	回虫の駆除	1	1	1	1	1	1	新基準 (213)
148	106	小半夏加茯苓湯	しょうはんげかぶくりよ うとう	半夏5-8、ヒネショウガ5-8(生姜を用いる場合1.5-3)、茯苓3-8	湯	体力に関わらず使用でき、悪心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症	つわり、嘔吐、悪心、胃炎	1	2	1	1	1	1	新基準 (213)
149	107	消風散	しょうふうさん	当帰3、知母1-2、地黃3、胡麻1-1.5、石膏3-5、蝉退1-1.5、防風2、苦参1-1.5、蒼朮2-3(白朮も可)、荆芥1-2、木通2-5、甘草1-1.5、牛蒡子2	湯	体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも	0	0	2	2	1	0	新基準 (213)
150	108	升麻葛根湯	しょうまかっこんとう	葛根5-6、升麻1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、芍薬3、甘草1.5-3	湯	体力中等度で、頭痛、発熱、悪寒などがあるものの次の諸症	感冒の初期、湿疹・皮膚炎	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (11/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしぼり ^{a)}					基準 分類
						しぼり	症状	I	II	III	IV	V	
151	109	逍遙散(八味逍遙散)	しょうようさん／ほち みしょうようさん	当帰3-4.5、芍薬3-4.5、柴胡3-4.5、 白朮3-4.5(蒼朮も可)、茯苓3-4.5、 甘草1.5-3、生薑0.5-1、薄荷葉1- 2.1	湯	体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく 精神不安などの精神神経症状、ときに便秘 の傾向のあるものの次の諸症	冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、 更年期障害、血の道症 ^{a)} 、不眠症、神経症	1	2	1	0	0	新基準 (213)
152	109A	加味逍遙散	かみしょうようさん	当帰3、芍薬3、白朮3(蒼朮も可)、 茯苓3、柴胡3、牡丹皮2、山梔子2、 甘草1.5-2、生薑1、薄荷葉1	湯	体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩が こり、疲れやすく、精神不安やいらだちなど の精神神経症状、ときに便秘の傾向のある ものの次の諸症	冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、 更年期障害、血の道症 ^{a)} 、不眠症	1	2	1	0	0	新基準 (213)
153	109B	加味逍遙散加川芎地 黄(加味逍遙散合四 物湯)	かみしょうようさんか せんきゅうじおう／か みしょうようさんごうし もつとう	当帰3-4、芍薬3-4、白朮3(蒼朮も 可)、茯苓3、柴胡3、川芎3-4、地黄 3-4、甘草1.5-2、牡丹皮2、山梔子 2、生薑1-2、薄荷葉1	湯	体力中等度以下で、皮膚があらえてかさかさ し、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、 肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだち などの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘 の傾向のあるものの次の諸症	湿疹・皮膚炎、しみ、冷え症、虚弱体質、月 経不順、月経困難、更年期障害、血の道症 ^{a)}	1	2	1	0	0	新基準 (213)
154	110	辛夷清肺湯	しんいせいはいとう	辛夷2-3、知母3、百合3、黄芩3、山 梔子1.5-3、麦門冬5-6、石膏5-6、 升麻1-1.5、枇杷葉1-3	湯	体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、とき に熱感を伴うものの次の諸症	鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)	0	0	2	2	1	新基準 (213)
155	111	秦艽羌活湯	じんぎょうきょうかつ とう	秦艽3、羌活5、黄耆3、防風2、升麻 1.5、甘草1.5、麻黄1.5、柴胡1.5、黨 本0.5、細辛0.5、紅花0.5	湯	体力中等度なもの次の症状	かゆみのある痔疾	0	0	2	0	0	新基準 (213)
156	112	秦艽防風湯	じんぎょうぼうふうとう	秦艽2、沢瀉2、陳皮2、柴胡2、防風 2、当帰3、蒼朮3、甘草1、黄柏1、 升麻1、大黃1、桃仁3、紅花1	湯	体力中等度で、便秘傾向があるものの次 の症状	痔核で排便痛のあるもの	0	0	2	0	0	新基準 (213)
157	113	神仙太乙膏	しんせんたいつこう	(外用)当帰1、桂皮1、大黃1、芍薬 1、地黄1、玄参1、白芷1、ゴマ油 30-48、黄蠟12-48	外用		切り傷、かゆみ、虫刺され、軽いとこずれ、 やけど	外用処方					改正(最 終31)
158	114	参蘇飲	じんそいん	蘇葉1-3、枳実1-3、桔梗2-3、陳皮 2-3、葛根2-6、前胡2-6、半夏3、 茯苓3、人参1.5-2、大棗1.5-2、生 薑0.5-1(ヒネショウガを使用する場 合1.5-3、生薑の代わりに乾姜も 可)、木香1-1.5、甘草1-2(木香は なくても可)	湯	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症	感冒、せき	1	2	0	0	0	新基準 (213)
159	115	神秘湯	しんぴとう	麻黄3-5、杏仁4、厚朴3、陳皮2-3、 甘草2、柴胡2-4、蘇葉1.5-3	湯	体力中等度で、せき、喘鳴、息苦しさがあり、 たんが少ないものの次の諸症	小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎	0	0	2	1	0	新基準 (213)
160	116	真武湯	しんぶとう	茯苓3-5、芍薬3-3.6、白朮2-3(蒼 朮も可)、生薑1(ヒネショウガを使用 する場合2-3.6)、加工ブシ0.3- 1.5	湯	体力虚弱で、冷えがあつて、疲労倦怠感が あり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるもの の次の諸症	下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、 動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚の かゆみ	2	1	0	0	0	改正(新 規27)
161	117	参苓白朮散	じんれいひやくじゆつ さん	人参1.5-3、山薬1.2-4、白朮1.5-4、 茯苓1.5-4、蒼朮0.8-8、扁豆1- 4、蓮肉0.8-4、桔梗0.8-2.5、縮砂 0.8-2、甘草0.8-2	(1)散・1回1.5-2g 1日3 (2)湯	体力虚弱で、胃腸が弱く、痩せて顔色が悪 く、食欲がなく下痢が続く傾向があるもの の次の諸症	食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲 労倦怠、消化不良、慢性胃腸炎	2	1	0	0	0	新基準 (213)
162	118	清湿化痰湯	せいしつけたんとう	天南星3、黄芩3、生薑1(ヒネショウ ガを使用する場合3)、半夏3-4、茯 苓3-4、蒼朮3-4(白朮も可)、陳皮 2-3、羌活1.5-3、白芷1.5-3、白芥 子1.5-3、甘草1-1.5	湯	体力中等度以下で、背中に冷感があり痛 みがあるものの次の諸症	神経痛、関節痛、筋肉痛	1	2	2	0	0	新基準 (213)
163	119	清上蠲痛湯(驅風触 痛湯)	せいじょうけんつうとう ／くふうしょくつうとう	麦門冬2.5-6、黄芩3-5、羌活2.5- 3、独活2.5-3、防風2.5-3、蒼朮2.5- 3(白朮も可)、当帰2.5-3、川芎2.5- 3、白芷2.5-3、蔓荊子1.5-2、細辛 1、甘草1、黨本1.5、菊花1.5-2、生 薑0.5-1(ヒネショウガを使用する場 合1.5-2.5)(黨本、菊花、生薑はな くても可)	湯	体力に関わらず使用でき、慢性化した痛み のあるものの次の諸症	顔面痛、頭痛	1	1	2	1	1	新基準 (213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (12/20)

通し番号	処方番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしびり ^{o)}					基準分類
						しびり	症状	I	II	III	IV	V	
164	120	清上防風湯	せいじょうぼうふうとう	荊芥1-1.5、黄連1-1.5、薄荷葉1-1.5、枳実1-1.5、甘草1-1.5、山梔子1.5-3、川芎2-3、黄芩2-3、連翹2.5-3、白芷2.5-3、桔梗2.5-3、防風2.5-3	湯	体力中等度以上で、赤ら顔で、ときにのぼせがあるものの次の諸症	にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな(酒さ)	0	0	2	2	1	新基準(213)
165	121	清暑益気湯	せいしよえつきとう	人參3-3.5、白朮3-3.5(蒼朮も可)、麥門冬3-3.5、当歸3、黄耆3、陳皮2-3、五味子1-2、黄柏1-2、甘草1-2	湯	体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渇などがあるものの次の諸症	暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振	1	2	0	0	0	新基準(213)
166	122	清心蓮子飲	せいしんれんしん	蓮肉4-5、麥門冬3-4、茯苓4、人參3-5、車前子3、黄芩3、黄耆2-4、地骨皮2-3、甘草1.5-2	湯	体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症	残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ(おりもの)	1	2	1	0	0	新基準(213)
167	123	清熱補気湯	せいねつほきとう	人參3、白朮3-4、茯苓3-4、当歸3、芍薬3、升麻0.5-1、五味子1、玄参1-2、麥門冬3、甘草1	湯	体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症	口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥	1	2	1	0	0	改正(新規27)
168	124	清熱補血湯	せいねつほけつとう	当歸3、川芎3、芍薬3、地黄3、玄参1.5、知母1.5、五味子1.5、黄柏1.5、麥門冬1.5-3、柴胡1.5、牡丹皮1.5	湯	体力中等度以下で、胃腸障害はなく、貧血気味で皮膚が乾燥しているものの次の諸症	口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥	1	2	1	0	0	改正(新規27)
169	125	清肺湯	せいはいとう	黄芩2-2.5、桔梗2-2.5、桑白皮2-2.5、杏仁2-2.5、山梔子2-2.5、天門冬2-2.5、貝母2-2.5、陳皮2-2.5、大菘2-2.5、竹茹2-2.5、茯苓3、当歸3、麥門冬3、五味子0.5-1、生姜1、甘草1	湯	体力中等度で、せきが続く、たんが多くて切れにくいものの次の諸症	たんの多く出るせき、気管支炎	0	1	2	0	0	新基準(213)
170	126	折衝飲	せつしょういん	牡丹皮3、川芎3、芍薬3、桂皮3、桃仁4-5、当歸4-5、延胡索2-2.5、牛膝2-2.5、紅花1-1.5	湯	体力中等度以上で、下腹部痛があるものの次の諸症	月経不順、月経痛、月経困難、神経痛、腰痛、肩こり	0	0	2	2	1	新基準(213)
171	127	洗肝明目湯	せんかんめいもくとう	当歸1.5、川芎1.5、芍薬1.5、地黄1.5、黄芩1.5、山梔子1.5、連翹1.5、防風1.5、決明子1.5、黄連1-1.5、荊芥1-1.5、薄荷1-1.5、羌活1-1.5、蔓荊子1-1.5、菊花1-1.5、桔梗1-1.5、菴梨子1-1.5、甘草1-1.5、石膏1.5-3	湯	体力中等度のものの次の諸症	目の充血、目の痛み、目の乾燥	0	1	2	1	0	改正(最終31)
172	128	川芎茶調散	せんきゆうちやちようさん	白芷2、羌活2、荊芥2、防風2、薄荷葉2、甘草1.5、細茶1.5、川芎3、番附子3-4	湯	体力に関わらず使用でき、頭痛があるものの次の諸症	かぜ、血の道症 ^{o)} 、頭痛	1	1	2	1	1	新基準(213)
173	129	千金鷄鳴散	せんきんけいめいさん	大黃1-2、当歸4-5、桃仁4-5	湯	体力に関わらず、使用できる。	打撲のはれと痛み	1	1	2	1	1	新基準(213)
174	130	千金内托散	せんきんないたくさん	黄耆2、当歸3-4、人參2-3、川芎2、防風2、桔梗2、白芷1-2、厚朴2、甘草1-2、桂皮2-4(金銀花2を加えても可)	湯	体力虚弱で、患部が化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患の初期、痔、軽いとこずれ	1	2	0	0	0	改正(新規27)
175	131	喘四君子湯	ぜんしくんしとう	人參2-3、白朮2-4、茯苓2-4、陳皮2、厚朴2、縮砂1-2、紫蘇子2、沈香1-1.5、桑白皮1.5-2、当歸2-4、木香1-1.5、甘草1-3、生姜1、大菘2(生姜、大菘なくても可)	湯	体力虚弱で、胃腸の弱いものの次の諸症	気管支ぜんそく、息切れ	2	1	0	0	0	改正(最終31)
176	132	錢氏白朮散	ぜんしびやくじゆつさん	白朮4、茯苓4、葛根4、人參3、薑香1、木香1、甘草1	湯 小児の消化不良の効能については小児用量に注意のこと。	体力虚弱で、嘔吐や下痢があり、ときに口渇や発熱があるものの次の諸症	感冒時の嘔吐・下痢、小児の消化不良	1	2	0	0	0	新基準(213)
177	133	続命湯	ぞくめいとう	麻黄3、桂皮3、当歸3、人參3、石膏3-6、乾姜2-3、甘草2-3、川芎1.5-3、杏仁2.5-4	湯	体力中等度以上のものの次の諸症	しびれ、筋力低下、高血圧に伴う症状(めまい、耳鳴り、肩こり、頭痛、頭重、頭部圧迫感)、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛、関節のはれや痛み、頭痛、むくみ	0	0	1	2	1	改正(新規27)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (13/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしびり ^①					基準 分類	
						しびり	症状	I	II	III	IV	V		
178	133A	小續命湯	しょうぞくめいとう	麻黄2-4、防己2-3、人参1-3、黄芩2-3、桂皮2-4、甘草1-4、芍薬2-3、川芎2-3、杏仁3-3.5、加工ブシ0.3-1、防風2-4、生姜1-3(ヒネシヨウガを使用する場合4-10)	湯	体力中等度以下のもの次の諸症	しびれ、筋力低下、気管支ぜんそく、気管支炎	1	2	1	0	0	0	改正(新規27)
179	134	疎経活血湯	そけいかっけつとう	当帰2-3.5、地黄2-3、川芎2-2.5、蒼朮2-3(白朮も可)、茯苓1-2、桃仁2-3、芍薬2.5-4.5、牛膝1.5-3、威靈仙1.5-3、防己1.5-2.5、羌活1.5-2.5、防風1.5-2.5、竜胆1.5-2.5、生姜0.5、陳皮1.5-3、白芷1-2.5、甘草1	湯	体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるもの次の諸症	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛	0	1	2	1	0	0	新基準(213)
180	135	蘇子降気湯	そしこうきとう	紫蘇子3-5(蘇葉可)、半夏3-5、陳皮2-3、前胡2-3、桂皮2-3、当帰2.5-3、厚朴2-3、大棗1-2、生姜0.5-1又は乾姜0.5-1、甘草1-2	湯	体力虚弱で、足冷えや顔のほせがあり、息苦しさのあるもの次の諸症	慢性気管支炎、気管支ぜんそく	1	2	0	0	0	0	新基準(213)
181	136	大黃甘草湯	だいおうかんぞうとう	大黃4-10、甘草1-5	(1)散:1回0.75-1.5g 1日1-2回 (2)湯	体力に関わらず、使用できる。	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和	1	1	2	1	1	0	新基準(213)
182	137	大黃附子湯	だいおうぶしとう	大黃1-3、加工ブシ0.2-1.5、細辛2-3	湯	体力中等度以下で、冷えて、ときに便秘するもの次の諸症	腹痛、神経痛、便秘	1	2	2	0	0	0	改正(最終31)
183	138	大黃牡丹皮湯	だいおうぼたんぴとう	大黃1-5、牡丹皮1-4、桃仁2-4、芒硝3.6-4、冬瓜子2-6	湯	体力中等度以上で、下腹部痛があつて、便秘しがちなもの次の諸症	月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾	0	0	1	2	2	0	新基準(213)
184	139	大建中湯	だいけんちゅうとう	山椒1-2、人参2-3、乾姜3-5、膠飴20-64	湯	体力虚弱で、腹が冷えて痛むもの次の諸症	下腹部痛、腹部膨満感	2	2	0	0	0	0	新基準(213)
185	139A	中建中湯	ちゅうけんちゅうとう	桂皮4、芍薬6、甘草2、大棗4、山椒2、乾姜1、人参3、(膠飴20を加えることもある)	湯	体力中等度以下で、腹痛を伴うもの次の諸症	慢性胃腸炎、下痢、便秘	1	2	1	0	0	0	改正(類方23)
186	140	大柴胡湯	だいさいことう	柴胡6-8、半夏2.5-8、生姜1-2(ヒネシヨウガを使用する場合4-5)、黄芩3、芍薬3、大棗3-4、枳実2-3、大黃1-2	湯	体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるもの次の諸症	胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症	0	0	0	1	2	0	新基準(213)
187	140A	大柴胡湯去大黃	だいさいことうきよだいおう	柴胡6-8、半夏3-8、生姜1-2(ヒネシヨウガを使用する場合4-5)、黄芩3-6、芍薬3、大棗3、枳実2-3	湯	体力中等度以上で、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しいもの次の諸症	胃炎、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛、神経症	0	0	1	2	1	0	新基準(213)
188	141	大半夏湯	だいはんげとう	半夏7、人参3、ハチミツ20	湯	体力中等度以下で、みぞおちがつかえた感じがあるもの次の諸症	嘔吐、むかつき、はきけ、悪心	1	2	1	0	0	0	新基準(213)
189	142	大防風湯	だいぼうふうとう	地黄2.5-3.5、芍薬2.5-3.5、甘草1.2-1.5、防風2.5-3.5、白朮2.5-4.5(蒼朮も可)、加工ブシ0.5-2、杜仲2.5-3.5、羌活1.2-1.5、川芎2-3、当帰2.5-3.5、牛膝1.2-1.5、生姜0.5-1(乾姜1も可)、ヒネシヨウガを使用する場合1.2-1.5)、黄芩2.5-3.5、人参1.2-1.5、大棗1.2-2	湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血気味なもの次の諸症	慢性関節炎、関節のはれや痛み、神経痛	2	1	0	0	0	0	改正(最終31)
190	143	沢瀉湯	たくしゃとう	沢瀉5-6、白朮2-3	湯	体力に関わらず、使用できる。	めまい、頭重	2	2	2	2	2	0	改正(類方23)
191	144	治頭瘡一方	ぢずそういっぽう	連翹3-4、蒼朮3-4、川芎3、防風2-3、忍冬2-3、荆芥1-4、甘草0.5-1.5、紅花0.5-2、大黃0.5-2	湯	体力中等度以上のもの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるもの次の諸症	湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎	0	0	2	2	1	0	新基準(213)
192	144A	治頭瘡一方去大黃	ぢずそういっぽうきよだいおう	連翹3、蒼朮3、川芎3、防風2、忍冬2、荆芥1、甘草1、紅花1	湯	体力中等度以下で、下痢傾向があるもの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるもの次の諸症	湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎	1	2	1	0	0	0	新基準(213)
193	145	治打撲一方	ぢだぼくいっぽう	川芎3、檳榔(又は桜皮)3、川骨3、桂皮3、甘草1.5、丁子1-1.5、大黃1-1.5	湯	体力に関わらず使用でき、はれ、痛みがあるもの次の諸症	打撲、捻挫	1	1	2	1	1	0	新基準(213)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (14/20)

通し番号	処方番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしぼり ^①					基準分類	
						しぼり	症状	I	II	III	IV	V		
194	146	中黄膏	ちゅうおうこう	(外用)ゴマ油1000mL、黄蠟380、 麝香40、黄柏20	外用		急性化膿性皮膚疾患(はれもの)の初期、 うち身、捻挫	外用処方					新基準 (213)	
195	147	調胃承気湯	ちよういじようきとう	大黄2-6.4、芒硝1-6.5、甘草1-3.2	湯	体力中等度なものの次の諸症	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚 炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減 退)・腹部膨満、腸内異常発酵・痔などの症 状の緩和	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
196	148	丁香柿蒂湯	ちようこうしていとう	柿蒂3、桂皮3、半夏3、陳皮3、丁子 1、良姜1、木香1、沈香1、茴香1、 藿香1、厚朴1、縮砂1、甘草1、乳香 1	湯	体力中等度以下のものの次の諸症	しゃっくり、胃腸虚弱	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
197	149	釣藤散	ちようとうさん	釣藤鈎3、橘皮3(陳皮も可)、半夏 3、麦門冬3、茯苓3、人参2-3、防風 2-3、菊花2-3、甘草1、生姜1、石膏 5-7	湯	体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めま い、肩こりなどがあるものの次の諸症	慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるも の	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
198	150	猪苓湯	ちよれいとう	猪苓3-5、茯苓3-5、滑石3-5、沢瀉 3-5、阿膠3-5	湯	体力に関わらず使用でき、排尿異常があ り、ときに口が渇くものの次の諸症	排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ	1	1	2	1	1	0	新基準 (213)
199	150A	猪苓湯合四物湯	ちよれいとうごうしもつ とう	当帰3、芍薬3、川芎3、地黄3、猪苓 3、茯苓3、滑石3、沢瀉3、阿膠3	湯	体力に関わらず使用でき、皮膚が乾燥し、 色つやが悪く、胃腸障害のない人で、排尿 異常があり口が渇くものの次の諸症	排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿	1	1	2	1	1	0	新基準 (213)
200	151	通導散	つうどうさん	当帰3、大黄3、芒硝3-4、枳実(枳 殼でも可)2-3、厚朴2、陳皮2、木通 2、紅花2-3、蘇木2、甘草2-3	湯	体力中等度以上で、下腹部に圧痛があっ て便秘しがちなものの次の諸症	月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、 打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、 めまい、肩こり)	0	0	1	2	2	0	新基準 (213)
201	152	桃核承気湯	とうかくじようきとう	桃仁5、桂皮4、大黄3、芒硝2、甘草 1.5	湯	体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちな ものの次の諸症	月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や 産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随 伴症状(頭痛、めまい、肩こり)、痔疾、打撲 傷	0	0	1	2	2	0	新基準 (213)
202	153	当帰散	とうきさん	当帰2-3、芍薬2-3、川芎2-3、黄芩 2-3、白朮1-1.5(蒼朮も可)	(1)散:1回1-2g 1日3 回 (2)湯	体力中等度以下のものの次の諸症	産前産後の障害(貧血、疲労倦怠、めま い、むくみ)	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
203	154	当帰四逆湯	とうきしぎやくとう	当帰1.8-4、桂皮1.8-4、芍薬1.8-4、 木通2-3、大棗1.8-6.5、細辛1.8-3、 甘草1.2-2.5	湯	体力中等度以下で、手足が冷えて下腹部 が痛くなりやすいものの次の諸症	しもやけ、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛、 冷え症	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
204	154A	当帰四逆加呉茱萸生 姜湯	とうきしぎやくかごしゆ ゆしよきようとう	当帰3-4、桂皮3-4、芍薬3-4、木通 1.5-3、細辛2-3、甘草1.5-2、大棗 4-6.5、呉茱萸1-6、生姜0.5-2(ヒネ ショウガを使用する場合4-8)	湯	体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下 肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くな りやすいものの次の諸症	冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、 下痢、月経痛	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
205	155	当帰芍薬散	とうきしゃくやくさん	当帰3-3.9、川芎3、芍薬4-16、茯 苓4-5、白朮4-5(蒼朮も可)、沢瀉 4-12	(1)散:1回1-2g 1日3 回 (2)湯	体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲 勞しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めま い、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるもの の次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障 害、産前産後あるいは流産による障害(貧 血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立 ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え 症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
206	155A	当帰芍薬散加黄耆釣 藤	とうきしゃくやくさんか おうぎちようとう	当帰3、沢瀉4、川芎3、芍薬4、茯苓 4、蒼朮4(白朮も可)、黄耆3、釣藤 鈎4	湯	体力虚弱で血圧が高く、冷え症で貧血の傾 向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、 頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを 訴えるものの次の諸症	高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴 り、頭重)	1	2	0	0	0	0	改正(類 方23)
207	155B	当帰芍薬散加人参	とうきしゃくやくさんか にんじん	当帰3.5、沢瀉3.5、川芎3、芍薬4、 茯苓3.5、白朮3(蒼朮も可)、人参 1-2	湯	体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾 向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、 頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを 訴えるものの次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障 害、産前産後あるいは流産による障害(貧 血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立 ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え 症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り	2	2	0	0	0	0	改正(類 方23)
208	155 C	当帰芍薬散加附子	とうきしゃくやくさんか ぶし	当帰3、沢瀉4、川芎3、加工フシ 0.4、芍薬4、茯苓4、白朮4(蒼朮も 可)	湯	体力虚弱で、冷えが強く、貧血の傾向があ り疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、め まい、肩こり、耳鳴り、動悸などがあるもの の次の諸症	月経不順、月経異常、月経痛、更年期障 害、産前産後あるいは流産による障害(貧 血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立 ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え 症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り	2	2	0	0	0	0	改正(類 方23)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (15/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果					基準 分類		
						しぼり	症状	I	II	III		IV	V
209	156	当帰湯	とうきとう	当帰5、半夏5、芍薬3、厚朴3、桂皮3、人参3、乾姜1.5、黄耆1.5、山椒1.5、甘草1	湯	体力中等度以下で、背中に冷感があり、腹部膨満感や腹痛・胸背部痛のあるものの次の諸症	胸痛、腹痛、胃炎	1	2	1	0	0	新基準 (213)
210	157	当帰貝母苦参丸料	とうきばいもくじんがんりょう	当帰3、貝母3、苦参3	湯	体力中等度以下のものの次の諸症	小便がしぶって出にくいもの、排尿困難	1	2	1	0	0	新基準 (213)
211	158	独活湯	どっかつとう	独活2、羌活2、防風2、桂皮2、大黄2、沢瀉2、当帰3、桃仁3、連翹3、防己5、黄柏5、甘草1.5	湯	体力中等度なものの次の諸症	腰痛、手足の屈伸痛	0	1	2	1	0	新基準 (213)
212	159	二朮湯	にじゅつとう	白朮1.5-2.5、茯苓1.5-2.5、陳皮1.5-2.5、天南星1.5-2.5、香附子1.5-2.5、黄耆1.5-2.5、威靈仙1.5-2.5、羌活1.5-2.5、半夏2-4、蒼朮1.5-3、甘草1-1.5、生薬0.6-1	湯	体力中等度で、肩や上腕などに痛みがあるものの次の諸症	四十肩、五十肩	0	1	2	0	0	新基準 (213)
213	160	二陳湯	にちんとう	半夏5-7、茯苓3.5-5、陳皮3.5-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2-3)、甘草1-2	湯	体力中等度で、悪心、嘔吐があるものの次の諸症	悪心、嘔吐、胃部不快感、慢性胃炎、二日酔	0	1	2	0	0	新基準 (213)
214	160A	枳縮二陳湯	しやくにちんとう	枳実1-3、縮砂1-3、半夏2-3、陳皮2-3、香附子2-3、木香1-2、草豆蔻1-2、乾姜1-2、厚朴1.5-2.5、茴香1-2.5、延胡索1.5-2.5、甘草1、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、茯苓2-3	湯	体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症	悪心、嘔吐、胃痛、胃部不快感、胸痛	1	2	2	0	0	改正(類 方23)
215	161	女神散(安栄湯)	によしんさん／あんえいとう	当帰3-4、川芎3、白朮3(蒼朮も可)、香附子3-4、桂皮2-3、黄耆2-4、人参1.5-2、檳榔子2-4、黄連1-2、木香1-2、丁子0.5-1、甘草1-1.5、大黄0.5-1(大黄はなくても可)	湯	体力中等度以上で、のぼせとめまいのあるものの次の諸症	産前産後の神経症、月経不順、血の道症 ²⁾ 、更年期障害、神経症	0	0	2	2	1	新基準 (213)
216	162	人参湯(理中丸)	にんじんとう／りちゅうがん	人参3、甘草3、白朮3(蒼朮も可)、乾姜2-3	(1)散:1回2-3g 1日3回 (2)湯	体力虚弱で、疲れやすくて手足などが冷えやすいものの次の諸症	胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎	2	1	0	0	0	新基準 (213)
217	162A	桂枝人参湯	けいしにんじんとう	桂皮4、甘草3-4、人参3、乾姜2-3、白朮3(蒼朮も可)	湯	体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症	頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒	1	2	0	0	0	新基準 (213)
218	162B	附子理中湯	ぶしりちゅうとう	人参3、加工アロエ0.5-1、乾姜2-3、甘草2-3、白朮3(蒼朮も可)	湯	体力虚弱で、手足の冷えが強く、疲れやすいものの次の諸症	胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎	2	0	0	0	0	改正(類 方23)
219	163	人参養栄湯	にんじんようえいとう	人参3、当帰4、芍薬2-4、地黄4、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、桂皮2-2.5、黄耆1.5-2.5、陳皮(橘皮も可)2-2.5、遠志1-2、五味子1-1.5、甘草1-1.5	湯	体力虚弱なものの次の諸症	病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	1	2	0	0	0	新基準 (213)
220	164	排膿散及湯	はいのうさんきゅうとう	桔梗3-4、甘草3、大棗3-6、芍薬3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、枳実2-3	湯	体力に関わらず、使用できる。	化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎	1	1	2	1	1	改正(類 方23)
221	164A	排膿散	はいのうさん	枳実3-10、芍薬3-6、桔梗1.5-2、卵黄1個(卵黄はない場合も可)	(1)散:1回1.5-4g 1日1-2回 (2)湯(卵黄ははぶくのが普通) 生薬を細末とし1回量2-3gに卵黄を加えて、よく攪拌し白湯にて服す。1日1-2回頓服として用いる。	体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎	0	0	2	1	1	新基準 (213)
222	164B	排膿湯	はいのうとう	甘草1.5-3、桔梗1.5-5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-3)、大棗2.5-6	湯	体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症	化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの	1	1	2	0	0	新基準 (213)
223	165	麦門冬湯	ばくもんどうとう	麦門冬8-10、半夏5、粳米5-10、大棗2-3、人参2、甘草2	湯	体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽喉の乾燥感があるものの次の諸症	からせき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽喉炎、しわがれ声	1	2	2	0	0	新基準 (213)
224	165A	竹葉石膏湯	ちくようせつこうとう	竹葉1.2-2、石膏4.8-16、半夏1.6-8、麦門冬3.4-12、人参0.8-3、甘草0.6-2、粳米2-8.5	湯	体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇くものの次の諸症	からせき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症	1	2	0	0	0	改正(類 方23)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (16/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしぼり ^①					基準 分類	
						しぼり	症状	I	II	III	IV	V		
225	166	八味地黄丸	はちみじおうがん	散:地黄6-8、山茱萸3-4、山薬3-4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、桂皮1、加工ブシ0.5-1 湯:地黄5、山茱萸3、山薬3、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、桂皮1、加工ブシ0.5-1	(1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症	下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
226	166A	杞菊地黄丸	こきくじおうがん	散:地黄8、山茱萸4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、枸杞子5、菊花3 湯:地黄5-8、山茱萸3-4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮2-3、枸杞子4-5、菊花3	(1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渴があるものの次の諸症	かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下	1	2	1	0	0	0	改正(類 方23)
227	166B	牛車腎気丸	ごしゃじんきがん	地黄5-8、山茱萸2-4、山薬3-4、沢瀉3、茯苓3-4、牡丹皮3、桂皮1-2、加工ブシ0.5-1、牛膝2-3、車前子2-3	(1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症	下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
228	166 C	知柏地黄丸	ちばくじおうがん	地黄8、山茱萸4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、知母3、黄柏3	(1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渴があるものの次の諸症	顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ	1	2	1	0	0	0	改正(類 方23)
229	166 D	味麦地黄丸	みばくじおうがん	地黄8、山茱萸4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、麦門冬6、五味子2	(1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、ときにせき、口渴があるものの次の諸症	下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、息切れ、からぜき	1	2	1	0	0	0	改正(類 方23)
230	166E	六味丸(六味地黄丸)	ろくみがん/ろくみじ おうがん	散:地黄4-8、山茱萸3-4、山薬3-4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3 湯:地黄5-6、山茱萸3、山薬3、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3	(1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症	排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
231	167	八味疝気方	はちみせんきほう	桂皮3-4、木通3-4、延胡索3-4、桃仁3-6、烏薬3、牽牛子1-3、大黃1、牡丹皮3-4	湯	体力中等度以上で、冷えがあるものの次の諸症	下腹部の痛み、腰痛、こむら返り、月経痛	0	0	2	2	1	0	改正(最 終31)
232	168	半夏厚朴湯	はんげこうぼくとう	半夏6-8、茯苓5、厚朴3、蘇葉2-3、生姜1-2(ヒネシヨウガを使用する場合2-4)	湯	体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症	不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
233	169	半夏散及湯	はんげさんきゅうとう	半夏3-6、桂皮3-4、甘草2-3	湯	体力に関わらず、使用できる。	のどの痛み、扁桃炎、のどのあれ、声がれ	1	2	1	1	1	1	改正(最 終31)
234	170	半夏瀉心湯	はんげしゃしんとう	半夏4-6、黄芩2.5-3、乾姜2-3、人参2.5-3、甘草2.5-3、大棗2.5-3、黄連1	湯	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症	急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
235	170A	甘草瀉心湯	かんぞうしゃしんとう	半夏5、黄芩2.5、乾姜2.5、人参2.5、甘草2.5-3.5、大棗2.5、黄連1	湯	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹が鳴るものの次の諸症	胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神経症、下痢	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
236	170B	生姜瀉心湯	しょうきょうしゃしんとう	半夏5-8、人参2.5-4、黄芩2.5-4、甘草2.5-4、大棗2.5-4、黄連1、乾姜1-2、生姜1-2(ヒネシヨウガを使用する場合2-4)	湯	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸症	食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
237	171	半夏白朮天麻湯	はんげびやくじゅつて んまとう	半夏3、白朮1.5-3、陳皮3、茯苓3、麦芽1.5-2、天麻2、生姜0.5-2(ヒネシヨウガを使用する場合2-4)、神麩1.5-2、黄耆1.5-2、人参1.5-2、沢瀉1.5-2、黄柏1、乾姜0.5-1(神麩のない場合も可)(蒼朮2-3を加えても可)	湯	体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症	頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
238	172	白朮附子湯	びやくじゅつぶしとう	白朮2-4、加工ブシ0.3-1、甘草1-2、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを用いる場合1.5-3)、大棗2-4	湯	体力虚弱で、手足が冷え、ときに頻尿があるものの次の諸症	筋肉痛、関節のはれや痛み、神経痛、しびれ、めまい、感冒	2	2	0	0	0	0	改正(最 終31)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (17/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしぼり ^②					基準 分類
						しぼり	症状	I	II	III	IV	V	
239	173	白虎湯	びやっことう	知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2	湯	体力中等度以上で、熱感、口渇があるものの次の諸症	のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	0	0	2	2	1	新基準 (213)
240	173A	白虎加桂枝湯	びやっこかけいしとう	知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2、桂皮3-4	湯	体力中等度以上で、熱感、口渇、のぼせがあるものの次の諸症	のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	0	0	2	2	1	新基準 (213)
241	173B	白虎加人參湯	びやっこかにんじんとう	知母5-6、石膏15-16、甘草2、粳米8-20、人參1.5-3	湯	体力中等度以上で、熱感と口渇が強いものの次の諸症	のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ	0	0	2	2	1	新基準 (213)
242	174	伏竜肝湯	ぶくりゆうかんとう	伏竜肝4-10、ヒネショウガ5-8(生姜を使用する場合1.5-3)、半夏6-8、茯苓3-5	湯	体力に関わらず、使用できる。	つわり、悪心、嘔吐	1	1	1	1	1	新基準 (213)
243	175	茯苓飲	ぶくりょういん	茯苓2.4-5、白朮2.4-4(蒼朮も可)、人參2.4-3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、陳皮2.5-3、枳実1-2	湯	体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症	胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ	1	2	1	0	0	新基準 (213)
244	175A	茯苓飲加半夏	ぶくりょういんかはんげ	茯苓5、白朮4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、陳皮3、枳実1.5、半夏4	湯	体力中等度以下で、はきけや胸やけが強く、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症	胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ	1	2	1	0	0	新基準 (213)
245	175B	茯苓飲合半夏厚朴湯	ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう	茯苓4-6、白朮3-4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4-5)、陳皮3、枳実1.5-2、半夏6-10、厚朴3、蘇葉2	湯	体力中等度以下で、気分がふさいで咽喉食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気、胸やけ、上腹部膨満感などがあり、尿量減少するものの次の諸症	不安神経症、神経性胃炎、つわり、胸やけ、胃炎、しわがれ声、のどのつかえ感	1	2	1	0	0	新基準 (213)
246	176	茯苓杏仁甘草湯	ぶくりょうきょうにんかんざうとう	茯苓3-6、杏仁2-4、甘草1-2	湯	体力中等度以下で、胸につかえがあるものの次の諸症	息切れ、胸の痛み、気管支ぜんそく、せき、動悸	1	2	1	0	0	改正(最終31)
247	177	茯苓四逆湯	ぶくりょうしぎゃくとう	茯苓4-4.8、甘草2-3、乾姜1.5-3、人參1-3、加工フシ0.3-1.5	湯	体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症	倦怠感、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、尿量減少	2	2	0	0	0	改正(新規27)
248	178	茯苓沢瀉湯	ぶくりょうたくしゃとう	茯苓4-8、沢瀉2.4-4、白朮1.8-3(蒼朮も可)、桂皮1.2-2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2.4-4)、甘草1-1.5	湯	体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、渇きを覚えるものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱	1	2	2	0	0	新基準 (213)
249	179	附子粳米湯	ぶしこうべいとう	加工フシ0.3-1.5、半夏5-8、大棗2.5-3、甘草1-2.5、粳米6-8	湯	体力虚弱で、腹部が冷えて痛み、腹が鳴るものの次の諸症	胃痛、腹痛、嘔吐、急性胃腸炎	2	1	0	0	0	改正(最終31)
250	180	扶脾生脈散	ふひしょうみやくさん	人參2、当帰4、芍薬3-4、紫苑2、黄耆2、麥門冬6、五味子1.5、甘草1.5	湯	体力中等度以下で、出血傾向があり、せき、息切れがあるものの次の諸症	鼻血、歯肉からの出血、痔出血、気管支炎	2	1	1	0	0	改正(最終31)
251	181	分消湯(実脾飲)	ぶんしょうとう/じつびいん	白朮2.5-3、蒼朮2.5-3、茯苓2.5-3、陳皮2-3、厚朴2-3、香附子2-2.5、猪苓2-2.5、沢瀉2-2.5、枳実(枳殼)1-3、大腹皮1-2.5、縮砂1-2、(但し、枳殼を用いる場合は実脾飲とする)	湯	体力中等度以上で、尿量が少なく、ときにみぞおちがつかつて便秘の傾向のあるものの次の諸症	むくみ、排尿困難、腹部膨満感	0	0	1	2	1	新基準 (213)
252	182	平胃散	へいいさん	蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、大棗2-3、甘草1-1.5、生姜0.5-1	原則として湯 (1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにははきけ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症	食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振	0	0	1	2	1	新基準 (213)
253	182A	加味平胃散	かみへいいさん	蒼朮4-6(白朮も可)、陳皮3-4.5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、神麴2-3、山楂子2-3、厚朴3-4.5、甘草1-2、大棗2-3、麦芽2-3(山楂子はなくても可)	湯	体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症	急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感	0	1	2	1	0	新基準 (213)
254	182B	香砂平胃散	こうしゃへいいさん	蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、甘草1-1.5、縮砂1.5-2、香附子2-4、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、大棗2-3、藿香1(藿香はなくても可)	湯	体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症	食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良	0	1	2	1	0	新基準 (213)
255	182C	不換金正気散	ふかんきんしょうきさん	蒼朮4(白朮も可)、厚朴3、陳皮3、大棗1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、半夏6、甘草1.5、藿香1-1.5	湯	体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときにははきけがあるものの次の諸症	急・慢性胃炎、胃腸虚弱、消化不良、食欲不振、消化器症状のある感冒	0	1	2	1	0	新基準 (213)

表1 一般用漢方製剤承認基準記載294処方の一覧 (18/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしぼり ^①					基準 分類	
						しぼり	症状	I	II	III	IV	V		
256	183	防已黄耆湯	ぼういおうぎとう	防已4-5、黄耆5、白朮3(蒼朮も可)、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、大棗3-4、甘草1.5-2	湯	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症	肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
257	184	防已茯苓湯	ぼういふくりょうとう	防已2.4-3、黄耆2.4-3、桂皮2.4-3、茯苓4-6、甘草1.5-2	湯	体力中等度以下で、手足のむくみや冷えやすい傾向のあるものの次の諸症	手足の疼痛・しびれ感、むくみ、めまい、慢性下痢	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
258	185	防風通聖散	ぼうふうつうしょうさん	当帰1.2-1.5、芍薬1.2-1.5、川芎1.2-1.5、山梔子1.2-1.5、連翹1.2-1.5、薄荷葉1.2-1.5、生姜0.3-0.5(ヒネショウガを使用する場合1.2-1.5)、荊芥1.2-1.5、防風1.2-1.5、麻黄1.2-1.5、大黃1.5、芒硝1.5、白朮2、桔梗2、黄芩2、甘草2、石膏2、滑石3(白朮のない場合も可)	原則として湯 (1)散:1回2g 1日3回 (2)湯	体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症	高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症	0	0	0	1	2	0	新基準 (213)
259	186	補気健中湯(補気建中湯)	ほきけんちゅうとう	白朮3-5、蒼朮2.5-3.5、茯苓3-5、陳皮2.5-3.5、人参1.5-4、黄耆2-3、厚朴2、沢瀉2-4、麥門冬2-8	湯	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症	腹部膨満感、むくみ	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
260	187	補中益気湯	ほちゅうえききとう	人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、黄耆3-4.5、当帰3、陳皮2-3、大棗1.5-3、柴胡1-2、甘草1-2、生姜0.5、升麻0.5-2	湯	体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症	虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒	1	2	0	0	0	0	新基準 (213)
261	188	補肺湯	ほはいとう	麦門冬4、五味子3、桂皮3、大棗3、粳米3、桑白皮3、款冬花2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)	湯	体力中等度以下のものの次の諸症	せき、しわがれ声	1	2	1	0	0	0	新基準 (213)
262	189	補陽還五湯	ほようかんごとう	黄耆5、当帰3、芍薬3、地竜2、川芎2、桃仁2、紅花2	湯	体力虚弱なものの次の諸症	しびれ、筋力低下、頻尿、軽い尿漏れ	1	2	0	0	0	0	改正(最終31)
263	190	奔豚湯(金匱要略)	ほんとうとう・きんきょうりやく	甘草2、川芎2、当帰2、半夏4、黄芩2、葛根5、芍薬2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、李根白皮5-8(桑白皮でも可)	湯	体力中等度で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症	発作性の動悸、不安神経症	0	1	2	1	0	0	改正(最終31)
264	191	奔豚湯(肘后方)	ほんとうとう・ちゅうごほう	甘草2、人参2、桂皮4、呉茱萸2、生姜1、半夏4	湯	体力中等度以下で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症	発作性の動悸、不安神経症	1	2	1	0	0	0	改正(最終31)
265	192	麻黄湯	まおうとう	麻黄3-5、桂皮2-4、杏仁4-5、甘草1-1.5	湯	体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症	感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり(使用上の注意 身体虚弱の人は使用しないこと。)	0	0	0	2	2	0	新基準 (213)
266	193	麻黄附子細辛湯	まおうぶしさいしんとう	麻黄2-4、細辛2-3、加工ブシ0.3-1	湯	体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症	感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛	2	2	0	0	0	0	改正(新規27)
267	194	麻杏甘石湯	まきょうかんせきとう	麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10	湯	体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症	せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み	0	0	1	2	1	0	新基準 (213)
268	194A	五虎湯	ごごとう	麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10、桑白皮1-3	湯	体力中等度以上で、せきが強くでるものの次の諸症	せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み	0	0	1	2	1	0	新基準 (213)
269	195	麻杏薤甘湯	まきょうよくかんと	麻黄4、杏仁3、薤白10、甘草2	湯	体力中等度なものの次の諸症	関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)	0	1	2	1	0	0	新基準 (213)
270	196	麻子仁丸	ましにんがん	麻子仁4-5、芍薬2、枳実2、厚朴2-2.5、大黃3.5-4、杏仁2-2.5(甘草1.5を加えても可)	(1)散:1回2-3g 1日1-3回 (2)湯	体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なもの次の諸症	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和	1	2	2	0	0	0	新基準 (213)
271	197	木防已湯	もくぼういとう	防已2.4-6、石膏6-12、桂皮1.6-6、人参2-4(竹節人参4でも可)	湯	体力中等度以上で、みぞおちがつかえ、血色すぐれないものの次の諸症	動悸、息切れ、気管支ぜんそく、むくみ	0	0	1	2	2	0	改正(最終31)

表1 一般用漢方製剤承認基準収載294処方の一覧 (19/20)

通し 番号	処方 番号	処方名	ふりがな	成分・分量	用法・用量	効能・効果		体力のしびり ³⁾					基準 分類
						しびり	症状	I	II	III	IV	V	
272	198	楊梅散	ようばくさん	(外用)楊梅皮2、黄柏2、天山椒1	外用である。細末を混和し、うすい酢又は水で泥状として患部に塗る。	捻挫、打撲		外用処方					新基準 (213)
273	199	薏苡仁湯	よくいこんとう	麻黄4、当帰4、蒼朮4(白朮も可)、 薏苡仁8-10、桂皮3、芍薬3、甘草2	湯	体力中等度で、関節や筋肉のはれや痛みがあるものの次の諸症	関節痛、筋肉痛、神経痛	0	1	2	1	0	新基準 (213)
274	200	薏苡附子敗醬散	よくいぶしはいしょうさん	薏苡仁1-16、加エブシ0.2-2、敗醬0.5-8	湯	体力虚弱なものの次の諸症	熱を伴わない下腹部の痛み、湿疹・皮膚炎、肌あれ、いぼ	1	2	0	0	0	改正(最終31)
275	201	抑肝散	よくかんさん	当帰3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5	湯	体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症	神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症 ³⁾	0	1	1	2	0	新基準 (213)
276	201A	抑肝散加芍薬黄連	よくかんさんかしゃくやくおうれん	当帰5.5、釣藤鈎1.5、川芎2.7、白朮5.3(蒼朮も可)、茯苓6.5、柴胡2、甘草0.6、芍薬4、黄連0.3	湯	体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症	神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症 ³⁾	0	0	2	2	1	改正(類方23)
277	201B	抑肝散加陳皮半夏	よくかんさんかちんぴはんげ	当帰3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5、陳皮3、半夏5	湯	体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症	神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症 ³⁾ 、歯ぎしり	0	2	1	0	0	新基準 (213)
278	202	六君子湯	りっくんしとう	人參2-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏3-4、陳皮2-4、大棗2、甘草1-1.5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)	湯	体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	2	2	1	0	0	新基準 (213)
279	202A	化食養脾湯	かしょくようひとう	人參4、白朮4、茯苓4、半夏4、陳皮2、大棗2、神麹2、麦芽2、山楂子2、縮砂1.5、生姜1、甘草1	湯	体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすいものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	2	2	1	0	0	新基準 (213)
280	202B	香砂六君子湯	こうしゃりっくんしとう	人參3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏3-6、陳皮2-3、香附子2-3、大棗1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、甘草1-1.5、縮砂1-2、藿香1-2	湯	体力中等度以下で、気分が沈みがちで頭が重く、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえて疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	2	2	1	0	0	新基準 (213)
281	202C	柴芍六君子湯	さいしゃりっくんしとう	人參3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏4、陳皮2-3、大棗2、甘草1-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、柴胡3-4、芍薬3-4	湯	体力中等度以下で、神経質であり、胃腸が弱くみぞおちがつかえ、食欲不振、腹痛、貧血、冷え症の傾向のあるものの次の諸症	胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐、神経性胃炎	2	2	1	0	0	新基準 (213)
282	202D	八解散	はっかいさん／はちげさん	半夏3、茯苓3、陳皮3、大棗2、甘草2、厚朴6、人參3、藿香3、白朮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2)	湯	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症	発熱、下痢、嘔吐、食欲不振のいずれかを伴う感冒	2	1	0	0	0	改正(類方23)
283	203	立効散	りっこうさん	細辛1.5-2、升麻1.5-2、防風2-3、甘草1.5-2、竜胆1-1.5	湯(口に含んでゆっくり飲む)	体力に関わらず、使用できる。	歯痛、抜歯後の疼痛	1	1	1	1	1	新基準 (213)
284	204	竜胆瀉肝湯	りゅうたんしゃかんと	当帰5、地黄5、木通5、黄芩3、沢瀉3、車前子3、竜胆1-1.5、山梔子1-1.5、甘草1-1.5	湯	体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症	排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ(おりもの)、頻尿	0	0	1	2	1	新基準 (213)
285	205	苓甘姜味辛夏仁湯	りょうかんきょうみんしんげにんと	茯苓1.6-4、甘草1.2-3、半夏2.4-5、乾姜1.2-3(生姜2でも可)、杏仁2.4-4、五味子1.5-3、細辛1.2-3	湯	体力中等度又はやや虚弱で、胃腸が弱り、冷え症で薄い水様のたんが多いものの次の諸症	気管支炎、気管支ぜんそく、動悸、息切れ、むくみ	0	2	1	0	0	改正(最終31)
286	206	苓姜朮甘湯	りょうきょうじゅつつかんと	茯苓4-6、乾姜3-4、白朮2-3(蒼朮も可)、甘草2	湯	体力中等度以下で、腰から下肢に冷えと痛みがあって、尿量が多いものの次の諸症	腰痛、腰の冷え、夜尿症、神経痛	1	2	1	0	0	新基準 (213)
287	207	苓桂甘藶湯	りょうけいかんそうとう	茯苓4-8、桂皮4、大棗4、甘草2-3	湯	体力中等度以下で、のぼせや動悸があり神経がたかぶるものの次の諸症	動悸、精神不安	1	2	1	0	0	新基準 (213)
288	208	苓桂朮甘湯	りょうけいじゅつつかんと	茯苓4-6、白朮2-4(蒼朮も可)、桂皮3-4、甘草2-3	湯	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症	立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏	1	2	1	0	0	新基準 (213)