

SD0J

心膽氣虛証^(TM)

心膽氣虛證 [心膽氣虛不甯證] – Xin dan qi xu zheng [Xin dan qi xu bu ning zheng] (zh), シンタンキキヨショウ (ja), SimdamGiheojeung [SimdamGiheobulnyeongjeung] (ko)

動悸、失眠、臆病、浮動性めまい、胸内苦悶、薄色の舌 (light colored tongue) を特徴とする証。胆囊の気の絶え間ない動きをもたらす心気の欠損によって説明できる。

SD0K

心脾兩虛証^(TM)

心脾兩虛證 – Xin pi liang xu zheng(zh), シンヒリョウキヨショウ (ja), Simbiyangheojeung (ko)

動悸、健忘症、失眠又は睡眠障害、食欲不振、腹部膨満、下痢、嗜眠、面色委黄、淡白で圧痛のある柔らかな舌 (pale, tender, soft tongue) 、細・弱脈を特徴とする証。心臓及び脾臓の正常な機能に影響を及ぼしている心臓及び脾臓の(気の?)欠乏(虚)によって説明できる。It may be explained by deficiency of heart and spleen affecting the normal function of heart and spleen.

SD0L

心肺氣虛証^(TM)

心肺氣虛証 – Xin fei qi xu zheng(zh), シンハイキキヨショウ (ja), Simpyegiheojeung (ko)

動悸、胸部の圧迫感、咳嗽、労作によって悪化する息切れ、乏しい喀出 (thin expectoration) 、浮動性めまい、気力低下及び乏力 (lack of strength) 、弱々しい声、自然発汗 (自汗) 、淡白舌及び弱脈を特徴とする証。正常な機能に影響を及ぼしている心臓及び肺における気の欠乏 (虚) によって説明できる。

SD0M

心腎不交証^(TM)

心腎不交証 – Xin shen bu jiao zheng(zh), シンジンフコウショウ (ja), Simsinsbulgyojeung (ko)

動悸、失眠、両耳の耳鳴り、浮動性めまい、背部及び膝のうずくような痛み及び脱力、精液漏、便秘、黄色尿、少しの舌苔を伴う紅舌、ならびに細・数脈を特徴とする証。腎陰及び心火の動に起因する心臓と腎臓の関係の障害によって説明できる。

SD0N

心腎陽虛証^(TM)

心腎陽虛証 – Xin shen yang xu zheng(zh), シンジンヨウキヨショウ (ja), Simsinyangheojeung (ko)

動悸、悪風、四肢の冷え、小便不利 (排尿困難: inhibited urination) 、脚の腫脹、腰部及び膝の疼痛及び冷え、白賦苔及び弱・沈脈を特徴とする証。心臓と腎臓双方を温め、活性化することができない陽気の不足によって説明できる。

SD0Y

その他の特定の心病証^(TM)

SD0Z

心病証^(TM)、詳細不明

-

脾病証^(TM)

脾病證 Pi bing zheng_(zh)

ヒビヨウショウ_(ja)

BiByeongjeung_(ko)




本セクションは、すべて脾臓系TMの機能障害に起因する、一連の TM 証(TM patterns)を含んでいる。この系は脾臓、胃、筋肉、口唇、口、関連する経絡で構成される。

SD10

脾氣虛証^(TM)

脾氣虛證 [脾氣虧虛] - Pi qi xu zheng [Pi qi kui xu]_(zh), ヒキキョウショウ_(ja), Bigiheojeung_(ko)

食欲低下、腹部膨満、軟便、嗜眠、淡白舌又は弱脈を特徴とする証。消化不良、血液の產生及び循環減少、ならびに体内の水分量調節不能を伴う脾氣の減少によって説明できる。



SD11

中気下陷証^(TM): Sunken middle qi pattern^(TM)

脾中氣下陷證 - Pi zhong qi xia xian zheng_(zh), ヒチュウキゲカンショウ_(ja), Junggihahamjeung_(ko)

心窩部及び腹部の努責感、不完全排便感覚を伴う頻繁な下痢、さらには直腸脱又は内臓下垂症も特徴とする証。脾気が不足し、保持機能に影響するためと考えられる。

SD12

脾氣不固証^(TM): Spleen qi insecurity pattern^(TM)

脾氣不固證 - Pi qi bu gu zheng_(zh), ヒキフクショウ_(ja), Bigibulgojeung_(ko)

慢性下痢、便失禁、息切れ、食欲減退、腹部膨満、淡白舌、弱脈を特徴とする証。脾氣虚又は氣陷證(qi sinking)が原因と考えられる。

SD13

気鬱脾虚証^(TM): Spleen deficiency with qi stagnation pattern^(TM)

脾虛氣滯證 – Pi xu qi zhi zheng_(zh), ヒキヨキタイショウ_(ja), BiheoGichejeung_(ko)

食欲減退、腹部膨満痛、不完全排便感覚を伴う頻回の軟便、腸雜音增加、放屁、嗜眠、運動減少、針金様脈を特徴とする証。脾氣虚による氣機の鬱滯が原因と考えられる。

SD14

食積脾虚証^(TM): Spleen deficiency with food retention pattern^(TM)

脾虛食積[夾食]證 – Pi xu shi ji [jia shi] zheng_(zh), ヒキヨショクセキ(キヨウショク)_(ja), Biheosikjeokjeung_(ko)

漸次的な食欲減退、腹部膨満、頻回の下痢、不規則な食事に伴う心窓部及び腹部の膨満痛、腐敗臭のおくび、胃酸逆流、inhibited diarrhea 又は脂性の淡白舌を特徴とする証。消化と運化に対する脾氣の不足から、胃や腸の食積と腐敗が生じたためと考えられる。

SD15

脾不統血証^(TM): Spleen failing to control the blood pattern^(TM)

脾不統[攝]血證 – Pi bu tong [she] xue zheng_(zh), ヒフトウ(セツ)ケツショウ_(ja), Bibultonghyeoljeung_(ko)

皮膚の赤色斑／紫斑などの慢性出血、女性の崩漏、つやのない顔色、厭食、軟便、嗜眠、無力症、短気、話すのが億劫、淡白舌及び弱脈を特徴とする証。脾気が不足し、血液の制御及び保持機能に影響するためと考えられる。

SD16

脾虛貧血証^(TM): Spleen deficiency and blood depletion pattern^(TM)

脾虛血虧證 – Pi xu xue kui zheng_(zh), ヒキヨケツキショウ_(ja), Biheohyeolhyujeung_(ko)

食欲減退、腹部膨満、軟便、浮動性めまい、嗜眠、月經の遅れ又は無月經、過少月經、顔面蒼白、淡白舌、細脈及び微弱脈を特徴とする証。脾氣虚による脾臓の血液生成の減少が原因と考えられる。

SD17

脾陰虛証^(TM): Spleen yin deficiency pattern^(TM)

脾陰虛證 [虧] – Pi yin xu zheng [kui]_(zh), ヒインキヨショウ_(ja), Bieumheojeung_(ko)

摂食不能による空腹、削瘦、嗜眠、便秘、微量唾液、口唇乾燥、微熱、僅かな苔をもつ紅舌、細・数脈を特徴とする証。脾臓の陰虚により、体液運化及び消化機能が障害されたことが原因と考えられる。

SD18

脾陽虛証^(TM): Spleen yang deficiency pattern^(TM)

脾陽虛證 [虧] – Pi yang xu zheng [kui]_(zh), ヒヨウキヨショウ(ヒヨウフシン)_(ja), Biyangheojeung_(ko)

四肢の冷え、腹部疼痛と冷覚、厭食、腹部膨満、腫脹、慢性下痢、嗜眠及び削瘦を特徴とする証。脾虛寒、陽氣不足により脾臓を温め活性化できないことが原因と考えられる。

SD19

水分貯留を伴う脾陽虚証^(TM): Spleen yang deficiency with water retention pattern^(TM)

脾陽虚水泛[停]證 - Pi yang xu shui fan [ting] zheng_(zh), ヒヨウキヨスイハン(ティ)ショウ_(ja), Biyangheosubeomjeung_(ko)

食欲減退、腹部膨満、軟便、悪寒、四肢の冷え、顔面及び四肢の浮腫、腹水、顔面蒼白、脂性の白苔を有する蒼白の胖大舌、濡脈又は弱脈を特徴とする証。脾臓の陽気が低下して、体液の温化及び運化のための脾機能に影響し、体液の内部鬱滯が生じることが原因と考えられる。

SD1A

脾胃両陽虚証^(TM): Dual deficiency of spleen and stomach yang pattern^(TM)

脾胃陽虚證 - Pi wei yang xu zheng_(zh), ヒヨウキヨショウ_(ja), Biwyangheojeung_(ko)

胃全体の疼痛と冷感があり、厭食、腹部膨満、おくび、津の嘔吐、慢性下痢、嗜眠及び四肢の冷えを伴うことを特徴とする証。脾を温める陽気の不足とともに、胃の冷えにより生じると考えられる。

SD1B

湿熱脾蓄積証^(TM): Dampness and heat accumulating the spleen pattern^(TM)

濕熱蘊[困]脾證 - Shi re yun [kun] pi zheng_(zh), シツネツウン(コン)ピショウ_(ja), Seupyeolgonbijeung_(ko)

腹部膨満、嘔吐、恶心、厭食、四肢の重い感じ、不完全排便感覚を伴う粘性の軟便、顔面と眼の黄色変化、発汗後緩和されない持続性の熱、口渴、脂性の黄色苔を有する紅舌、濡・数脈を特徴とする証。湿邪と熱邪が体内に蓄積し、脾臓の運化不良に至るためと考えられる。

SD1C

湿邪脾虚証^(TM): Spleen deficiency with dampness encumbrance pattern^(TM)

脾虛濕困[蘊][盛][泛]證 - Pi xu shi kun [yun] [sheng] [fan] zheng_(zh), ヒキヨシツコン(ウン)(セイ)(ハン)ショウ_(ja), Biheoseupgonjeung_(ko)

食欲減退、腹部膨満、軟便、身体の重い感じ又は軽度浮腫、湿った又は脂性の白苔をもつ蒼白の胖大舌、濡脈及び緩脈を特徴とする。脾氣虚から濁邪と湿邪の体内貯留に至ることが原因と考えられる。

SD1D

脾虛水泛証^(TM): Spleen deficiency with water flooding pattern^(TM)

脾(氣)虛水泛[停][濕]證 - Pi (qi) xu shui fan [ting] [shi] zheng_(zh), ヒ(キ)キヨスイハン(ティ)(シツ)ショウ_(ja), Biheosubeomjeung_(ko)

食欲減退、腹部膨満、軟便、顔面と四肢の腫脹、腹腔内の体液貯留、嗜眠、運動減少、顔面蒼白、脂性の白苔をもつ蒼白の胖大舌、濡脈又は弱脈を特徴とする証。脾気が不足し、体液の運化及び昇発における脾機能に影響し、体液の内部鬱滯が生じることが原因と考えられる。

SD1E

脾胃湿熱証^(TM):Dampness and heat in the spleen and stomach pattern^(TM)

脾胃濕熱證 – Pi wei shi re zheng_(zh), ヒイシツネツショウ_(ja), Biwiseupyeoljeung_(ko)

心窓部又は腹部膨満、厭食、恶心、嘔吐、嗜眠、身体の重い感じ、皮膚及び強膜の明るい黄変色、顆粒が密な黄・膩苔を特徴とする証。脾臓・胃に湿邪と熱邪が蓄積し、消化機能に影響するためと考えられる。

SD1F

脾胃湿邪証^(TM):Dampness encumbering the spleen and stomach pattern^(TM)

濕困脾胃證 – Shi kun pi wei zheng_(zh), シツコンピイショウ_(ja), Seupgonbiwijeung_(ko)

心窓部・腹部の膨満と重圧感、口の中の油っぽい感じ、食欲減退、恶心、嘔吐、口渴を伴わない口淡、腹痛、軟便、頭部と身体の重い感じ、皮膚と眼の黄変色、脂性の白苔をもつ蒼白の胖大舌、濡脈、緩脈を特徴とする証。濁邪・湿邪が体内で過剰になり中焦に鬱滯することが原因と考えられる。

SD1G

風邪湿邪脾蓄積証^(TM):Cold and dampness encumbering the spleen pattern^(TM)

寒濕困脾證 – Han shi kun pi zheng_(zh), カンシツコンビショウ_(ja), Hanseupgonbijeung_(ko)

心窓部・腹部膨満、口のねばつき、口淡、恶心、軟便、頭部と身体の重い感じ、皮膚及び眼のくすんだ黄変色、白膩苔をもつ淡白舌、濡・緩脈を特徴とする証。寒邪及び湿邪が蓄積して脾機能に影響することが原因と考えられる。

SD1H

胃氣虛証^(TM):Stomach qi deficiency pattern^(TM)

胃氣虛證 – Wei qi xu zheng_(zh), イキキヨシショウ_(ja), Wigihéojeung_(ko)

食欲減退及び消化障害を特徴とする証。胃気の衰弱が胃の機能に影響することで生じると考えられる。

SD1J

胃氣逆証^(TM):Stomach qi counterflow pattern^(TM)

胃氣上逆證 – Wei qi shang ni zheng_(zh), イキジョウギヤクショウ_(ja), Wigisangyeokjeung_(ko)

おくび、吃逆、胃酸逆流及び嘔吐を特徴とする証。胃気に影響する寒熱と温熱に伴い、上方向に胃気が逆流し、気が正常に下行することを妨げ、上方向に流れさせることで生じると考えられる。

SD1K

胃陰虛証^(TM):Stomach yin deficiency pattern^(TM)

胃陰虛證 [虧] – Wei yin xu zheng [kui]_(zh), インキヨシショウ_(ja), Wieumheojeung_(ko)

口及び喉の乾燥、胃・心窓部の鈍い灼熱痛、空腹感又は食欲減退、空嘔吐、吃逆、便秘、微量の津を有する紅舌、細・数脈を特徴とする証。過度の胃火又は熱盛により生じる、胃機能障害を伴う胃の津虚が原因と考えられる。

SD1L

胃熱証^(TM): Stomach heat pattern^(TM)

胃熱證 – Wei re zheng_(zh), イネツショウ_(ja), Wiyeoljeung_(ko)

胃酸逆流、胃・心窩部の灼熱痛、空腹感亢進を伴う速やかな消化、口内の腐敗臭、便秘、歯肉の腫脹と出血、食後の嘔吐、脂性の厚苔を有する紅舌、洪脈又は滑・数脈を特徴とする証。熱邪による胃障害又は熱い刺激物の過食が原因と考えられる。

SD1M

津の不足を伴う胃熱証^(TM): Stomach heat with fluid depletion pattern^(TM)

胃熱津傷[虧]証 – Wei re jin shang [kui] zheng_(zh), イネツシンショウ(キ)ショウ_(ja), Wiyeoljinhyujeung_(ko)

胃・心窩部の灼熱痛、飲水欲のある口渴、頻繁な空腹感を伴う食欲亢進、乾燥便、紅舌、微量の津を有する黄苔、数脈を特徴とする証。体液を消費する過盛な胃熱が原因と考えられる。

SD1N

腸管湿邪蓄積証^(TM): Dampness building up in the intestinal tract pattern^(TM)

濕阻[滯][蘊]腸道証 – Shi zu [zhi] [yun] chang dao zheng_(zh), シツソ(タイ)(ウン)コドウショウ_(ja), Seupchejangdojeung_(ko)

腹部の隠痛及び膨満、水様便又は下痢、異常臭の粘液便、脂性の白苔、濡脈及び緩脈を特徴とする証。腸管内の湿邪の蓄積により、津の運化及び昇発が異常になることで生じると考えられる。

SD1P

胃寒邪侵入証^(TM): Cold invading the stomach pattern^(TM)

寒邪犯胃証 – Han xie fan wei zheng_(zh), カンジャハンイショウ_(ja), Hansabeomwijeung_(ko)

温かさを求める胃・心窩部の鋭い冷痛、透明な津の嘔吐、悪寒、四肢の冷え、白苔、針金様脈を特徴とする証。胃・心窩部に寒邪が侵入し、胃気が正常に下行することを妨げることが原因と考えられる。

SD1Q

腸寒邪鬱滯証^(TM): Cold stagnation in the intestine pattern^(TM)

寒滯腸道証 – Han zhi chang dao zheng_(zh), カンタイチヨウドウショウ_(ja), HancheJangdojeung_(ko)

腹部の鋭い冷痛、透明で水様性の下痢、悪寒、四肢の冷え、白苔、針金様脈を特徴とする証。腸に寒邪が侵入し、腸の運化と昇発機能に影響することが原因と考えられる。

SD1R

不安脾損傷証^(TM): Anxiety damaging the spleen pattern^(TM)

思傷脾氣証 – Si shang pi qi zheng_(zh), シショウヒキショウ_(ja), Sasangbigijeung_(ko)

うつろな表情、厭食、胸部・下肋部・心窩部・腹部の膨満、太息、軟便の排便困難、針金様脈を特徴とする証。過剰な不安が、肝臓と脾臓の気機を鬱滯させ、消化機能を損なうことが原因と考えられる。

SD1S

肺脾両虚証^(TM): Dual deficiency of the lung and spleen pattern^(TM)

肺脾両虚證 - Fei pi liang xu zheng_(zh), ハイヒリョウコショウ_(ja), Pyebiyangheojeung_(ko)

嘔声、咳嗽、息切れ又は短氣、透明で水様性の痰、食欲減退、腹部膨満、軟便、脂性の白苔をもつ淡白舌、又は弱脈を特徴とする証。脾臓又は肺の気虚が原因と考えられる。

SD1T

脾腎陽虚証^(TM): Dual deficiency of spleen and kidney pattern^(TM)

脾腎陽虚證 - Pi shen yang xu zheng_(zh), ヒジンヨウキヨショウ_(ja), Bisinyangheojeung_(ko)

顔面蒼白、四肢の冷えを伴う悪寒、下腹部の冷えと疼痛、慢性下痢、浮腫、排尿困難、蒼白の胖大舌を特徴とする証。腎又は脾臓の陽気の不足が原因と考えられる。

SD1Y

その他の特定の脾病証^(TM): Other specified spleen Patterns^(TM)

SD1Z


脾病証^(TM)、詳細不明:Spleen Patterns^(TM), unspecified

肺病証^(TM): Lung Patterns^(TM)

肺病證 Fei bing zheng_(zh)

ハイビヨウショウ_(ja)

Pyebyeongjeung_(ko)



本セクションには、肺系^(TM)の機能障害が原因である、一連の TM の証が含まれている。この系は肺、大腸、皮膚、産毛、鼻、関連する経絡及び絡脈から構成される。

SD20

肺気虚証^(TM): Lung qi deficiency pattern^(TM)

肺気虚證 [虧] - Fei qi xu zheng [kui]_(zh), ハイキキヨショウ_(ja), Pyegiheojeung_(ko)

弱い咳嗽、労作時の短い喘ぎ、漿液性痰、自然発汗、悪風、淡白舌、弱脈を特徴とする証。肺気レベルの低下を伴う肺機能低下が原因と考えられる。

SD21

肺衛氣虛証^(TM):Lung and defense qi deficiency pattern^(TM)

肺衛氣虛(不固)證 - Fei wei qi xu (bu gu) zheng_(zh), ハイエイキキヨ(フコ)ショウ_(ja), PyewiGiheo(Bulgo)jeung_(ko)

悪風、自然発汗、頻繁な悪寒、短気、運動減少、淡白舌及び弱脈を特徴とする証。肺気虚による衛氣の失調が原因と考えられる。

SD22

肺陰虛証^(TM):Lung yin deficiency pattern^(TM)

肺陰虛證 [虧] - Fei yin xu zheng [kui]_(zh), ハイインキヨショウ_(ja), Pyeumheojeung_(ko)

去痰困難な粘性痰、血痰、口及び喉の乾燥、嘔声、周期性発熱、頬部潮紅、寝汗、微量の津を有する紅舌、細・数脈を特徴とする証。肺機能と陰虚の概念の組み合わせにより説明できると考えられる。

SD23

肺腎陰虛証^(TM):Lung and kidney yin deficiency pattern^(TM)

肺腎陰虛證 - Fei shen yin xu zheng_(zh), ハイジンインキヨショウ_(ja), Pyesineumheojeung_(ko)

少量の喀出物を伴う咳嗽、口と咽喉の乾き又は嘔声、腰部疼痛と跛行、体内から生じている感じの周期性発熱、頬部潮紅、寝汗、男性の夢精と女性の月経不順、少量の舌苔を有する紅舌、細数脈を特徴とする証。内熱の障害を伴う肺・腎の陰津不足が原因と考えられる。

SD24

肺氣陰両虛証^(TM):Dual deficiency of lung qi and yin pattern^(TM)

肺氣陰兩虛證 - Fei qi yin liang xu zheng_(zh), ハイキインリョウキヨショウ_(ja), Pyegieumyangheojeung_(ko)

嘔声、弱い空咳、短気又は呼吸困難、両側の手掌と足底及び心臓の熱感を伴う刺激感、細脈及び微弱脈を特徴とする証。肺の気陰の不足が原因と考えられる。

SD25

肺陽虛証^(TM):Lung yang deficiency pattern^(TM)

肺陽虛證 - Fei yang xu zheng_(zh), ハイヨウキヨショウ_(ja), Pyeyangheojeung_(ko)

咳嗽、短気、漿液性痰、四肢の冷えを伴う畏寒、自然発汗、顔面蒼白、白い滑苔をもつ胖大舌、弱脈を特徴とする証。陽気の不足による肺の温化成が原因と考えられる。

SD26

寒痰肺閉塞証^(TM):Cold and phlegm obstructing the lung pattern^(TM)

寒痰阻閉證 - Han tan zu bi zheng_(zh), カンタンソヘイショウ_(ja), Handamjopyejeung_(ko)

大量の痰・喀出物・胸部圧迫感を伴う咳嗽、痰を伴う喘鳴、悪寒と四肢の冷え、白膩苔又は滑苔をもつ淡白舌、弦・滑脈を特徴とする証。寒痰の肺への鬱滯が肺機能に影響することが原因と考えられる。

SD27

痰濁肺蓄積証^(TM):Turbid phlegm building up in the lung pattern^(TM)

痰濁[濕]阻[蘊]肺證 - Tan zhuo [shi] zu [yun] fei zheng_(zh), タンダク(シツ)ゾ(ウン)ハイショウ_(ja), Damseupjopyejeung_(ko)

胸苦しさ、咳嗽及び喘息、大量の白色痰の喀出、脂性の白苔、針金様脈及び滑脈を特徴とする証。肺氣を閉塞する痰湿の蓄積が原因と考えられる。

SD28

表寒肺熱証^(TM):Exterior cold with lung heat pattern^(TM)

表寒肺熱證 - Biao han fei re zheng_(zh), ヒヨウカンハイネツショウ_(ja), Pyohanpyeyeoljeung_(ko)

発熱を伴う悪寒、口渴、発汗の低下又は消失、落ち着きのなさ、咳嗽と喘息、胸苦しさ、黄色と白色の苔、浮・数脈を特徴とする証。寒邪の罹患による肺熱の外側鬱滯が原因と考えられる。

SD29

肺熱の激しい鬱滯証^(TM):Intense congestion of lung heat pattern^(TM)

肺熱熾[壅]盛證 - Fei re chi [yong] sheng zheng_(zh), ハイネツシ(ヨウ)セイショウ_(ja), Pyeyeolchiseongjeung_(ko)

発熱、口渴、咳嗽、荒い喘ぎ、胸痛、咽喉痛、鼻腔開大、熱感のある息、便秘、黄色尿、黄苔をもつ紅舌、数脈を特徴とする証。肺内の過盛な火と熱の蓄積が原因と考えられる。

SD2A

痰熱肺閉塞証^(TM):Phlegm-heat obstructing the lung pattern^(TM)

痰熱壅肺證 - Tan re yong fei zheng_(zh), タンネツヨウハイショウ_(ja), Damyeolongpyejeung_(ko)

咳嗽、短気、黄色又は血の混じった粘性痰の喀出、胸痛、帶黄色の膩苔をもつ紅舌、数・滑脈を特徴とする証。

SD2B

風熱肺侵入証^(TM):Wind and heat invading the lung pattern^(TM)

風熱犯肺證 - Feng re fan fei zheng_(zh), フウネツハンハイショウ_(ja), Pungyeolbeompyejeung_(ko)

軽度の寒気、頭痛、咽喉痛、咳嗽、黄薄苔をもつ紅舌尖、数・浮脈を特徴とする証。肺に風熱が侵入し、肺の機能に影響することが原因と考えられる。

SD2C

肺熱腸移行証^(TM):Lung heat transmitting into the intestine pattern^(TM)

肺熱移腸證 - Fei re yi chang zheng_(zh), ハイネツイチョウショウ_(ja), Pyeyeolijangjeung_(ko)

発熱、口渴、咳嗽、喘息、腹部膨満、便秘、紅舌、黄苔、滑脈又は実脈を特徴とする証。過盛な肺熱が蓄積し、腸熱に至り、腸の輸送機能に影響することが原因と考えられる。

SD2D

風寒肺傷害証^(TM):Wind and cold fettering the lung pattern^(TM)

風寒束肺證 – Feng han shu fei zheng_(zh), フウカンソクハイショウ_(ja), Punghansokpyejeung_(ko)

白色の水様性痰を伴う咳嗽、軽度悪寒を伴う発熱を特徴とする証。風寒という気候要因の攻撃が、肺氣の正常な流れを障害することが原因と考えられる。

SD2E

乾邪肺侵入証^(TM):Dryness pathogen invading the lung pattern^(TM)

燥邪犯肺證 – Zao xie fan fei zheng_(zh), ソジヤハンハイショウ_(ja), Josabeompyejeung_(ko)

痰を伴わない空咳、又は去痰困難な微量の粘性痰を伴う空咳、胸痛、軽度の寒氣及び発熱、口渴、口唇、口喉、鼻の乾燥、浮脈を特徴とする証。乾邪が肺に侵入し、津虛に至り、肺機能を障害することが原因と考えられる。

SD2F

肺燥腸遮断証^(TM):Lung dryness with intestinal blockage pattern^(TM)

肺燥腸閉證 – Fei zao chang bi zheng_(zh), ハイソウチョウヘイショウ_(ja), Pyejojangpyejeung_(ko)

咳嗽、口渴、喘息、便秘、膨満、腹部の脹満感及び疼痛、乾いた舌の黄苔、沈・実脈を特徴とする証。肺燥により体液を消耗し、腸内で中空器官の気が閉塞することが原因と考えられる。

SD2G

大腸実熱証^(TM):Large intestinal excess heat pattern^(TM)

大腸實熱證 – Da chang shi re zheng_(zh), ダイチョウシツネツショウ_(ja), Daejangsilyeoljeung_(ko)

便秘又は排便困難を伴う乾燥便、腹部膨満、触知による圧痛を特徴とする証。過盛な熱邪が腸気を閉塞することが原因と考えられる。

SD2H

大腸湿熱証^(TM):Dampness and heat in the large intestine pattern^(TM)

腸道[大腸]濕熱證 – Chang dao [da chang] shi re zheng_(zh), チョウドウ(ダイチョウ)シツネツショウ_(ja), Daejangseupyeoljeung_(ko)

腹部膨満と疼痛、悪臭性又は血性のことがある大量の下痢、排便中の疼痛のあるいきみ、肛門の灼熱感、発熱、口渴、尿量減少、褐色尿、脂性の黄苔、滑・数脈を特徴とする証。大腸内の湿熱という気候要因の蓄積、又は気機の乱れが原因と考えられる。

SD2J

大腸津虛証^(TM):Large intestinal fluid deficiency pattern^(TM)

大腸津虧證 – Da chang jin kui zheng_(zh), ダイチョウシンキショウ_(ja), Daejangjinhyujeung_(ko)

便秘又は排便困難、咽喉乾燥、少量の舌苔をもつ紅舌を特徴とする証。腸機能に影響する陰虛が原因と考えられる。

SD2K

大腸虛寒証^(TM):Large intestinal deficiency cold pattern^(TM)

大腸虛寒證 – Da chang xu han zheng_(zh), ダイチョウキヨカンショウ_(ja), Daejangheohanjeung_(ko)


異常な排便、異常な隠痛、悪熱と悪圧、下痢、四肢の冷え、腸雜音増、排便困難、薄い湿白苔をもつ淡白舌、沈・遲脈を特徴とする証。大腸の陽気の衰弱による内寒が原因と考えられる。

SD2Y

その他の特定の肺病証^(TM):Other specified lung Patterns^(TM)

SD2Z

肺病証^(TM)、詳細不明:Lung Patterns^(TM), unspecified




腎病証^(TM):Kidney Patterns(TM)

腎病證 Shen bing zheng_(zh)

ジンビョウショウ_(ja)

SinByeongjeung_(ko)



本セクションには、腎系^(TM)の機能障害が原因である、一連の TM の証が含まれている。この系は腎臓、膀胱、骨、毛髪、耳、生殖器、肛門、関連する経絡及び絡脈から構成される。

SD30

腎氣虛証^(TM):Kidney qi deficiency pattern^(TM)

腎氣虛證 [虧] – Shen qi xu zheng [kui]_(zh), ジンキキヨショウ_(ja), Singiheojeung_(ko)

浮動性めまい、健忘症、耳鳴、腰痛、性欲減退、弱脈を特徴とする証。腎気レベルの低下が原因と考えられる。

SD31

腎不納氣証^(TM):Kidney failing to receive qi pattern^(TM)

腎不納氣證 – Shen bu na qi zheng_(zh), ジンキフノウキショウ_(ja), Sinbulnapgijeung_(ko)

呼気の延長を伴う短気、吸気困難、無力性咳嗽、弱々しい声を特徴とする証。腎による気の保持機能低下が原因と考えられる。

SD32

水分貯留を伴う腎気虚証^(TM):Kidney qi deficiency with water retention pattern^(TM)

腎氣虛水泛[停]證 – Shen qi xu shui fan [ting] zheng_(zh), ジンキキヨスイハン(ティ)ショウ_(ja), Sinheosubeomjeung_(ko)


下肢で強い浮腫、尿量減少、背部と膝の酸痛と脱力、脂性の白苔をもつ蒼白の胖大舌、弱脈を特徴とする証。腎気の不足が、気の昇発と水の代謝に関わる腎機能に影響し、水分の貯留と横溢に至ることが原因と考えられる。

SD33

腎気不固証^(TM):Kidney qi insecurity pattern^(TM)

腎氣不固證 – Shen qi bu gu zheng_(zh), ジンキフコショウ_(ja)

頻尿、排尿後の尿滴下、尿失禁又は便失禁、男性の夢精又は早漏、女性の持続性の月経滴下又は高い流産リスク、背部及び膝の酸痛、弱脈を特徴とする証。腎気が障害され、固定機能に影響するためと考えられる。



SD34

腎陰虚証^(TM):Kidney yin deficiency pattern^(TM)

腎陰虚證 – Shen yin xu zheng_(zh), ジンインキヨショウ_(ja), Sineumheojeung_(ko)


背部痛、嗜眠、浮動性めまい、耳鳴、男性の夢精、女性の希発月経、削瘦、咽喉乾燥、口渴、頬部潮紅、手掌、足底及び胸部の熱感を伴う身体違和感、午後の発熱、寝汗、舌苔がほとんど又はまったくない紅舌、細数脈を特徴とする証。腎陰の不足により、陰虛に由来する火の内的障害に至ることが原因と考えられる。

SD35

腎陰陽虛証^(TM):Kidney yin-yang deficiency pattern^(TM)

腎陰陽兩虛證 – Shen yin yang liang xu zheng_(zh), ジンインヨウリョウキヨショウ_(ja), Sineumyangyangheojeung_(ko)

回転性めまい、耳鳴、腰部及び膝の痛み、手掌及び胸部の熱、寝汗、夢精、四肢の冷え、自然発汗を特徴とする証。腎臓の陰陽両虛が原因と考えられる。



SD36

骨髓枯渇を伴う腎虚証^(TM):Kidney deficiency with marrow depletion pattern^(TM)

腎虛髓虧證 – Shen xu sui kui zheng_(zh), ジンキズイキショウ_(ja), Sinheosuhujujeung_(ko)

成長遅延、長期間の骨癒合不全、腰部の疼痛、骨の軟化、浮動性めまい、耳鳴、健忘症、認知症を特徴とする証。腎精の不足による髄の失調が原因と考えられる。

SD37

腎精虚証^(TM):Kidney essence insufficiency pattern^(TM)

腎精虧虛證 – Shen jing kui xu zheng_(zh), ジンセイフクショウ_(ja), Sinjeongbujokjeung_(ko)

発育遅延(小児);早老、生殖機能低下、耳鳴、歯のゆるみ、脱毛及び健忘症(成人)を特徴とする証。発達に必要な腎精の不足が原因と考えられる。

SD38

腎陽虛証^(TM):Kidney yang deficiency pattern^(TM)

腎陽虛證 – Shen yang xu zheng_(zh), ジンヨウキヨショウ_(ja), Sinyangheojeung_(ko)

悪寒、四肢の冷え、倦怠感、腰部・膝の脱力及び痛み、早漏又は陽痿(男性)、不感症又は不孕(女性)、夜間頻尿、白苔、尺部の弱脈を特徴とする証。腎陽の不足により身体を温められないことが原因と考えられる。

SD39

畏怖腎損傷証^(TM):Fear damaging the kidney pattern^(TM)

驚恐傷腎證 – Jing kong shang shen zheng_(zh), キョウキョウショウジンショウ_(ja), GyeonggongSangsinjeung_(ko)

パニック、陽痿、精液漏、尿失禁、便失禁を特徴とする証。大きな恐怖が腎氣を障害する、又は情動的状態の身体化が原因と考えられる。

SD3A

水泛を伴う腎陽虛証^(TM):Kidney yang deficiency with water flooding pattern^(TM)

腎陽虛水泛[停]證 – Shen yang xu shui fan [ting] zheng_(zh), ジンヨウキヨスイハン(ティ)ショウ_(ja), Sinheosubeomjeung_(ko)

悪寒、四肢の冷え、浮腫、腹部膨満、背部痛、尿量減少、脂性の白苔、蒼白の胖大舌、沈・遲脈を特徴とする証。腎陽の低下を伴う湿邪の気候要因と関連すると考えられる。

SD3B

子宮血熱蓄積^(TM):Blood and heat accumulation in the uterus pattern^(TM)

胞宮血[積]熱證 – Bao gong xue [ji] re zheng_(zh), ホウキュウケツ(セキ)ネツショウ_(ja), Pogunghyeolyeoljeung_(ko)

下腹部の灼熱感と疼痛、鮮紅色の大量月経を伴う月経先期、悪臭を伴う粘性で帶黄色の膿分泌物、黄苔をもつ紅舌、数脈を特徴とする証。子宮内の熱蓄積が原因と考えられる。

SD3C

痰子宮閉塞^(TM):Phlegm obstructing the uterus pattern^(TM)

痰凝[阻]胞宮證 – Tan ning [zu] bao gong zheng_(zh), タンギョ(ゾ)ホウキュウショウ_(ja), Damjopogungjeung_(ko)

大量の白色膿分泌物、無月経、不孕、肥満、運動減少、脂性の白苔をもつ淡白舌、及び滑・濡・遲脈を特徴とする証。子宮内に痰が鬱滯し、血液又は気の流れを閉塞することが原因と考えられる。

SD3D

子宮湿熱証^(TM):Dampness and heat in the uterus pattern^(TM)

胞宮濕熱證 – Bao gong shi re zheng_(zh), ホウキュウシツネツショウ_(ja), Pogungseupyeoljeung_(ko)

悪臭を伴う大量の粘性で帶黄色の膿分泌物、外陰の痒み肌とびらん、脂性の黄苔をもつ紅舌、滑・数脈を特徴とする証。湿熱の気候要因の子宮内蓄積が原因と考えられる。

SD3E

子宮湿邪証^(TM):Dampness and wet obstructing the uterus pattern^(TM)


痰濕阻胞證 - Tan shi zu bao zheng_(zh), タンシツソホウショウ_(ja), Damseupjopojeung_(ko)

SD3F

子宮寒鬱滯証^(TM):Cold stagnation in the uterus pattern^(TM)

寒凝胞宮證 [寒滯胞宮證] - Han ning bao gong zheng [Han zhi bao gong zheng]_(zh), カンギョホウキュウショウ_(ja), Haneungpogungjeung_(ko)

温かさを求める下腹部の冷痛、月経時の下腹部と腰仙領域の疼痛、月経周期の遅れ、黒紫の月経血、透明で水様性で白色がかかった膣分泌物、白苔、沈・緊脈を特徴とする証。子宮内の寒の蓄積が血氣の流れを遮断することが原因と考えられる。



SD3G

子宮虛寒証^(TM):Uterine deficiency and cold pattern^(TM)

胞宮虛寒[陽虛]證 - Bao gong xu han [yang xu] zheng_(zh), ホウキュウキヨカン(ヨウキヨ)ショウ_(ja), Pogungheohanjeung_(ko)


悪寒、四肢の冷え、温かさを求める圧迫感のある下腹部の隠痛、明るい色で薄い月経血、透明で水様性の膣分泌物、不孕、流産、顔面蒼白、白苔をもつ淡白舌を特徴とする証。陽気の不足により子宮を温められないことが原因と考えられる。

SD3H

膀胱血蓄積証^(TM):Blood accumulation in the bladder pattern^(TM)

膀胱蓄血證 - Pang guang xu xue zheng_(zh), ポウコウチクケツショウ_(ja), Banggwangchughyeoljeung_(ko)

下腹部の膨満と鋭痛、排尿困難及び排尿時痛、紫舌又は斑を有する舌、針金様脈、非滑脈を特徴とする証。下腹部の損傷又は熱邪の侵襲により、膀胱内の血鬱滯が原因と考えられる。



SD3J

膀胱熱蓄積証^(TM):Bladder heat accumulation pattern^(TM)

膀胱蘊[實][積][蓄]熱證 - Pang guang yun [shi] [ji] [xu] re zheng_(zh), ポウコウウン(ジツ)(セキ)(チク)ネツショウ_(ja), Banggwangchugyeoljeung_(ko)

下腹部膨満、排尿時の灼熱感及び疼痛、発熱、口渴、黄苔をもつ紅舌、強い数脈を特徴とする証。膀胱内の熱蓄積が原因と考えられる。

SD3K

膀胱湿熱証^(TM):Bladder dampness and heat pattern^(TM)

膀胱濕熱證 - Pang guang shi re zheng_(zh), ポウコウシツネツショウ_(ja), Banggwangseupyeoljeung_(ko)

切迫性で頻回の疼痛性排尿、舌根に向かつた脂性の黄苔、滑脈を特徴とする証。膀胱内の湿熱蓄積が原因と考えられる。

SD3L

膀胱蓄水証^(TM):Water accumulation in the bladder pattern^(TM)

膀胱蓄水證 – Pang guang xu shui zheng_(zh), ポウコウチクスイショウ_(ja), Banggwangchugsujeung_(ko)


下腹部の膨満及び疼痛、排尿困難を特徴とする証。膀胱内の気昇発障害による、膀胱内の水分貯留が原因と考えられる。

SD3M

膀胱虛寒証^(TM):Bladder deficiency cold pattern^(TM)

膀胱虛寒證 – Pang guang xu han zheng_(zh), ポウコウキヨカンショウ_(ja), Banggwangheohanjeung_(ko)

疼痛及び多量の透明な尿の排尿を特徴とする証。腎陽が消耗することで気の不足が生じることが原因と考えられる。



SD3Y

その他の特定の腎病証^(TM):Other specified kidney Patterns^(TM)

SD3Z

腎病証^(TM), 詳細不明:Kidney Patterns^(TM), unspecified

SD5Y

その他の特定の臓器系証^(TM):Other specified organ system patterns^(TM)

SD5Z

臓器系証^(TM), 詳細不明:Organ system patterns^(TM), unspecified



環境因子証^(TM): Environmental factor patterns^(TM)

環境證 Huan jing zheng_(zh)

カンキヨウショウ_(ja)

Oesabyeongjeung_(ko)

本セクションには、気候要因に関する共通の原因(風、寒、湿、燥、火、暑)をもち、病原体、寄生虫又は毒素が存在する証が含まれている。

SD60

風証^(TM): Wind pattern^(TM)

風淫證 - Feng yin zheng_(zh), フワインショウ_(ja), Pungeumjeung_(ko)

発熱、悪風、遊走痛、硬舌、浮動性めまい、霧視、そう痒、四肢のしびれ感、振戦、痙攣、口眼喰斜又は片麻痺を特徴とする証。

外風因子があり、肝氣又は肝風が体内を逆方向に上行することが原因と考えられる。

SD61

寒証^(TM): Cold pattern^(TM)

寒淫證 - Han yin zheng_(zh), カンインショウ_(ja), Haneumjeung_(ko)

悪寒又は畏寒、熱を好む冷痛、口渴の欠如、希薄な透明の痰及び鼻粘液、長時間の清澄尿の排出、下痢、白い顔色、白苔を伴う淡白舌、緊脈又は遲脈を特徴とする証。外寒の因子、陽気の不足、又は体内の過剰な陰寒が原因と考えられる。

SD62

湿証^(TM): Dampness pattern^(TM)

濕淫證 - Shi yin zheng_(zh), シツインショウ_(ja), Seubeumjeung_(ko)

疲労、重く動かしにくい四肢、頭重、食欲不振、腹部膨満、便溏、滑・膩苔、濡・緩脈を特徴とする証。

外湿の因子、又は脾腎の陽虛に起因する体内の湿により、津の運化及び昇発が低下し、それによる水鬱滯が原因と考えられる。

SD63

燥証^(TM): Dryness pattern^(TM)

燥淫證 - Zao yin zheng_(zh), ソウインショウ_(ja), Joeumjeung_(ko)

皮膚乾燥、そう痒、鼻・口・喉の乾燥、乾咳、眼乾燥又は便秘を特徴とする証。外燥因子又は体液不足による内燥が原因と考えられる。

SD64

火熱証^(TM):Fire-heat pattern^(TM)

火熱淫證 – Huo re yin zheng_(zh), カネツインショウ_(ja), Hwayeoreumjeung_(ko)

高熱、頭痛、目の充血、口苦、口内乾燥、冷たい飲料に対する口渴を特徴とする証。体外で感受するか、又は体内で発生する熱と火が原因と考えられる。

SD65

暑熱証^(TM):Summer-heat pattern^(TM)

暑熱淫證 – Shu re yin zheng_(zh), ショネツインショウ_(ja), Seoyeoreumjeung_(ko)

発汗を伴う高熱、口渴、息切れ、倦怠感、動かしにくい四肢、短時間の暗黒色の尿の排出、紅舌、又は数・虚脈を特徴とする証。体外の暑邪の感受が原因と考えられる。

SD66

重度病証^(TM):Severe pathogenic pattern^(TM)

疫疠證 – Yi li zheng_(zh), エキレイショウ_(ja), Yeongnyeobyeongjeung_(ko)

病原体、寄生虫又は毒素の存在に関係する、共通の原因をもつ証。

SD6Y

その他の特定の環境因子証^(TM):Other specified environmental factor patterns^(TM)

–

SD6Z

環境因子証^(TM), 詳細不明:Environmental factor patterns^(TM), unspecified

–

AF


経絡証^(TM):Meridian patterns^(TM)

経絡證 Jing luo zheng_(zh)

ケイラクショウ_(ja)

Gyeongrakbyeongjeung_(ko)

本セクションには、経絡^(TM)の機能障害が原因である、一連の TM の証が含まれている。これは正経 12 脈と奇経 8 脈から構成される。



経脈病証^(TM):Main Meridian Patterns^(TM)

ケイミヤクビヨウショウ_(ja)

Sibijeonggyeongbyeongjeung_(ko)


本セクションには、正経 12 脈の機能障害が原因である、一連の TM の証が含まれている。

SD70

肺経証^(TM):Lung meridian pattern^(TM)

手太陰肺經 是動病證 – Shou tai yin fei jing shi dong bing zheng_(zh), テタイインハイケイゼドウビヨウ ショウ_(ja), Sutaeemyeongbyeongjeung_(ko)

肺の膨満感、息切れ、咳嗽、鎖骨上窩の疼痛を特徴とする証。極端な場合、腕を交差させたとき、苦しみに身をよじらせて震える。この証では、ときに以下の症状が発現する。咳嗽、息切れ、嘔声、胸部の病的感覺及び胸部膨満、上肢前側の橈側縁の疼痛、ほてり、手掌の熱感。



SD71

大腸経証^(TM):Large intestine meridian pattern^(TM)

手陽明大腸經 是動病證 – Shou yang ming da chang jing shi dong bing zheng_(zh), テヨウメイダイチヨウ ケイゼドウビヨウショウ_(ja), Suyangmyeongdaejanggyeongjeung_(ko)

歯痛及び頸部腫大を特徴とする証。この証では、ときに以下の症状が発現する。帶黄色眼、口内乾燥、鼻閉、鼻出血、喉頭の腫脹及び疼痛、前肩部及び上腕の疼痛、示指の疼痛、指の不十分な随意運動。

SD72

胃經証^(TM): Stomach meridian pattern^(TM)

足陽明胃經 是動病證 – Zu yang ming wei jing shi dong bing zheng_(zh), アショウメイケイゼドウビヨウ
ショウ_(ja), Jogyangmyeongwigyeongbyeongjeung_(ko)

多くの場合は呻吟、伸び、あくび、暗い顔を伴う悪寒戦慄を特徴とする証。重篤な場合、人や火を見るなどを嫌い、木をたたく音を怖がり、気分が動搖し、門と窓を閉めて、部屋にひとりでいることを望む。極短な場合、高い所に上の衝動があり、歌い、服を脱いで走る。腹部膨満を認める。この証では、ときに以下の症状が発現する。精神障害、悪寒、痙攣、発汗を伴う高熱、鼻閉及び鼻出血、口の歪み及び口唇潰瘍、頸部腫脹、喉頭の腫脹と疼痛、腹部浮腫、腫脹膝蓋の疼痛、胸部、乳房、鼠径部、大腿、大腿下部、すねの外側縁、足背全体の疼痛、第3趾の不十分な随意運動。

SD73

脾經証^(TM): Spleen meridian pattern^(TM)

足太陰脾經 是動病證 – Zu tai yin pi jing shi dong bing zheng_(zh), アシタイインヒケイゼドウビヨウショウ
ウ_(ja), Joktaeeumbigyeongbyeongjeung_(ko)

硬い舌根、食後すぐの胃痛を伴う嘔吐、頻繁なおくびを伴う腹部膨満、排便又は放屁後の快適又は安堵感、全身の重い感じを特徴とする証。この証では、ときに以下の症状が発現する。舌根の疼痛、身体の運動不能、消化障害、胸のむかつき、心窓部のうずくような痛み、下痢、尿閉、黄疸、横になることができない、大腿及び膝内側が腫脹して無理に立ち上がったとき冷える、母趾の不十分な随意運動。

SD74

心經証^(TM): Heart meridian pattern^(TM)

手少陰心經 是動病證 - Shou shao yin xin jing shi dong bing zheng_(zh), テショウインシンケイゼドウビ
ヨウショウ_(ja), Susoeumsimgyeongbyeongjeung_(ko)

胸痛、口渴、口渴に対する飲水欲を特徴とする証。この証では、ときに以下の症状が発現する。帶黄色眼、腹部と胸部の両側の疼痛、上肢前側尺骨縁の疼痛と悪寒、手掌の熱感と疼痛。

SD75

小腸經証^(TM): Small intestine meridian pattern^(TM)

手太陽小腸經 是動病證 – Shou tai yang xiao chang jing shi dong bing zheng_(zh), テタイヨウショウチヨウ
ウケイゼドウビヨウシヨウ_(ja), Sutaeeumsojanggyeongbyeongjeung_(ko)

咽喉痛、顎腫脹、振り返って頭を回せない、肩脱臼又は上腕骨折の感覚を特徴とする証。この証では、ときに以下の症状が発現する。聴覚障害、帯黄色眼、頬部腫脹、頸部、顎、肩、上腕、肘、前腕後側の尺骨縁の疼痛。

SD76

膀胱經証^(TM):Bladder meridian pattern^(TM)

足太陽膀胱經 是動病証 – Zu tai yang pang guang jing shi dong bing zheng_(zh), アシタイヨウボウコウケイ ゼドウビョウショウ_(ja), Joktaeyangbanggwanggyeongbyeongjeung_(ko)

重度の頭痛、眼球と項部の落ちる感じ、脊椎の疼痛と腰が曲がる感じ、肢の屈曲不能、膝窩部の硬直、腓腹筋が引きちぎられる感じを特徴とする証。この証では、ときに以下の症状が発現する。痔核、悪寒、譫妄、頭頂部又は項部の疼痛、帶黃色眼、流涙、鼻閉及び鼻出血、項部、背部、殿部、膝窩部、腓腹、下肢の全体の疼痛、第5趾の不十分な随意運動。

SD77

腎經証^(TM):Kidney meridian pattern^(TM)

足少陰腎經 是動病証 – Zu shao yin shen jing shi dong bing zheng_(zh), アシショウインジンケイゼドウビョウショウ_(ja), Joksoeumsingyeongbyeongjeung_(ko)

空腹感はあるが食欲はない、暗くつやのない顔、咳嗽を伴う血性唾液、嗄声、息切れ、頭部ふらふら感、精神不安定、気が不十分なとき誰かが彼／彼女を捕まえようとしているように感じ恐怖することを特徴とする証。この証では、ときに以下の症状が発現する。口の熱感、乾燥舌、咽頭腫脹、ほてり、口渴、咽喉痛、胸のむかつき、胸痛、黄疸、下痢、大腿内側の後端の疼痛、肢の脱力と冷え、横になりたい感じ、足底の熱感と疼痛。

SD78

心包經証^(TM):Pericardium meridian pattern^(TM)

手厥陰心包經 是動病証 – Shou jue yin xin bao jing shi dong bing zheng_(zh), テケツインシンボウケイゼドウビョウショウ_(ja), Sugworeumsimpogyeongbyeongjeung_(ko)

SD79

手少陽三焦經是動病証^(TM)

手少陽三焦經 是動病証 – Shou shao yang san jiao jing shi dong bing zheng_(zh), テノショウヨウサンショウケイゼドウビョウショウ_(ja), Susoyangsamchogyeongbyeongjeung_(ko)

難聴、急速な流水音の知覚、咽喉の腫脹、喉頭の腫脹及び疼痛を特徴とする証。本証は次の症状を発現し呈することがある。発汗、目尻疼痛、頬部疼痛及び耳後部、肩、上腕、肘、前腕外側部の全部位における疼痛ならびに手の第四指の随意運動不十分。

SD7A

足少陽胆經是動病証^(TM)

足少陽膽經 是動病証 – Zu shao yang dan jing shi dong bing zheng_(zh), アシショウヨウタンケイゼドウビョウショウ_(ja), Joksoyangdamgyeongbyeongjeung_(ko)

口腔内の苦味、ため息回数の増加、肋骨下部疼痛、身体回転不可能を特徴とする証。極端な例では、粉っぽい暗黒色の顔色及び光沢のない身体、外反足及び足の熱感がみられる。本証は次の症状を発現し呈することがある。頭痛、頸痛、目尻疼痛、鎖骨上窩の腫脹及び疼痛、腋窩腫脹、凍瘡、発汗、悪寒戦慄、悪寒ならびに胸部、肋骨下部、肋骨、大腿部、膝外側、脛、下肢外側、外踝前縁及び各関節の疼痛、足指の第四指の随意運動不十分。