

表2 多重ロジスティックモデルによる膿疱性乾癬の頻回再発リスク(1)

要因		頻回再発症例 数/対象数	オッズ 比	95% CI
経過	治癒～軽快	6/82	1	-
	不変	2/13	2.13	0.37-12.19
	徐々に悪化～ 急速に悪化	13/66	3.02	1.08-8.48
発症誘因	なし	18/144	1	-
	上気道感染症	4/19	1.72	0.51-5.84
	なし	18/140	1	-
	薬剤	4/23	1.49	0.45-4.94
	なし	20/148	1	-
	副腎皮質ステロイド*	2/15	1.01	0.21-4.90
先行疾患 尋常性乾癬	なし	12/89	1	-
	あり	10/80	0.81	0.32-2.05
先行疾患 掌蹠膿疱症	なし	21/147	1	-
	あり	1/16	0.44	0.06-3.52
新規申請時の 再燃	なし	13/137	1	-
	あり	8/23	5.92	2.02-17.32
新規申請時の	再燃回数		2.29	1.40-3.74
合併症	なし	8/92	1	-
	あり	11/64	2.43	0.89-6.63
紅斑 (発症時・悪化 時)	体表面積 50%以下	3/45	1	-
	ほぼ全身	19/104	3.09	0.85-11.23
膿疱形成 (発症時・悪化 時)	体表面積 50%以下	12/103	1	-
	ほぼ全身	10/44	2.01	0.78-5.18
膿海 (発症時・悪化 時)	なし	5/53	1	-
	あり	17/92	2.27	0.77-6.67

表2 多重ロジスティックモデルによる膿疱性乾癬の頻回再発リスク(2)

要因		頻回再発症例 数/対象数	オッズ 比	95% CI
粘膜疹 (発症時・悪化 時)	なし	17/128	1	-
	あり	5/21	1.97	0.62-6.18
発熱 (発症時・悪化 時)	なし	4/20	1	-
	38 未満	6/39	0.77	0.19-3.19
	38 以上 39 未満	5/53	0.43	0.10-1.83
	39 以上	7/37	1.01	0.25-4.07
白血球数(/mm ³)	10000 未満	6/56	1	-
	10000 以上 15000 未満	12/73	1.53	0.53-4.44
	15000 以上	4/31	1.15	0.29-4.53
赤沈(mm/60 分)	16 未満	3/11	1	-
	16-50 未満	6/38	0.57	0.11-2.86
	50 以上	2/30	0.26	0.04-1.95
IgG	正常(870-1700)	9/84	1	-
	低い	6/23	2.64	0.81-8.58
	高い	3/10	4.01	0.85-18.9 5
血清アルブミン	3.8 以上	13/64	1	-
	3.0 以上 3.8 未満	4/51	0.34	0.10-1.14
	3.0 未満	3/28	0.63	0.15-2.69
CRP(mg/dl)	0.3 未満	1/18	1	-
	0.3 以上-7.0 未満	11/76	3.16	0.37-26.8 3
	7.0 以上	9/62	4.06	0.44-37.0 9
内服治療 エトレチナート	なし	14/65	1	-
	あり	7/87	0.35	0.13-0.96
内服治療 シクロスポリン	なし	7/80	1	-
	あり	13/66	2.49	0.92-6.73
内服治療 副腎皮質ステロイド	なし	11/102	1	-
	あり	9/41	2.34	0.88-6.25
外用薬等 副腎皮質ステロイド	なし	2/18	1	-
	あり	18/142	1.06	0.22-5.10
外用薬等 活性ビタミン D3	なし	6/45	1	-
	あり	16/114	1.00	0.36-2.78
外用薬等 光線療法	なし	18/114	1	-
	あり	2/31	0.36	0.08-1.67

注) 更新時の再発回数不明を除く