

厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）

分担研究報告書

ペット飼育と身体的・精神的・社会的健康との関連の横断的評価

分担研究者 宮松 直美 滋賀医科大学臨床看護学講座 教授

研究協力者 片寄 亮 滋賀医科大学大学院医学系研究科 大学院生

研究要旨

B町に在住する65歳以上高齢者を対象にペット飼育と身体的・精神的・社会的健康との関連を横断的に検討することを本研究の目的とした。B町高齢者コホートベースライン悉皆調査に協力が得られた5,094名（応諾率94.3%）のうち、直近の重症疾患歴や入院歴があった者、さらに主要変数に欠損のあった者を除外した3,350名を本研究の解析対象者とした。主要評価指標はペット飼育項目（飼育の有無・飼育者）、基本チェックリスト25項目、主観的健康感、社会活動・交流関連3項目（友人宅訪問・ボランティア活動・地域活動）とした。応答変数として身体的健康を運動機能、精神的健康を認知機能・うつ傾向・主観的健康感、社会的健康を閉じこもり傾向・社会活動と定義した。説明変数は「ペット飼育者（飼育していない・家族飼育・本人飼育）」とし、飼育していない群を参照水準とした各応答変数（運動機能低下あり・認知機能低下あり・うつ傾向あり・良好な主観的健康感・閉じこもり傾向あり・活発な社会活動・交流）のオッズ比及び95%信頼区間を性・年齢・調査方法（郵送・訪問）・慢性疾患の有無・運動制限の有無を調整した多重ロジスティック回帰モデルを用いて算出した。その結果、解析対象者の約6割が女性、平均年齢±標準偏差は75.4±6.9歳（後期高齢者は約半数）であり、ペットの飼育割合は全体で638名（19.0%）であった。ペット飼育による各応答変数の該当頻度は⁽¹⁾運動機能低下者は本人飼育群で0.70倍、⁽²⁾良好な主観的健康感である者は本人飼育群で1.43倍、家族飼育群で0.72倍、⁽³⁾活発な社会活動である者が本人飼育群で1.33倍であることが示された。しかし認知機能及びうつ傾向との関連は認めなかった。これらの結果は対象者を70歳以上の者・慢性疾患があった者・同居者がいた者に限定したサブ解析、さらに説明変数をイヌの飼育者（非飼育者、イヌ以外のペット飼育者、イヌ飼育者）としたサブ解析（運動機能のみ）においても主解析結果と同様の傾向を示した。

B町高齢者においてペットの世話を自ら行っている者は運動機能・主観的健康感・社会活動・交流が良好に維持されている可能性が高いと考えられる。そのため地域在住高齢者の身体的・精神的・社会的健康を包括的に維持させていくために「ペット飼育」が効果的な役割を果たす可能性が示唆された。

A. 目的

近年は平均寿命の延伸率が健康寿命の延伸率を超えており、その差が年々広がっている¹⁾。高齢者の生活の質を維持させるためには

健康寿命を今後より延伸させるための取り組みが必要である。高齢者は加齢による身体的な変化だけでなく、精神状態や機能の変化、さらに高齢者を取り巻く社会環境の変化が著

しい世代であるため、高齢者の健康を維持するためには「身体的にも精神的にも社会的にも健康状態が満たされた状態」を維持するという観点が重要であると考えられる。

そこで本研究では高齢者の身体的・精神的・社会的健康それぞれを良好に維持させる作用を保有すると考えられる要因の1つである「ペット飼育」に焦点を当て、以下3点を明らかにすることを目的とした。

1. ペット飼育と身体的健康としての運動機能との関連
2. ペット飼育と精神的健康としての認知機能・うつ傾向・主観的健康感との関連
3. ペット飼育と社会的健康としての閉じこもり傾向・社会活動との関連

B. 方法

1. 対象者

B町高齢者コホート研究のベースライン悉皆調査(対象者5,417名)に参加した5,094名(回収率94.1%)のうち6ヶ月以内の循環器疾患の既往歴、重症高血圧症の既往歴、糖尿病性の視覚障害・腎機能障害・低血糖発作の既往歴、3ヶ月以内の入院歴があった385名と、運動機能、認知機能、うつ傾向、主観的健康感、閉じこもり、社会活動・交流、ペット飼育の主要変数いずれかに欠損のあった1,359名を除外した3,350名を本研究の解析対象者とした。

2. データ収集方法および調査項目

本調査はまず郵送調査を実施し、その後郵送調査の未回収者に対して看護職者による訪問聞き取り調査を実施した。

ベースライン調査では④基本チェックリスト25項目、⑤生活実態(住居構造、家族構成、交通の利便性や医療圏・生活圏、ペット飼育状況など)、⑥主観的な健康観や健康に対する

受け止め方、⑦未受診の理由や健診に対する考え方を含む項目を収集した。

3. 用語の定義

1). 応答変数

(1) 身体的健康

身体的健康は「運動機能」を以って評価した。基本チェックリストによる運動器関連5項目(No.6-10)を用いて評価し、5項目のいずれか3項目以上に否定的回答をした者を「運動機能低下あり」と定義した²⁾。

(2) 精神的健康

精神的健康は「認知機能」「うつ傾向」「主観的健康感」を以って評価した。基本チェックリストによる認知機能関連3項目(No.18-20)を用い、3項目いずれか1項目以上に否定的回答をした者を「認知機能低下あり」とし²⁾、同様に基本チェックリストによるうつ関連5項目(No.21-25)の内いずれか2項目以上に否定的回答をした者を「うつ傾向あり」と定義した²⁾。「主観的健康感」に関しては「普段、ご自分で健康だと思いますか」という問いに対し「とても健康」「まあまあ健康」「あまり健康でない」「健康でない」の4つの選択肢から択一で回答を得ており、「とても健康」「まあまあ健康」と回答したものを「良好な主観的健康感」とした³⁾。

(3) 社会的健康

社会的健康は「閉じこもり傾向」「社会活動」を以って評価した。基本チェックリスト外出頻度関連2項目(No.16・17)を用い「(No.16)週に1回以上外出していますか」に対して否定的回答した者を「閉じこもり傾向あり」とした²⁾。また「友人の家を訪ねていますか」「ボランティア活動をしていますか」「地域活動(自治会や町内行事、老人クラブ、祭りなど)をしていますか」の問いをそれぞれ二項択一で回答を得ており、3項目のうちいずれ

か2項目以上の肯定的回答をした者を「活発な社会活動」と定義した。

2). 説明変数

ペットの飼育については「ペットを飼っていますか」の問いに対し「はい、主な世話は自分がする(以下、本人飼育と記す)」「はい、主な世話は家族がする(以下、家族飼育と記す)」「いいえ(以下、非飼育者と記す)」の三項択一で回答を得ており、ペット飼育者と定義した。

4. データ分析方法

対象者の属性は全体及びペット飼育者別に記述した。次に運動機能、認知機能、うつ傾向、主観的健康感、閉じこもり、社会活動・交流それぞれの評価項目の該当割合について全体及びペット飼育者別に記述し、ペット飼育者間の相違を χ^2 検定で検定した。さらに「運動機能低下あり」、「認知機能低下あり」、「うつ傾向あり」、「主観的健康感良好」、「閉じこもり傾向あり」、「活発な社会活動・交流」の該当の有無を応答変数とし、ペット飼育者(飼育していない[参照水準]・家族飼育・本人飼育)を説明変数とし、性・年齢・調査方法(郵送調査、訪問調査)・慢性疾患の有無・運動制限の有無を調整した多変量ロジスティック回帰分析を行いオッズ比及び95%信頼区間を算出した。

またサブ解析として㊸解析対象者を70歳以上であった者・慢性疾患があった者・同居者がいた者に限定しての同様の解析、㊹説明変数をイヌの飼育者(非飼育者、イヌ以外のペット飼育者、イヌ飼育者)として運動機能低下との関連を検討した。

5. 倫理的配慮

本研究は、京都大学大学院医学研究科・医

学部および医学部附属病院医の倫理委員会(承認番号E-1457)および滋賀医科大学倫理委員会(承認番号26-175)の承認のもとに実施された。調査結果は住所・氏名等個人が容易に特定されるデータを除いた匿名化データとして調査協力自治体よりデータ分析担当者に送付された。また、個人情報を含むデータおよび対応表は、調査協力自治体で保管された。

C. 結果

1. 対象者の属性

対象者全体の属性について表1に示した。対象者の約6割が女性であった。年齢(平均値±標準偏差)は75.4±6.9歳、約5割が後期高齢者であった。訪問聞き取り調査により調査協力した者は888名(26.5%)であった。経済的暮らしぶりを豊かであると受け止めている者は約4割であり、全体の約4割が趣味や習い事をもっていた。また慢性疾患をもっている者は74.5%、健康上の問題で運動制限がある者が5.6%であった。

対象者のペット飼育者について表2に示した。ペットを飼育している者は638名(19.0%)であった。ペット飼育者のうち家族飼育者は218名(34.2%)、本人飼育者は420名(65.8%)と家族飼育よりも本人飼育の方が割合は大きかった。ペット飼育者別(非飼育・家族飼育・本人飼育)の属性について表3に示した。性別・調査方法・慢性疾患の有無・運動制限の有無・居住環境・経済的暮らしぶりの受け止め方についてはペット飼育者間で有意な差を認めなかった。しかし年齢・趣味や習い事の有無に関しては群間での有意差が認められた。本人飼育群の平均年齢は非飼育群及び家族飼育群いずれよりも有意に低かった(いずれも $p<0.001$, Games-Howell検定)。

2. 身体的健康

運動機能低下ありの該当割合と運動機能関

連項目それぞれの該当割合を全体及びペット飼育者別に記述した結果を表 4 に示した。全体では運動機能低下ありの該当割合は 30.2% であり、ペット飼育者別の群間で有意差が認められた ($p<0.001$)。またいずれの運動機能関連項目も本人飼育群での該当割合は小さく、群間で有意差が認められた (いずれの項目も $p<0.001$)。

次に、ペット飼育者による「運動機能低下あり」の調整オッズ比 (95%信頼区間) を表 5 に示した。非飼育群を参照水準とした家族飼育群と本人飼育群の「運動機能低下あり」の調整オッズ比 (95%信頼区間) はそれぞれ 1.23 (0.89-1.69) 0.70 (0.53-0.92) であり、本人飼育群において運動機能低下ありの頻度が低いことが示された。

3 . 精神的健康

認知機能低下あり・うつ傾向あり・良好な主観的健康感の該当割合と認知機能・うつ・主観的健康感の関連項目それぞれの該当割合について全体及びペット飼育者別に記述した結果を表 6-8 に示した。認知機能低下ありの該当割合は対象者全体で約 3 割であり、ペット飼育者の群間で有意差は認めなかった ($p=0.278$)。うつ傾向ありの該当割合は全体で約 2 割であり、ペット飼育者間で有意差は認めなかった ($p=0.214$)。良好な主観的健康感の該当割合は全体で 77.9% であった。ペット飼育者別で群間での有意差が認められ ($p=0.001$)、本人飼育群において主観的健康感を良好に保っている者の割合が大きかった。

次にペット飼育者による「認知機能低下あり」「うつ傾向あり」「良好な主観的健康感」それぞれの調整オッズ比 (95%信頼区間) を表 9 に示した。非飼育群を参照水準とした家族飼育群と本人飼育群の「認知機能低下あり」「うつ傾向あり」「良好な主観的健康感」の調整オッズ比 (95%信頼区間) は「認知機能低

下あり」で 1.23(0.92-1.65) 1.17(0.93-1.46) 「うつ傾向あり」で 1.23 (0.88-1.72) 1.00 (0.76-1.31) 「良好な主観的健康観」で 0.72 (0.52-0.99) 1.43 (1.07-1.89) であった。家族飼育群において良好な主観的健康観の頻度は低く、本人飼育群において良好な主観的健康観の頻度が高いことが示された。

4 . 社会的健康

閉じこもり傾向あり及び活発な社会活動の該当割合と外出頻度及び社会活動関連項目それぞれの該当割合を全体及びペット飼育者別に記述した結果を表 10・11 に示した。閉じこもり傾向ありの該当割合は全体で 17.7% であり、ペット飼育者別で群間での有意差が認められた ($p=0.012$)。また活発な社会活動の該当割合は全体で 50.2% であった。ペット飼育者別で群間での有意差が認められ ($p=0.004$)、社会活動関連項目いずれの項目も本人飼育群での該当割合が大きかった。

次にペット飼育者別による「閉じこもり傾向あり」及び「活発な社会活動」それぞれの調整オッズ比 (95%信頼区間) を表 12 に示した。非飼育群を参照水準とした家族飼育群と本人飼育群の「閉じこもり傾向あり」「活発な社会活動・交流」の調整オッズ比 (95%信頼区間) は「閉じこもり傾向あり」で 1.15 (0.81-1.64) 0.86 (0.63-1.17) 「活発な社会活動」で 1.22(0.92-1.61) 1.33(1.08-1.65) であった。本人飼育群でのみ活発な社会活動の頻度が高いことが示された。

5 . サブ解析

ペット飼育と関連の見られた運動機能・主観的健康感・社会活動について、解析対象者を 70 歳以上である者、慢性疾患がある者、同居者がいる者に限定したサブ解析を行った結果、本研究結果と大きな差は見られず同様の傾向を示していた (表 13)。

さらに運動機能との関連においては説明変数をイヌの飼育者（非飼育者・イヌ以外のペット飼育者・イヌの飼育者）としてサブ解析を行った結果、飼育ペットの種類（イヌ、もしくはそれ以外のペット）に関わらず何らかのペットを飼育している者は飼育していない者よりも運動機能低下者の頻度は低かった（表 14）。

D. 考察

1. 対象者のペット飼育の実態

B 町におけるペット飼育割合は全体で約 2 割であり、内閣府が平成 22 年度に行った「動物愛護に関する世論調査」⁴⁾で報告された 60 歳以上のペット飼育割合（約 3 割）と比較するとやや低かった。

本調査では本人飼育者の平均年齢が他群と比較して低かったが、これは高齢になるにつれて自身の健康状態や寿命を考えて新しくペットを飼い始める人が減少していくためであると推測された。

2. ペット飼育と身体的健康との関連

本研究では本人飼育群において運動機能低下者の頻度が有意に低かった。高齢者におけるペット飼育の有無と 1 年間の日常生活動作能力の低下を検討した先行研究ではペット飼育者（特に犬の飼育者）はペットを飼育していない者よりも日常生活動作能力の低下が緩やかであったことが報告されており⁵⁾ 本研究はこの結果を支持するものであった。ペット飼育者は普段の日常生活動作に加えてペットの世話（遊戯・餌やり・散歩など）に係る身体活動が上乘せされると考えられる。また説明変数をイヌの飼育者（非飼育者・イヌ以外のペット飼育者・イヌの飼育者）で運動機能との関連を検討したサブ解析結果においても飼育ペットがイヌでなくても運動機能低下者の頻度が低く、ペット飼育には飼育ペットの

種類に関わらず本人が飼育していることで世話に係る身体活動量が増加し運動機能を維持させている可能性が考えられる。

3. ペット飼育と精神的健康との関連

本研究ではペット飼育者による認知機能とうつ傾向との関連は認められなかったものの、本人飼育群において良好な主観的健康感である者の頻度が有意に高く、逆に家族飼育群において有意に低かった。

認知機能に関して、施設入所している高齢者を対象に動物介在療法を用いた介入研究⁶⁾では認知機能の改善傾向を認めていたが統計的有意差は認められず、ペット飼育による認知機能の改善は未だ報告されていない。ペット飼育と高齢者の認知機能と関連については今後様々な対象者や研究デザインによる検討が必要であると考えられる。

うつ傾向に関して、先行研究では地域在住高齢者 2,551 名においてペット飼育の有無とうつ状態との関連を検討した横断研究⁷⁾ではペット飼育者は非飼育者よりもうつ状態が不良であったことが報告されている。一方で施設入所中の高齢者に対して動物介在療法を用いた研究のメタアナリシスでは⁸⁾、動物介在療法によってうつ病の発症リスクが 0.87 倍になるとの報告がされており対象者の属性の違いから一貫した見解が得られていない。そのため本研究では、ペットの存在によってストレス軽減や社会性の向上といった肯定的作用だけでなく世話に係る労力や煩わしさといった否定的作用の両側面が存在し、ペット飼育とうつ傾向との関連が認められなかったのではなかと考えられる。

主観的健康感に関しては、339 名のオーストラリア人を対象に行った電話調査ではペット飼育者は非飼育者よりも主観的健康感が高かったことが報告されており⁹⁾、本調査でも同様の傾向を示した。ペット飼育という趣味

の存在、ペットの世話による身体活動量の増加、コミュニケーションの向上といったことが介在し高齢者の主観的健康感を向上させていた可能性が考えられる。

これらのことから、ペット飼育によって認知機能及びうつとの関連については今度の検討を要するものの、ペットを高齢者本人が飼育している場合には主観的健康感を良好に保つ可能性があることが示唆された。

4．ペット飼育と社会的健康との関連

本研究ではペット飼育者による閉じこもりとの関連は認められなかったが、社会活動・交流との関連が認められ本人飼育群において活発な社会活動である者の頻度が有意に高かった。

ペット飼育者は散歩に行く頻度が多く、余暇活動時間が長く、近隣住民や社会コミュニティとより繋がっていることが知られている。さらにペット飼育者はペットの飼育用品の購入といった外出する目的が多く存在するため外出する頻度が高くなると予測していた。しかし本研究では本人飼育群は閉じこもり傾向の者の割合は小さいものの統計的有意差は認められなかった。

先行研究で報告されているようにペット飼育者は飼育していない者よりも社会活動・交流が活発である¹⁰⁾ことを本研究は支持している。ペットが介在することで言語的・非言語的なコミュニケーションが増加すること¹¹⁾や、犬の散歩に連れて行くことで近所の人とすれ違いざまの挨拶、道端での会話といった交友関係が良好に維持される環境が整いやすいと考えられる。

これらのことからペットを本人が飼育している者はペットとの関わりや世話を通して社会活動がより活発となっている可能性が示唆された。

5．研究の限界

本研究には以下に示す2つの限界がある。

第一に本研究は横断研究であり、因果関係について言及することはできない。そのためサブ解析では、ペット飼育者と「運動機能低下あり」「良好な主観的健康感」「活発な社会活動・交流」との関連の検討70歳以上の者のみ、慢性疾患がある者のみに限定した解析を行い、主解析結果と同様の傾向を示していたことを確認したが、因果関係について言及するためには今後の追跡調査による検討が必要である。

第二に本研究ではペット飼育者のみで身体的・精神的・社会的健康との関連を検討しており、ペットに対する愛着度を用いた検討ができていない。先行研究ではペットに対する愛着度が高いほど身体的健康や精神的健康が良好であるとの報告があるため¹²⁾、本研究のようにペット飼育者だけの検討ではペットと高齢者の身体的・精神的健康との関連を十分評価できているとは言い難く、ペットの愛着度も含めた高齢者の身体的・精神的・社会的健康との関連を評価する必要があると考えられる。

E. 結語

ペット飼育者と身体的健康(運動機能)、精神的健康(認知機能・うつ・主観的健康感)、社会的健康(閉じこもり・社会活動・交流)との関連を横断的に検討した結果、非飼育者と比較して、(1)運動機能低下者は本人飼育群で約0.7倍、(2)良好な主観的健康感である者は本人飼育群で約1.4倍、家族飼育群で約0.7倍、(3)活発な社会活動である者が本人飼育群で約1.3倍であることが示された。地域に住む高齢者の身体的・精神的・社会的健康を包

括的に維持するための 1 つの方法として高齢者本人が「ペット飼育」を行う事が効果的な役割を果たす可能性が示唆された。高齢者の健康寿命をより延伸させていくための様々な方略が検討される中、ペット飼育が 1 つのアプローチ方法となる可能性が示唆された点で意義があると考え。今後ペットに対する愛着度に関する情報を用いた検討や追跡調査による因果関係の解明が必要であると考え。

謝辞

本研究にご協力いただいた関係者の方々をはじめ、調査にご協力いただいた皆様に深く感謝いたします。

文献

- 1). 総務省. 情報通信白書平成 25 年版. (Accessed 2014-12-17).
<http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/pdf/index.html>.
- 2). 厚生労働省. 介護予防マニュアル(改訂版:平成 24 年 3 月). (Accessed 2014-12-25).
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/t_p0501-1.html.
- 3). 中村 好一, 金子 勇, 河村 優子, 他. 在宅高齢者の主観的健康感と関連する因子. 日本公衆衛生雑誌. 49(5): 409-16, 2002.
- 4). 内閣府大臣官房政府広報室. 平成 22 年動物愛護に関する世論調査. (Accessed 2014-12-17).
<http://survey.gov-online.go.jp/h22/h22-doubutu/index.html>.
- 5). Raina P, Waltner-Toews D, Bonnett B, et al. Influence of companion animals on the physical and psychological health of older people: an analysis of a one-year longitudinal study. *Journal of the American Geriatrics Society*. 47(3): 323-9, 1999.
- 6). Mossello E, Ridolfi A, Mello AM, et al. Animal-assisted activity and emotional status of patients with Alzheimer's disease in day care. *International psychogeriatrics / IPA*. 23(6): 899-905, 2011.
- 7). Parslow RA, Jorm AF, Christensen H, et al. Pet ownership and health in older adults: findings from a survey of 2,551 community-based Australians aged 60-64. *Gerontology*. 51(1): 40-7, 2005.
- 8). Souter MA and Miller MD. Do Animal-Assisted Activities Effectively Treat Depression? A Meta-Analysis. *Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*. 20(2): 167-80, 2007.
- 9). Wood L, Giles-Corti B and Bulsara M. The pet connection: pets as a conduit for social capital? *Social science & medicine*. 61(6): 1159-73, 2005.
- 10). Wood LJ, Giles-Corti B, Bulsara MK, et al. More than a furry companion: The ripple effect of companion animals on neighborhood interactions and sense of community. *Society and Animals*. 15(1): 43-56, 2007.
- 11). Hall PL and Malpus Z. Pets as therapy: effects on social interaction in long-stay psychiatry. *British journal of nursing*. 9(21): 2220-5, 2000.
- 12). 杉田 陽出. 犬の飼育と犬に対する愛着度が飼い主の身体的健康と精神的健康に及ぼす効果 -JGSS2001 のデータから-. *JGSS 研究論文集*. 2:127-43, 2003.

F . 研究発表

1. 論文発表

該当なし

2. 学会発表

- 1) 片寄亮,宮松直美,荻田美穂子,大倉美佳,山本美樹,沼田朋子,荒井秀典.地域在住高齢者におけるペット飼育と認知機能との関連の検討. 第73回日本公衆衛生学会.栃木. (2014.11.6 発表)

H. 知的財産権の出願・登録状況

該当なし

表 1 対象者の属性

	全体 □n=3,350□	
女性, 人数(%)	1,926	(57.5)
年齢, 歳(標準偏差)	75.4	(6.9)
75歳以上, 人数(%)	1,712	(51.1)
慢性疾患あり, 人数(%)	2,496	(74.5)
運動制限あり, 人数(%)	189	(5.6)
調査方法; 訪問, 人数(%)	888	(26.5)
居住環境; 一戸建て, 人数(%)	3,251	(97.0)
独居者, 人数(%)	385	(11.5)
経済的暮らしぶりの受け止め方; 豊かである, 人数(%)	1,395	(41.6)
趣味や習い事あり, 人数(%)	1,463	(43.7)
BMI*, kg/m ² (標準偏差)	22.8	(3.3)

*欠損 n=155

表 2 対象者のペット飼育者の割合

	全体 □n=3,350□	
ペット飼育者*, 人数(%)		
飼育していない	2,712	(81.0)
家族飼育	218	(6.5)
本人飼育	420	(12.5)

*「ペットを飼っていますか」の問いに対し「飼育していない」、「家族飼育」、「本人飼育」の三項択一で回答を得た。

表 3 ペット飼育者による属性の比較

	ペット飼育者			p値
	飼育していない (n=2,712)	家族飼育 (n=218)	本人飼育 (n=420)	
女性, 人数(%)	1,580 (58.3)	124 (56.9)	222 (52.9)	0.112
年齢, 歳(標準偏差)	75.7 (6.9)	76.2 (7.4)	73.0 (5.9)	<0.001
75歳以上, 人数(%)	1,442 (53.2)	117 (53.7)	153 (36.4)	<0.001
慢性疾患あり, 人数(%)	2,026 (74.7)	163 (74.8)	307 (73.1)	0.777
運動制限あり, 人数(%)	147 (5.4)	14 (6.4)	28 (6.7)	0.515
調査方法;訪問, 人数(%)	716 (26.4)	63 (28.9)	109 (26.0)	0.697
居住環境;一戸建て, 人数(%)	2,623 (96.7)	212 (97.2)	416 (99.0)	0.032
独居者, 人数(%)	343 (12.6)	3 (1.4)	39 (9.3)	<0.001
経済的暮らしぶりの受け止め方;豊かである, 人数(%)	1,158 (42.7)	88 (40.4)	149 (35.5)	0.019
趣味や習い事あり, 人数(%)	1,134 (41.8)	92 (42.2)	237 (56.4)	<0.001
BMI ^a , kg/m ² (標準偏差)	22.8 (3.3)	22.9 (3.3)	22.8 (3.1)	0.683

^a欠損 n=155

離散量は χ^2 検定を用いて検定した。

連続量は一元配置分散分析を用いて検定した。

表 4 ペット飼育者による【運動機能】関連項目該当者の割合

	全体 □n=3,350□	ペット飼育者			p値
		飼育していない □n=2,712□	家族飼育 □n=218□	本人飼育 □n=420□	
運動機能関連5項目, 人数(%)					
階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか(いいえ)	1,537 (45.9)	1,276 (47.1)	114 (52.3)	147 (35.0)	<0.001
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってますか(いいえ)	877 (26.2)	739 (27.2)	61 (28.0)	77 (18.3)	<0.001
15分間位続けて歩いていますか(いいえ)	846 (25.3)	707 (26.1)	58 (26.6)	81 (19.3)	0.011
この1年間で転んだことはありますか(はい)	770 (23.0)	624 (23.0)	67 (30.7)	79 (18.8)	0.003
転倒に対する不安は大きいですか(はい)	1,696 (50.6)	1,414 (52.1)	115 (52.8)	167 (39.8)	<0.001
運動機能低下あり ^a , 人数(%)	1,011 (30.2)	848 (31.3)	80 (36.7)	83 (19.8)	<0.001

離散量は χ^2 検定を用いて検定した。

^a運動機能関連5項目のうち、いずれか3項目以上に該当したものを「運動機能低下あり」とした。

表 5 ペット飼育者による運動機能低下との関連

	ペット飼育者		
	飼育していない	家族飼育	本人飼育
運動機能低下あり ^a , % (case/n)	31.3 (848/2,712)	36.7(80/218)	19.8(83/420)
Model 1 (あり/なし)	ref.	1.24 (0.90 - 1.70)	0.72 (0.55 - 0.94)
Model 2 (あり/なし)	ref.	1.23 (0.89 - 1.69)	0.70 (0.53 - 0.92)

Model 1: 性・年齢を調整

Model 2: Model 1に加えて, 調査方法 (郵送・訪問), 慢性疾患の有無, 運動制限の有無を調整

^a運動機能関連5項目のうち, いずれか3項目以上に該当したものを「運動機能低下あり」とした.

表 6 ペット飼育者による【認知機能】関連項目該当者の割合

	全体 (n=3,350)	ペット飼育者			p値
		飼育していない (n=2,712)	家族飼育 (n=218)	本人飼育 (n=420)	
認知機能関連3項目, 人数(%)					
周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるとされますか(はい)	619 (18.5)	484 (17.8)	54 (24.8)	81 (19.3)	0.036
自分で電話番号を調べて電話をかけることをしていますか(はい/え)	188 (5.6)	153 (5.6)	14 (6.4)	21 (5.0)	0.751
今日が何月何日か分からないときがありますか(はい)	618 (18.4)	494 (18.2)	51 (23.4)	73 (17.4)	0.138
認知機能低下あり ^a , 人数(%)	1,057 (31.6)	843 (31.1)	79 (36.2)	135 (32.1)	0.278

離散量は χ^2 検定を用いて検定した.

^a認知関連3項目のうち, いずれか1項目以上に該当したものを「認知機能低下あり」とした.

表 7 ペット飼育者による【うつ】関連項目該当者の割合

	全体 (n=3,350)	ペット飼育者			p値
		飼育していない (n=2,712)	家族飼育 (n=218)	本人飼育 (n=420)	
うつ関連5項目, 人数(%)					
(ここ2週間)毎日の生活に充実感がない(はい)	428 (12.8)	351 (12.9)	26 (11.9)	51 (12.1)	0.835
(ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった(はい)	302 (9.0)	247 (9.1)	24 (11.0)	31 (7.4)	0.293
(ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる(はい)	666 (19.9)	536 (19.8)	51 (23.4)	79 (18.8)	0.365
(ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない(はい)	510 (15.2)	423 (15.6)	32 (14.7)	55 (13.1)	0.403
(ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする(はい)	783 (23.4)	636 (23.5)	57 (26.1)	90 (21.4)	0.400
うつ傾向あり ^a , 人数(%)	704 (21.0)	571 (21.1)	54 (24.8)	79 (18.8)	0.214

離散量は χ^2 検定を用いて検定した.

^aうつ関連5項目のうち, いずれか2項目以上に該当したものを「うつ傾向あり」とした.

表 8 ペット飼育者による【主観的健康感】該当の割合

	全体 (n=3,350)	ペット飼育者			p値
		飼育していない (n=2,712)	家族飼育 (n=218)	本人飼育 (n=420)	
主観的健康感, 人数(%)					0.005
とても健康	275 (8.2)	219 (8.1)	11 (5.0)	45 (10.7)	
まあまあ健康	2,336 (69.7)	1,886 (69.5)	144 (66.1)	306 (72.9)	
あまり健康でない	618 (18.4)	504 (18.6)	54 (24.8)	60 (14.3)	
健康でない	121 (3.6)	103 (3.8)	9 (4.1)	9 (2.1)	
良好な主観的健康感 ^a , 人数(%)	2,611 (77.9)	2,105 (77.6)	155 (71.1)	351 (83.6)	0.001

離散量は χ^2 検定を用いて検定した。

^a主観的健康感に関する問いに対して、「とても健康」もしくは「まあまあ健康」と回答した者を「良好な主観的健康感」とした。

表 9 ペット飼育者による認知機能低下・うつ傾向あり・良好な主観的健康感との関連

	ペット飼育者		
	飼育していない	家族飼育	本人飼育
認知機能低下あり ^a , %(case/n)	31.1 (843/2,712)	36.2 (79/218)	32.1 (135/420)
Model 1 (あり/なし)	ref.	1.23 (0.92 - 1.65)	1.17 (0.94 - 1.47)
Model 2 (あり/なし)	ref.	1.23 (0.92 - 1.65)	1.17 (0.93 - 1.46)
うつ傾向あり ^b , %(case/n)	21.1 (571/2,712)	24.8 (54/218)	18.8 (79/420)
Model 1 (あり/なし)	ref.	1.20 (0.87 - 1.66)	1.01 (0.78 - 1.32)
Model 2 (あり/なし)	ref.	1.23 (0.88 - 1.72)	1.00 (0.76 - 1.31)
良好な主観的健康感 ^c , %(case/n)	77.6 (2,105/2,712)	71.1 (155/218)	83.6 (351/420)
Model 1 (良好/不良)	ref.	0.72 (0.53 - 0.98)	1.37 (1.04 - 1.81)
Model 2 (良好/不良)	ref.	0.72 (0.52 - 0.99)	1.43 (1.07 - 1.89)

Model 1: 性・年齢を調整

Model 2: Model 1に加えて, 調査方法(郵送・訪問), 慢性疾患の有無, 運動制限の有無を調整

^a認知関連3項目のうち, いずれか1項目以上に該当したものを「認知機能低下あり」とした。

^bうつ関連5項目のうち, いずれか2項目以上に該当したものを「うつ傾向あり」とした。

^c主観的健康感に関する問いに対して、「とても健康」もしくは「まあまあ健康」と回答した者を「良好な主観的健康感」とした。

表 10 ペット飼育者による【閉じこもり】関連項目該当者の割合

	全体 (n=3,350)	ペット飼育者			p値
		飼育していない (n=2,712)	家族飼育 (n=218)	本人飼育 (n=420)	
外出頻度関連2項目, 人数(%)					
週に1回以上は外出していますか(いいえ)	593 (17.7)	493 (18.2)	46 (21.1)	54 (12.9)	0.012
昨年と比べて外出の回数が減っていますか(はい)	974 (29.1)	806 (29.7)	73 (33.5)	95 (22.6)	0.004
閉じこもり傾向あり ^a , 人数(%)	593 (17.7)	493 (18.2)	46 (21.1)	54 (12.9)	0.012

離散量は χ^2 検定を用いて検定した。

^a外出頻度関連2項目のうち、[週に1回以上は外出していますか]に該当したものを「閉じこもり傾向あり」とした。

表 11 ペット飼育者による【社会活動】関連項目該当者の割合

	全体 (n=3,350)	ペット飼育者			p値
		飼育していない (n=2,712)	家族飼育 (n=218)	本人飼育 (n=420)	
社会活動関連3項目, 人数(%)					
友人宅を訪問している	1,938 (57.9)	1,541 (56.8)	141 (64.7)	256 (61.0)	0.030
ボランティア活動をしている	725 (21.6)	563 (20.8)	41 (18.8)	121 (28.8)	0.001
地域活動(自治会、町内行事、老人クラブなど)へ参加している	2,261 (67.5)	1,799 (66.3)	150 (68.8)	312 (74.3)	0.005
活発な社会活動 ^a , 人数(%)	1,681 (50.2)	1,325 (48.9)	116 (53.2)	240 (57.1)	0.004

離散量は χ^2 検定を用いて検定した。

^a社会活動関連3項目のうち、いずれか2項目以上に該当したものを「活発な社会活動」とした。

表 12 ペット飼育者と閉じこもり傾向・活発な社会活動との関連

	ペット飼育者		
	飼育していない	家族飼育	本人飼育
閉じこもり傾向あり ^a , %(case/n)	18.2 (493/2,712)	21.1 (46/218)	12.9 (54/420)
Model 1 (あり/なし)	ref.	1.15 (0.81 - 1.64)	0.85 (0.63 - 1.17)
Model 2 (あり/なし)	ref.	1.15 (0.81 - 1.64)	0.86 (0.63 - 1.17)
活発な社会活動 ^b , %(case/n)	48.9 (1,325/2,712)	53.2 (116/218)	57.1 (240/420)
Model 1 (活発/不活発)	ref.	1.21 (0.92 - 1.60)	1.33 (1.08 - 1.60)
Model 2 (活発/不活発)	ref.	1.22 (0.92 - 1.61)	1.33 (1.08 - 1.65)

Model 1:性・年齢を調整

Model 2:Model 1に加えて、調査方法(郵送・訪問)、慢性疾患の有無、運動制限の有無を調整

^a外出頻度関連2項目のうち、[週に1回以上は外出していますか]に該当したものを「閉じこもり傾向あり」とした。

^b社会活動関連3項目のうち、いずれか2項目以上に該当したものを「活発な社会活動」とした。

表 13 対象者を 70 歳以上・慢性疾患がある者・同居者ありの者に限定したペット飼育者と運動機能・主観的健康感・社会活動との関連：サブ解析

	ペット飼育者					
	飼育していない		家族飼育		本人飼育	
運動機能低下あり^a						
(再掲)全体 [*]	31.3% (848/2,712)	ref.	36.7% (80/218)	1.23 (0.89 - 1.69)	19.8% (83/420)	0.70 (0.53 - 0.92)
70歳以上 [*]	36.0% (756/2,101)	ref.	42.9% (72/168)	1.22 (0.86 - 1.73)	23.3% (66/283)	0.66 (0.49 - 0.90)
慢性疾患あり [*]	36.0% (729/2,026)	ref.	40.5% (66/163)	1.12 (0.78 - 1.60)	23.1% (71/307)	0.67 (0.50 - 0.91)
同居者あり [*]	30.6% (726/2,369)	ref.	36.3% (78/215)	1.20 (0.86 - 1.66)	20.2% (77/381)	0.73 (0.55 - 0.98)
良好な主観的健康感^b						
(再掲)全体 [*]	77.6% (2,105/2,712)	ref.	71.1% (155/218)	0.72 (0.52 - 0.99)	83.6% (351/420)	1.43 (1.07 - 1.89)
70歳以上 [*]	76.4% (1,606/2,102)	ref.	70.2% (118/168)	0.76 (0.53 - 1.08)	82.0% (232/283)	1.38 (0.99 - 1.91)
慢性疾患あり [*]	72.7% (1,472/2,026)	ref.	64.4% (105/163)	0.70 (0.50 - 0.99)	79.8% (245/307)	1.48 (1.10 - 2.00)
同居者あり [*]	77.2% (1,828/2,369)	ref.	70.7% (152/215)	0.73 (0.53 - 1.00)	84.0% (320/381)	1.51 (1.12 - 2.04)
活発な社会活動^c						
(再掲)全体 [*]	48.9% (1,325/2,712)	ref.	53.2% (116/218)	1.22 (0.92 - 1.61)	57.1% (240/420)	1.33 (1.08 - 1.65)
70歳以上 [*]	48.7% (1,023/2,101)	ref.	56.0% (94/168)	1.41 (1.01 - 1.95)	58.0% (164/283)	1.33 (1.03 - 1.71)
慢性疾患あり [*]	48.3% (979/2,026)	ref.	52.8% (86/163)	1.15 (0.66 - 2.01)	55.7% (171/307)	1.49 (0.98 - 2.25)
同居者あり [*]	48.6% (1,152/2,369)	ref.	53.5% (115/215)	1.25 (0.94 - 1.66)	55.9% (213/381)	1.27 (1.02 - 1.58)

^{*}性、年齢、調査方法(郵送・訪問)、慢性疾患の有無、運動制限の有無を調整

^a運動機能関連5項目のうち、いずれか3項目以上に該当したものを「運動機能低下あり」とした。

^b主観的健康感に関する問いに対して、「とても健康」もしくは「まあまあ健康」と回答した者を「良好な主観的健康感」とした。

^c社会活動関連3項目のうち、いずれか2項目以上に該当したものを「活発な社会活動」とした。

表 14 イヌの飼育者による運動機能低下との関連：サブ解析

	イヌの飼育者		
	飼育していない	イヌ以外のペット飼育	イヌ飼育
運動機能低下あり ^a , % (case/n)	31.3 (848/2,712)	24.8(83/334)	26.3(80/304)
Model 1 (あり/なし)	ref.	0.85 (0.64 - 1.13)	0.94 (0.70 - 1.25)
Model 2 (あり/なし)	ref.	0.82 (0.62 - 1.10)	0.93 (0.69 - 1.25)

Model 1:性・年齢を調整

Model 2:Model 1に加えて、調査方法(郵送・訪問)、慢性疾患の有無、運動制限の有無を調整

^a運動機能関連5項目のうち、いずれか3項目以上に該当したものを「運動機能低下あり」とした。