


## - 5. 検索 -

HOME 画面より〔検索〕ボタンを押下すると検索画面へ遷移します



### ○検索画面

任意の検索項目を入力し、検索画面内の〔検索〕ボタンを押下することで検索結果画面へ遷移します。

チェックボックスにチェック(☑)したものが検索の対象となります。

(注) 検索項目なしで全検索をすると時間が掛かる可能性があります。

▶ 端末 ID、年齢、相談時間帯、相談時間(分)、フリーワードの欄は直接入力してください。

相談日、都道府県、主訴、マニュアル判定、最終判定は選択項目が展開しますので、必要箇所を各々選択してください。

## ○検索結果画面

検索結果画面では、検査の編集、削除、印刷、データ出力を行うことができます。

- I. 編集・・・〔編集〕ボタンを押下することで入力情報を編集することができます。  
※ 編集画面は確定画面と同様の操作
- II. 更新・・・編集されたものが反映されていない場合に押下して、更新してください。
- III. 削除・・・任意にチェックしたリストを〔削除〕ボタンを押下することで削除できます。
- IV. リスト印刷・・・検索した結果を一覧で印刷します。
- V. 印刷・・・任意にチェックしたリストを〔印刷〕ボタンを押下することで印刷できます。
- VI. データ出力・・・検索結果全てを csv 形式で出力します。

#8000 Console 都道府県: 東京都 端末ID : 0001 相談対応者: Test Jiro HOME

### 検索結果

件数 9 件

<input checked="" type="checkbox"/>	相談日付	相談時刻	対応時間(分)	年齢	主訴	マニュアル判定	最終判定	I
<input checked="" type="checkbox"/>	2013/01/20	09:56:00	3	02歳 08月 09日	熱中症	1蘇生	2緊急	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	04:34:00	4	04歳 00月 11日	発熱	2緊急	3準緊急	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	02:29:00	0		発熱	3準緊急	2緊急	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	02:13:00	1		上肢・下肢を動かせ		1蘇生	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	02:05:00	4			1蘇生	1蘇生	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	01:50:00	1	04歳 00月 11日	発熱	2緊急	3準緊急	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	22:05:00	0			1蘇生	1蘇生	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	17:42:00	249	04歳 00月 11日	下痢	2緊急	2緊急	編集
<input type="checkbox"/>	2013/12/23	01:50:00	1	04歳 00月 11日	発熱	2緊急	3準緊急	編集

戻る II 更新 III 削除 IV リスト印刷 V 個別印刷 VI データ出力

## ○編集画面

編集画面では最終確定した内容の変更ができます。

内容を変更後〔更新〕ボタンを押下し、編集を完了します。

また、〔←前〕、〔次→〕ボタンを押下することで表示している前後の相談内容を表示することができます。


The screenshot shows a web application interface for editing a consultation record. The header includes the console ID (#8000 Console), hospital ID (0001), and doctor name (Horie Tetsuya). The main content area is divided into several sections:

- 郵便番号**: 〒 111-1111
- 相談患者情報**: Includes birth date (平成 2000 年 12 月 12 日), gender (男), and other details.
- 相談開始日時**: 2014 年 00 月 00 日 12 時 00 分
- 主治**: 血尿
- 症状**: 排尿時に血尿を認める
- マニュアル判定**: 医師時間以内により判定済 (with a yellow '判定済' label)
- 医師の勘言**: あり (with a yellow '判定済' label)
- 最終判定**: 医師時間以内により判定済 (with a yellow '判定済' label)
- 相談終了日時**: 2014 年 00 月 00 日 12 時 00 分 (相談時間: 2 分)
- メモ**: A text input field.
- コメント**: A text input field.

Navigation buttons '←前' and '次→' are located at the top right, and the '更新' (Update) button is at the bottom right. A '戻る' (Back) button is at the bottom left.


## ○データ読込

ホーム画面の〔データ読込〕ボタンを押下すると読込むデータを指定する画面が開きます。



読込むデータを選択し〔開く〕ボタンを押下することで、データを読込むことができます。

読込後、#8000 データベースシステムの〔検索〕機能で検索して頂くと読込んだデータが反映されていることがわかります。



- 7. その他 -

【使用端末条件】

OS: Windows 7 もしくは 8

CPU: Core i3、Core i5、もしくは Core i7

メモリ: 2GB 以上

HDD: 空き容量 5 GB/年

※入力データを集約する場合はデータ容量分必要になります。

モニター解像度: 横 1280(pixel) × 縦 800(pixel)以上

【使用ソフトウェア】

DB ソフト: SQL Server 2012 Express

印刷用ソフト: Adobe Rader 11

以上

## I. 総合研究報告

資料 ④子どもの事故と対策のオンライン版

こどもの命を救おう

こどもの命を救おう

一次救命処置の手順

keyword

気道確保 回復体位 胸骨圧迫 人工呼吸 AED

1) 大きな声で呼びかけ、反応をみます。反応がない場合は、2)へ。



大きな声で呼びかけ、反応をみます。

2) 応答を呼んで、119番通報と救急搬送 (AED) を依頼します。



応答を呼んで、119番通報と救急搬送 (AED) を依頼します。

3) あごを上げて息ができるようにし、(気道確保)、回復を促します。

気道確保



あごを上げて息ができるようにし、(気道確保)、回復を促します。

4) 反応がない場合は、5)へ。反応がある場合は救急車を待ちます。

回復体位



反応がない場合は、5)へ。反応がある場合は救急車を待ちます。

5) 胸骨圧迫と人工呼吸による蘇生法 (CPR) を行います。

すぐに胸骨圧迫!



胸骨圧迫と人工呼吸による蘇生法 (CPR) を行います。

胸骨圧迫30回

人工呼吸2回

順番ができれば、人工呼吸



人工呼吸ができない場合は、胸骨圧迫だけでも構いません。

乳児の胸骨圧迫



乳児の胸骨圧迫

6) AEDを持ってきたら、着脱パッドをつけてもらいます。



AEDを持ってきたら、着脱パッドをつけてもらいます。

7) AEDから電流の指示を聞き、電流ショックのボタンを押し続けます。



AEDから電流の指示を聞き、電流ショックのボタンを押し続けます。

8) 電流ショックが済んだら、ショックの指示が通ります。



電流ショックが済んだら、ショックの指示が通ります。

9) 電流ショックが済んだら、すぐに胸骨圧迫を再開します。



電流ショックが済んだら、すぐに胸骨圧迫を再開します。

10) 救急車が到着するまで「CPR (胸骨圧迫+人工呼吸)」を続けて、最終的にAEDによる心臓蘇生を行います。



救急車が到着するまで「CPR (胸骨圧迫+人工呼吸)」を続けて、最終的にAEDによる心臓蘇生を行います。

※市販のAEDでも心臓蘇生が可能な場合があります。詳しくはAEDの取扱説明書をご覧ください。

救急車を呼ぶとき  
「119」を必ず  
「救急」を必ず  
「救急」を必ず  
「救急」を必ず

TOP > こどもの事故を防ごう > 溺水

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転倒・転落

熱傷

熱中症

こども救急

8000

近頃の電話番号を掲載  
03-5561-8000

リンク集  
サイトマップ  
ご利用規約

いいね! 86

ツイート 93

3

## 家庭内 こどもの事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転落・転倒

熱傷

熱中症

できすい  
溺水

どうやって  
予防する?

起こって  
しまった時は?

病院を受診  
するべき?

救急車を呼ぶ  
必要はある?


溺水で毎年300人前後のこども達が亡くなっています。溺水は海や川での発生が多いと思われがちですが、1歳前後では家庭の浴槽で起こることがとても多くなっています。

家庭での溺水は、こどもだけの入浴、おかあさんの洗髪中、ちょっと着がえを取りにいった、電話に出たなどのほんのわずかなすきに起こっています。たとえ短い時間だとしても、こどもを浴室に1人にするのは絶対に止めましょう。

また、お風呂以外にも水洗トイレ、水槽、洗濯機などの水がたまっているものでの溺水も起こっています。水のたまっている場所を大人がチェックし、気をつけておくことが大切です。

### どうやって予防する?

こどもだけで  
浴室に  
入れないように  
しておく



こどもが  
小さいうちは  
浴槽の水は  
必ず抜く



こどもを  
浴室で  
一人きりに  
しない



髪を  
洗うときには  
こどもを  
浴槽から出す



### 起こってしまった時は?

- 大きな声で呼びかけて反応をみます。反応がなければ、直ちに胸骨圧迫と口対口の人工呼吸を開始します。
- 同時に応援を呼んで119番で救急車を呼びましょう。誰もいない場合には、まず胸骨圧迫と人工呼吸を2分間行ってから119番へ連絡します。
- 無理に水を吐かせるより、胸骨圧迫が重要です。
- お子さんが泣くようなら一安心。

### 病院を受診するべき?

- 「おかあさんが髪を洗っていたとき浴槽で一瞬溺れた」など短時間の溺水は、お子さんの呼吸や顔色が正常であれば、受診は不要と考えてよいでしょう。
- 顔色が悪い、意識がない、呼吸をしていないといった場合、叩いたり刺激したりしましょう。泣き出したら、落ち着いて体を拭き、服を着せ替えてから受診をします。

### 救急車を呼ぶ必要はある?

- 水に浮いている、もしくは沈んでいるときは呼吸が停止しています。発見したらすぐに口対口の人工呼吸を行います(2分間)。その間、近くにいる人に119番通報をお願いしましょう。
- 救急車が到着するまで、人工呼吸をしっかりと続けましょう。心臓が動いていないようでしたら、**胸骨圧迫**も行います。

▲ページTOPへ



TOP > こどもの事故を防ごう > 熱中症

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転倒・転落

熱傷

熱中症

# こどもの<sup>家庭内</sup>事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転落・転倒

熱傷

熱中症

## ちゅうそく 窒息

どうやって予防する？

起こってしまった時は？

病院を受診するべき？

救急車を呼ぶ必要はある？

赤ちゃんは口や鼻をおおったものを自力で取ることができず、布団や吐いたミルクなど思いもよらないもので窒息する可能性があります。危険なものは大人が赤ちゃんの周りから遠ざけてあげましょう。

窒息の原因になりやすい物として、こんにゃくゼリー、ピーナッツなどの豆類、野菜スティック、アメ、キャラメル、ポップコーン、甘栗などの食品があります。その他、柔らかい布団などの日用品やおもちゃの部品、硬貨、ボタン電池などの雑貨にも注意が必要です。

また、遊びのひとつとしてコンビニエンスストアのビニール袋を頭にかぶったり、電気コート、カーテン・フライントのヒモなどを首に巻き付けたりして窒息することもあります。

どうやって予防する？

ふわふわの柔らかい布団を使わない



5歳以下の子どもにはピーナッツやアーモンド、枝豆などを与えない



コンビニ袋やヒモ、電気コードなどを放置しない



スーパーボールやBB弾などの上の子のおもちゃに気をつける



起こってしまった時は？

●突然声が出なくなった、首をおさえ苦しそうにしている、唇が紫色になった、などで窒息を疑います。

●1歳未満の乳児には「胸部突き上げ法」と「背部叩打法」を数回ずつ交互に行いましょう。意識がない場合、**心肺蘇生(CPR)**、救急車を呼びます。

●意識がある1歳以上の幼児には「腹部突き上げ法」を行います。意識がない場合、**心肺蘇生(CPR)**、救急車を呼びます。

1歳未満の乳児

1歳以上の幼児

胸部突き上げ法

背部叩打法

腹部突き上げ法



繰り返す

片手で体を支え、手の平で後頭部をしっかりと支えます。心肺蘇生法の胸部圧迫と同じやりかたで圧迫しましょう。

片手で体を支え、手の平でおこをしっかりと支えます。もう一方の手の平の付け根で背中をしっかりと叩きましょう。

背後から両腕を回し、子どものみそおちの下で片方の手を握り締めます。その手を腹部を上方へ圧迫しましょう。

病院を受診するべき？

●窒息後、呼吸が戻った場合でも、念のため、受診しておきましょう。

救急車を呼ぶ必要はある？

●呼吸が止まっている場合、直ちに**心肺蘇生(CPR)**を行いながら救急車を呼びましょう。

▲ページTOPへ

こどもの救急

80000

近頃の医療機関を調べ

リンク集  
サイトマップ  
ご利用規約

いいね! 86

ツイート 93

1 3

TOP > こどもの事故を防ごう > 誤飲

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転倒・転落

熱傷

熱中症

# こどもの<sup>家庭内</sup>事故を防ごう

溺水 窒息 誤飲 転倒・転落 熱傷 熱中症

## こ 誤 飲

どうやって予防する？

起こってしまった時は？

病院を受診するべき？

緊急性の高いものは？

こどもの誤飲率は生後7-8カ月頃から増加し、3-4歳頃までよくみられます。特に10カ月くらいになると、手に持ったものを口に入れてしまうようになります。これはおおむね1歳か2歳頃に成長している証しなので、誤飲の危険性が増すこととなりますので大人も十分注意してあげましょう。

誤飲事故の原因として最も多いのはタバコです。ぜひ禁煙をしましょう。親指と人差し指で作る輪に入る大きさのものはこどもの口に入りやすい。誤飲を引き起こさないためには、それらのものは子どもの届かない場所にごくくることが最も大切です。

### どうやって予防する？

禁煙しましょう

タバコや灰皿を置きっぱなしにしない

薬や化粧品は引出しや戸棚に入れる

小さなものはこどもの手の届かない所へ

キッチンで洗剤やアルコール類を放置しない

ボタン電池やコインを放置しない

### 起こってしまった時は？

- いつ、何を飲んだか書いて記録しましょう。薬類などの液体は飲んだ量と食べたものと考え正確な量を把握しましょう。
- 恐ろしいかもしれませんが、薬に虫が落ちていたりも知れません。服用量や成分がある場合、食塩、高に入ったかも知れません。
- 飲んだものによって緊急性の高い・低い、吐いてはいない・吐かせた方がいいなどの違いがあります。「こどもの救急 相談」をチェックしましょう。
- 誤飲について相談したいときは下記の中継110番へ。

類似した例の電話番号検索口/中継110番・電話サービス


神奈川県無届の一般市民専用サービス

- ▶ 中継110番 (965日 24時間対応) 072-727-2499
- ▶ ツイート110番 (965日 9時~21時対応) 029-852-9999
- ▶ タバコ専用電話 (965日 24時間対応) 072-726-9922 ※テープによる一般市民向け緊急連絡

### 病院を受診するべき？

- 灯油 ガソリン シンナー マニキュア除光液などは 絶対に吐かせてはいけません。付いた洋服の少くともある程度は取り除きましょう。これは呼吸器系を傷め込んで化学物質を吸ってまで危険な場合があります。この場合、飲んだ量も、身体でも45時間経過する要となります。
- 錠剤や小さな粒を食べて、ヒアアなどの咳が出る、カラスやカラスなどの鳴き声、吐きけなどに注意しましょう。
- ボタン電池や錠剤を飲み込んでしまうと腸にアが抜くことも、どの場合でも胃に吐かせる必要があります。

下の写真はボタン電池を飲み込んで受診した児童さんのものです



### 緊急性の高いものは？

- ネズミ駆除薬 トイレ用洗剤 苛性ソーダ アンモニア系洗剤の殺菌剤(クレゾール)、業務用漂白剤 花火 (筒状) しょうゆ、目薬類、軟ろうぜん、蚊香網・蚊帳網を飲んだ場合は注意が必要です。
- 上記以外のものは絶対に吐かせてはいけません!

▲ ページTOPへ



こども救急 110番

救急相談専用電話番号検索

リンク集

サイトマップ

ご利用規約

お問い合わせ 96

ツイート 99

96

3

TOP>こどもの事故を防ごう>転落・転倒

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転倒・転落

熱傷

熱中症

こどもの救急

119番 28000

近くの医療機関を検索

リンク集  
サイトマップ  
ご利用規約

86

93

3

## 家庭内 こどもの事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転落・転倒

熱傷

熱中症

### てん らく てん どう 転 落 ・ 転 倒

どうやって  
予防する？

起こって  
しまった時は？


ハイハイをする月齢から5・6歳の各年齢層にみられ、特に1歳前後で多くなっています。1歳頃では全身に対して頭が大きく重いため、転落・転倒すると頭を強く打ちやすいことを覚えておきましょう。

屋外では階段や遊具、室内でも階段、ベッド、イスやソファなどから転落する恐れがありますので、十分に気を配る必要があります。なお転倒だけでも硬膜下血腫が起こることがあるため、転倒後はこどもの様子をよく見てあげてください。

2・3歳になると自分で踏み台を使って上れる場所も増えますので、高さのあるベランダや窓からの転落も起こります。常に家庭内の安全チェックをするように心がけましょう。

#### どうやって予防する？


ベビーベッドの  
柵は  
必ず上げる



ものにつまづいたり  
すべってころんだり  
しないように  
床は整理整頓を  
する



階段には  
乳幼児用  
移動防止柵を  
取り付ける



ベッドやイス、  
ソファ  
などの上で  
遊ばせない



お風呂場には  
転倒防止の  
マットを敷く



踏み台に  
なりそうなものを  
ベランダや  
窓の近くに  
置かない



自転車では  
ヘルメットを  
必ず着用する



こどもを  
乗せたまま  
にして  
自転車から  
離れない



#### 起こってしまった時は？

▶ 頭を打った場合

- 『こどもの救急 / 頭を強くぶつけた』をチェックしてみましょう。

▶ 鼻血が出た場合

- 『こどもの救急 / 鼻血』をチェックしてみましょう。

▲ページTOPへ

TOP > こどもの事故を防ごう > 熱中症

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転倒・転落

熱傷

熱中症

こどもの救急

119 110 112

近くの警署消防署を検索

リング集  
サイトマップ  
ご利用規約

いいね! 86

ツイート 93

3

## こどもの<sup>家庭内</sup>事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転落・転倒

熱傷

熱中症

ねっ しょう  
**熱 傷**

どうやって  
予防する?

起こって  
しまった時は?

病院を受診  
するべき?

救急車を呼ぶ  
必要はある?

熱傷は痛みが強く、やけどのあとなど見た目の後遺症を残すことがあるため、こどもにとってつらい事故のひとつです。大人が十分気を配って熱傷を防ぎましょう。

熱傷は熱い液体が原因で起こることが多いため、ポット、コーヒーマーカー、カップ麺、味噌汁、お茶などの取扱いには注意が必要です。

それ以外にも、炊飯器の蒸気口に手を当てる、炊きたてご飯に手をつっ込む、魚焼きグリルのふたに触る、コンセントに差し込めるプラグをなめるなど、こどもの思わぬ行動が熱傷へとつながります。

### どうやって予防する?

テーブルに熱いものを置くときはこどもの手の届かないように

テーブルクロスを使用しない

炊飯器・ポットは手の届かない高さに配置する

熱いものからこどもを遠ざける

抱っこでご飯を食べさせる際には十分注意する

こどもを台所に入れない

### 起こってしまった時は?

- よく冷やしてあげることが最も大切です! 痛みがなくなるまで冷やしましょう。
- 熱傷部分にさわらないようにしましょう。
- アロエをぬるなどの民間療法は止めましょう。
- 市販されている冷却シートは、熱傷には使えません。
- 熱傷などをかぶった場合には、服の上からでも流水で冷やしましょう。

### 病院を受診するべき?

『こどもの救急/やけど』をチェックしてみましょう。熱傷の重症度判断はぎわめて難しいので、判断がつかない場合は急患診療所を受診しましょう。

### 救急車を呼ぶ必要はある?

- 水疱かてきたり皮がむけたりした部分が広範囲におよぶ熱傷では、専門医療が可能な医療機関に搬送してもらう必要があります。
- 火事や熱い空気の中にいたことによる気道や目の熱傷、爆発などによる顔面～気道の熱傷、化学薬品による熱傷なども救急車を呼ぶ方がよいでしょう。

▲ページTOPへ

TOP>こどもの事故を防ごう>熱中症

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転倒・転落

熱傷

熱中症

子どもの救急

24時間 80000

近くの医療機関を調べる

リンク集

サイトマップ

ご利用規約

いいね! 86

ツイート 93

3

## 家庭内 こどもの事故を防ごう

溺水

窒息

誤飲

転落・転倒

熱傷

熱中症

ねっ ちゅう しょう  
**熱 中 症**

どうやって  
予防する?

こどもは熱中症  
になりやすい?

起こって  
しまった時は?

夏は熱中症が最も多くなる季節です。高温の炎天下にいますと、大量の汗で体の水分や塩分が失われ、体温調節がうまくできなくなってしまいます。特にこどもは体温調節機能が未熟で熱中症になりやすいため、大人が気をつけてあげましょう。

また、熱中症は戸外でだけ起こるとは限りません。真夏の車内はクーラーをかけていても高温になることがあります。また、家の中にも屋内に熱がこもり、熱中症になってしまうことがあります。戸外、屋内にかかわらず、こまめな水分補給、温度管理など適切な対処をし、熱中症を予防することが大切です。

### どうやって予防する?

こまめな水分補給をする




小さいこどものおしっこの量や回数に気を配る



気温と湿度にあわせて衣類を調整する



車内や屋内では適切なクーラーの使用をこころがける



こまめに日陰で休憩する



ベビーカーを日なたに長時間置かない



### こどもは熱中症になりやすい?

- こどもは体温を調節する機能が大人に比べて未発達です。私たちは汗をかくことで体温を調節していますが、こどもは大人のようにうまく汗をかけません。
- 全身に占める水分の割合が大人より高いため、外気温の影響を受けやすくなっています。以上のような特徴から、小さなこどもほど脱水状態や熱中症になりやすいです。

### 起こってしまった時は?

- 軽いめまいや頭痛がある場合、軽い熱中症の可能性があります。衣類を緩め、涼しいところに頭を低くした状態で寝かせます。塩分・糖分が含まれたイオン飲料を、こまめに少しずつ飲ませましょう。
- めまいや頭痛以外に、全身かたるそう、意識がはっきりしないなどの症状がみられたら、「熱疲労」かも知れません。重症化しないための処置が必要です。イオン飲料をこまめに少しずつ与えつつ、冷たいぬれタオルで拭く・風を送る・クーラーの効いた部屋に寝かせるなど積極的に体を冷やそうにしましょう。同時に病状を受診する準備をしましょう。
- 40℃を超える体温、意識障害やけいれん、汗が出なくなるなどの症状がみられる場合、生命の危険がある「熱射病」の恐れがあります。急いで救急車を要請しましょう。到着を待っている間も体を冷やし続けることが大切です。

▲ページTOPへ



こどもの救急TOP > こどもの事故と対策 > 交通事故

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

- 溺水
- 窒息
- 誤飲
- 転落・転倒
- 熱傷
- 熱中症
- 交通事故
- 異物

## 家庭内 こどもの事故を防ごう

溺水 窒息 誤飲 転落・転倒 熱傷 熱中症 交通事故 異物

### こ っ こ っ こ っ こ 交 通 事 故

どうやって予防する? 起こってしまった時は? 病院を受診するべき?

交通事故は悲惨な結果につながりやすい一方で、その多くは大人が気をつけてあげれば防げるため、予防がとても大切です。

戸外での活動時間が長くなる3・4歳頃から交通事故が急に増加するため、おこさんが小さい頃は道路では目を離さない、遊ばせないことを心がけましょう。そして話が理解できるまでに成長したら、交通ルールを教えてあげましょう。

チャイルドシート未装着時の事故も見逃せません。自家用車では必ず体に合ったチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。「近所だから」「泣き止まないから」「授乳したいから」という理由でチャイルドシートを装着しないでおくと、万が一事故になった際、子どもだけが車外に投げ出され、重いウカを負ったり命を落としたりすることもあります。そうならないためにも、常に装着することが重要です。

また、車による事故だけでなく自転車の事故が多発しています。自転車に乗る際はヘルメットの着用を徹底させましょう。

#### どうやって予防する?

道路越しに子どもに声をかけない

道路やその近くでは遊ばせない

小さな子どもと歩くときには必ず手をつなぎ、親が車道側を歩く

日頃から交通ルールを教える

車では必ずチャイルドシートを使用する

チャイルドシートは正しく装着する  
※1歳未満・10kg未満では後向きに後部座席へ取付など

チャイルドシートを取り付ける際シートベルトでしっかりと固定する

自転車ではヘルメットを必ず着用させる

#### 起こってしまった時は?

●119番通報して、救急車を呼びましょう。

こどもの事故と対策

こどもの救急

280000

近くの経理顧問を検索

このサイトについて

リンク集

サイトマップ

ご利用規約

救急にかかる前に

いいね! 3,401

ツイート 1,828

8+1 12

### 起こってしまった時は？

- 119番通報して、救急車を呼びましょう。
- まず顔色を観察しましょう。更に体全体を見回して傷がないかを観察するとともに、声をかけて意識の有無を確認しましょう。
- 手足が普通通りに動くかを観察します。正常に動いているようにみえる場合も、手を添えて動かしてみても痛みがないかをチェックしましょう。ただし、痛がる場合は無理に動かすことは禁物です。
- 事故にあった瞬間は、パニックから十分に観察できていないことがあります。後々どうなるかが予測しづらいため、一定の時間をかけて全身の観察をする必要があります。
- 交通事故に遭遇した場合、あわてないことが最も大切です。こどもの姿勢や動き、反応をよく観察して病院受診時、もしくは到着時に救急隊員に伝えましょう。
- 大きな声で呼びかけても反応がない場合には、**心肺蘇生 (CPR)** を行いながら救急車を待つ必要があります。

### 病院を受診するべき？

- 交通事故の場合、軽そうにみえたとしても病院を受診し詳しく診察を受けましょう。受診後も一定の時間をかけて観察する必要があります。
- こどもは事故によりショックを受けているため、過度の緊張から通常とは異なる反応をしてしまいます（例えば痛くても痛いと感じない・伝えないなど）。まずは落ち着かせるためにも、受診して診察を受けましょう。

▲ページTOPへ



こどもの救急TOP &gt; こどもの事故と対策 &gt; 異物（目・耳・鼻）

こどもの命を救おう

一次救命処置

こどもの家庭内事故を防ごう

漏水

窒息

誤飲

転倒・転落

熱傷

熱中症

交通事故

異物

こどもの事故対策

こどもの救急

28000

近くの医療機関を検索

このサイトについて

リンク集

サイトマップ

ご利用規約

救急にかかる前に

いいね! &lt; 3,481

ツイート &lt; 1,828

8+1 12

家庭内  
こどもの事故を防ごう

溺水 窒息 誤飲 転落・転倒 熱傷 熱中症 交通事故 異物

い ぶつ め みみ はな  
異物（目・耳・鼻）どうやって  
予防する？目の異物と  
対処法耳の異物と  
対処法鼻の異物と  
対処法

こどもは好奇心旺盛で、時には大人では考えつかないようなことを起こしてしまいます。いたずらから小さなものを耳や鼻の中に入れて取れなくなることがあります。小さなものをこども自ら耳や鼻に入れないように、日頃から注意しておきましょう。一方、目や耳・鼻に虫が偶然入ってしまうこともあります。

また、自分自身でものを入れたとき、こどもは怒られるのを恐れて取れないことを話したがりません。そのため入れた場所の痛み・出血や、耳の場合聞こえが悪くなることから初めて気づかれることも少なくありません。そうならないためにも、こどもが耳や鼻をさわる、いつもと違う仕草に気がついたときは「何が入れた？」、入れたとしたら「何をいつ頃入れた？」と優しくたずね、正確な情報を集めましょう。

## どうやって予防する？

日頃から  
耳・鼻にももの  
入れないように  
気をつける

## 目の異物と対処法

## 入りやすいもの

- ・砂
- ・虫
- ・植物の切れ端
- ・ペットの毛



## 家庭での対処法

- ・突然目を痛がる、涙を流す、まはたきなどが増えるなどの行動は、こどもの目に異物が入ったサインです。見落とさないようにしましょう。
- ・目をこすらせないことが最も大切です。手を押さえアでもこすらせないようにしましょう。
- ・泣くことで異物が涙で洗い流されることがあります。少し落ち着くまで泣かせて様子を見ましょう。
- ・それでも痛がるようなら、こどもを寝かせて目の中を鑑査し、異物を見つけましょう。
- ・異物を見つけたら水で洗眼したり、目薬を点眼して洗い流したりしてみましょう。
- ・異物が取れると痛みは消え、涙も止まります。

## 病院を受診するべき？

- ・目の中の異物を見つけれなかった場合、あるいは異物が取れたと思ってても痛みが続く場合は受診しましょう。透明でみえにくい異物が入っている可能性があります。
- ・異物は確認できたものの、家庭で除去できなかった場合も受診しましょう。
- ・次のような場合は受診しましょう。
  - 運動場などで石灰の混じった砂が入った可能性がある場合。
  - 消毒液やトイレ洗浄液などの化学品が目に入った場合。
  - 転倒などでまぶたに裂けた傷を負った場合。
  - 転倒などで鏡や歯ブラシなどで眼球をついたり、強く打ったりした場合。


## 耳の異物と対処法



## 耳の異物と対処法

### 入りやすいもの

- BB弾・ビーズなどの小さなおもちゃ
- 豆類
- 虫



### 家庭での対処法

- 入ったものが何であってピンセットなどで取り出そうとしないようにしましょう。あやまって奥へ押し込んでしまう可能性があります。
- BB弾・ビーズなどの小さなおもちゃや豆類は、耳たぶを後ろ上方に引っ張って下向きにし、反対側の頭の横を軽く叩くと出てくる場合があります。
- 虫の場合、暗くした部屋で耳たぶを後ろ上方に引っ張って懐中電灯をあててみましょう。小さい虫なら出てくる場合があります。大きい虫ではこの方法では難しいことが多いため、20～30分待って出てこない場合は受診しましょう。

### 病院を受診するべき？

- 異物が取れなかった場合は受診しましょう。

## 鼻の異物と対処法

### 入りやすいもの

- BB弾・ビーズなどの小さなおもちゃ
- 豆類
- パチンコ玉



### 家庭での対処法

- 入ったものが何であってピンセットなどで取り出そうとしないようにしましょう。あやまって奥へ押し込んでしまう可能性があります。
- 詰まっていない方の小鼻を押さえて鼻を強くかませてみたり、コヨリて鼻をくすくすってクシャミをさせたりしてみましょう。

### 病院を受診するべき？


- 異物が取れなかった場合は受診しましょう。

▲ページTOP


## I. 総合研究報告

資料 ⑤電話相談対応者実態調査


1.どの都道府県で#8000電話対応をしていますか。




2.あなたの職種はなんですか。




3.あなたの年齢をおしえてください。




4.看護師・保健師の資格を得てから何年ですか。




5.電話相談の経験年数は何年ですか。




6.電話相談をするのに、小児看護(外来・病棟)臨床経験は必要と感じますか。




7.あなたの相談センター(自治体)では、相談対応職員は足りていますか。




8.相談対応に困ることが多いですか。




9.ソフトを試用してみましたか。



10.今後、深夜帯での電話対応を行うことになった場合に、勤務することはできますか。



11.処遇(勤務条件・勤務環境など)に満足していますか。



12.#8000事業以外の仕事もしていますか。

