

後発症疾患の登録などをすすめるひとつの要因となっている可能性が考えられた。先行研究では、専従あるいは専任の医療安全管理者を配置している病院において、医療安全を目的とした院内報告を実施し、その報告事例の分析を活発に実施していることが明らかとなっており¹⁾、こうした院内活動が関連している可能性が考えられる。今後、各施設で行われている医療安全活動と周術期ケアプロセスとの関連等を明らかにする必要があると考えられた。

Safety Indicators. Agency for Healthcare Research and Quality (U.S.). 2002.

- 5) Kitazawa T, Matsumoto K, Fujita S, Yoshida A, Iida S, Nishizawa H, Hasegawa T: Perioperative patient safety indicators and hospital surgical volumes. BMC research notes. 28; 7(1):117. doi: 10.1186/1756-0500-7-117. 2014.

参考文献

- 1) 伊藤慎也、藤田茂、北澤健文、吉田愛、飯田修平、西澤寛俊、長谷川友紀：病院における医療安全管理体制整備の状況と課題 2004 年調査と 2011 年調査の比較検討から。日本医療マネジメント学会雑誌. 15 (1) ;2-8. 2014.
- 2) 総務省行政評価局：医療安全対策に関する行政評価・監視結果報告書. 2013.
- 3) 飯田修平、西澤寛俊、長谷川友紀、小谷野圭子：DPC データを用いた医療の質評価事業と医療の質評価公表等推進事業の報告。日本医療マネジメント学会雑誌. 13 (3) ; 127-133. 2012.
- 4) McDonald KM, Romano PS, Geppert J, Davies SM, Duncan BW, Shojania KG, Hansen A.: Measures of Patient Safety Based on Hospital Administrative Data - The Patient

E. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

なし

F. 知的財産権の出願・登録状況

なし

表 1 医療安全対策加算算定状況

	医療安全対策加算 あり		医療安全 対策加算 1*				医療安全対策加算 なし		合計
2009	112	(64.4)	112	(64.4)	-	-	62	(35.6)	174 (100.0)
2010	147	(80.8)	126	(69.2)	21	(11.5)	35	(19.2)	182 (100.0)
2011	135	(83.9)	112	(69.6)	23	(14.3)	26	(16.1)	161 (100.0)

*：医療安全対策加算は2010年から医療安全加算1と2に区分された。2009年は、区分される前の医療安全対策加算を算定している施設を計上した。以下同様。

表 2 手術件数別医療安全対策加算算定状況

		加算あり				加算なし		合計	
		医療安全 対策加算 1	医療安全 対策加算 2						
2009	Low-Volume	23	(39.7)	-	-	35	(60.3)	58	(100.0)
	Middle-Volume	41	(70.7)	-	-	17	(29.3)	58	(100.0)
	High-Volume	48	(82.8)	-	-	10	(17.2)	58	(100.0)
2010	Low-Volume	29	(47.5)	15	(24.6)	17	(27.9)	61	(100.0)
	Middle-Volume	45	(75.0)	5	(8.3)	10	(16.7)	60	(100.0)
	High-Volume	52	(85.2)	1	(1.6)	8	(13.1)	61	(100.0)
2011	Low-Volume	25	(46.3)	16	(29.6)	13	(24.1)	54	(100.0)
	Middle-Volume	40	(75.5)	5	(9.4)	8	(15.1)	53	(100.0)
	High-Volume	47	(87.0)	2	(3.7)	5	(9.3)	54	(100.0)

表 3 医療安全対策加算算定状況と周術期に関する臨床指標の関連

1) PSI#4 術後の治療可能な重症合併症による死亡率

		加算あり		加算なし	合計	p*
		医療安全 対策加算 1	医療安全 対策加算 2			
2009	Low-Volume	0.350		0.336	0.342	0.732
	Middle-Volume	0.298		0.301	0.299	0.670
	High-Volume	0.213		0.248	0.219	0.478
	全施設	0.273		0.311	0.286	0.222
2010	Low-Volume	0.397	0.407	0.306	0.377	0.103
	Middle-Volume	0.268	0.236	0.377	0.282	0.352
	High-Volume	0.210	0.383	0.216	0.214	0.394
	全施設	0.273	0.365	0.303	0.289	0.175
2011	Low-Volume	0.338	0.241	0.240	0.288	0.098
	Middle-Volume	0.185	0.160	0.250	0.192	0.829
	High-Volume	0.134	0.281	0.207	0.147	0.194
	全施設	0.198	0.226	0.236	0.208	0.246

*2 群間比較には Mann-Whitney U test、3 群間比較には Kruskal-Wallis test をそれぞれ用いた。以下同様。

※加算 1 と 2 を併せた集計

		医療安全対策加算あり**	医療安全対策加算なし	合計	p
2010	Low-Volume	0.400	0.306	0.377	0.033
	Middle-Volume	0.265	0.377	0.282	0.152
	High-Volume	0.213	0.216	0.214	0.906
	全施設	0.286	0.303	0.289	0.614
2011	Low-Volume	0.303	0.240	0.288	0.140
	Middle-Volume	0.182	0.250	0.192	0.565
	High-Volume	0.140	0.207	0.147	0.276
	全施設	0.202	0.236	0.208	0.442

**医療安全対策加算 1 あるいは 2 を算定している施設。以下同様。

2) PSI#9 術後の出血、血腫発生率

		加算あり		加算なし	合計	p
		医療安全 対策加算 1	医療安全 対策加算 2			
2009	Low-Volume	0.022		0.022	0.022	0.405
	Middle-Volume	0.029		0.062	0.039	0.522
	High-Volume	0.043		0.036	0.042	0.150
	全施設	0.034		0.035	0.034	0.000
2010	Low-Volume	0.021	0.003	0.021	0.017	0.122
	Middle-Volume	0.032	0.012	0.037	0.031	0.134
	High-Volume	0.044	0.017	0.022	0.041	0.034
	全施設	0.035	0.006	0.026	0.030	0.000
2011	Low-Volume	0.017	0.020	0.013	0.017	0.237
	Middle-Volume	0.034	0.043	0.028	0.034	0.472
	High-Volume	0.049	0.008	0.028	0.045	0.062
	全施設	0.036	0.024	0.021	0.032	0.000

※加算 1 と 2 を併せた集計

		医療安全対策加算あり	医療安全対策加算なし	合計	p
2010	Low-Volume	0.015	0.021	0.017	0.678
	Middle-Volume	0.030	0.037	0.031	0.321
	High-Volume	0.044	0.022	0.041	0.029
	全施設	0.031	0.026	0.030	0.041
2011	Low-Volume	0.018	0.013	0.017	0.102
	Middle-Volume	0.035	0.028	0.034	0.747
	High-Volume	0.047	0.028	0.045	0.412
	全施設	0.034	0.021	0.032	0.304

3) PSI#13 術後の敗血症発生率

		加算あり		加算なし	合計	p
		医療安全 対策加算 1	医療安全 対策加算 2			
2009	Low-Volume	0.002		0.006	0.004	0.649
	Middle-Volume	0.005		0.006	0.005	0.442
	High-Volume	0.011		0.012	0.011	0.837
	全施設	0.007		0.007	0.007	0.124
2010	Low-Volume	0.003	0.006	0.006	0.004	0.506
	Middle-Volume	0.006	0.003	0.004	0.006	0.270
	High-Volume	0.011	0.008	0.010	0.011	0.590
	全施設	0.007	0.005	0.006	0.007	0.125
2011	Low-Volume	0.005	0.004	0.005	0.005	0.931
	Middle-Volume	0.006	0.004	0.008	0.006	0.673
	High-Volume	0.011	0.003	0.011	0.011	0.131
	全施設	0.008	0.004	0.007	0.007	0.005

※加算 1 と 2 を併せた集計

		医療安全対策加算あり	医療安全対策加算なし	合計	p
2010	Low-Volume	0.004	0.006	0.004	0.545
	Middle-Volume	0.006	0.004	0.006	0.302
	High-Volume	0.011	0.010	0.011	0.305
	全施設	0.007	0.006	0.007	0.165
2011	Low-Volume	0.005	0.005	0.005	0.714
	Middle-Volume	0.006	0.008	0.006	0.940
	High-Volume	0.011	0.011	0.011	0.363
	全施設	0.007	0.007	0.007	0.090

参考表 PSI 各指標の算出条件

PSI01 麻酔合併症

分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患に以下のコードを持つ患者（麻酔合併症）：Y653、T410、T411、T412、T413
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者、あるいは妊娠・出産・産褥期の患者
	除外	1. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（麻酔合併症）：Y653、T410、T411、T412、T413 2. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（アヘン類他による精神及び行動の障害）：F112、F132、F142、F122、F152、F162、F192、F121、F129、F161、F131、F111、F141、F151、F191、F181 3. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（故意の自傷及び自殺）：X62、X63、X64、X65、X66、X67、X68、X69、X70、X71、X72、X73、X74、X75

PSI 02 低死亡率の DRG における死亡

分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち DPC6 桁分類欄に以下のコードを持つ患者のうち死亡退院患者（死亡率 0.5%未満）：02001x、02006x、100150、100170、100230、100240、100250、100270、100290、100320、100360、010120、010180、010240、010250、010260、010280、010290、010300、110430、120080、120090、120100、120120、120130、120150、120160、120170、120180、120200、120220、120230、120240、120250、120260、120270、120300、130140、140070、140100、140110、140140、140160、140170、140190、140210、140220、140230、140245、140250、140260、140270、140280、140290、140300、140310、140330、140350、140370、140390、140410、140440、140450、140460、140480、140490、140500、140510、140550、140560、140570、140580、140590、140600、140620、150030、150040、150070、150100、150110、160030、160040、160060、160280、160330、160440、160460、160470、160480、160500、160530、160560、160590、160620、160640、160730、160740、160750、160770、160790、160810、160830、160840、160860、160890、160895、160960、160995、170060、180020、020040、020080、020110、020120、020130、020150、020160、020190、020200、020210、020220、020230、020240、020250、020280、020290、020320、020340、020350、020370、020380、020400、030150、030160、030180、030200、030220、030230、030250、030280、030290、030320、030330、030340、030350、030360、030370、030380、030425、030428、030430、030450、030460、030470、030475、030490、030500、050020、060080、060110、060240、060250、060260、060565、070015、070020、070060、070085、070090、070120、070135、070150、070160、070170、070190、070200、070210、070240、070250、070270、070280、070310、070340、070370、070380、070390、070420、070430、070440、070460、070510、070530、070580、070590、080007、080040、080070、080080、080130、080140、080150、080160、080180、080190、080210、080220、080230、080240、080245、080260、080270、090020、090030、090040、030400、070230、160760、060160、160850、120140、120060、160700、040060、030440、070350、060150、160200、160780、120070、030270、060100、020180、070360、160660、070520、11012x、030410、030240、030300、040070、080020、030390、070010、110200、060245、060330、070220、07034x、170050、160835、160610、100130、030245、050050、010030、060220、11022x、080090、060090、
----	----	---

040100、080100、140010、100060、160820、080030、170020、070080、070570、060235、060200、010111、120050、160720、150010、080050、071030、160250、070050、070290、030190、100050、160400、060360、070400、140430、120110、100070、170040、130111、050180、160580、11013x、070470、100140、070070、100220
 ※DRGをDPC6桁コードに置換して算出

除外

-

分母

包含

1. 18歳以上の患者、あるいは妊娠・出産・産褥期の患者のうち、分子に挙げるコードを持つ患者

除外

1. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者(外傷):S00-S99、T00-T14、T20-T35、T79
2. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者(癌):C00~C97
3. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者(免疫不全状態):B20-B24、B59、D462、D471、D610、D618、D70-D77、D80-D89、E40、E41、E43、I12、I13、K912、M359、N180、T86、Z94、Z49、Z992

PSI03 褥瘡

分子

包含

1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患に以下のコードを持つ患者(褥瘡):L89

除外

-

分母

包含

1. 18歳以上の手術実施患者

除外

1. 在院日数が5日未満の患者
2. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者(褥瘡):L89
3. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者(皮膚および皮下組織の疾患):L00-L99
4. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者(妊娠,分娩および産じょく<褥>):O00-O99
5. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者(片麻痺、全麻痺、四肢麻痺):G114、G80-G83、P910
6. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者(二分脊椎、無酸素脳症):G931、Q050-Q059
7. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者(デブリードマンあるいは有茎移植):K0021、K0022、K0023、K0002、K0081、K0082、K0083、K016、K020、K0151、K0152、K0153、K019'

PSI04 術後の治療可能な重症合併症による死亡

分子

包含

1. 分母の包含条件を満たす患者のうち死亡退院した患者

除外

-

分母

包含

1. 手術を受けた患者
2. 18歳以上の患者、あるいは妊娠・出産・産褥期の患者
3. 入院後発症疾患欄に以下のコードを持つ患者(肺塞栓あるいは深部静脈血栓):T800、T817、T282、I269、I801、I802、I803、I809、I829
4. 入院後発症疾患欄に以下のコードを持つ患者(肺炎):J150、J151、J14、J154、J153、J152、J158、J155、J156、A481、J159、J180、J189、J690、J182、J81
5. 入院後発症疾患欄に以下のコードを持つ患者(敗血症):A409、A412、A410、A411、A418、A414、A413、A415、A419、R571、R578、T811
6. 入院後発症疾患欄に以下のコードを持つ患者(ショックあるいは心停止):I469、O083、I751、R579、R570、R652、R571、R578、R092、T782、T882、T811、T805
7. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者(人工呼吸):K9131、K9132、

K045、K046

8. 入院後発症疾患欄に以下のコードを持つ患者（胃腸出血、急性潰瘍）：
I850、K226、K228、K250、K251、K252、K253、K259、K260、K261、
K262、K263、K269、K270、K271、K272、K273、K279、K280、K281、
K282、K283、K289、K290、K294、K296、K292、K297、K298、K318、
K571、K573、K625、K552、K638、K920、K921、K922

- 除外
1. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（肺塞栓あるいは深部静脈血栓）：
T800、T817、T282、I269、I801、I802、I803、I809、I829
 2. 肺塞栓あるいは深部静脈血栓患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（流産関連、分娩後の産科関連肺塞栓症）：O037、O032、O047、
O072、O082、O882
 3. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（肺炎）：J150、J151、J14、J154、
J153、J152、J158、J155、J156、A481、J159、J180、J189、J690、
J182、J81
 4. 肺炎患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（ウイルス
性肺炎）：J120、J121、J122、J128、J129、J13、J181、J157、J160、
J168、B250、A378、A221、B440、J110、J129、J111、J118
 5. 肺炎患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（免疫不全
状態）：B20-B24、B59、D462、D471、D610、D618、D70-D77、D80-
D89、E40、E41、E43、I12、I13、K912、M359、N180、T86、Z94、
Z49、Z992
 6. 肺炎患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（呼吸器系
の疾患）：J00-J99
 7. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（敗血症）：A409、A412、A410、
A411、A418、A414、A413、A415、A419、R571、R578、T811
 8. 敗血症患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（感染
症）：A00、A01、A02、A03、A04（A045、A046、A047を除く）、A05、
A20（A203を除く）、A21、A22、A23、A24（A241、A242を除く）、A25、
A26（A260を除く）、A28（A282を除く）
 9. 敗血症患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（免疫不
全状態）：B20-B24、B59、D462、D471、D610、D618、D70-D77、D80-
D89、E40、E41、E43、I12、I13、K912、M359、N180、T86、Z94、
Z49、Z992
 10. 敗血症患者のうち在院日数が4日未満の患者
 11. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（ショックあるいは心停止）：I469、
O083、I751、R579、R570、R652、R571、R578、R092、T782、T882、
T811、T805
 12. ショックあるいは心停止患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患
者（外傷）：S00-S99、T00-T14、T20-T35、T79
 13. ショックあるいは心停止患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患
者（出血と胃腸出血）：I850、K226、K228、K250、K251、K252、K253、
K259、K260、K261、K262、K263、K269、K270、K271、K272、K273、
K279、K280、K281、K282、K283、K289、K290、K294、K296、K292、
K296、K297、K298、K318、K571、K573、K625、K552、K638、K920、
K921、K922
 14. ショックあるいは心停止患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患
者（人工流産）：O038、O033、O048、O073
 15. ショックあるいは心停止患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患
者（呼吸器系の疾患）：J00-J99
 16. ショックあるいは心停止の患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコード
-

を持つ患者（循環器系の疾患）：I00-I99

17. 主傷病に以下のコードを持つ患者（胃腸出血、急性潰瘍）：I850、K226、K228、K250、K251、K252、K253、K259、K260、K261、K262、K263、K269、K270、K271、K272、K273、K279、K280、K281、K282、K283、K289、K290、K294、K296、K292、K297、K298、K318、K571、K573、K625、K552、K638、K920、K921、K922
18. 胃腸出血、急性潰瘍の患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（外傷）：S00-S99、T00-T14、T20-T35、T79
19. 胃腸出血、急性潰瘍の患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（アルコール依存）：F102、F109、F101、I426、K292、K700、K701、K703、K709、T510、T519
20. 胃腸出血、急性潰瘍の患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（貧血）：D500
21. 胃腸出血、急性潰瘍の患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（消化器系の疾患）：K00-K93
22. 胃腸出血、急性潰瘍の患者のうち主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（肝疾患、胆嚢胆管及び膵の障害）：K70-K77、K80-K87

PSI05 異物残存

分子	包含	1. 18歳以上の患者、あるいは妊娠・出産・産褥期の患者のうち、入院後発症疾患欄に以下のコードを持つ患者（異物残存）：T815、T816
	除外	-
分母	包含	-
	除外	-

PSI06 医原性気胸

分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患名称欄に以下の疾患を持つ患者（医原性気胸）：医原性気胸
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の患者
	除外	1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（医原性気胸）：医原性気胸 2. 18歳以上の患者、あるいは妊娠・出産・産褥期の患者のうち、主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（異物残存）：T815、T816 3. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（妊娠、分娩および産じょく<褥>）：O00-O99 4. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（胸部外傷あるいは胸水貯留）：S223、S224、S222、S225、S128、S229、S270、S271、S272、S269、S260、S273、S278、S274、S279、S211、S212、S310、S250、S251、S252、S253、S254、S255、S258、S259、S201、S308、L088、S201、S309、S200、S202、S300、S381、S280、S772、S244、S345、S243、S346、S298、S398、T149、A156、A150、C782 5. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者（diaphragmatic surgery repair）：K1423、K183、K185、K186、K1961、K1962、K1963、K399、K402、K4031、K4032、K477、K480、K4841、K4842、K485、K486、K4871、K4872、K4873、K488、K493、K4961、K4962、K497、K4981、K4982、K499、K501、K503、K504、K506、K507、K5091、K5092、K5111、K5112、K5113、K5114、K5115、K5116、K5141、K5142、K5143、K5144、K514-21、K514-22、K514-4、K515、K516、K517、K5181、K5182、K5183、K5184、K519、K5201、K5202、K5203、K5211、K5212、K5213、K5221、K5222、K5223、K5231、K5232、K5233、K5241、K5242、K5251、K5252、K5253、K5261、K5262、K5263、K5261、K5262、K526-

33、K528、K530、K5311、K5312、K5321、K5322、K5341、K5342、K534-2、K5351、K5352、K5371、K5372、K539、K540、K541、K542、K543、K5441、K5442、K5443、K545、K5521、K5522、K5531、K5532、K5533、K5541、K5542、K5543、K5551、K5552、K5553、K556、K557、K558、K5601、K5602、K5603、K5604、K5605、K5606、K5607、K5608、K564、K566、K5671、K5672、K5673、K569、K5701、K5702、K5711、K5712、K5741、K5742、K574-2、K5761、K5762、K5763、K5764、K5771、K5772、K5791、K5792、K579-21、K579-22、K5801、K5802、K5811、K5812、K5813、K5821、K5822、K5823、K5831、K5832、K5833、K5834、K585、K5861、K5862、K5863、K587、K588、K589、K592、K593、K6001、K6002、K6021、K6022、K667

PSI07 中心静脈カテーテルに関連する血流感染

分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（病院関連の感染症）：T827、T802
----	----	---

除外

-

分母	包含	1. 18歳以上の患者、あるいは妊娠・出産・産褥期の患者
----	----	------------------------------

除外

1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（病院関連の感染症）：T827、T802
2. 在院日数が2日間未満の患者
3. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（免疫不全状態）：B20-B24、B59、D462、D471、D610、D618、D70-D77、D80-D89、E40、E41、E43、I12、I13、K912、M359、N180、T86、Z94、Z49、Z992
4. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（癌）：C00～C97

PSI08 術後の股関節骨折

分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（股関節骨折）：S720、S721、S722
----	----	---

除外

-

分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者
----	----	-----------------

除外

1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（股関節骨折）：S720、S721、S722
2. 股関節骨折治療のみを受けた患者
3. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（筋骨格系及び結合組織の疾患）：M00-M99
4. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（てんかん）：G403、G401、G404、G405、F803、G408、G409、R560
5. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（失神）：G900
6. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（動脈閉塞、昏睡、中毒、せん妄、低酸素性脳障害）：B150、B160、B162、B170、B171、B172、B178、B180、B181、B182、B190、E101、E106、E110、E116、E15、F01、F028、F03、F050、F051、F058、F059、F060、F061、F062、F063、F064、F068、F101、F102、F109、F111、F112、F119、F121、F122、F129、F131、F132、F139、F141、F142、F149、F151、F152、F159、F161、F162、F169、F172、F181、F182、F189、F191、F192、F199、F200、F201、F202、F205、F208、F209、F259、F308、F311、F312、F317、F318、F319、F323、F328、F330、F331、F332、F333、F334、F339、F448、F803、F840、F843、F845、F848、F849、G401、G402、G403、G404、G405、G408、G409、G450、G900、G931、I469、I609、I619、I620、I621、I629、I630、I631、I632、I633、I634、I635、I678、I978、K729、R402、R560、T400、T401、T402、T403、T404、T406、T407、T408、T409、T410、T411、T412、T413、T414、T420、T421、T422、T423、T424、T425、T426、T427、T428、T430、T431、T432、T433、

		T434、T435、T436、T438、T439、T481
		7. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（転移性癌、リンパ性腫瘍、骨腫瘍、自傷・故意の障害）：'C400、C401、C402、C403、C410、C411、C412、C413、C414、C419、C770、C771、C772、C773、C774、C775、C778、C779、C780、C781、C782、C783、C784、C785、C786、C787、C788、C790、C791、C792、C793、C794、C795、C796、C797、C798、C810、C811、C812、C813、C817、C819、C829、C833、C835、C837、C838、C840、C841、C900、C901、C902、C910、C911、C914、C919、C920、C921、C922、C923、C924、C925、C929、C930、C931、C939、C940、C942、C943、C950、C951、C959、C960、C962、C969
		8. 妊娠・出産・産褥期の患者
PSI09 術後の出血、血腫		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（術後出血、術後血腫）：T888
		2. 分母の条件に合致する患者のうち何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者（術後出血の管理）：K3771、K3772、K6071、K6072、K564、K563、K5621、K5622、K615、K1961、K1962、K1963、K646、K285、K112、K630、K638、K854、K8551、K8552
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者
	除外	1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（術後出血、術後血腫）：T888
		2. 行われた手術が術後出血の管理のみの患者
		3. 妊娠・出産・産褥期の患者
PSI10 術後の生理学的代謝障害		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（生理学的代謝障害）：E116、E101、E106、E110、N170、N171、N172、N178、N179、N19、N998
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者
	除外	1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（生理学的代謝障害）：E116、E101、E106、E110、N170、N171、N172、N178、N179、N19、N998
		2. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（急性心筋梗塞）：I210、I211、I212、I214、I213、I442、I471、I472、I479、I480、I481、I490、I469、O038、O033、O048、O073、O083、O751、R579、R570、R652、R571、R578、T782、T882、T811、T805、D62、R58、K661、T792、T888、I850、I851、K226、K228、K250、K252、K254、K256、K260、K262、K264、K266、K270、K272、K274、K276、K280、K282、K284、K286、K290、K294、K295、K296、K292、K297、K298、K299、K318、K571、K573、K625、K552、K638、K920、K921、K922
		3. 入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（腎障害）：I129、I120、I131、I130、I132、E119、E109、E116、E106、E101、E110、E112、E102、E113、E103、E114、E104、E115、E105
PSI11 術後の呼吸器不全		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（呼吸不全）：J969、J960
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者
	除外	1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（呼吸不全）：J969、J960
		2. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（神経筋障害）：G610、

		G700、G733、G701、G702、G708、G709、G712、G710、G711、G723、G722、G737、G724、G728、G729
		3. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者（喉頭・咽頭・顔面の手術）： K402、K401、K415、K406、K3792、K373、K3712、K371、K372、 K375、K381、K382、K3822、K3882、K346、K389、K389、K393、 K387、K3922、K385、K392、K4032、K397、K4032、K394、K395、 K4032、K391、K390、K383、K384、K398、K400、K403、K519、K399、 K415、K418、K4182、K419、K407、K4072、K4032、K443、K4272
		4. 3に該当する患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（頭蓋顔面異常）：Q184、Q185、Q189、Q311、Q313、Q318、Q321、Q324、Q750、Q752、Q759
		5. 妊娠・出産・産褥期の患者
		6. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（呼吸器系の疾患）：J00-J99
		7. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（循環器系の疾患）：I00-I99
PSI12 術後の肺動脈塞栓症、深部静脈血栓		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（肺動脈塞栓症、深部静脈血栓）：I801、I802、I803、I809、I829、T800、T817、T828、I269
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者
	除外	1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（肺動脈塞栓症、深部静脈血栓）：I801、I802、I803、I809、I829、T800、T817、T828、I269 2. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者（大静脈断絶）：K620 3. 妊娠・出産・産褥期の患者
PSI13 術後の敗血症		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（敗血症）：A409、A412、A410、A411、A418、A414、R571、R578、T811、A415、A413、A418、A419
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者
	除外	1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者（敗血症）：A409、A412、A410、A411、A418、A414、R571、R578、T811、A415、A413、A418、A419 2. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者（感染症）：A00、A01、A02、A03、A04（A045、A046、A047を除く）、A05、A20（A203を除く）、A21、A22、A23、A24（A241、A242を除く）、A25、A26（A260を除く）、A28（A282を除く） 3. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（免疫不全状態）：B20-B24、B59、D462、D471、D610、D618、D70-D77、D80-D89、E40、E41、E43、I12、I13、K912、M359、N180、T86、Z94、Z49、Z992 4. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（癌）：C00～C97 5. 妊娠・出産・産褥期の患者 6. 在院日数が4日間未満の患者
PSI14 術後の創傷離開		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者（創傷離開）：T813
	除外	-
分母	包含	1. 18歳以上の手術実施患者 2. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者（腹骨盤手術）：K022、K112、K113、K1961、K1962、K1963、K196-3、K430、K4441、K4442、K4443、

K4444、K5251、K5252、K5253、K525-2、K530、K5321、K5322、K532-2、K5351、K5352、K5371、K5372、K537-2、K5601、K5602、K5603、K5604、K5605、K5606、K5607、K5608、K564、K6091、K6092、K6093、K6191、K6192、K619-2、K621、K623-2、K630、K6311、K6312、K6321、K6322、K6331、K6332、K6333、K6334、K6335、K6336、K6337、K6348、K6369、K6371、K6372、K6373、K6374、K638、K639、K6401、K6402、K641、K6421、K6422、K643、K6441、K6442、K647、K648、K649、K649、K651、K653-4、K6551、K6552、K655-2、K6571、K6572、K657-2、K6591、K6592、K6593、K6601、K6602、K6603、K660-2、K662、K663、K666、K667、K669、K670、K6711、K6712、K672、K674、K6751、K6752、K6753、K6754、K677、K680、K681、K6821、K6822、K682-2、K684、K689、K6911、K6912、K693、K694、K6951、K6952、K6953、K6954、K6955、K695-2、K696、K697、K697-2、K6981、K6982、K6991、K6992、K700、K701、K7021、K7022、K7023、K7024、K7031、K7032、K7033、K7034、K704、K705、K706、K7071、K7072、K708、K709、K713、K714、K7151、K7152、K7161、K7162、K716-2、K717、K7181、K7182、K7191、K7192、K7193、K719-21、K719-22、K719-3、K720、K721-2、K724、K725、K726、K728、K7291、K7292、K7301、K7302、K7311、K7312、K7321、K7322、K734、K735、K7361、K7362、K7421、K7422、K7423、K7424、K7551、K7552、K758、K762、K769、K772、K778、K779、K780、K785、K786、K787、K789、K790、K791、K794、K8011、K8012、K8031、K8032、K8033、K8034、K8035、K8036、K806、K810、K811、K843、K8651、K8652、K8653、K8654、K876、K881、K884、K885、K8861、K8862、K8871、K8872、K887-21、K888-22、K890、K9031、K9032、K9033、K904、K911

- 除外
1. 在院日数が2日間未満の患者
 2. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者(免疫不全状態): B20-B24、B59、D462、D471、D610、D618、D70-D77、D80-D89、E40、E41、E43、I12、I13、K912、M359、N180、T86、Z94、Z49、Z992
 3. 妊娠・出産・産褥期の患者

PSI15 偶発的な穿刺または裂傷

- | | | |
|----|----|---|
| 分子 | 包含 | 1. 分母の条件に合致する患者のうち入院後発症疾患欄に以下の疾患を持つ患者(偶発的な穿刺または裂傷): Y600、Y601、Y602、Y603、Y604、Y605、Y606、Y607、Y608、Y609 |
|----|----|---|

除外

-

- | | | |
|----|----|---|
| 分母 | 包含 | 1. 18歳以上の手術実施患者 |
| | 除外 | 1. 主傷病名欄に以下の疾患を持つ患者(偶発的な穿刺または裂傷): Y600、Y601、Y602、Y603、Y604、Y605、Y606、Y607、Y608、Y609
2. 妊娠・出産・産褥期の患者
3. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者(脊椎手術): K131、K131-2、K133、K1421、K1422、K1423、K1424、K142-21、K142-22、K142-3、K184、K189 |

PSI16 輸血反応

- | | | |
|----|----|--|
| 分子 | 包含 | 1. 18歳以上の患者、あるいは妊娠・出産・産褥期の患者
2. 入院後発症疾患に以下のコードを持つ患者(輸血反応): T812 |
|----|----|--|

除外

1. 主傷病名欄に以下のコードを持つ患者(輸血反応): T812

- | | | |
|----|----|---|
| 分母 | 包含 | - |
| | 除外 | - |

PSI17 分娩時外傷		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（分娩時外傷）：P100、P101、P104、P524、P528、P122、P130、P132、P133、P138、P115、P113、P140、P141、P143、P150、P151、P153、P155、P158
	除外	1. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（低出生体重児）：P070、P071 2. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（腕神経叢損傷）：P140、P141、P143 3. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（骨形成不全）：Q780
分母	包含	1. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（分娩）：O810、O811、O812、O813、O814、O815、O830、O831、O832、O833、O834、O838、O839、O841、O800、O801、O808、O809、O840、O848、O849、O820、O821、O822、O828、O829、O842
	除外	-
PSI18 産科外傷（経膣分娩、機械補助有り）		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（会陰裂傷）：O702、O703
	除外	-
分母	包含	1. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（経膣分娩、機械補助有り）：O810、O811、O812、O813、O814、O815、O830、O831、O832、O833、O834、O838、O839、O841 2. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者（機械補助有り）：K7551、K7552、K8941、K8942
	除外	-
PSI19 産科外傷（経膣分娩、機械補助無し）		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（会陰裂傷）：O702、O703
	除外	-
分母	包含	1. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者：O800、O801、O808、O809、O840、O848、O849
	除外	1. 何れかの手術欄に以下のコードを持つ患者（機械補助分娩）：K8941、K8942、K893
PSI20 産科外傷（帝王切開）		
分子	包含	1. 分母の条件に合致する患者のうち何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（会陰裂傷）：O702、O703
	除外	-
分母	包含	1. 何れかの疾患名欄に以下のコードを持つ患者（帝王切開）：O820、O821、O822、O828、O829、O842
	除外	-

※PSI#1 と PSI#20 は AHRQ による技術サポートが終了している。

