

表 1-5 三重県産フグの部位別毒性

魚種（個体数）	毒性値（マウスユニット/g）							
	筋肉	皮	肝臓	消化管	腎臓	脾臓	卵巣	精巣
トラフグ属								
ヒガンフグ（4）	<10	<10	<10- 18	<10	<10	<10	<5-157	<5
アカメフグ（1）	<5	<10	<10	<10	<10	<17	—	<5
ショウサイフグ（7）	<5	<10-159	<10-500	12-120	<10-17	17-153	224-1120	6.5-11
ナシフグ（2）	<5-11	50-379	<10- 17	<10- 24	<10-11	<10	334- 356	—
マフグ（1）	<5	127	349	935	<10	447	1220	—
コモンフグ（3）	<5	99-263	<10- 35	<10- 20	<10-10	<39	—	<5
シマフグ（1）	<5	<10	<10	11	<10	<10	50	—
ムシフグ（1）	10	64	13	27	<10	17	337	—
クサフグ（2）	<5	45- 47	<10- 79	<10- 11	<10	<29	29-748	—
トラフグ（1）	<5	<10	<10	<10	<10	<5	—	<5
モヨウフグ属								
ホシフグ（1）	<5	<10	<10	<10	<10	<13	—	—
サバフグ属								
クマサカフグ（1）	<5	<10	<10	<10	<10	<10	<5	—
センニンフグ（1）	<5	<10	<10	<10	<10	<17	—	<5

- ：測定せず．