

表 1-7 トラフグ類似フグ有毒個体の毒性

No.	漁獲場所	性別	毒性値（MU/g）								外部形態から推定した親魚
			肝臓	消化管	生殖腺		胆嚢	脾臓	筋肉	皮	
					精巣	卵巣					
4	山口県瀬戸内海	♂	13.8	< 5	< 5	—	16.0	16.0	< 5	5.4	トラフグ、マフグ
18	山口県	♀	< 5	< 5	—	74.8	—	—	< 5	< 5	トラフグ、マフグ
21	山口県厚狭	♂	11.9	< 5	32.6		< 10	< 38	< 5	< 5	トラフグ、マフグ
24	山口県厚狭	♀	< 5	< 5	—	54.2	< 10	< 10	< 5	< 5	トラフグ、マフグ
28	山口県厚狭	♀	550	1070	—	465	298	595	< 5	220	トラフグ、マフグ
84	山口県	不明	292	—	—		186	—	< 5	10.5	トラフグ、マフグ
88	山口県	♀	460	—	—	109	—	—	< 5	45.2	トラフグ、マフグ
89	山口県	♀	13.5	—		10.9	19.8	—	< 5	< 5	トラフグ、マフグ
90	山口県	♂	689	—	< 5	—	552	—	< 5	69.0	トラフグ、？

—：測定せず