

安全に  
使うための

おつじとう  
**乙字湯の確認票**

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に乙字湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**大黄を含む漢方薬** \*\* を服用して、激しい腹痛を伴う下痢やひどい腹痛を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 痔（いぼ痔、きれ痔など）
- 軽度の脱肛
- 便秘

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

- 下痢をしやすいですか？
- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力はひどく虚弱ですか？

↓ やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱

普段から便がかたく、便秘がちですか？

↓ はい

いいえ

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません  
が、あなたの意思により服用可能です



服用できます

きれ痔、便秘に使用する場合には、5~6日くらい服用しても症状がよくならない時は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

本剤を服用中は他の下剤（瀉下剤）は服用しないでください。

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 効能・効果

体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症：痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

一元乃錠剤乙字湯	一元製薬	オツジンS「コタロー」（乙字湯エキス錠）	小太郎漢方製薬
ウチダの天地通暢	ウチダ和漢薬	JPS乙字湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬
乙字湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ツムラ漢方乙字湯エキス顆粒	ツムラ
乙字湯エキス顆粒KM	カーヤ	トチモトの乙字湯	板本天海堂
乙字湯エキス〔細粒〕3	松浦薬業	南陽（エキス顆粒）	建林松鶴堂
乙字湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	プリザ漢方内服薬	大正製薬
乙字湯エキス錠クラシエ	クラシエ薬品	本草乙字湯エキス顆粒-M	本草製薬
乙字湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠	モリ タイヂーン	大杉製薬

## 使用上の注意（平成26年6月現在）

### してはいけないこと

- 次の人には服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

### 相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位（きれ痔、便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

## 処方構成生薬

当帰、柴胡、黃芩、甘草、升麻、大黃

## 乙字湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	2	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

かみきひとう  
**加味帰脾湯の確認票**

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に加味帰脾湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用はおすすめできません\*

次のような症状がありますか？

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 貧血   | <input type="checkbox"/> 健忘、動悸、ヒステリー、神経衰弱、<br>神經症 |
| <input type="checkbox"/> 不眠   |   |
| <input type="checkbox"/> 精神不安 |   |

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？

↓ 中等度／虚弱

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません  
が、あなたの意思により服用可能です

- 胃腸が弱いですか？
- 心身ともに疲れていますか？
- 貧血ぎみで、血色が悪いですか？
- なんとなく熱っぽく、熱感がありますか？
- イライラや不安、のぼせ感がありますか？

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 効能・効果

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：貧血、不眠症、精神不安、神経症

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

加味帰脾湯エキス顆粒KM	カーヤ
加味帰脾湯エキス顆粒クラシエ	クラシエ薬品
加味帰脾湯エキス〔細粒〕9	松浦薬業
加味帰脾湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠

JPS 加味帰脾湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬
妙光（エキス顆粒）	建林松鶴堂
ロート加味帰脾湯錠	ロート製薬

## 使用上の注意（平成25年10月現在）

### してはいけないこと

次の人には服用しないこと

生後3ヶ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

人参、白朮または蒼朮、茯苓、酸棗仁、竜眼肉、黃耆、当帰、遠志、柴胡、山梔子、甘草、木香、大棗、生姜、(牡丹皮)

## 加味帰脾湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	2	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

かみしうようさん  
**加味逍遙散の確認票**

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に加味逍遙散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> のぼせ感    | <input type="checkbox"/> 寝付きが悪い、眠れないことが<br>ある |
| <input type="checkbox"/> 肩こり     | <input type="checkbox"/> 月経不順、月経困難            |
| <input type="checkbox"/> 疲れやすい   | <input type="checkbox"/> 更年期障害                |
| <input type="checkbox"/> 不安、イライラ |   |

服用はおすすめで  
きません\*

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

心臓に不具合はありますか？

腎臓に不具合はありますか？

血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

気分にムラがあって落ち着かず、上記の症状だけでなく、頭痛やめまいなどいろいろと気になる症状がありますか？

はい

いいえ

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません  
が、あなたの意思により服用可能です



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 効能・効果

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの加味逍遙散	ウチダ和漢薬
加味逍遙散エキス顆粒〔東洋〕 分包	東洋薬行
加味逍遙散エキス〔細粒〕 8	松浦葉業
加味逍遙散エキス細粒「分包」 三和生薬	三和生薬
加味逍遙散エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
加味逍遙散エキス顆粒KM	カーヤ
加味逍遙散料「タキザワ」	タキザワ漢方廠
カミセーヌN「コタロー」	小太郎漢方製薬

「クラシエ」漢方加味逍遙散料エキス顆粒	クラシエ薬品
サン・コーミン	大杉製薬
JPS加味逍遙散料エキス錠N	ジェーピーエス製薬
錠剤 加味逍遙散	一元製薬
清心（エキス顆粒）	建林松鶴堂
ツムラ漢方加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ
トチモトの加味逍遙散	板本天海堂
ホノミチョウケイ錠	創盛堂薬品

## 使用上の注意（平成24年9月現在）

### してはいけないこと

次の人には服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。医師の治療を受けている人。
  - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

当帰、芍薬、白朮または蒼朮、茯苓、柴胡、牡丹皮、山梔子、甘草、生姜、薄荷葉

## 加味逍遙散の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	1	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

# かつ こん とう 葛根湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に葛根湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬<sup>\*\*</sup>を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> かぜ   | <input type="checkbox"/> 肩こり    |
| <input type="checkbox"/> 鼻づまり | <input type="checkbox"/> 筋肉痛    |
| <input type="checkbox"/> 頭痛   | <input type="checkbox"/> 手や肩の痛み |
| <input type="checkbox"/> 発熱   |                                 |

服用はおすすめできません\*

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

- 心臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- （男性の方）尿の出に不具合がありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 現在、たくさん汗をかいていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの解表舒筋	ウチダ和漢薬
エスタック「葛根湯」エキス顆粒	エスエス製薬
カコナル	第一三共ヘルスケア
カゼコール内服液	大草薬品
カッコーンV「コタロー」	小太郎漢方製薬
葛根湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬
葛根湯（エキス顆粒）	建林松鶴堂
葛根湯エキス顆粒Sクラシエ	クラシエ薬品
葛根湯エキス顆粒〔大峰〕	大峰堂薬品工業
葛根湯エキス顆粒KM	カーヤ
葛根湯エキス顆粒「至聖」	三九製薬
葛根湯エキス顆粒〔東洋〕分包	東洋薬行
葛根湯エキス〔細粒〕7	松浦薬業
葛根湯エキスG	東亜薬品
葛根湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠

紀伊国屋カッコン湯	紀伊国屋漢薬局
生隆「分包」	太虎精堂製薬
阪本漢法の葛根湯エキス顆粒	阪本漢法製薬
サトウ葛根湯エキス顆粒	佐藤製薬
三宝葛根湯エキス顆粒	三宝製薬
JPS葛根湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬
錠剤 葛根湯	一元製薬
ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒	ツムラ
トチモトのカッコン湯	柘本天海堂
ハイ・カッコー	大杉製薬
ピュアドリップ葛根湯	湧永製薬
風治散	和漢薬研究所
ホノミキシユ錠	創盛堂薬品
本草葛根湯エキス顆粒-H	本草製薬
山本漢方「葛根湯エキス顆粒」	山本漢方製薬

## 使用上の注意（平成24年9月現在）

### してはいけないこと

次の人には服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことのある人。
- (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

葛根、麻黄、大棗、桂皮、芍藥、甘草、生姜

## 葛根湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	2	2	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

かつ こん とう か せん きゅう しん い  
**葛根湯加川芎辛夷の確認票**

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に葛根湯（加川芎辛夷）を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**麻黄を含む漢方薬\*\***を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 鼻づまり
- 副鼻腔炎（ちくのう症）
- 粘った鼻水

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

- 心臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- （男性の方）尿の出に不具合がありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 現在、たくさん汗をかいていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 効能・効果

比較的体力があるものの次の諸症：鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの太陽爽鼻湯（分包）	ウチダ和漢薬	サンワ葛根湯加川芎辛夷エキス細粒「分包」	三和生薬
オオクサ鼻優S	大草薬品	JPS葛根湯加川芎辛夷エキス錠N	ジェーピーエス製薬
葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒KM	カーヤ	ツムラ漢方葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒	ツムラ
葛根湯加川芎辛夷エキス〔細粒〕77	松浦薬業	ノーザA「コタロー」	小太郎漢方製薬
葛根湯加川芎辛夷エキス散〔勝昌〕	東洋薬行	ノンパースA	一元製薬
葛根湯加川芎辛夷エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	モリチクノーン	大杉製薬
葛根湯加川芎辛夷「タキザワ」	タキザワ漢方廠		
「クラシエ」ベルエムピK 葛根湯加川芎辛夷エキス錠	クラシエ薬品		

## 使用上の注意（平成24年9月現在）

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

葛根、麻黄、大棗、桂皮、芍薬、甘草、生姜、川芎、辛夷

## 葛根湯加川芎辛夷の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	2	2	0

2:最適、1:適応可能、0:原則としては適さない