

安全に  
使うための

# ごりんさん 五淋散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に五淋散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- 頻尿
- 残尿感がある
- 排尿痛
- 尿がにごる

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

- 血圧はひどく高いですか？
- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 効能・効果

体力中等度のものの次の諸症：頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|               |         |           |       |
|---------------|---------|-----------|-------|
| 五淋散料エキス〔細粒〕80 | 松浦薬業    | 腫経（エキス顆粒） | 建林松鶴堂 |
| ゴリンサンN「コタロー」  | 小太郎漢方製薬 | ボーコレン     | 小林製薬  |

## 使用上の注意（平成25年3月現在）

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 次の症状のある人。 むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

茯苓、当帰、黄芩、甘草、芍薬、山梔子、(地黄、沢瀉、木通、滑石、車前子)

## 五淋散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0      | 1       | 2         | 1           | 0      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

# ご利用さん 五苓散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に五苓散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

→ はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

→ 1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 水様性下痢
- 急性胃腸炎
- 暑気あたり
- むくみ
- 二日酔
- 頭痛

↓ 1つ以上「はい」

→ すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

残便感があり、繰り返し腹痛を伴う便意を催す状態（しぶり腹）ですか？

↓ いいえ

→ はい

服用できません  
医療機関への受診をおすすめします

- のどが渇いて尿の量が少ないですか？
- めまいがありますか？
- 吐き気や嘔吐、腹痛がありますか？
- 頭痛がありますか？
- むくみがありますか？

↓ 1つ以上「はい」

→ すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの  
体質・症状に合わない  
かもしれませんが、あなたの  
意思により服用可能です



**服用できます**

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

急性胃腸炎、二日酔の場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりの場合には5～6日くらい服用しても症状がよくなる時は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

## ■ 効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量がすくないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

## ■ 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|                       |         |                |           |
|-----------------------|---------|----------------|-----------|
| ウチダの五苓散               | ウチダ和漢薬  | 五苓散料エキス散〔勝昌〕   | 東洋薬行      |
| 〔救心漢方〕五苓散             | 救心製薬    | 五苓散料エキス錠〔大峰〕   | 大峰堂薬品工業   |
| クラシエ五苓散錠              | クラシエ薬品  | 五苓散料「タキザワ」     | タキザワ漢方廠   |
| 光風（エキス顆粒）             | 建林松鶴堂   | JPS五苓散料エキス錠N   | ジェーピーエス製薬 |
| ゴレーンS「コタロー」（五苓散料エキス錠） | 小太郎漢方製薬 | 錠剤 五苓散         | 一元製薬      |
| 五苓散エキス顆粒SA            | 湧永製薬    | スイギャクEP錠       | 劑盛堂薬品     |
| 五苓散料A                 | 大杉製薬    | ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒 | ツムラ       |
| 五苓散料Aエキス細粒「分包」三和生薬    | 三和生薬    | トチモトの五苓湯       | 栃本天海堂     |
| 五苓散料エキス〔細粒〕16         | 松浦薬業    | 本草五苓散顆粒-R      | 本草製薬      |

## ■ 使用上の注意（平成26年6月現在）

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■ 処方構成生薬

沢瀉、猪苓、茯苓、蒼朮または白朮、桂皮

## ■ 五苓散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1      | 1       | 2         | 1           | 1      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に  
使うための

# 柴胡加竜骨牡蛎湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に柴胡加竜骨牡蛎湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？#

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**大黄を含む漢方薬\*\***を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？#
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 精神不安、驚きやすい、イライラ感、不眠、円形脱毛症、神経症
- 動悸
- 小児夜泣き
- 更年期障害
- 便秘

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

下痢をしやすいですか？#

いいえ

はい

平素の体力は虚弱ですか？

充実/中等度

虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

# 柴胡加竜骨牡蛎湯には大黄が配合されていない商品もありますが、この確認票は大黄を含む商品を念頭に作られています

【参考事項】本剤は、次のいずれかの方に特に適しています。

- ・わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがある
- ・寝返りを打ちにくいほど、身体が重く感じる
- ・よく夢を見る
- ・口が苦いとか、口がねばる感じがある

## 効能・効果

体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|                       |         |                      |           |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------|
| ウチダの電化順清              | ウチダ和漢薬  | サンワ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒〔分包〕 | 三和生薬      |
| オオクサ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠      | 大草薬品    | JPS柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠N     | ジェーピーエス製薬 |
| 休息（エキス顆粒）             | 建林松鶴堂   | 錠剤 柴胡加竜骨牡蠣湯          | 一元製薬      |
| 「クラシエ」漢方柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 | クラシエ薬品  | ツムラ漢方柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒   | ツムラ       |
| 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒KM       | カーヤ     | トチモトの柴胡加竜骨牡蠣湯        | 栃海天海堂     |
| 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス（細粒）22     | 松浦薬業    | ホノミサイキ錠              | 劑盛堂薬品     |
| 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス散〔勝昌〕      | 東洋薬行    | 本草柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒-M    | 本草製薬      |
| 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠〔大峰〕      | 大峰堂薬品工業 | モリ コーミン              | 大杉製薬      |
| 柴胡加竜骨牡蠣湯「タキザワ」        | タキザワ漢方廠 | ロート柴胡加竜骨牡蠣湯錠         | ロート製薬     |
| サイリユンN「コタロー」          | 小太郎漢方製薬 | ワクナガ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒    | 湧永製薬      |

## 使用上の注意（平成25年10月現在）

### してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

柴胡、半夏、茯苓、桂皮、大棗、人參、竜骨、牡蠣、生姜、（大黄、黄芩、甘草）

## 柴胡加竜骨牡蠣湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0      | 0       | 1         | 2           | 1      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
軟便、下痢
- 1ヵ月位（小児夜泣き、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

安全に  
使うための

さい こ けい し とう

# 柴胡桂枝湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に柴胡桂枝湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- かぜの諸症状：微熱、悪寒（さむけ）、頭痛、倦怠（けんたい）感
- 胃腸の不調の諸症状：胃のむかつき、吐き気、胃痛、胃のつかえ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

- わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがしますか？
- 口が苦いとか、口がねばる感じがしますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|                      |         |                   |           |
|----------------------|---------|-------------------|-----------|
| ウチダの半裏回陽             | ウチダ和漢薬  | 柴胡桂枝湯「タキザワ」       | タキザワ漢方廠   |
| オオクサ柴胡桂枝湯エキス顆粒(分包)   | 大草薬品    | 三宝柴胡桂枝湯エキス顆粒      | 三宝製薬      |
| 「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒 A | クラシエ薬品  | JPS柴胡桂枝湯エキス錠N     | ジェーピーエス製薬 |
| サイケットN「コタロー」         | 小太郎漢方製薬 | 錠剤 柴胡桂枝湯          | 一元製薬      |
| 柴胡桂枝湯Aエキス細粒「分包」三和生薬  | 三和生薬    | ツムラ漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒 A | ツムラ       |
| 柴胡桂枝湯エキス顆粒SA         | 帝國漢方製薬  | 天香(エキス顆粒)         | 建林松鶴堂     |
| 柴胡桂枝湯エキス顆粒KM         | カーヤ     | トチモトの柴胡桂枝湯        | 栃本天海堂     |
| 柴胡桂枝湯エキス細粒〔東洋〕       | 東洋薬行    | ハイ・カンボール          | 大杉製薬      |
| 柴胡桂枝湯エキス〔細粒〕23       | 松浦薬業    | ホノミキョウカン錠         | 劑盛堂薬品     |
| 柴胡桂枝湯エキス錠〔大峰〕        | 大峰堂薬品工業 | 本草柴胡桂枝湯エキス顆粒-H    | 本草製薬      |

## 使用上の注意 (平成 25 年 3 月現在)

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後 3 ヶ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| その他  | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 1 ヶ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、人参、大棗、甘草、生姜

## 柴胡桂枝湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普段の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0      | 2       | 2         | 1           | 0      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



安全に  
使うための

しゃく やく かん ぞう とう

# 芍薬甘草湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に芍薬甘草湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- こむらがり
- 筋肉のけいれん、痛み
- 腹痛
- 腰痛

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

- 血圧はひどく高いですか？
- 足などがむくみやすいですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



**服用できます**

服用できません

薬剤師または登録販売者に相談してください

服用はおすすめできません\*

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

服用後に、手足のだるさ、むくみ、息苦しさを感じたときは、服用を中止して、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

**症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないこと**

## 効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|                    |           |                 |         |
|--------------------|-----------|-----------------|---------|
| ウチダの解筋止痛湯 (分包)     | ウチダ和漢薬    | 芍薬甘草湯エキス錠 (大峰)  | 大峰堂薬品工業 |
| 「クラシエ」漢方芍薬甘草湯エキス顆粒 | クラシエ薬品    | 芍薬甘草湯「タキザワ」     | タキザワ漢方廠 |
| コムレケア              | 小林製薬      | 錠剤 芍薬甘草湯        | 一元製薬    |
| コムロン               | 小太郎漢方製薬   | 太虎堂の仙敢「分包」      | 太虎精堂製薬  |
| JPS漢方顆粒 - 20号      | ジェーピーエス製薬 | ツムラ漢方芍薬甘草湯エキス顆粒 | ツムラ     |
| 芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34     | 松浦薬業      | トチモトの芍薬甘草湯      | 栃本天海堂   |
| 芍薬甘草湯エキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬      | ドルチェ顆粒          | 阪本漢法製薬  |
| 芍薬甘草湯エキス散〔勝昌〕      | 東洋薬行      |                 |         |

## 使用上の注意 (平成 25 年 3 月現在)

### してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
  - 生後 3 ヶ月未満の乳児。
  - 次の診断を受けた人。 心臓病
- 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないこと

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| うっ血性心不全、心室頻拍    | 全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。                           |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

3. 5 ~ 6 回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

芍薬、甘草

## 芍薬甘草湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 2      | 2       | 2         | 2           | 2      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない