

安全に
使うための

じゅう ぜん たい ほ とう

十全大補湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に十全大補湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 病後・術後の体力低下 | <input type="checkbox"/> 疲労倦怠（けんたい）感 |
| <input type="checkbox"/> 手足の冷え | <input type="checkbox"/> 食欲不振 |
| <input type="checkbox"/> 寝あせ | <input type="checkbox"/> 貧血 |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

胃腸が弱いですか？

いいえ

はい

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱／わからない

充実／中等度



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力虚弱なものの次の諸症：病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------|---------|
| ウチダの十全大補湯 | ウチダ和漢薬 | 十全大補湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| JPS十全大補湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 十全大補湯エキス錠クラシエ | クラシエ薬品 |
| ジュゼンS「コタロー」(十全大補湯エキス錠) | 小太郎漢方製薬 | ジュホトウ | 大杉製薬 |
| 十全大補湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | 錠剤 十全大補湯 | 一元製薬 |
| 十全大補湯エキス顆粒KM | カーヤ | ホノミジュンケツ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 十全大補湯エキス〔細粒〕36 | 松浦薬業 | 本草十全大補湯エキス顆粒-M | 本草製薬 |
| 十全大補湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | 離雲(エキス顆粒) | 建林松鶴堂 |
| 十全大補湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 | | |

使用上の注意 (平成 26 年 6 月現在)

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人參、黄耆、白朮または蒼朮、茯苓、当歸、芍薬、地黄、川芎、桂皮、甘草

十全大補湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

しょう さい こう

小柴胡湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に小柴胡湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

インターフェロン製剤を投与されていますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- かぜをひいた後、すっきりと治らない
- 胃のむかつき、吐き気
- 熱っぽい
- 胃痛、胃のつかえ
- 食欲不振

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがしますか？
- が苦いとか、□がねばる感じがしますか？
- 熱がある場合、発熱と悪寒（さむけ）が交互に起きたりしますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症：食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|---------|
| ウチダの少少陽 | ウチダ和漢薬 | 小柴胡湯エキス〔細粒〕29 | 松浦薬業 |
| エスタック「小柴胡湯」エキス顆粒 | エスエス製薬 | 小柴胡湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| オースギカンポール | 大杉製薬 | 小柴胡湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 「紀伊国屋」小柴胡湯エキス顆粒 | 紀伊国屋漢薬局 | ショウサインS「コタロー」（小柴胡湯エキス錠） | 小太郎漢方製薬 |
| JPS小柴胡湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 錠剤 小柴胡湯 | 一元製薬 | トチモトの小柴胡湯 | 栃本天海堂 |
| 小柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | 宝生（エキス顆粒） | 建林松鶴堂 |
| 小柴胡湯エキス顆粒SA | 帝國漢方製薬 | ホノミチキョウ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 小柴胡湯エキス顆粒クラシエ | クラシエ薬品 | 本草小柴胡湯エキス顆粒-H | 本草製薬 |
| 小柴胡湯エキス顆粒KM | カーヤ | 力湧仙 | 和漢薬研究所 |
| 小柴胡湯エキス顆粒〔東洋〕分包 | 東洋薬行 | | |

使用上の注意（平成24年9月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。むくみ
 - 次の診断を受けた人。肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
 - インターフェロン製剤で治療を受けている人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| その他 | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位（かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、生姜、黄芩、大棗、人參、甘草

小柴胡湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

しょうせいりゅうとう

小青竜湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に小青竜湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 発熱
- 悪寒（さむけ）
- 頭痛
- うすい痰
- 鼻水
- 咳
- くしゃみ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓や腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- (男性の方) 尿の出に不具合はありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力はひどく虚弱ですか？

やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱

- 咳が出る場合、からぜきですか？
- 鼻水や痰が出る場合、粘っていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|---------|
| ウチダの小青竜湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | 小青竜湯エキス細粒〔勝昌〕 分包 | 東洋薬行 |
| エスタック「小青竜湯」エキス顆粒 | エスエス製薬 | 小青竜湯エキス〔細粒〕 28 | 松浦薬業 |
| オオクサ小青竜湯エキス錠 | 大草薬品 | 小青竜湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| カコナール小青竜湯＜鼻かぜ・鼻炎用＞ | 第一三共ヘルスケア | 小青竜湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 紀伊国屋小青竜湯 | 紀伊国屋漢薬局 | ショウセリンN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 「クラシエ」ベルエムピS 小青竜湯エキス錠 | クラシエ薬品 | ツムラ漢方小青竜湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 阪本漢法の小青竜湯エキス顆粒 | 阪本漢法製薬 | トチモトの小青竜湯 | 栃本天海堂 |
| JPS小青竜湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | ホノミチンガイン錠 | 劑盛堂薬品 |
| 錠剤 小青竜湯 | 一元製薬 | 本草小青竜湯エキス錠-H | 本草製薬 |
| 小青竜湯Aエキス細粒〔分包〕 三和生薬 | 三和生薬 | モリ ゼンチトウ | 大杉製薬 |
| 小青竜湯エキス顆粒SA | 帝國漢方製薬 | 山本漢方「小青竜湯エキス顆粒」 | 山本漢方製薬 |
| 小青竜湯エキス顆粒KM | カーヤ | ロート小青竜湯錠 | ロート製薬 |
| 小青竜湯エキス顆粒「創至聖」 | 三九製薬 | 呂仁「分包」 | 太虎精堂製薬 |

使用上の注意（平成 24 年 9 月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1 ヶ月位（感冒に服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

麻黄、芍薬、乾姜、甘草、桂皮、細辛、五味子、半夏

小青竜湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

しん い せい はい とう

辛夷清肺湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に辛夷清肺湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？



いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？



すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 鼻づまり
- 慢性鼻炎
- 粘った鼻水
- 副鼻腔炎（ちくのう症）



1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 胃腸が弱いですか？
- 冷え症ですか？



1つ以上「いいえ」

すべて「はい」

平素の体力は虚弱ですか？



中等度／充実

虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- 鼻づまりがありますか？
- 鼻水や痰が出る場合、粘っていますか？
- 熱っぽい感じがしますか？



1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|------------------|---------|------------|---------|
| ウチダの辛夷清肺湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | ノーザV「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」 | クラシエ薬品 | ノンパースD | 一元製薬 |
| 辛夷清肺湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | ハイビナール | 大杉製薬 |
| チクナイン | 小林製薬 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸虚弱で冷え症の人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|----------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる。 |

2.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

辛夷、知母、百合、黄芩、山梔子、麦門冬、石膏、升麻、枇杷葉

辛夷清肺湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

せい しん れん し いん 清心蓮子飲の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に清心蓮子飲を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？



いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？



すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？



いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- 残尿感がある
- 頻尿
- 排尿痛
- 尿が出にくい
- 尿がにごる
- (女性の場合) おりものがある



1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？



中等度/虚弱

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- 胃腸が弱いですか？
- 全身倦怠（けんたい）感がありますか？
- 口や舌が乾きやすいですか？
- 排尿異常（頻尿・排尿困難）がありますか？



1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症:残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ(おりもの)

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | |
|-----------|-------|
| 清澄(エキス顆粒) | 建林松鶴堂 |
| ユリナール | 小林製薬 |

使用上の注意 (平成 25 年 3 月現在)

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 次の症状のある人。 むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりとすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

蓮肉、麦門冬、茯苓、人參、車前子、黄芩、黄耆、地骨皮、甘草

清心蓮子飲の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2:最適、1:適応可能、0:原則としては適さない