

安全に
使うための

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に半夏厚朴湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 不安神経症 | <input type="checkbox"/> 神経性胃炎 |
| <input type="checkbox"/> つわり | <input type="checkbox"/> せき |
| <input type="checkbox"/> しわがれ声（声がれ） | <input type="checkbox"/> のどのつかえ感 |

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は虚弱ですか？

↓ 中等度／充実

虚弱

- 気分が落ち込んだ感じや、ふさいだ感じがしますか？
 のどや、のどの奥にもものがつまった感じがありますか？
 めまいや吐き気がありますか？
 胃腸が弱いですか？

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

つわりに使用する場合には、5～6日間が目安です。

症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの理気利心	ウチダ和漢薬	半夏厚朴湯エキス〔細粒〕 51	松浦薬業
雲桂（エキス顆粒）	建林松鶴堂	半夏厚朴湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
「クラシエ」漢方半夏厚朴湯エキス顆粒	クラシエ薬品	半夏厚朴湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
JPS半夏厚朴湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	ハンゲコーN「コタロー」	小太郎漢方製薬
錠剤 半夏厚朴湯	一元製薬	ホノミアンセイ錠	剤盛堂薬品
ツムラ漢方半夏厚朴湯エキス顆粒	ツムラ	本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M	本草製薬
トチモトの半夏厚朴湯	栃本天海堂	ハイ・コーミン	大杉製薬
半夏厚朴湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ワクナガ半夏厚朴湯エキス細粒	湧永製薬
半夏厚朴湯エキス顆粒KM	カーヤ		

使用上の注意（平成 25 年 10 月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 カ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1 カ月位（つわりに服用する場合には 5 ～ 6 日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

半夏、茯苓、厚朴、蘇葉、生姜

半夏厚朴湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

はんげしゃしんとう

半夏瀉心湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に半夏瀉心湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 急性・慢性胃腸炎 | <input type="checkbox"/> 下痢、もしくは軟便 |
| <input type="checkbox"/> 胃下垂 | <input type="checkbox"/> 神経性胃炎 |
| <input type="checkbox"/> 胸焼け、げっぷ | <input type="checkbox"/> 口内炎 |
| <input type="checkbox"/> 神経症（不眠、いらいらなど） | |

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

心臓に不具合はありますか？
 腎臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力はひどく虚弱ですか？

↓ やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱

みぞおちにつかえや違和感がありますか？
 胃が気持ち悪く、お腹がゴロゴロなったりしますか？
 悪心や吐き気がありますか？
 軟便、下痢の傾向がありますか？

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

服用できません

薬剤師または登録販売者に相談してください

服用はおすすめできません*

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの中焦健和	ウチダ和漢薬	半夏瀉心湯エキス散〔勝昌〕	東洋薬行
オオクサ半夏瀉心湯エキス錠	大草薬品	半夏瀉心湯エキス錠Fクラシエ	クラシエ薬品
鶴寿（エキス顆粒）	建林松鶴堂	半夏瀉心湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
三共胃腸薬「漢方」	第一三共ヘルスケア	半夏瀉心湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
JPS半夏瀉心湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	ハンシャンV「コタロー」(半夏瀉心湯エキス錠)	小太郎漢方製薬
錠剤 半夏瀉心湯	一元製薬	ホノミイチョウ錠	劑盛堂薬品
ツムラ漢方半夏瀉心湯エキス顆粒	ツムラ	本草半夏瀉心湯エキス顆粒-M	本草製薬
半夏瀉心湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	モリ漢方胃腸薬	大杉製薬
半夏瀉心湯エキス顆粒KM	カーヤ	ワクナガ半夏瀉心湯エキス細粒	湧永製薬
半夏瀉心湯エキス〔細粒〕53	松浦薬業		

使用上の注意（平成26年6月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

処方構成生薬

半夏、黄芩、乾姜、人参、甘草、大棗、黄連

半夏瀉心湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

安全に
使うための

ほ ちゅう えっ き とう 補中益気湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に補中益気湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 疲労、倦怠（けんたい）感 | <input type="checkbox"/> 微熱、発汗（寝あせ） |
| <input type="checkbox"/> 胃腸症状や食欲不振 | <input type="checkbox"/> こじれたかぜ症状 |
| <input type="checkbox"/> 病後、術後の体力低下 | |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱／わからない

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

【参考事項】本剤は、次のいずれかの方に特に適しています。

- ・手足がだるい
- ・眼に勢いがない
- ・食事に味がない
- ・声に力がない
- ・口中に白い泡沫（あわ）ができる
- ・口が渇き、熱い飲食物を好む

効能・効果

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの保中回帰	ウチダ和漢薬	補中益気湯エキス顆粒〔東洋〕 分包	東洋薬行
悦我「分包」	太虎精堂製薬	補中益気湯エキス〔細粒〕 58	松浦薬業
JPS補中益気湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	補中益気湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
錠剤 補中益気湯	一元製薬	補中益気湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
調寿（エキス顆粒）	建林松鶴堂	ホノミホイオー錠	劑盛堂薬品
ツムラ漢方補中益気湯エキス顆粒	ツムラ	モリ エーボン	大杉製薬
ホエキンN「コタロー」	小太郎漢方製薬	ロート補中益気湯錠	ロート製薬
補中益気湯Aエキス細粒「分包」 三和生薬	三和生薬	ワカゲン錠	クラシエ薬品
補中益気湯エキス顆粒KM	カーヤ		

使用上の注意（平成 25 年 3 月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。 むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1 ヶ月位（感冒に服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人參、白朮または蒼朮、黄耆、当歸、陳皮、大棗、柴胡、甘草、生姜、升麻

補中益気湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	0	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ぼう い おう ぎ とう

防已黄耆湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に防已黄耆湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

関節の腫れや痛み 多汗症
 むくみ 水ぶとり

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

心臓に不具合はありますか？
 腎臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？

虚弱／中等度

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

疲れやすいですか？
 汗をかきやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの表湿清澄	ウチダ和漢薬
ココアポL	クラシエ薬品
サンワ防已黄耆湯エキス細粒「分包」	三和生薬
JPS防已黄耆湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬
松鶴鶴姿（エキス顆粒）	建林松鶴堂
錠剤 防已黄耆湯	一元製薬
ツムラ漢方防已黄耆湯エキス顆粒	ツムラ
ハクスイトウ	大杉製薬

防已黄耆湯エキス顆粒KM	カーヤ
防已黄耆湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
防已黄耆湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
ボーキットN「コタロー」	小太郎漢方製薬
本草防已黄耆湯エキス錠-H	本草製薬
ロート防已黄耆湯錠a	ロート製薬
ロコフィットGL	太田胃散

使用上の注意（平成 25 年 10 月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦くなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

防已、黄耆、白朮または蒼朮、生姜、大棗、甘草

防已黄耆湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	1	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ぼう ふう ふう しょう さん

防風通聖散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に防風通聖散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**麻黄を含む漢方薬****を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に**大黄を含む漢方薬****を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 高血圧や肥満に伴う動悸、肩こり、 湿疹、皮膚炎、ふきでもの、にきび
- のぼせ、むくみ、便秘 肥満症
- 副鼻腔炎(ちくのう症)

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 下痢をしやすいですか？
- 血圧はひどく高いですか？
- 心臓や腎臓に不具合がありますか？
- (男性の方)尿の出に不具合がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

- 便秘がちですか？ 腹部に脂肪が多いですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱

充実

わからない



服用できます

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談してください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

意発（エキス顆粒）	建林松鶴堂	防風通聖散料Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬
ウチダの攻肥聖健	ウチダ和漢薬	防風通聖散料エキス顆粒KM	カーヤ
エバユーススリムF	第一三共ヘルスケア	防風通聖散料エキス細粒〔勝昌〕	東洋薬行
オオクサ防風通聖散エキス錠	大草薬品	防風通聖散料エキス錠「東亜」	三九製薬
ココスリム	佐藤製薬	防風通聖散料「タキザワ」	タキザワ漢方廠
ココアポプラスA錠	クラシエ薬品	ポーツーンN「コタロー」	小太郎漢方製薬
サンスラット	大峰堂薬品工業	ホノミサンイン錠	劑盛堂薬品
JPS防風通聖散料エキス錠N	ジェーピーエス製薬	本草防風通聖散エキス錠-H	本草製薬
錠剤 防風通聖散	一元製薬	マスラックII	阪本漢法製薬
ツムラ漢方防風通聖散エキス顆粒	ツムラ	モリ カッコミン	大杉製薬
ナイトール	小林製薬	ロート防風通聖散錠	ロート製薬
防風通聖散エキス〔細粒〕57	松浦薬業		

使用上の注意（平成 25 年 3 月現在）

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、芍薬、川芎、山梔子、連翹、薄荷葉、生姜、荊芥、防風、麻黄、大黄、芒硝、（白朮）、桔梗、黄芩、甘草、石膏、滑石

防風通聖散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	0	1	2

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない