

表4
小児B-4「多合指症」(Q70.4)

No.			1	2	3			
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	Q704	Q704	Q70.4			
		ICD-10コード						
		ICD-10コード						
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	LB90.A2	LB90.A2	LB90.A2			
		ICD-11コード						
		ICD-11コード						
	2.代替診断	ICD-10コード						
		ICD-10コード						
		ICD-10コード						
	3.時間	(分)	10	10	5			
		4.何を参考にして行ったか				標準病名マスター	Web上	インターネット、ICD10??標準病名マスター
		5.難しかったですか				1=はい, 2=いいえ	1	2
	6.使いやすさ	1=はいの人(具体的に)	索引でスクロールしましたが それもたいへん。	3	1	1		
		1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい						
1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い								
7.自信		4	4	3				
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		LB90.A2	LB90.A2	LB90.A2			
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる	1	1	1			

表5
小児B-5「唇裂を伴う両側性軟口蓋裂」(Q37.2)

No.			1	2	3
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	Q372	Q37.2	Q37.2
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	LA62	LA62	LA63.2 LA60.2 LA62
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	2.代替診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	3.時間	ICD-11コード			
ICD-11コード					
ICD-11コード					
4.何を参考にして行ったか	(分)	5	7	10	
4.何を参考にして行ったか		標準病名マスター(ウェブ)	Web上	インターネット、ICD10??標準病名マスター	
5.難しかったですか	1=はい、2=いいえ	2	2	1	
	1=はいの人(具体的に)			唇裂と口蓋裂それぞれに詳しい分類があるが、'??'分類しているのは「LA62」であり、「LA62」が再分類されていない	
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい、2=使いやすい、3=ふつう、4=使いにくい、5=非常に使いにくい	3	1	4	
7.自信	1=とても低い、2=低い、3=ふつう、4=高い、5=とても高い	3	4	3	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		LA62	LA62	LA62
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ、2=個別評価と異なる	1	1	1

表6
小児B-6「心室中隔欠損」(Q21.0)

No.			1	2	3	
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	Q210	Q21.0	Q21.0	
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		ICD-11コード	ICD-11コード	LB30.531	LB30.531	LB30.531
			ICD-11コード			
			ICD-11コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
	2.代替診断	ICD-11コード				
		ICD-11コード				
		ICD-11コード				
	3.時間	(分)	5	5	10	
	4.何を参考にして行ったか		標準病名マスター(ウェブ)	Web上	インターネット、ICD10??標準病名マスター	
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	1	2	1		
	1=はいの人(具体的に)			細かく分類されすぎていて探すのが大変		
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	1	4		
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	4	3		
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		LB30.531	LB30.531	LB30.531	
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる	1	1	1	

表7
小児B-7「乳幼児突然死症候群」(R95)

No.			1	2	3
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	R95	P95	R95
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	MM01	K0Z	MM01
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	2.代替診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	3.時間	ICD-11コード			
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	4.何を参考にして行ったか	(分)	10	5	5
	5.難しかったですか		標準病名マスター(ウェブ)	Web上	インターネット、ICD10??標準病名マスター
6.使いやすさ	1=はい, 2=いいえ		2	2	
	1=はいの人(具体的に)				
	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	1	1	
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	4	3	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		MM01	MM01	MM01
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる	1	2	1

表8
小児B-8「呼吸窮迫症候群、生後1週間、他院出生の女児」(P22.0)

No.			1	2	3
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	P220	P22.0	P22.0
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-11コード	KA91.1	KA91.1	KA91.1
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード			P22.9
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	2.代替診断	ICD-11コード			KA91.12
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
3.時間	(分)	5	15	10	
	4.何を参考にして行ったか	標準病名マスター(ウェブ)	Web上、ICDコーディングトレーニング第2版	インターネット、ICD10??標準病名マスター	
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2	2	1	
	1=はいの人(具体的に)			他院なのでRDSの状態がよくわからない。そのため原因不明をつけた	
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	1	2	
	7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	4	3
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		KA91.1	KA91.1	KA91.1
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる	1	1	1

表9

小児B-9「過期産児、双子の第1子、院内出生、チアノーゼ発作」(①P08.2②P28.2③Z38.3)

No.			1	2	3
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	P015	P08.2	P08.2
		ICD-10コード	P082	P28.2	P01.5
		ICD-10コード	R230	Z38.3	R23.0
		ICD-11コード	KA11.6	JBOH	KA22.3
		ICD-11コード	KA22.3	KA91.1	KA11.6
		ICD-11コード	KA99	JB14.1	KA99
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	2.代替診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	3.時間	(分)	25	10	15
	4.何を参考にして行ったか		標準病名マスター(ウェブ)	Web上、ICDコーディングト レーニング第2版	インターネット、ICD10??標準病 名マスター
	5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	1	2	1
		1=はいの人(具体的に)	双子、チアノーゼ発作に対応 するICD11を見つけるのに病 名を読んで探さなければなら なかった		「双子」をあらわすKA11.6を探す のに苦労した
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2= 使いやすい,3=ふつう,4= 使いにくい,5=非常に使い にくい	4	1	4	
7.自信	1=とても低い,2=低い,3= ふつう,4=高い,5=とても高 い	3	3	3	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		KA22.3 KA11.6 KA99	KA22.3 KA11.6 KA99	KA22.3 KA11.6 KA99
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個 別評価と異なる	1	2	1

表10

小児B-10「薬物中毒による湿疹(3歳児の男児) 家で誤って兄に処方された薬(抗真菌性抗生剤)を飲む」
(①T36.7 ②X44.09)

No.		1	2	3	
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	T509 [ICD-11コード2つ目の欄へ伸びる点線矢印、矢印の上に「細分化」の記載あり]	T36.7	L27.0
		ICD-10コード		X44.09	
		ICD-10コード	L270		
	ICD-11コード	ICD-11コード	ND08	HD08	FR61
		ICD-11コード	FR61	HD08	
		ICD-11コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	2.代替診断	ICD-11コード			
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
3.時間(分)	ICD-10コード				
	ICD-10コード				
	ICD-10コード				
4.何を参考にして行ったか	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
5.難しかったですか	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
6.使いやすさ	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
7.自信	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断	25	10	15	
	4.何を参考にして行ったか	標準病名マスタ(ウェブ)	Web上	インターネット、ICD10??標準病名マスター	
ii)妥当性・信頼性調査	5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	1	2	
	5.難しかったですか	1=はいの人(具体的に)	薬疹(薬剤による湿疹)がなかなかみつからなかった	発疹、湿疹の病名??しており、その中から薬物由来を検索するのが大変だった	
ii)妥当性・信頼性調査	6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	4	2	
	6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	2	3	
ii)妥当性・信頼性調査	7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	2	3	
	8.共同評価後の一次診断	FR61 ND08	FR61 ND08	FR61 ND08	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる	1	2	
	8.共同評価後の一次診断	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる	1	2	

表11

小児B-11「38週と2日と3,580gで満期産にて出生の女児。出生時に皮膚の緊張低下、目のつりあがり、鼻骨定型性、腹直筋離開あり、手指内弯を認め21トリソミーを疑う。染色体検査は退院後に結果を待つこととなりいったん退院となる。なお、入院中、新生児黄疸を認め光線療法を施行する。」

(Q59.9, Z38.0)

No.			1	2	3
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	Q909	Q90.9	Q90.9
		ICD-10コード		P59.9	P59.8
		ICD-10コード		Z38.0	
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	LD40	LD40	LD21
		ICD-11コード		KB18.2	KB18.Y
		ICD-11コード		JB10.1	
		ICD-10コード		6A600ZZ	
	2.代替診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
ICD-11コード			?		
ICD-11コード					
3.時間	(分)	5	25	5	
4.何を参考にして行ったか		標準病名マスター(ウェブ)	Web上、ICDコーディングトレーニング第2版	インターネット、ICD10??標準病名マスター	
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2	2	2	
6.使いやすさ	1=はいの人(具体的に)				
	1=非常に使いやすい, 2=使いやすい, 3=ふつう, 4=使いにくい, 5=非常に使いにくい	3	2	2	
7.自信	1=とても低い, 2=低い, 3=ふつう, 4=高い, 5=とても高い	3	3	3	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		LD40	LD40	LD40
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ, 2=個別評価と異なる	1	1	2

表12

小児B-12「3歳の男児。在胎38週、体重2,850g、正常分娩で出生。38.6°Cの発熱とともに、10秒前後の全身性硬直性痙攣が持続。救急部を受診する。2～3日前から、手や足に発疹がみられた。手足口病の診断で入院。」
(B08.4, R56.0)

No.			1	2	3
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	R560	B08.4	R56.0
		ICD-10コード	B084	P56.0	B08.4
		ICD-10コード			
		ICD-11コード	MA05.1	1M90	AB33.11
		ICD-11コード	1E4Y	AB33.11	1371.Y
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
2.代替診断	ICD-10コード				
	ICD-10コード				
	ICD-10コード				
	ICD-11コード				
	ICD-11コード				
3.時間	(分)		10	20	
4.何を参考にして行ったか		標準病名マスター(ウェブ)	Web上	インターネット、ICD10??標準病名マスター	
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2	2	1	
	1=はいの人(具体的に)			MA05.1に??があり、混同しやすい??手足口病という病名がなく、ウイルス性????するものとした	
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	1	5	
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	3	3	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断		AB33.11	AB33.11	AB33.11
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる	2	1	1

表13
 がんB-1「漿膜下子宮平滑筋腫」(D25.2, M8890/0, 68.92)

No.			4	5	6	
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	D25.2	D25.2	D252	
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	2J16.1	2J16.1	2J16.1	
		ICD-11コード				
		ICD-11コード				
	2.代替診断	ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
	3.時間	ICD-11コード	(分)	60	5	15
		ICD-11コード				
		ICD-11コード				
	4.何を参考にして行ったか		2巻	ICD-10 2巻・3巻	標準病名マスター,ICD2巻、ICD-10,ICD-11 whoのwebサイト	
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	1	2	1		
6.使いやすさ	1=はいの人(具体的に)	「しょう膜下」で細分化できるかどうかの判断がつきにくかった			漿膜下の判断	
7.自信	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	3	3		
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	2	3		
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断				D25.2 2J16.1	
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			2	

表14
 がんB-2「慢性リンパ性白血病、寛解状態」(C91.1, M9823/3)

No.			4	5	6
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C91.1	C91.1	C911
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	2C53.2	2C22.1	2C53.1
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	2.代替診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	3.時間 (分)	ICD-11コード			
ICD-11コード					
ICD-11コード					
4.何を参考にして行ったか		60	5	20	
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2巻	2巻・3巻		
6.使いやすさ	1=はいの人(具体的に)	1	2	1	
	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい				
	・寛解状態がコーディングできるかどうかの判断がつかなかった ・「慢性」が特定できなかった				
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	4	3	3	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断				C91.1 2C53.2
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			2

表15
 がんB-3「多発性骨髄症」(C90.0, N9732/3)

No.			4	5	6	
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C90.0	C90.0	C90.0	
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		ICD-11コード		2C23.2	2C23.2	2C23.2
			ICD-11コード			
			ICD-11コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
	2.代替診断	ICD-11コード				
		ICD-11コード				
		ICD-11コード				
	3.時間	ICD-10コード				
ICD-10コード						
ICD-10コード						
4.何を参考にして行ったか	ICD-11コード					
	ICD-11コード					
	ICD-11コード					
5.難しかったですか	ICD-11コード					
	ICD-11コード					
	ICD-11コード					
6.使いやすさ	(分)		30	5	15	
			2巻	2巻・3巻		
			2	2	2	
7.自信	1=はい、2=いいえ					
	1=はいの人(具体的に)					
	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい		3	3	3	
8.共同評価後の一次診断	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い		3	3	4	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断				同じ	
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			1	

表16
がんB-4「気管支腺腫」(D38.1, M8140/1)

No.			4	5	6		
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	D14.3	D14.3	D381		
		ICD-10コード					
		ICD-10コード					
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	2J30.Y	XC92.L	2J91.4		
		ICD-11コード					
		ICD-11コード					
	2.代替診断	ICD-10コード					
		ICD-10コード					
		ICD-10コード					
	3.時間	(分)	60	15	15		
		4.何を参考にして行ったか				2巻	2巻・3巻
		5.難しかったですか				1=はい, 2=いいえ	1
6.使いやすさ	1=はいの人(具体的に)	「気管支」が見つからなかった	線腫をみつけにくかった。	部位の特定、良性悪性の区別 →良性と判断すべき?			
	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	4	3	3			
	7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	2	3	3		
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断			D14.3 2J30.Y			
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			2		

表17
 がんB-5「皮膚のカポジ肉腫」(C46.0, M9140/3)

No.			4	5	6	
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C46.0	C46.0	C46.0	
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	2C67.1	2C67.1	2C67.1
			ICD-11コード			
			ICD-11コード			
	2.代替診断	ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		ICD-10コード				
		2.代替診断	ICD-11コード			
			ICD-11コード			
			ICD-11コード			
	3.時間	(分)	30	5	5	
	4.何を参考にして行ったか		2巻	2巻・3巻		
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2	2	2		
	1=はいの人(具体的に)					
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい, 2=使いやすい, 3=ふつう, 4=使いにくい, 5=非常に使いにくい	3	3	3		
	1=とても低い, 2=低い, 3=ふつう, 4=高い, 5=とても高い	3	3	5		
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断			C46.0 2C67.1		
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ, 2=個別評価と異なる			1	

表18

がんB-6「卵巣からの骨盤骨への転移性癌」(①C79.5 M8010/6 ②C56 M8010/3)

No.			4	5	6	
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C79.5	C79.5	C795	
		ICD-10コード	C56		C56.	
		ICD-10コード				
			ICD-11コード	2G63	2G63	2G63
			ICD-11コード	2F00.Z		2F00.Z
			ICD-11コード			
	1b.2つ目の一次診断		ICD-10コード		C56	
			ICD-10コード			
			ICD-10コード			
			ICD-11コード		2F00.Z	
			ICD-11コード			
			ICD-11コード			
	2.代替診断		ICD-10コード			
ICD-10コード						
ICD-10コード						
		ICD-11コード				
		ICD-11コード				
		ICD-11コード				
3.時間	(分)	60	10	30		
4.何を参考にして行ったか		2巻	2巻・3巻			
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	1		1		
	1=はいの人(具体的に)	骨盤骨が特定できなかった	骨盤骨の分類がない	ICD-11が詳細なため(骨盤骨の特定出来ず)		
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	3	3		
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	2	3		
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断			C79.5 2G63 C56 2F00.Z		
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			1	

表19

がんB-7「腹膜および脳への転移性癌」(①C78.6 M8010/6, ②C79.3 M8010/6 C80 M8010/3)

No.			4	5	6
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C78.6	C78.6	C78.6
		ICD-10コード	C79.3	C79.3	C79.3
		ICD-10コード			
		ICD-11コード	2G50	2G50	2G50
		ICD-11コード	2G69	2G69	2G69
		ICD-11コード			
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	2.代替診断	ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
ICD-11コード					
ICD-11コード					
ICD-11コード					
3.時間	(分)	40	10	15	
4.何を参考にして行ったか		2巻	2巻・3巻		
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2	2	2	
6.使いやすさ	1=はいの人(具体的に)				
	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	3	3	
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	3	4	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断				C78.6 2G50 C79.3 2G69
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			1

表20

がんB-8「前立腺からの骨盤骨への転移性癌、前立腺摘出術の既往」(①C79.5 M8010/6 ②Z85.4 ③Z90.7)

No.		4	5	6	
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C79.5	C79.5	C795
		ICD-10コード	Z90.7		C61
		ICD-10コード	Z85.4		
		ICD-11コード	2G63	2G63	2G63
		ICD-11コード	QB51		2F22.Z
		ICD-11コード	QF20		
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード		C61	
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-11コード		2F22.Z	
		ICD-11コード			
	2.代替診断	ICD-10コード		Z85.4	Z85.4
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
		ICD-11コード		QF20	QF20
		ICD-11コード			
		ICD-11コード			
	3.時間	(分)	120	60	30
4.何を参考にして行ったか		2巻	2巻・3巻		
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	1	1	1	
	1=はいの人(具体的に)	「保健サービスの利用」について ICD10とICD11を比較し、それぞれを 対応させていくこと	Zコードがわかりにくい	摘出術の既往について、前立腺 がんの既往をいかにするか C61がいつからなのか?	
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2= 使いやすい,3=ふつう,4= 使いにくい,5=非常に使い にくい	3	4	4	
7.自信	1=とても低い,2=低い,3= ふつう,4=高い,5=とても高 い	3	2	2	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断			C795 2G63 C61 2F22.Z Z90.7 QB51	
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個 別評価と異なる		2	

表21
 がんB-9「停留精巣セミノーマ(精上皮腫)(C62.0,M9061/3, 62.41)

No.			4	5	6		
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C62.0	C62.0	C62.9		
		ICD-10コード					
		ICD-10コード					
		1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	2F20.3	2F20.3	2F20.3	
			ICD-11コード				
			ICD-11コード				
	2.代替診断	ICD-10コード					
		ICD-10コード					
		ICD-10コード					
		3.時間	(分)	30	15	15	
			ICD-11コード				
			ICD-11コード				
		4.何を参考にして行ったか		2巻			
			ICD-11コード				
ICD-11コード							
	5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2	1	2		
		1=はいの人(具体的に)				セミノーマの部位がコーディン	
	6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	3	3		
	7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	2	4		
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断				C62.0 2F20.3		
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			2		

表22

がんB-10「右肺からの腹腔内リンパ節への線維性癌 肺右葉切除後、原発部位の再発なし」
 (①C77.2 M8010/6②Z85.1 ③Z90.2)

No.			4	5	6
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	C77.2	G77.2	G77.2
		ICD-10コード	Z90.2		
		ICD-10コード	Z85.1		
		ICD-11コード	2G20.2	2G20.2	2G20.2
		ICD-11コード	QB51 QB61Y		
	1b.2つ目の一次診断	ICD-11コード	QF20		
		ICD-10コード		Z85.1	
		ICD-10コード			
		ICD-10コード			
	2.代替診断	ICD-11コード		QF20	
		ICD-10コード		Z90.2	Z85.2
		ICD-10コード		Z85.1	Z90.2
		ICD-10コード			
ICD-11コード			QB61.Y	QF20	
	ICD-11コード		QF20	QB51.Y or QE7Y [QB51に〇し 欄外矢印で「リストが間違っている QB61.Yが正解」と記載]	
	ICD-11コード				
3.時間	(分)	50		60	
4.何を参考にして行ったか		2巻			
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	1	1	2	
	1=はいの人(具体的に)		「原発部位の再発なし」について ICD11に新設されたコードか どうかわからなかった	Zコードがわかりにくい ただしリストに誤りがある QB51Y→QB61Yのはず	
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	4	4	3	
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	2	2	2	
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断			C77.2 2G20.2	
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			1

表23

がんB-11「42歳男性。しばらく前からめまい、偏頭痛を認める。精査目的で入院。頭部CTで右前頭葉に腫瘍を認める。仕事の都合で1週間後、詳細検査を予約し一時退院。」
(D43.0)

No.			4	5	6			
i)ブリッジコーディング	1a.一次診断	ICD-10コード	D43.0	D43.0	D43.0			
		ICD-10コード						
		ICD-10コード						
		ICD-11コード				2J9Y, 2A5Y or 2A5Z	2A5Z or Y ?	2K0Y
		ICD-11コード						
		ICD-11コード						
	1b.2つ目の一次診断	ICD-10コード						
		ICD-10コード						
		ICD-10コード						
	2.代替診断	ICD-11コード				R42		
		ICD-10コード						
		ICD-10コード						
ICD-11コード					MD49.Z			
	ICD-11コード							
	ICD-11コード							
	ICD-11コード							
3.時間	(分)	40						
4.何を参考にして行ったか		2巻	2巻・3巻					
5.難しかったですか	1=はい, 2=いいえ	2	1	1				
	1=はいの人(具体的に)		脳腫瘍の分類の仕方がわかりにくい	めまい、偏頭痛の扱い 脳腫瘍の分類が困難→ICD-10は容易				
6.使いやすさ	1=非常に使いやすい,2=使いやすい,3=ふつう,4=使いにくい,5=非常に使いにくい	3	4	3				
7.自信	1=とても低い,2=低い,3=ふつう,4=高い,5=とても高い	3	2	2				
ii)妥当性・信頼性調査	8.共同評価後の一次診断				D43.0 2A5Yor2A5Z			
	9.共同評価後の一次診断コードは	1=個別評価と同じ,2=個別評価と異なる			2			