

表4. HIV感染がわかってから現在までのセックスライフ(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■あなたは、HIV感染がわかってから現在までに次の経験がありますか？										
サウナ系ハッテン場に行った										
一度もない	6	(85.7)	18	(75.0)	17	(89.5)	4	(80.0)	45	(81.8)
行ったことがある	1	(14.3)	6	(25.0)	2	(10.5)	1	(20.0)	10	(18.2)
1～4回	-	(0.0)	4	(16.7)	1	(5.3)	1	(20.0)	6	(10.9)
5～9回	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
ビデオボックス系ハッテン場に行った										
一度もない	6	(85.7)	23	(95.8)	19	(100.0)	5	(100.0)	53	(96.4)
行ったことがある	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
1～4回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
5～9回	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
マンション系ハッテン場に行った										
一度もない	6	(85.7)	22	(91.7)	17	(89.5)	5	(100.0)	50	(90.9)
行ったことがある	1	(14.3)	2	(8.3)	2	(10.5)	-	(0.0)	5	(9.1)
1～4回	1	(14.3)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	3	(5.5)
5～9回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行った										
一度もない	6	(85.7)	22	(91.7)	17	(89.5)	5	(100.0)	50	(90.9)
行ったことがある	1	(14.3)	2	(8.3)	2	(10.5)	-	(0.0)	5	(9.1)
1～4回	1	(14.3)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	4	(7.3)
5～9回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
10～19回	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
クラブ(男only)に行った										
一度もない	7	(100.0)	22	(91.7)	17	(89.5)	5	(100.0)	51	(92.7)
行ったことがある	-	(0.0)	2	(8.3)	2	(10.5)	-	(0.0)	4	(7.3)
1～4回	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
5～9回	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
ゲイバーに行った										
一度もない	5	(71.4)	18	(75.0)	15	(78.9)	4	(80.0)	42	(76.4)
行ったことがある	2	(28.6)	6	(25.0)	4	(21.1)	1	(20.0)	13	(23.6)
1～4回	1	(14.3)	3	(12.5)	3	(15.8)	1	(20.0)	8	(14.5)
5～9回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
10～19回	-	(0.0)	2	(8.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	3	(5.5)
20回以上	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
お金を払って男性とセックスした										
一度もない	7	(100.0)	23	(95.8)	19	(100.0)	5	(100.0)	54	(98.2)
行ったことがある	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
1～4回	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
5～9回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)

表4. HIV感染がわかってから現在までのセックスライフ(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
お金をもらって男性とセックスした										
一度もない	7	(100.0)	23	(95.8)	19	(100.0)	5	(100.0)	54	(98.2)
行ったことがある	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
1~4回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
5~9回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
10~19回	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
ゲイマッサージ(ヌキあり)に行った										
一度もない	7	(100.0)	24	(100.0)	19	(100.0)	5	(100.0)	55	(100.0)
行ったことがある	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
1~4回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
5~9回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
10~19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
SNSやアプリを通じて出会った男性とセックスした										
一度もない	5	(71.4)	17	(70.8)	15	(78.9)	5	(100.0)	42	(76.4)
行ったことがある	2	(28.6)	7	(29.2)	4	(21.1)	-	(0.0)	13	(23.6)
1~4回	2	(28.6)	5	(20.8)	3	(15.8)	-	(0.0)	10	(18.2)
5~9回	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
10~19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
■あなたは、HIV感染がわかってから現在までに男性とセックスしましたか？										
はい	4	(57.1)	14	(58.3)	7	(36.8)	1	(20.0)	26	(47.3)
いいえ	3	(42.9)	10	(41.7)	12	(63.2)	4	(80.0)	29	(52.7)




図 1. セックスライフの経験

表4. HIV感染がわかってから現在までのセックスライフ(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=4 ^{※3}		n=14		n=7		n=1		n=26	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■HIV感染がわかってから現在までにどのようなプレイをどの程度しましたか？										
相互マスターベーション										
一度もない	1	(25.0)	2	(14.3)	3	(42.9)	1	(100.0)	7	(26.9)
1～4回	2	(50.0)	10	(71.4)	4	(57.1)	-	(0.0)	16	(61.5)
5～9回	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
10～19回	1	(25.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
フェラチオ										
一度もない	-	(0.0)	3	(21.4)	3	(42.9)	-	(0.0)	6	(23.1)
1～4回	2	(50.0)	9	(64.3)	2	(28.6)	1	(100.0)	14	(53.8)
5～9回	2	(50.0)	1	(7.1)	1	(14.3)	-	(0.0)	4	(15.4)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(14.3)	-	(0.0)	1	(3.8)
無回答	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
アナルセックス										
一度もない	1	(25.0)	6	(42.9)	3	(42.9)	-	(0.0)	10	(38.5)
1～4回	1	(25.0)	6	(42.9)	2	(28.6)	1	(100.0)	10	(38.5)
5～9回	1	(25.0)	1	(7.1)	1	(14.3)	-	(0.0)	3	(11.5)
10～19回	1	(25.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(14.3)	-	(0.0)	1	(3.8)
無回答	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
口内射精										
一度もない	3	(75.0)	13	(92.9)	5	(71.4)	1	(100.0)	22	(84.6)
1～4回	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(28.6)	-	(0.0)	2	(7.7)
5～9回	1	(25.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
顔射										
一度もない	3	(75.0)	12	(85.7)	6	(85.7)	1	(100.0)	22	(84.6)
1～4回	1	(25.0)	1	(7.1)	1	(14.3)	-	(0.0)	3	(11.5)
5～9回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
種づけ(中だし)										
一度もない	2	(50.0)	13	(92.9)	4	(57.1)	1	(100.0)	20	(76.9)
1～4回	2	(50.0)	-	(0.0)	1	(14.3)	-	(0.0)	3	(11.5)
5～9回	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(28.6)	-	(0.0)	2	(7.7)
10～19回	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
20回以上	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
その他										
該当する	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
該当しない	4	(100.0)	13	(92.9)	7	(100.0)	1	(100.0)	25	(96.2)
無回答	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.8)
※3 HIV感染がわかってから現在までに男性とセックスしたことがある者を分母とする。										
■HIV感染がわかってから現在までにセックスした男性の種別をお答えください。										
彼氏や恋人など特定の相手	2	(50.0)	6	(42.9)	3	(42.9)	-	(0.0)	11	(42.3)
友達やセフレ	3	(75.0)	5	(35.7)	2	(28.6)	-	(0.0)	10	(38.5)
その場限りの相手	2	(50.0)	6	(42.9)	4	(57.1)	1	(100.0)	13	(50.0)
※3 HIV感染がわかってから現在までに男性とセックスしたことがある者を分母とする。										

表5. セイファーセックスの認識(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■あなたの現在のセックスライフは以下のどれに近いですか？										
セックス自体をしない、機会がない	1	(14.3)	7	(29.2)	9	(47.4)	3	(60.0)	20	(36.4)
アナルセックスはしない	1	(14.3)	6	(25.0)	3	(15.8)	1	(20.0)	11	(20.0)
アナルセックス時にはコンドームを100%使う	2	(28.6)	7	(29.2)	3	(15.8)	1	(20.0)	13	(23.6)
アナルセックス時はできるだけコンドームを使うが、時にナマのこともある	2	(28.6)	4	(16.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(10.9)
ナマのアナルセックスが多い	1	(14.3)	-	(0.0)	4	(21.1)	-	(0.0)	5	(9.1)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
■セックスで人にHIVにうつさないために、ウイルス量を減らそうと抗HIV薬を内服していますか？										
内服している	4	(57.1)	10	(41.7)	5	(26.3)	2	(40.0)	21	(38.2)
内服はしているが、セックスのためではない	-	(0.0)	2	(8.3)	4	(21.1)	2	(40.0)	8	(14.5)
内服していない	3	(42.9)	12	(50.0)	9	(47.4)	1	(20.0)	25	(45.5)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
■自分がコンドームを使わないことで、相手の愛情を確認しようとする。										
よくある	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
時々ある	1	(14.3)	4	(16.7)	1	(5.3)	-	(0.0)	6	(10.9)
ない	6	(85.7)	18	(75.0)	15	(78.9)	3	(60.0)	42	(76.4)
無回答	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	2	(40.0)	4	(7.3)
■薬を飲んで治る性感染症なら、「うつってもいいや」と思うこと。										
よくある	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
時々ある	1	(14.3)	4	(16.7)	4	(21.1)	-	(0.0)	9	(16.4)
ない	5	(71.4)	20	(83.3)	14	(73.7)	4	(80.0)	43	(78.2)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	1	(20.0)	2	(3.6)
■セックスの相手が見つからないと、自信をなくしてしまうこと。										
よくある	1	(14.3)	1	(4.2)	3	(15.8)	-	(0.0)	5	(9.1)
時々ある	2	(28.6)	5	(20.8)	2	(10.5)	1	(20.0)	10	(18.2)
ない	4	(57.1)	18	(75.0)	14	(73.7)	2	(40.0)	38	(69.1)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(40.0)	2	(3.6)
■セックスの際にコンドーム使用を提案すると、HIVに感染しているのではないかと疑われてしまうように思うこと。										
よくある	2	(28.6)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	3	(5.5)
時々ある	2	(28.6)	3	(12.5)	2	(10.5)	1	(20.0)	8	(14.5)
ない	3	(42.9)	21	(87.5)	14	(73.7)	2	(40.0)	40	(72.7)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(10.5)	2	(40.0)	4	(7.3)
■病気の予防も大切だけれど、予防以上に相手とナマでつながりたいと思うこと。										
よくある	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(10.5)	1	(20.0)	3	(5.5)
時々ある	2	(28.6)	9	(37.5)	7	(36.8)	1	(20.0)	19	(34.5)
ない	5	(71.4)	14	(58.3)	10	(52.6)	1	(20.0)	30	(54.5)
無回答	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	2	(40.0)	3	(5.5)

表6. STD診断(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■これまでに医療機関で、HIV以外の性感染症にかかっていると診断されたことがありますか？										
ある	3	(42.9)	13	(54.2)	12	(63.2)	1	(20.0)	29	(52.7)
ない	4	(57.1)	11	(45.8)	7	(36.8)	3	(60.0)	25	(45.5)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	1	(1.8)
■これまでに診断されたHIV以外の性感染症は何ですか？(複数回答)										
	n=3 ^{※4}		n=13		n=12		n=1		n=29	
梅毒	2	(66.7)	10	(76.9)	9	(75.0)	-	(0.0)	21	(72.4)
A型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
B型肝炎	-	(0.0)	2	(15.4)	5	(41.7)	-	(0.0)	7	(24.1)
C型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(8.3)	-	(0.0)	1	(3.4)
淋菌感染症	-	(0.0)	2	(15.4)	1	(8.3)	-	(0.0)	3	(10.3)
クラミジア	2	(66.7)	3	(23.1)	4	(33.3)	1	(100.0)	10	(34.5)
尖圭コンジローマ	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(33.3)	-	(0.0)	4	(13.8)
アメーバ赤痢	-	(0.0)	1	(7.7)	2	(16.7)	-	(0.0)	3	(10.3)
その他	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.4)

※4 これまでにHIV以外の性感染症にかかっていると診断されたことがある者を分母とする。

表7. メンタルヘルス(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)								
■K6										
陰性群(4点以下)	2	(28.6)	15	(62.5)	5	(26.3)	1	(20.0)	23	(41.8)
陽性群(5-12点)	3	(42.9)	7	(29.2)	10	(52.6)	4	(80.0)	24	(43.6)
重症群(13点以上)	2	(28.6)	2	(8.3)	4	(21.1)	-	(0.0)	8	(14.5)
■自尊尺度の平均										
有効	7		23		19		5		54	
欠損値	-		1		-		-		1	
平均値	28.00		32.13		33.00		33.40		32.02	
中央値	26.00		32.00		35.00		32.00		32.00	
標準偏差	9.713		7.759		8.260		5.459		7.985	

表8. HIV感染判明前のメンタルヘルス(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■HIV感染がわかるまでに、気分の落ち込み・不安・不眠などのメンタルの症状で、次の場所を利用したことがありますか？										
心理カウンセリング	1	(14.3)	2	(8.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	4	(7.3)
心療内科	1	(14.3)	2	(8.3)	2	(10.5)	-	(0.0)	5	(9.1)
精神科	1	(14.3)	2	(8.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	4	(7.3)
いずれかある	2	(28.6)	5	(20.8)	3	(15.8)	-	(0.0)	10	(18.2)
■HIV感染がわかるまでに、気分の落ち込み・不安・不眠などのメンタルの症状を改善・治療するためにメンタル系の治療薬を服用しましたか？										
抗うつ薬	-	(0.0)	2	(8.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	3	(5.5)
抗不安薬	1	(14.3)	2	(8.3)	2	(10.5)	-	(0.0)	5	(9.1)
睡眠薬	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
睡眠導入薬	-	(0.0)	2	(8.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	3	(5.5)
その他のメンタル系治療薬	7	(100.0)	23	(95.8)	18	(94.7)	5	(100.0)	53	(96.4)
いずれかある	1	(14.3)	3	(12.5)	4	(21.1)	-	(0.0)	8	(14.5)

表9. HIV感染判明前の薬物使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■HIV感染がわかるまでに、次のドラッグ(違法・合法問わず)を使ったことがありますか？										
大麻	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	1	(14.3)	6	(25.0)	4	(21.1)	-	(0.0)	11	(20.0)
MDMA(エクスタシー)	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
覚せい剤	1	(14.3)	1	(4.2)	3	(15.8)	-	(0.0)	5	(9.1)
ラッシュ	4	(57.1)	13	(54.2)	9	(47.4)	2	(40.0)	28	(50.9)
ガス(エアードスター)	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
危険ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)										
ハーブ系(植物片)	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
パウダー系(粉末状)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(15.8)	-	(0.0)	3	(5.5)
リキッド系(液体状)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(21.1)	-	(0.0)	4	(7.3)
勃起改善薬・漢方精力剤	-	(0.0)	7	(29.2)	7	(36.8)	2	(40.0)	16	(29.1)
いずれかの薬物を、注射器・注射針で使用した										
	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
いずれかある	4	(57.1)	15	(62.5)	12	(63.2)	3	(60.0)	34	(61.8)
■HIV感染がわかるまでに、セックスをしている時(あるいはセックスを始める2時間前まで)に次のドラッグ(違法・合法問わず)を使ったことがありますか？										
大麻	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	1	(14.3)	5	(20.8)	4	(21.1)	-	(0.0)	10	(18.2)
MDMA(エクスタシー)	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
覚せい剤	1	(14.3)	1	(4.2)	3	(15.8)	-	(0.0)	5	(9.1)
ラッシュ	3	(42.9)	11	(45.8)	8	(42.1)	1	(20.0)	23	(41.8)
ガス(エアードスター)	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
危険ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)										
ハーブ系(植物片)	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
パウダー系(粉末状)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(10.5)	-	(0.0)	2	(3.6)
リキッド系(液体状)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(15.8)	-	(0.0)	3	(5.5)
勃起改善薬・漢方精力剤	-	(0.0)	7	(29.2)	7	(36.8)	2	(40.0)	16	(29.1)
いずれかの薬物を、注射器・注射針で使用した										
	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
いずれかある	3	(42.9)	13	(54.2)	11	(57.9)	3	(60.0)	30	(54.5)

表10. HIV感染判明後の薬物使用状況(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■HIV感染がわかってから現在までに、次のドラッグ(違法・合法問わず)を使ったことがありますか？										
大麻	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
MDMA(エクスタシー)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
覚せい剤	1	(14.3)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
ラッシュ	1	(14.3)	-	(0.0)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
ガス(エアードスター)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
危険ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)										
ハーブ系(植物片)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
パウダー系(粉末状)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
リキッド系(液体状)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
勃起改善薬・漢方精力剤	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
いずれかの薬物を、注射器・注射針で使用した										
	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
いずれかある	1	(14.3)	1	(4.2)	3	(15.8)	-	(0.0)	5	(9.1)
■HIV感染がわかってから現在までに、セックスをしている時(あるいはセックスを始める2時間前まで)に次のドラッグ(違法・合法問わず)を使ったことがありますか？										
大麻	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
MDMA(エクスタシー)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
覚せい剤	1	(14.3)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
ラッシュ	1	(14.3)	-	(0.0)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
ガス(エアードスター)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
危険ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)										
ハーブ系(植物片)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
パウダー系(粉末状)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
リキッド系(液体状)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
勃起改善薬・漢方精力剤	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
いずれかの薬物を、注射器・注射針で使用した										
	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
いずれかある	1	(14.3)	1	(4.2)	3	(15.8)	-	(0.0)	5	(9.1)




図 2. 薬物の使用経験




図 3. 性交時の薬物の使用経験

表11. 生活へのHIVの影響(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■現在、抗HIV薬を服薬していますか？										
服薬している	3	(42.9)	12	(50.0)	9	(47.4)	4	(80.0)	28	(50.9)
以前服薬、今はしていない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
服薬していない	3	(42.9)	12	(50.0)	10	(52.6)	1	(20.0)	26	(47.3)
無回答	1	14.3%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1	1.8%
■HIV陽性者のグループや、陽性者支援団体(ボランティア団体)などのサービスを、これまでに利用したことがありますか？										
ある	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
ない	6	(85.7)	23	(95.8)	19	(100.0)	5	(100.0)	53	(96.4)
■HIV陽性の友人はいますか？										
いる	2	(28.6)	10	(41.7)	6	(31.6)	-	(0.0)	18	(32.7)
いない	5	(71.4)	14	(58.3)	13	(68.4)	5	(100.0)	37	(67.3)
■HIV陽性のパートナー(お付き合いしている男性)はいますか？										
いる	1	(14.3)	4	(16.7)	2	(10.5)	-	(0.0)	7	(12.7)
いない	6	(85.7)	20	(83.3)	17	(89.5)	5	(100.0)	48	(87.3)
■HIVに感染していることを、どなたかに打ち明けていますか(カミングアウト)？										
はい	5	(71.4)	19	(79.2)	11	(57.9)	2	(40.0)	37	(67.3)
いいえ	2	(28.6)	5	(20.8)	8	(42.1)	3	(60.0)	18	(32.7)
■次の人たちにあなたがHIV陽性であることを知らせていますか？										
親	2	(40.0)	4	(21.1)	3	(27.3)	-	(0.0)	9	(24.3)
きょうだい	2	(40.0)	2	(10.5)	1	(9.1)	-	(0.0)	5	(13.5)
夫・妻	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(27.3)	-	(0.0)	3	(8.1)
パートナー	2	(40.0)	7	(36.8)	5	(45.5)	-	(0.0)	14	(37.8)
元の、夫・妻・パートナー	1	(20.0)	4	(21.1)	2	(18.2)	-	(0.0)	7	(18.9)
子ども	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	1	(2.7)
その他の親戚	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	1	(2.7)
面識のある、HIV陽性者	-	(0.0)	4	(21.1)	2	(18.2)	-	(0.0)	6	(16.2)
面識のある、その他知人	3	(60.0)	12	(63.2)	3	(27.3)	-	(0.0)	18	(48.6)
ネット上など面識のない、HIV陽性者	1	(20.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	2	(5.4)
ネット上など面識のない、その他知人	1	(20.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	2	(5.4)
職場の同僚・上司など	2	(40.0)	2	(10.5)	2	(18.2)	-	(0.0)	6	(16.2)
その他の関係の人	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(18.2)	-	(0.0)	2	(5.4)
■HIVに感染していることをカミングアウトしている人数										
1人だけ	1	(20.0)	3	(15.8)	5	(45.5)	1	(50.0)	10	(27.0)
2人～5人	2	(40.0)	14	(73.7)	3	(27.3)	-	(0.0)	19	(51.4)
6人以上	2	(40.0)	2	(10.5)	3	(27.3)	-	(0.0)	7	(18.9)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	1	(2.7)

※5 HIVに感染していることをカミングアウトしている者を分母とする。

表12. 制約項目(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■病気や障害をもって生活する上で、ふだん制約を受けたり、自分で制約しているとかんじることがありますか？										
生活習慣(食事・喫煙・飲酒など)										
かなり制約あり	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
少し制約あり	-	(0.0)	2	(8.3)	10	(52.6)	-	(0.0)	12	(21.8)
ほとんど制約はない	3	(42.9)	9	(37.5)	4	(21.1)	4	(80.0)	20	(36.4)
まったく制約はない	4	(57.1)	13	(54.2)	4	(21.1)	1	(20.0)	22	(40.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
外出や行動の範囲										
かなり制約あり	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
少し制約あり	-	(0.0)	4	(16.7)	3	(15.8)	-	(0.0)	7	(12.7)
ほとんど制約はない	2	(28.6)	9	(37.5)	7	(36.8)	4	(80.0)	22	(40.0)
まったく制約はない	5	(71.4)	11	(45.8)	8	(42.1)	1	(20.0)	25	(45.5)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
現在の働き方や学校生活										
かなり制約あり	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
少し制約あり	1	(14.3)	4	(16.7)	5	(26.3)	1	(20.0)	11	(20.0)
ほとんど制約はない	1	(14.3)	7	(29.2)	5	(26.3)	3	(60.0)	16	(29.1)
まったく制約はない	5	(71.4)	12	(50.0)	6	(31.6)	1	(20.0)	24	(43.6)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
将来の働き方や進路、職業選択										
かなり制約あり	1	(14.3)	2	(8.3)	2	(10.5)	-	(0.0)	5	(9.1)
少し制約あり	1	(14.3)	5	(20.8)	9	(47.4)	-	(0.0)	15	(27.3)
ほとんど制約はない	2	(28.6)	6	(25.0)	5	(26.3)	3	(60.0)	16	(29.1)
まったく制約はない	3	(42.9)	11	(45.8)	3	(15.8)	2	(40.0)	19	(34.5)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
家族や親戚との関係										
かなり制約あり	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	1	(20.0)	2	(3.6)
少し制約あり	2	(28.6)	6	(25.0)	8	(42.1)	1	(20.0)	17	(30.9)
ほとんど制約はない	2	(28.6)	7	(29.2)	4	(21.1)	3	(60.0)	16	(29.1)
まったく制約はない	3	(42.9)	11	(45.8)	6	(31.6)	-	(0.0)	20	(36.4)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
友人との関係										
かなり制約あり	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	1	(20.0)	2	(3.6)
少し制約あり	2	(28.6)	8	(33.3)	6	(31.6)	1	(20.0)	17	(30.9)
ほとんど制約はない	1	(14.3)	3	(12.5)	8	(42.1)	2	(40.0)	14	(25.5)
まったく制約はない	4	(57.1)	13	(54.2)	4	(21.1)	1	(20.0)	22	(40.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
恋人との関係や出会い										
かなり制約あり	3	(42.9)	6	(25.0)	8	(42.1)	1	(20.0)	18	(32.7)
少し制約あり	2	(28.6)	9	(37.5)	5	(26.3)	1	(20.0)	17	(30.9)
ほとんど制約はない	1	(14.3)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
まったく制約はない	1	(14.3)	9	(37.5)	5	(26.3)	1	(20.0)	16	(29.1)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(40.0)	2	(3.6)
セックス										
かなり制約あり	2	(28.6)	7	(29.2)	15	(78.9)	3	(60.0)	27	(49.1)
少し制約あり	4	(57.1)	12	(50.0)	2	(10.5)	-	(0.0)	18	(32.7)
ほとんど制約はない	1	(14.3)	1	(4.2)	1	(5.3)	-	(0.0)	3	(5.5)
まったく制約はない	-	(0.0)	4	(16.7)	1	(5.3)	1	(20.0)	6	(10.9)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	1	(1.8)

表13. スタッフへの相談(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■次の事柄について、病院のスタッフには相談ができていますか？										
この頃の体調について										
十分できている	3	(42.9)	5	(20.8)	4	(21.1)	3	(60.0)	15	(27.3)
ある程度できている	4	(57.1)	15	(62.5)	12	(63.2)	1	(20.0)	32	(58.2)
あまりできていない	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
まったくできていない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
相談の必要がない	-	(0.0)	3	(12.5)	1	(5.3)	1	(20.0)	5	(9.1)
相談するつもりがない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)

表13. スタッフへの相談(年齢別)

	20代		30代		40代		50歳以上		全体	
	n=7		n=24		n=19		n=5		n=55	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
この頃の精神状態について										
十分できている	3	(42.9)	2	(8.3)	2	(10.5)	1	(20.0)	8	(14.5)
ある程度できている	1	(14.3)	14	(58.3)	10	(52.6)	2	(40.0)	27	(49.1)
あまりできていない	2	(28.6)	2	(8.3)	3	(15.8)	1	(20.0)	8	(14.5)
まったくできていない	1	(14.3)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	2	(3.6)
相談の必要がない	-	(0.0)	4	(16.7)	2	(10.5)	1	(20.0)	7	(12.7)
相談するつもりがない	-	(0.0)	2	(8.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	3	(5.5)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
内服継続について										
十分できている	3	(42.9)	7	(29.2)	6	(31.6)	4	(80.0)	20	(36.4)
ある程度できている	3	(42.9)	9	(37.5)	7	(36.8)	1	(20.0)	20	(36.4)
あまりできていない	-	(0.0)	2	(8.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
まったくできていない	1	(14.3)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(3.6)
相談の必要がない	-	(0.0)	4	(16.7)	4	(21.1)	-	(0.0)	8	(14.5)
相談するつもりがない	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(10.5)	-	(0.0)	2	(3.6)
仕事や学業について										
十分できている	2	(28.6)	4	(16.7)	2	(10.5)	-	(0.0)	8	(14.5)
ある程度できている	3	(42.9)	12	(50.0)	7	(36.8)	2	(40.0)	24	(43.6)
あまりできていない	2	(28.6)	4	(16.7)	4	(21.1)	-	(0.0)	10	(18.2)
まったくできていない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
相談の必要がない	-	(0.0)	2	(8.3)	3	(15.8)	2	(40.0)	7	(12.7)
相談するつもりがない	-	(0.0)	2	(8.3)	2	(10.5)	-	(0.0)	4	(7.3)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	1	(1.8)
家族や親戚との関係について										
十分できている	3	(42.9)	5	(20.8)	3	(15.8)	-	(0.0)	11	(20.0)
ある程度できている	3	(42.9)	6	(25.0)	5	(26.3)	4	(80.0)	18	(32.7)
あまりできていない	1	(14.3)	2	(8.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	4	(7.3)
まったくできていない	-	(0.0)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	3	(5.5)
相談の必要がない	-	(0.0)	8	(33.3)	3	(15.8)	1	(20.0)	12	(21.8)
相談するつもりがない	-	(0.0)	2	(8.3)	5	(26.3)	-	(0.0)	7	(12.7)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)
日常生活について										
十分できている	3	(42.9)	5	(20.8)	1	(5.3)	1	(20.0)	10	(18.2)
ある程度できている	1	(14.3)	13	(54.2)	10	(52.6)	3	(60.0)	27	(49.1)
あまりできていない	2	(28.6)	3	(12.5)	3	(15.8)	-	(0.0)	8	(14.5)
まったくできていない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
相談の必要がない	1	(14.3)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	4	(7.3)
相談するつもりがない	-	(0.0)	2	(8.3)	1	(5.3)	1	(20.0)	4	(7.3)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	1	(1.8)
恋愛について										
十分できている	2	(28.6)	3	(12.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(9.1)
ある程度できている	2	(28.6)	4	(16.7)	5	(26.3)	-	(0.0)	11	(20.0)
あまりできていない	1	(14.3)	7	(29.2)	3	(15.8)	-	(0.0)	11	(20.0)
まったくできていない	1	(14.3)	1	(4.2)	3	(15.8)	-	(0.0)	5	(9.1)
相談の必要がない	1	(14.3)	7	(29.2)	4	(21.1)	2	(40.0)	14	(25.5)
相談するつもりがない	-	(0.0)	2	(8.3)	4	(21.1)	2	(40.0)	8	(14.5)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	1	(1.8)
セックスについて										
十分できている	2	(28.6)	3	(12.5)	1	(5.3)	-	(0.0)	6	(10.9)
ある程度できている	2	(28.6)	10	(41.7)	5	(26.3)	1	(20.0)	18	(32.7)
あまりできていない	1	(14.3)	3	(12.5)	2	(10.5)	-	(0.0)	6	(10.9)
まったくできていない	1	(14.3)	1	(4.2)	6	(31.6)	-	(0.0)	8	(14.5)
相談の必要がない	1	(14.3)	5	(20.8)	1	(5.3)	1	(20.0)	8	(14.5)
相談するつもりがない	-	(0.0)	2	(8.3)	4	(21.1)	2	(40.0)	8	(14.5)
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	1	(1.8)
薬物等の乱用・依存について										
十分できている	2	(28.6)	3	(12.5)	1	(5.3)	-	(0.0)	6	(10.9)
ある程度できている	1	(14.3)	2	(8.3)	3	(15.8)	-	(0.0)	6	(10.9)
あまりできていない	-	(0.0)	2	(8.3)	3	(15.8)	-	(0.0)	5	(9.1)
まったくできていない	1	(14.3)	1	(4.2)	2	(10.5)	-	(0.0)	4	(7.3)
相談の必要がない	1	(14.3)	14	(58.3)	7	(36.8)	3	(60.0)	25	(45.5)
相談するつもりがない	1	(14.3)	2	(8.3)	3	(15.8)	1	(20.0)	7	(12.7)
無回答	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	2	(3.6)
■今後の調査への協力										
協力する	7	(100.0)	23	(95.8)	18	(94.7)	4	(80.0)	52	(94.5)
無回答	-	(0.0)	1	(4.2)	1	(5.3)	1	(20.0)	3	(5.5)

ストリートユースの HIV 感染リスクに関する行動疫学研究

研究代表者：日高 庸晴 (宝塚大学看護学部)
研究協力者：濱中 洋平 (クライシスサポートセンターnolb)
星野 慎二 (特定非営利活動法人 SHIP)
河野 泉洋 (日本放送協会大阪放送局)
松山 晶 (自立生活サポートセンター・もやい)
長野 香 (特定非営利活動法人 SHIP)
岡田 実穂 (RC-NET)
大西 連 (自立生活サポートセンター・もやい)
辻 宏幸 (大阪医療センター感染症内科、公益財団法人エイズ予防財団)
宇佐美 翔子 (RC-NET)

研究要旨

繁華街におけるストリートユース (路上滞留若年層 MSM) における HIV 感染リスクの実態を明らかにするためのフィールド調査を実施した。当該集団は学校教育からのドロップアウトや、生活困窮に伴って金銭接受があるセックスやサポートネットワークの不足などが推測され、実態把握と対策・支援が必要な集団である。新宿二丁目周辺で 11 名の研究参加者を得て、サバイバルセックスの現状や性感染症の既往歴、HIV 感染リスク行動の現状などについて構造化面接を実施した。その結果、過去 6 ヶ月間の金銭接受のあるセックス経験割合は 45.5%、その理由は食費や生活費を稼ぐためでありサバイバルセックスの一端が示された。

A. 研究目的

ロンドン都市部のストリートユースの特徴把握と薬物使用や HIV 感染リスクに曝される可能性のある行動についての横断研究によれば (12-23 歳の 409 人の若者に構造化面接、男性の回答割合 74%)、43%にサバイバルセックス (金銭、食料、寝場所、服、薬物を得るためのセックス) の経験があり、複数の性的パートナーを持つ若者は、STI 既往、性行為中の薬物使用、サバイバルセックスの経験率がより高いことが示されている。当該集団における使用薬物は、マリファナ (55%)、覚せい剤 (62%)、クラックコカイン (38%) であり、全体の 30%に注射での薬物使用経験があった。薬物使用経験のある若者は、性行為中の薬物使用 3.6 倍、サバイバルセックス 2.2 倍、性感染症の罹患 2.5 倍であった。同様の研究はモントリオール、ワシントン DC で実施されている。また、デンバー、ニューヨーク、サンフランシスコのストリートユースのためのシェルタ

ーとストリートで研究参加者を募集した研究によれば、自殺企図と家庭環境や身体的虐待経験の実態が明らかにされている。

わが国の HIV 感染は MSM (Men who have Sex with Men) を中心に今なお拡大しているが、同集団におけるストリートユースの実態についてはこれまでほとんど注目されてこなかった。その理由として、同集団は MSM の中でもさらに **hard to reach population** であるため、実態が明らかになったことはなく、支援活動としてもほとんど取り組みがされていない状況である。しかしながら最近になって、臨床現場からの報告や HIV 陽性者の語りの中から、生活困窮あるいは家庭環境に起因した路上生活を送っている若者の存在が示唆されるようになってきた。よって本研究の目的は、ストリートユース (路上滞留若年 MSM) における HIV 感染リスクの現状およびその関連要因を明らかにすることである。

B. 研究方法

研究デザインは横断調査とし、研究参加者のリクルート方法は東京都内新宿区内（二丁目）およびその周辺の街頭や公園などとした（実施期間2015年11月～2016年2月のうち、24日間フィールド調査を実施した）。

選択基準は、1）男性であること、2）路上あるいはインターネットカフェなどを主たる生活場所にしており居所がはっきりしない、あるいは家はあるが路上での滞留時間が長い生活を送っている、3）12歳以上であることとした。本研究の目的を考慮すると未成年者も対象となるため、その場合は研究の趣旨、方法についてわかりやすく平易な言葉を用いて、圧迫感をもたれるようなことがないように十二分に丁寧に説明した後に、本人の同意を得た上で研究参加となるよう特段の配慮をすることとした。

研究参加者のリクルートにあたっては、性暴力被害者支援等の活動や経験がある者が調査員となり、対象と思われる者（当該研究の対象者であるか、しばらく参与観察をした後に）に慎重かつ不愉快にさせることがないように声をかけ、選択基準にあてはまり、本人の研究参加の同意が得られた場合、研究参加者とした。

インタビュー方法：1時間～1.5時間程度の構造化面接調査（先行研究等をもとに設計した質問紙をもとに、インタビュアーが質問項目を読み上げる形式でのインタビュー）を実施した。対象者の中には教育レベルによって識字の課題も想定されるため、自記式ではなくあえて構造化面接法によって実施した。

質問場所は喫茶店の個室あるいは喫茶店等店舗の中で他の客席と離れ、インタビューや会話に支障がない空間を確保したうえで実施した。なお16歳未満のインタビュー調査は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に基づき、23時以前に終えるように配慮した。研究参加者には研究内容について丁寧に説明し、研究参加の同意を得る際にはわかりやすく平易な言葉を用いて、圧迫感をもたれるようなことがないように、研究参加にあたって強制力が伴わないように最大限配慮し、質問項目の読み上げにあたっては平易な言葉を用いて質問の意図が正しく伝わるように配慮した。

謝品：インタビュー協力謝品として2,000円分のクオカードおよび研究に関連する問い合わ

せを研究者に電話でする際の通話料金相当として500分のクオカード（計2,500円分）を手渡した。

質問紙構成内容：基本属性、生涯および過去6ヶ月における性行動（セックスの相手やコンドーム使用状況、ソーシャルネットワークサービスおよび金銭接受のセックスなど）、HIV/STI 既往歴、HIV 抗体検査受検歴、学齢期・生育歴における出来事、性暴力被害、暴力被害、現在の生活形態、メンタルヘルス（K6による測定）、薬物使用歴、HIV 診療受診歴（HIV 陽性者限定の項目）、その他社会経済的項目などによって構成した。

C. 研究結果

インタビュー実施人数は11人であり、平均年齢は27.9歳（SD=7.3）、20代が7割を占めた。最終学歴は高校中退あるいは高校卒業で半数にのぼった。身体的な性別は全員が男性であったが、性自認が女性あるいはその他と回答した者がそれぞれ1人ずついた。性的指向は男性同性愛が54.5%、両性愛および異性愛がそれぞれ18.2%であった。

複数回答によるこの1ヶ月間の主たる寝泊まり場所は多岐にわたり、実家や自宅が多いが、SNSで知り合った人の家やハッテン場やネットカフェなども宿泊場所として活用していることがわかった。新宿二丁目に来てからの期間は半数が3年以上であり長期にわたっていることも示された。手段的・情緒的サポートネットワークを問うことを目的に「泊めてくれる人」「ご馳走してくれる人」「お金をくれる人」「話を聞いてくれる人」「一緒にご飯を食べてくれる人」「一緒に遊ぶ人」の有無について尋ねた。過去6ヶ月間という時間軸では7～8割の人間関係の保持状況であったが、6ヶ月より以前となる場合3～5割程度に軽減していた。

過去6ヶ月間に金銭接受のあるセックス経験割合は45.5%であり、1回あたりの平均額は6,000～15,000円と幅がある一方で最低金額は0円と搾取の実態をうかがわせる経験があることがわかった。金銭接受を伴うセックスの理由は、食費生活費を稼ぐためが45.5%、泊めてもらうため18.2%であった。アナルセックス時のコンドーム常時使用は半数程度であった。また、全員が客に対してコンドーム使用の交渉をしていた。過去6ヶ月間のセックスワーク以外のセックス関

連行動は、サウナ系ハッテン場や一般の銭湯やサウナの利用割合が 63.6%、ゲイバーや SNS を介してのセックス経験は 54.5%であった。

これまでの、いずれかの身体的な暴力被害経験割合および性暴力被害経験割合は 63.6%であり、K6 による抑うつや不安といったメンタルヘルスは、陽性群 27.3%、重症群 36.4%であった。

医療機関で診断された性感染症の既往歴は A 型肝炎、尖圭コンジローマ、HIV、梅毒、クラミジアの順であり、これまでにいずれかの薬物使用経験は 81.8%、過去 6 ヶ月間では 36.4%であった。

D. 考察

研究参加者のリクルートは困難を極めた。当事者を対象にした事前のヒアリングなどからは、新宿二丁目内の公園やその周辺、商業ビルなどに滞留するユースの存在が指摘されていたが、リクルート期間中にその数はさほど多くなかった。その理由として、インターネット上のホームページやアプリを介してその日泊まるための場所や客を探すことが多くなっているためストリートユースの行動パターンが以前より急激に変化したことが考えられること、リクルート時期が冬期であったことも影響していたと考えられる。しかしながら、全国の MSM を対象にしたインターネット調査がいわば空中戦とも言うならば、ストリート調査から MSM における最もリスクの高い層の一端を探索的に明らかにすることが出来たとも言えよう。11 人という少人数ではあったが、新宿二丁目に来訪する理由や生育歴の一端が明らかになると共に、サバイバルセックスの経験割合、HIV 感染リスク行動や薬物使用の現状が示された。手段的・情緒的サポートネットワークの獲得状況について尋ねた質問項目からは、過去 6 ヶ月間ではサポートのある人間関係を持つ者が 7~8 割であったが、6 ヶ月より以前となった場合のそれは 3~5 割程度に軽減していた。つまり、長期的かつ持続的なサポートネットワークが構築されていないことが示唆された。今後の課題としてより多くの研究参加者を獲得したうえで、当該集団の HIV 感染リスクに関する実態やそれに関連する生育歴、学校教育、心理・社会的要因を明らかにする必要があるだろう。研究参加者のリクルート方法は、今回同様に venue based によるフィ

ールド調査の継続実施は難しいであろう。インターネット時代の今日、MSM 向けホームページやスマートフォンのアプリを活用した上で研究参加者をリクルートすること、あるいはインターネット調査の一環として当該集団を対象に取り込むことが、実施可能な現実的な調査手法であるとも言えるだろう。

E. 結論

限られた人数ながらストリートユースの現状の一端が示された。今後はリクルート方法を工夫し、研究参加者の数を拡大させたいうえで、実態をより詳細に明らかにすると同時に支援策の立案が求められる。

F. 研究発表

1. 論文発表
(和文)
 - 1) 日高庸晴：学校における性的マイノリティへの対応、精神科治療学、星和書店、第 31(4・5)、印刷中、2016.
 - 2) 西村由実子、岩井美詠子、尾崎晶代、和木明日香、日高庸晴：近畿圏の保健師における HIV 検査相談の現状に関する研究、日本エイズ学会誌、18(1)、20-28、2016.
 - 3) 日高庸晴：もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ ありのままのきみがいい 3 未来に向かって、汐文社、2016.
 - 4) 日高庸晴ほか：学校・病院スタッフ必携 LGBT サポートブック、メディカ出版、印刷中、2016.
 - 5) 日高庸晴：もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ ありのままのきみがいい 2 わたしの気持ち、みんなの気持ち、汐文社、2016.
 - 6) 日高庸晴：もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ ありのままのきみがいい 1 セクシュアルマイノリティについて、汐文社、2015.
 - 7) 日高庸晴、古谷野淳子：性的マイノリティの自殺予防、精神科治療学、星和書店、第 30 巻 3 号、361-367、2015.
 - 8) 日高庸晴・星野慎二ほか：LGBTQ を知っていますか？“みんなと違う”は“ヘン”じゃない、日高庸晴監著、少年写真新聞社、13-34 頁、2015.

- 9) 日高庸晴：思春期青年期に配慮が必要なセクシュアルマイノリティ、教育と医学、慶應義塾大学出版会、第 63(10)、65-73 頁、2015 年
- 10) 日高庸晴：教育現場で配慮と支援が必要なセクシュアルマイノリティ、女も男も、労働教育センター、No.125、26-33 頁、2015.
- 11) 日高庸晴・古谷野淳子：性的マイノリティの自殺予防、精神科治療学、30(3):361-367、2015.

2. 学会発表

(国内)

- 1) 古谷野淳子、松高由佳、桑野真澄、小松賢亮、長野香、西川歩美、日高庸晴. 個別認知行動面接の実践から MSM の HIV 予防を考える. 日本エイズ学会、2015、東京.

G. 引用文献

なし

表1. 居所・収入等について

	n=11	
	n	(%)
■年齢階級		
20代	8	(72.7)
30代	2	(18.2)
40代	1	(9.1)
■年齢平均		
平均値	27.91	
中央値	24.00	
標準偏差	7.27	
最小値	20.00	
最大値	43.00	
■この一ヶ月間、主に寝泊りしてる場所を教えてください。(複数回答)		
実家	3	(27.3)
自宅(一人暮らし)	2	(18.2)
自宅(ルームシェア)	3	(27.3)
公園	2	(18.2)
屋外	-	(0.0)
SNSで知り合った人	2	(18.2)
ハッテン場(ボックス)	1	(9.1)
ハッテン場(サウナ)	1	(9.1)
ネットカフェマンガ喫茶	3	(27.3)
友人知人宅	2	(18.2)
顧客宅	1	(9.1)
簡易宿泊施設(一般サウナ)	1	(9.1)
コインランドリー	-	(0.0)
その他	1	(9.1)
回答拒否	-	(0.0)
■新宿2丁目に来て、街にいるようになってどのくらい経ちますか？		
1ヶ月未満	1	(9.1)
3ヶ月未満	1	(9.1)
半年未満	-	(0.0)
1年未満	-	(0.0)
1-3年未満	3	(27.3)
3年以上	6	(54.5)
回答拒否	-	(0.0)
■直前までお住まいの都道府県はどちらですか？		
埼玉県	3	(27.3)
千葉県	1	(9.1)
東京都	5	(45.5)
福岡県	1	(9.1)
回答拒否	1	(9.1)
■国籍を教えてください。		
日本	11	(100.0)
■最終学歴を教えてください。		
中学校卒業	2	(18.2)
高校在学中	-	(0.0)
高校中退	3	(27.3)
高校卒業	3	(27.3)
専門学校在学中	-	(0.0)
専門学校中退	1	(9.1)
専門学校卒業	-	(0.0)
高等専門学校在学中	-	(0.0)
高等専門学校中退	-	(0.0)
高等専門学校卒業	-	(0.0)
大学在学中	-	(0.0)
大学中退	1	(9.1)
大学卒業	1	(9.1)

表1. 居所・収入等について

	n=11	
	n	(%)
■あなたの一週間あたりの収入を教えてください。		
1,000円未満	1	(9.1)
1,000~5,000円	1	(9.1)
5,000~10,000円	1	(9.1)
10,000~20,000円	2	(18.2)
20,000円以上	3	(27.3)
その他	3	(27.3)
■現在の主な働き方・収入源は何ですか？		
パート・アルバイト	2	(18.2)
日雇いアルバイト	-	(0.0)
派遣雇用	1	(9.1)
ウリ(セックスワーク)	2	(18.2)
生活保護	2	(18.2)
その他	2	(18.2)
回答拒否	1	(9.1)
無回答	1	(9.1)
■ウリ(セックスワーク)と答えた方のみ、お尋ねします。顧客の性別を教えてください。		
男性	2	(18.2)
回答拒否	1	(9.1)
無回答	1	(9.1)

表2. 性別・性的指向について

	n=11	
	n	(%)
■あなたの身体的な性別を教えてください。		
男性	11	(100.0)
女性	-	(0.0)
その他	-	(0.0)
■あなたの自認する性別を教えてください。		
男性	9	(81.8)
女性	1	(9.1)
その他	1	(9.1)
■あなたの性的指向を教えてください。		
男性同性愛者	6	(54.5)
両性愛者	2	(18.2)
異性愛者	2	(18.2)
その他	1	(9.1)
わからない	-	(0.0)
決めたくない	-	(0.0)
■あなたは、親に自分の性的指向をカミングアウトしていますか？		
カミングアウトしていない	5	(45.5)
両親ともに	1	(9.1)
母親にだけ	2	(18.2)
父親にだけ	-	(0.0)
親はいない	1	(9.1)
無回答	1	(9.1)
■あなたは、家族以外の異性愛者に自分の性的指向をカミングアウトしていますか？		
している	8	(72.7)
していない	2	(18.2)
■家族以外の異性愛者の何人にカミングアウトしましたか。		
5人	2	(18.2)
8人	1	(9.1)
10人	1	(9.1)
20人	2	(18.2)
40人	1	(9.1)
100人以上	1	(9.1)

表3. 日常生活・習慣について

	n=11	
	n	(%)
■あなたは日頃、煙草を吸いますか？		
吸わない	4	(36.4)
時々吸う	2	(18.2)
毎日吸う	5	(45.5)
■あなたは日頃、お酒を飲みますか？		
飲まない	2	(18.2)
時々飲む	7	(63.6)
毎日飲む	2	(18.2)
■一番最後に食事をしたのはいつですか？		
今日(24時間以内)	9	(81.8)
昨日(48時間以内)	1	(9.1)
1週間以内	1	(9.1)
■洗濯はどうしていますか？(複数回答)		
実家	2	(18.2)
自宅(一人暮らし)	1	(9.1)
自宅(ルームシェア)	3	(27.3)
公園	-	(0.0)
屋外	-	(0.0)
SNSで知り合った人	-	(0.0)
ハッテン場(ボックス)	-	(0.0)
ハッテン場(サウナ)	-	(0.0)
ネットカフェ・マンガ喫茶	1	(9.1)
友人・知人宅	1	(9.1)
顧客宅	-	(0.0)
簡易宿泊施設(一般サウナ)	-	(0.0)
コインランドリー	3	(27.3)
その他	2	(18.2)
回答拒否	-	(0.0)
■着替えは週にどれくらいしますか？		
毎日	8	(72.7)
週3回	-	(0.0)
週2回	1	(9.1)
週1回	-	(0.0)
月2~3回	-	(0.0)
月1回	-	(0.0)
その他	2	(18.2)
■入浴はどうしていますか？(複数回答)		
実家	2	(18.2)
自宅(一人暮らし)	2	(18.2)
自宅(ルームシェア)	3	(27.3)
公園	-	(0.0)
屋外	-	(0.0)
SNSで知り合った人	1	(9.1)
ハッテン場(ボックス)	1	(9.1)
ハッテン場(サウナ)	1	(9.1)
ネットカフェ・マンガ喫茶	3	(27.3)
友人・知人宅	1	(9.1)
顧客宅	-	(0.0)
親せき宅	-	(0.0)
カプセルホテル	-	(0.0)
簡易宿泊施設(一般サウナ)	1	(9.1)
コインシャワー	-	(0.0)
その他	3	(27.3)
回答拒否	-	(0.0)

表3. 日常生活・習慣について

	n=11	
	n	(%)
■入浴は週にどれくらいしますか？		
毎日	8	(72.7)
週3回	2	(18.2)
週2回	1	(9.1)
週1回	-	(0.0)
月2~3回	-	(0.0)
月1回	-	(0.0)
その他	-	(0.0)
■荷物の保管場所はどこですか？(複数回答)		
実家	1	(9.1)
自宅(一人暮らし)	2	(18.2)
自宅(ルームシェア)	3	(27.3)
友人・知人宅	-	(0.0)
顧客宅	-	(0.0)
親せき宅	-	(0.0)
ロッカー(時間貸し)	-	(0.0)
持ち歩いている	5	(45.5)
公園に隠している	-	(0.0)
建物のどこか	-	(0.0)
その他	-	(0.0)
回答拒否	-	(0.0)

表4. 人間関係について

	n=11	
	n	(%)
■次のような人間関係はありますか		
過去6ヶ月以前にいた		
泊めてくれる人	5	(45.5)
ご馳走してくれる人	6	(54.5)
お金をくれる人	4	(36.4)
話を聞いてくれる人	3	(27.3)
一緒にご飯を食べてくれる人	3	(27.3)
一緒に遊ぶ人	3	(27.3)
過去6ヶ月間にいた		
泊めてくれる人	9	(81.8)
ご馳走してくれる人	8	(72.7)
お金をくれる人	5	(45.5)
話を聞いてくれる人	8	(72.7)
一緒にご飯を食べてくれる人	9	(81.8)
一緒に遊ぶ人	8	(72.7)
■親との関係を教えてください。		
関係がいい	1	(9.1)
関係は悪い	3	(27.3)
時々連絡をする	5	(45.5)
連絡したくない	1	(9.1)
連絡できない	-	(0.0)
親はいない	1	(9.1)

表5. いじめ・暴力について

	n=11	
	n	(%)
■これまでの学校生活(小・中・高)で、いじめ被害経験		
ある	6	(54.5)
ない	5	(45.5)
覚えていない	-	(0.0)
■これまでの学校生活(小・中・高)で、不登校経験		
ある	2	(18.2)
ない	9	(81.8)
覚えていない	-	(0.0)
■これまでの学校生活(小・中・高)で、いじめを解決してくれる先生がいましたか？		
いた	4	(36.4)
いなかった	5	(45.5)
覚えていない	-	(0.0)
無回答	1	(9.1)
■これまでの学校生活(小・中・高)で、心から信頼できる先生がいましたか？		
いた	7	(63.6)
いなかった	3	(27.3)
覚えていない	1	(9.1)
■これまでの身体的な暴力被害経験(複数回答)		
学校で	3	(27.3)
家族から	3	(27.3)
ゲイコミュニティで	2	(18.2)
SNSで知り合った人から	2	(18.2)
客から	1	(9.1)
客以外の見知らぬ人から	2	(18.2)
宿泊先のハッテン場で	2	(18.2)
街にいる友人・知人から	3	(27.3)
その他	1	(9.1)
いずれかある	7	(63.6)
回答拒否	-	(0.0)
■これまでの性暴力被害経験(複数回答)		
学校で	1	(9.1)
家族から	-	(0.0)
ゲイコミュニティで	3	(27.3)
SNSで知り合った人から	2	(18.2)
客から	3	(27.3)
客以外の見知らぬ人から	1	(9.1)
宿泊先のハッテン場で	3	(27.3)
街にいる友人・知人から	1	(9.1)
その他	1	(9.1)
いずれかある	7	(63.6)
回答拒否	-	(0.0)
■これまでにあった性暴力被害の内容(複数回答)		
服を脱がされた	3	(27.3)
ひどいな言葉でからかわれた	3	(27.3)
無理矢理キスされた	2	(18.2)
身体(性器、胸、お尻)に触られた	3	(27.3)
性器に触るよう強要された	3	(27.3)
膣性交を強要された	1	(9.1)
オーラルセックスを強要された	2	(18.2)
生でアナルセックスを強要された	2	(18.2)
アナルセックスを強要された	2	(18.2)
契約外のことをされた	4	(36.4)
その他	1	(9.1)
回答拒否	-	(0.0)

表6. 情報アクセスについて

	n=11	
	n	(%)
■次の制度を知っていますか？		
生活保護		
実際に利用している	3	(27.3)
名前は知っているが利用していない	6	(54.5)
知らない	2	(18.2)
障害年金		
実際に利用している	1	(9.1)
名前は知っているが利用していない	7	(63.6)
知らない	3	(27.3)
健康保険証を持っていますか？		
持っている	5	(45.5)
持っていない	6	(54.5)
知らない	-	(0.0)

表7. 気持ちの状態(メンタルヘルス)について

	n=11	
	n	(%)
■K6		
陰性群(4点以下)	4	(36.4)
陽性群(5-12点)	3	(27.3)
重症群(13点以上)	4	(36.4)

表8. 客との性行為について

	n=5	
	n	(%)
■あなたは、過去6ヶ月間にお金をもらって男性とセックスしましたか？ (サバイバルセックス)		
はい	5	(45.5)
■一回当たりの平均額・最低額・最高額を教えてください。 (過去6ヶ月間にお金をもらってセックスした経験がある方)		
一回あたりの平均額		
6,000円	2	(40.0)
7,000円	1	(20.0)
10,000円	1	(20.0)
15,000円	1	(20.0)
過去6ヶ月の最低額		
0円	1	(20.0)
3,000円	3	(60.0)
6,000円	1	(20.0)
過去6ヶ月の最高額		
10,000円	1	(20.0)
20,000円	1	(20.0)
25,000円	1	(20.0)
40,000円	1	(20.0)
200,000円	1	(20.0)
■どのようなセックスをしましたか。 (過去6ヶ月間にお金をもらってセックスした経験がある方)		
相互マスターベーション	3	(60.0)
フェラチオ	5	(100.0)
アナルセックス(タチ)	3	(60.0)
アナルセックス(ウケ)	4	(80.0)
口内射精(される側)	2	(40.0)
顔射(される側)	2	(40.0)
種づけ(中だし、する側)	1	(20.0)
種づけ(中だし、される側)	1	(20.0)
SM	1	(20.0)
その他	-	(0.0)
回答拒否	-	(0.0)
■お金をもらってセックスをした理由を教えてください。 (過去6ヶ月間にお金をもらってセックスした経験がある方)		
食費生活費を稼ぐため	5	(45.5)
泊めてもらうため	2	(18.2)
薬物を買うため	-	(0.0)
その他	-	(0.0)
回答拒否	-	(0.0)
■過去6ヶ月間におけるアナルセックス(タチ)の時のコンドーム使用状況。 (過去6ヶ月間にお金をもらってセックスした経験がある方)		
	n=3	
必ず使用	1	(33.3)
使用多かった	2	(66.7)
五分五分	-	(0.0)
不使用多かった	-	(0.0)
不使用	-	(0.0)
■過去6ヶ月間におけるアナルセックス(ウケ)の時のコンドーム使用状況。 (過去6ヶ月間にお金をもらってセックスした経験がある方)		
	n=4	
必ず使用	2	(50.0)
使用多かった	2	(50.0)
五分五分	-	(0.0)
不使用多かった	-	(0.0)
不使用	-	(0.0)
■アナルセックス時にコンドーム使用の交渉をしましたか？ (過去6ヶ月間にお金をもらってセックスした経験がある方)		
	n=4	
毎回交渉した	4	(100.0)
時々交渉した	-	(0.0)
交渉していない	-	(0.0)

表9. 人とのコンタクト、性行為について

	n=11	
	n	(%)
■あなたは、過去6ヶ月間に次の経験がありますか？(複数回答)		
サウナ系ハッテン場	7	(63.6)
ビデオボックス系ハッテン場	3	(27.3)
マンション系ハッテン場	2	(18.2)
野外系ハッテン場	3	(27.3)
クラブ(男性only)	1	(9.1)
ゲイバー	6	(54.5)
お金を払って男性とセックス	-	(0.0)
お金をもらって男性とセックス	5	(45.5)
ゲイマッサージ(ヌキあり)	-	(0.0)
SNSアプリ出会い男性とセックス	6	(54.5)
一般の銭湯、サウナ	7	(63.6)
公共のプール	1	(9.1)
いずれもない	1	(9.1)
回答拒否	-	(0.0)
■あなたは、過去6ヶ月間に客以外の男性とセックスしましたか？		
はい	7	(63.6)
■過去6ヶ月間にどのようなプレイをしましたか？ (過去6ヶ月間に客以外の男性とセックス経験ありの方)		
相互マスターベーション	3	(27.3)
フェラチオ	6	(54.5)
アナルセックス(タチ)	4	(36.4)
アナルセックス(ウケ)	6	(54.5)
口内射精(される側)	5	(45.5)
顔射(される側)	3	(27.3)
種づけ(中だし、する側)	3	(27.3)
種づけ(中だし、される側)	3	(27.3)
SM	2	(18.2)
その他	1	(9.1)
回答拒否	-	(0.0)
■過去6ヶ月間セックスした男性の種別を教えてください。 (過去6ヶ月間に客以外の男性とセックス経験ありの方)		
特定の相手	3	(27.3)
友達セフレ	4	(36.4)
その場限り	5	(45.5)
その他	1	(9.1)
回答拒否	-	(0.0)
■過去6ヶ月間におけるアナルセックス(タチ)の時のコンドーム使用状況。 (過去6ヶ月間に客以外の男性とセックス経験ありの方)		
	n=4	
必ず使用	-	(0.0)
使用多かった	1	(25.0)
五分五分	-	(0.0)
不使用多かった	2	(50.0)
不使用	1	(25.0)
■過去6ヶ月間におけるアナルセックス(ウケ)の時のコンドーム使用状況。 (過去6ヶ月間に客以外の男性とセックス経験ありの方)		
	n=6	
必ず使用	2	(33.3)
使用多かった	1	(16.7)
五分五分	1	(16.7)
不使用多かった	2	(33.3)
不使用	-	(0.0)

表10. 感染症・薬物について

	n=11	
	n	(%)
■現在、日本のゲイ男性の間でHIV/エイズが流行していると思いますか？		
流行していると思う	9	(81.8)
流行していないと思う	-	(0.0)
わからない	2	(18.2)
■これまでにHIV検査を受けたことがありますか？		
ある	8	(72.7)
ない	3	(27.3)
■過去1年間にHIV検査を受けたことがありますか？		
ある	4	(36.4)
ない	7	(63.6)
■過去1年間にHIV検査を受けた検査場所(複数回答)		
保健所保健センター	3	(27.3)
病院診療所クリニック	2	(18.2)
郵送検査	-	(0.0)
その他	-	(0.0)
回答拒否	-	(0.0)
■性感染症既往歴		
ある	6	(54.5)
ない	5	(45.5)
■これまでに診断された性感染症(複数回答)		
梅毒	3	(27.3)
A型肝炎	5	(45.5)
B型肝炎	1	(9.1)
C型肝炎	1	(9.1)
淋菌感染症	2	(18.2)
HIV感染症(エイズ)	4	(36.4)
クラミジア	3	(27.3)
尖圭コンジローマ	5	(45.5)
アメーバ赤痢	1	(9.1)
その他	1	(9.1)
回答拒否	-	(0.0)
■これまでに、次のドラッグを使ったことがありますか？(複数回答)		
大麻	2	(18.2)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	4	(36.4)
MDMA(エクスタシー)	1	(9.1)
覚せい剤	4	(36.4)
ラッシュ	8	(72.7)
ガス(エアードスター)	1	(9.1)
危険ドラッグ(ハーブ系)	3	(27.3)
危険ドラッグ(パウダー系)	2	(18.2)
危険ドラッグ(リキッド系)	3	(27.3)
勃起改善薬漢方精力剤	5	(45.5)
その他	-	(0.0)
注射器注射針	3	(27.3)
注射器注射針の共有	3	(27.3)
いずれかある	9	(81.8)
回答拒否	-	(0.0)
■過去6ヶ月に、次のドラッグを使ったことがありますか？(複数回答)		
大麻	-	(0.0)
5-MeO-DIPT(ゴメオ)	-	(0.0)
MDMA(エクスタシー)	-	(0.0)
覚せい剤	2	(18.2)
ラッシュ	2	(18.2)
ガス(エアードスター)	-	(0.0)
危険ドラッグ(ハーブ系)	1	(9.1)
危険ドラッグ(パウダー系)	1	(9.1)
危険ドラッグ(リキッド系)	1	(9.1)
勃起改善薬漢方精力剤	3	(27.3)
その他	-	(0.0)
注射器注射針	2	(18.2)
注射器注射針の共有	2	(18.2)
いずれかある	4	(36.4)
回答拒否	-	(0.0)

表10. 感染症・薬物について

	n=11	
	n	(%)
■これまでに、次のコミュニティセンターを知っていますか？		
ZEL(仙台)		
知らない	11	(100.0)
知っている	-	(0.0)
行ったことがある	-	(0.0)
akta(新宿)		
知らない	2	(18.2)
知っている	1	(9.1)
行ったことがある	8	(72.7)
SHIP(横浜)		
知らない	10	(90.9)
知っている	1	(9.1)
行ったことがある	-	(0.0)
rise(名古屋)		
知らない	11	(100.0)
知っている	-	(0.0)
行ったことがある	-	(0.0)
dista(大阪)		
知らない	10	(90.9)
知っている	1	(9.1)
行ったことがある	-	(0.0)
haco(博多)		
知らない	10	(90.9)
知っている	-	(0.0)
行ったことがある	1	(9.1)
mabui(那覇)		
知らない	11	(100.0)
知っている	-	(0.0)
行ったことがある	-	(0.0)

表11. HIV陽性について

	n=4	
	n	(%)
■HIVに感染していることを知ったのは、いつ頃ですか？		
2009年	1	(25.0)
2011年	1	(25.0)
2014年	1	(25.0)
2015年	1	(25.0)
■初診時のCD4の値を覚えていますか？		
はい	3	(75.0)
いいえ	1	(25.0)
■初診時のCD4の値を教えてください。		
200以下	1	(33.3)
366	1	(33.3)
700	1	(33.3)
■最近受診したときのCD4の値を覚えていますか？		
はい	2	(50.0)
いいえ	2	(50.0)
■最近受診したときのCD4の値を教えてください。		
504	1	(50.0)
約1000	1	(50.0)
■最近受けた検査でのウイルス量はいくつでしたか？		
10万コピー以上	-	(0.0)
検出限界以上、10万コピー未満	-	(0.0)
検出限界未満	2	(50.0)
検査を受けていない	1	(25.0)
回答拒否	1	(25.0)
■現在、HIV診療を目的として、医療機関に通院していますか？		
通院している	3	(75.0)
以前は通院していたけれど、今はしていない	1	(25.0)
通院していない	-	(0.0)
■現在、抗HIV薬を服薬していますか？		
服薬している	2	(50.0)
以前は服薬していたけれど、今はしていない	1	(25.0)
服薬していない	1	(25.0)
■HIVに感染していることを、どなたかに打ち明けていますか(カミングアウト)？		
はい	3	(75.0)
いいえ	1	(25.0)
■家族以外の同性愛者の何人にカミングアウトしましたか(カミングアウトした方)？		
3人	1	(33.3)
10人	1	(33.3)
15人	1	(33.3)
■これまでにHIV陽性者のグループや、陽性者支援団体などのサービスを利用したことがありますか？		
ある	2	(50.0)
ない	2	(50.0)