



比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

JECFA No. 1195

2,4-Undecadienal


含量: JECFA 規格 99%以上は厳しすぎるためすべて合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格には合致しないため、1.507~1.515 採用した。

比重: JECFA 規格には合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


酸価: JECFA 規格を採用した。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値,それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価




■:規格、●:実測値

JECFA No. 1206

Isobutyl 2-butenate


データが少ないため、規格設定できず、来年度以降検討することとした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

JECFA No. 1212


2-Methylheptanoic acid

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 1231

sec-Butyl ethyl ether


含量: JECFA 規格は厳しすぎるため、95%以上を採用した。

屈折率: JECFA 規格には合致しないため、JFFMA 案を採用した。

比重: JECFA 規格には合致しないため、JFFMA 案を採用した。


酸価: エーテル類のため酸価は設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値


設定不要

JECFA No. 1236

2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran


含量: 異性体情報が必要のため、今回は規格は設定せず、来年度以降検討することとした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

JECFA No. 1243

p-Methylanisole


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格は間違いと思われる。JFFMA 規格を採用した。


酸価: エーテル類のため酸価は設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

-設定不要-

JECFA No. 1254

Methyl phenethyl ether


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格を採用した。


酸価: エーテル類のため、設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値


-設定不要-

JECFA No. 1262

Isoeugenyl acetate


融点： 凝固点のデータしか得られていないため、今回は規格は設定せず、来年度以降検討することとした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

融点・凝固点



■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは融点、白抜きは凝固点

酸価



JECFA No. 1283

(Z,Z)-3,6-Nonadien-1-ol


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格を採用した。


酸価: アルコール類のため、設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■口:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

-設定不要-

JECFA No. 1287


4-Decenoic Acid

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格は間違いと思われる。JFFMA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格は間違いと思われる。JFFMA 規格を採用した。

含量



■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C