

JECFA No. 1468

2-Phenylpropionaldehyde dimethyl acetal


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格を採用した。


酸価: JECFA 規格を採用した。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価




■:規格、●:実測値

JECFA No. 1473

4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal


今回は規格は設定せず、来年度以降検討することとした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

JECFA No. 1487

2-Methylfuran


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格を採用した。


酸価: フラン類のため設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

設定不要

JECFA No. 1488

2,5-Dimethylfuran


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


酸価: フラン類のため設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

JECFA No. 1489

2-Ethylfuran


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格では合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


酸価: フラン類のため設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

-設定不要-

JECFA No. 1491

2-Pentylfuran


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格では合致しないため、0.881-0.887(20°C)を採用した。


酸価: フラン類のため設定不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■ □:規格(幅あり)、◆ ◇:規格(1点)、● ○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価



■:規格、●:実測値

-設定不要-

JECFA No. 1511


4-(2-Furyl)-3-buten-2-one

含量: JECFA 規格を採用した。

融点: JECFA 規格では合致しないため、33~40°Cを採用した。


酸価: ケトン類のため、酸価設定は不要とした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

融点・凝固点



■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは融点、白抜きは凝固点

酸価



■:規格、●:実測値

JECFA No. 1536

Butyl anthranilate


含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格には合致しないため、JFFMA 規格を採用した。

比重: JECFA 規格には合致しないため、JFFMA 規格を採用した。


酸価: JECFA 規格を採用した。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率




■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20℃、白抜きは 25℃

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

酸価




■:規格、●:実測値

JECFA No. 1543

Phenylethyl anthranilate


今回は規格は設定せず、来年度以降検討することとした。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

融点・凝固点



■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは融点、白抜きは凝固点

屈折率



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

JECFA No. 1553


Trimethyloxazole

含量: JECFA 規格を採用した。

屈折率: JECFA 規格を採用した。


比重: JECFA 規格では合致しないため、0.960-0.970 を採用した。

含量




■□:規格、●○:実測値、それぞれ黒塗りは GC 法、斜線は異性体合算、白抜きは化学法

屈折率



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値、それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C

比重



■□:規格(幅あり)、◆◇:規格(1点)、●○:実測値, それぞれ黒塗りは 20°C、白抜きは 25°C