

1	1	1	2	2	1	2	消化管蠕動亢進のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養補給のため
1	1	1	2	2	1	3	疲が絡むため
1	1	2	2	2	1	6	心不全治療
1	1	2	2	2	1	6	心不全治療
1	1	2	2	2	6	2	血圧低下の為
1	1	1	2	2	1	6	血栓防止の為
1	1	1	2	2	4	6	入院前より中止していたため再開
1	1	1	2	2	1	1	クロストリジウム陽性のため
1	1	1	2	2	2	6	敗血症により内服不可
1	1	1	2	2	1	1	酸素飽和度低下の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	体温37℃、CRP0.38で改善なしの為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞治療の為
1	1	1	2	2	1	6	発作抑制の為
1	1	1	2	2	1	6	耳鼻科ドクターの指示
1	1	1	2	2	1	3	患者の希望により
1	1	1	2	2	1	6	梗塞が見つかったため
1	1	1	2	2	1	3	しひれ改善のため
1	1	1	2	2	1	6	経管栄養療法はじまるため
1	1	1	2	2	1	1	Hb低下のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	消化器症状改善のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	opeのための前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	2	2	2	1	6	鎮痛のため
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	2	6	内服から注射に切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	座撃治療の為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	発熱治療の為
1	1	1	2	2	1	2	舌炎治療の為
1	1	1	2	2	1	1	真菌治療
1	1	2	2	2	1	6	呼吸状態悪化のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	5	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛緩和の為
1	1	1	2	2	1	2	浮腫治療
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低値のため
1	1	1	2	2	4	6	出血が見られなくなったため再開
1	1	1	2	2	1	1	尿酸値高値のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫改善のため
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留のため
1	1	1	2	2	1	4	サムス力による口渴のため
1	1	1	2	2	1	3	胃部不快感の緩和のため
1	1	1	2	2	1	6	ope後疼痛緩和のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛緩和
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	経鼻管挿入、内服中止
1	1	1	2	2	1	2	消化不良改善のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	6	状態よくなつたため
1	1	1	2	2	5	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	2	2	誤嚥性肺炎の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	6	食事開始したため
1	1	2	2	2	1	2	薬疹(+)のため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向
1	1	1	2	2	1	6	CF前処置
1	1	1	2	2	1	2	逆流性食道炎のため
1	1	1	2	2	1	6	化学療法による吐き気の為
1	1	1	2	2	1	6	吐き気予防

1	1	1	2	2	1	3	ふらつき防止のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	7	3	疼痛治まってきたため
1	1	1	2	2	1	6	骨粗鬆症治療
1	1	1	2	2	3	7	転院先でフォルテオを施行できないため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	1	3	整腸のため
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	1	2	解熱のため
1	1	1	2	2	1	6	感染症治療の為
1	1	2	2	2	1	3	咳痰治療のため
1	1	1	2	2	1	6	偽膜性腸炎疑われるため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	1	血糖低下のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	opeのために内服止め指示のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	創傷感染予防のため
1	1	2	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	リウマチによる関節痛
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	尿路感染症
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	消化管機能改善のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養状態改善の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	2	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	2	4	味覚異常の原因と推測されるため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	2	2	2	1	3	軟便のため
1	1	2	2	2	1	3	軟便のため
1	1	2	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	7	不明
1	1	2	2	2	1	7	不明
1	1	2	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	2	2	2	1	2	皮膚炎のため
1	1	2	2	2	1	2	吐血の為
1	1	1	2	2	2	1	腎機能低下のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値の為
1	1	1	2	2	1	3	めまいの為
1	1	2	2	2	1	6	梗塞予防のため
1	1	1	2	2	3	4	プレタールで頭痛の副作用のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	2	帯状疱疹のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	偏頭痛の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールの為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	2	誤嚥性肺炎のため
1	1	2	2	2	1	6	肺炎治療の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	2	2	寝ているため

1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能低下のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	2	尿の混濁が見られたため
1	1	1	2	2	1	1	低ナトリウム血症のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	4	プラザキサ服用中のため
1	1	1	2	2	2	1	血糖低下が見られたため
1	1	1	2	2	2	1	血糖上昇が見られたため
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防
1	1	1	2	2	1	6	ステロイド性胃潰瘍予防の為
1	1	1	2	2	1	1	コレステロール値高いため
1	1	1	2	2	2	2	内服困難の為
1	1	1	2	2	5	2	胸水コントロールのため
1	1	1	2	2	2	1	血清カリウム低値のため
1	1	1	2	2	4	6	イレウス改善の為
1	1	1	2	2	1	6	消化管機能改善の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	発作性上室性頻脈のため
1	1	1	2	2	2	1	肝機能回復したため
1	1	1	2	2	1	1	尿細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	2	2	吐血のため
1	1	1	2	2	4	6	状態改善の為
1	1	1	2	2	2	1	尿酸値低下の為
1	1	1	2	2	4	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫のため
1	1	1	2	2	5	2	浮腫のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫のため
1	1	1	2	2	1	1	低カリウムのため
1	1	1	2	2	1	6	結核治療の為
1	1	1	2	2	1	6	副作用回避のため
1	1	1	2	2	1	6	結核治療の為
1	1	1	2	2	2	4	食欲不振の副作用の為
1	1	1	2	2	2	6	肝障害の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状完全の為
1	1	1	2	2	1	4	投与開始2ヶ月となるため
1	1	1	2	2	2	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	6	状態回復してきたため
1	1	1	2	2	1	1	高血糖状態の為
1	1	1	2	2	6	1	血糖安定してきたため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	胸水増加傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	栄養剤開始
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	下肢浮腫のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠改善の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠改善の為
1	1	1	2	2	1	3	疲れの為
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向の為
1	1	1	2	2	2	2	HD時、血圧低下するため
1	1	1	2	2	1	1	血清Na値定値の為
1	1	1	2	2	5	1	血清Na値改善みられないため
1	1	1	2	2	3	6	心原性C/I予防のため
1	1	1	2	2	1	2	心拍数上昇のため
1	1	1	2	2	3	2	心拍数低下したため
1	1	1	2	2	2	1	INR：5.4と高値のため
1	1	1	2	2	4	1	INR：1.26に低下したため
1	1	1	2	2	2	4	ジゴキシン中毒の可能性あり
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛緩和目的
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ後、血栓防止のため

1	1	1	2	2	1	3	不眠を訴えるため
1	1	1	2	2	1	2	術後状態が安定して、動けるようになってきたため
1	1	2	2	2	1	1	発熱しているため
1	1	1	2	2	1	6	血清鉄低下
1	1	1	2	2	1	2	肺梗塞のため
1	1	1	2	2	1	2	薬疹のため
1	1	1	2	2	1	6	肺塞栓症のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	3	頭痛のため
1	1	2	2	2	1	6	術後経腸栄養
1	1	1	2	2	1	6	ビオスリーからの切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	術後経腸栄養
1	1	1	2	2	1	3	腹痛のため
1	1	1	2	2	1	6	潰瘍性腸炎疑いの為
1	1	1	2	2	1	1	低ナトリウム傾向のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	5	1	血清ナトリウム低値の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	経腸栄養管理のため
1	1	1	2	2	4	6	血栓防止のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	嘔吐、下痢のため
1	1	2	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	感染症治療のため
1	1	1	2	2	1	3	咳が出るため
1	1	1	2	2	1	2	発熱の為
1	1	1	2	2	1	1	骨密度改善のため
1	1	1	2	2	1	2	尿漏漏（+）のため
1	1	1	2	2	2	6	経口薬投与不可の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	腎盂腎炎のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	発熱しているため
1	1	1	2	2	2	2	誤嚥のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱の為
1	1	1	2	2	1	6	抗がん剤吐き気の為
1	1	1	2	2	1	3	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	2	3	めまい強いため中止
1	1	1	2	2	4	3	中止後、幻覚症状再発のため
1	1	1	2	2	1	1	尿より、細菌検出されたため
1	1	1	2	2	1	3	呼吸苦改善目的
1	1	1	2	2	1	3	膝痛、腰痛あるため
1	1	1	2	2	1	2	痰が多いため
1	1	1	2	2	1	2	胃腸障害防止の為
1	1	1	2	2	1	2	痙攣のため
1	1	1	2	2	7	5	顛眠傾向により夕食後に変更
1	1	1	2	2	1	3	便通管理の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	3	下痢の為
1	1	2	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	3	頭痛の為
1	1	1	2	2	4	6	全身状態安定の為
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	3	下痢症状続いているため
1	1	2	2	2	1	2	扁桃腺の腫れにより
1	1	2	2	2	1	3	頭痛改善の為
1	1	2	2	2	1	3	痰のため
1	1	2	2	2	1	6	梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	1	血清カリウム値低下のため
1	1	2	2	2	1	1	ヘモグロビン値低下のため
1	1	2	2	2	3	4	ブレタールで頭痛の副作用の為
1	1	2	2	2	5	1	血清カリウム値低下のため
1	1	1	2	2	1	2	てんかん症状発現の為
1	1	1	2	2	2	1	I N R 値高値の為
1	1	1	2	2	6	1	血中パルブロ酸高値の為

1	1	1	2	2	1	6	利尿目的
1	1	1	2	2	1	6	胃酸分泌亢進のため
1	1	1	2	2	1	6	胃酸分泌亢進のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	1	ヘモグロビン低値の為
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	4	6	PEG増設したため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下の為
1	1	1	2	2	4	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	5	1	ヘモグロビン低地の為、血清ナトリウム低地の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	DIVより切り替えのため
1	1	1	2	2	4	6	オペ後再開のため
1	1	1	2	2	1	6	DIVより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	胆摘オペ後の胆汁うっ滞改善のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	5	食事開始と同時に服用開始
1	1	1	2	2	2	1	I NR値：3.02と高値のため
1	1	1	2	2	4	1	I NR値：1.85と低下したため
1	1	1	2	2	1	6	期外収縮出現の為
1	1	1	2	2	1	2	体動（硬縮）改善
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防の為
1	1	1	2	2	2	2	脈拍低下の為
1	1	1	2	2	2	1	I NR値：4.19と高値の為
1	1	1	2	2	4	1	I NR値：1.46と低下の為
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	血糖値コントロールのため
1	1	1	2	2	3	1	腎機能悪化の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖値コントロールのため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	1	腎機能悪化の為
1	1	1	2	2	2	1	血糖値低下の為
1	1	1	2	2	4	6	PEG延期のため
1	1	1	2	2	4	2	血圧上昇の為
1	1	1	2	2	1	1	血清ナトリウム低下の為
1	1	1	2	2	5	1	I NR値：1.27と低地の為
1	1	1	2	2	2	1	B S高値のため
1	1	1	2	2	6	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留の為
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値の為
1	1	1	2	2	2	6	D I C発症の為
1	1	1	2	2	1	1	緑コレステロール高値の為
1	1	1	2	2	1	1	低カリウム血症の為
1	1	1	2	2	1	7	持参薬から切り替え
1	1	1	2	2	1	1	K低値のため
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留のため
1	1	1	2	2	2	6	経口困難のため
1	1	1	2	2	1	6	DIVより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	2	胸水改善のため
1	1	1	2	2	6	1	脱水傾向のため
1	1	1	2	2	1	6	イレウスのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	6	イレウスのため
1	1	1	2	2	1	6	消化管動かすため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	6	炎症性腸疾患
1	1	1	2	2	1	2	解熱目的
1	1	1	2	2	1	2	蕁麻疹十より
1	1	1	2	2	1	3	便秘改善
1	1	1	2	2	1	3	便秘改善
1	1	1	2	2	1	3	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化の為
1	1	1	2	2	2	2	利尿作用が強く発現しているため
1	1	1	2	2	1	6	内視鏡術後
1	1	2	2	2	1	6	ERCP後の疼痛管理
1	1	2	2	2	1	4	ロキソプロフェンでの胃腸障害予防
1	1	1	2	2	1	6	慢性肝炎のため
1	1	1	2	2	1	1	Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	1	CBP上昇のため

1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	腹部症状改善の為
1	1	1	2	2	1	3	痰除去
1	1	1	2	2	1	6	疼痛、発熱コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	2	風邪のため
1	1	1	2	2	6	6	ステロイド減量
1	1	1	2	2	1	3	OABと不眠のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	2	てんかんのため
1	1	1	2	2	1	6	心不全のため
1	1	1	2	2	1	1	RBC、Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	4	6	オペ後のため
1	1	1	2	2	1	4	胃腸炎
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠状態の為
1	1	2	2	2	1	6	うつ血性心不全治療
1	1	2	2	2	6	2	血圧低下の為
1	1	2	2	2	1	4	禁食のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防
1	1	1	2	2	1	6	入院前服用薬のうち、必要と判断
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	6	CF前処置
1	1	1	2	2	1	1	CD(+)のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	嘔気のため
1	1	1	2	2	2	3	血痰(+)のため
1	1	1	2	2	1	6	止血効果の為
1	1	1	2	2	1	3	嘔気のため
1	1	1	2	2	4	3	血痰消失したため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	2	止血確認の為
1	1	1	2	2	1	6	胆のう炎のため
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	2	7	D(r)の指示により
1	1	1	2	2	1	6	逆流性食道炎
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	ステロイドによる骨量低下予防
1	1	1	2	2	1	6	感染治療のため
1	1	1	2	2	2	1	血糖値低下の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	1	PT-INR高値のため
1	1	1	2	2	4	1	PT-INR安定したため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	4	1	状態回復、血清カリウム低下、Hb低下の為
1	1	1	2	2	5	1	PT-INR低値のため
1	1	2	2	2	1	6	耳鳴り、難聴改善目的
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値につき
1	1	1	2	2	4	6	術後止血確認
1	1	1	2	2	1	3	整腸のため
1	1	1	2	2	1	6	多発性脳梗塞のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	2	2	血圧低値の為
1	1	1	2	2	5	1	INR低値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	癌性疼痛のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	3	3	疼痛緩和の為セレコックストラムセット
1	1	1	2	2	3	6	トラムセットで精神症状現れたため
1	1	1	2	2	2	6	効果が表れていないと判断したため
1	1	1	2	2	1	6	精神症状緩和の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	持続する痛みあり
1	1	1	2	2	1	3	脚の痛み緩和のため
1	1	1	2	2	5	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低いため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	胃痛の為

1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	糖尿病改善の為
1	1	2	2	2	2	7	医師の指示
1	1	2	2	2	2	6	痙攣発作が消失したため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値のため
1	1	1	2	2	5	1	血清カリウム高値のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	胃部不快感
1	1	1	2	2	1	6	前立腺癌
1	1	1	2	2	1	2	体温上昇のため
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置のため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	6	1	INR:2.62のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	5	1	INR:9.8のため
1	1	2	2	2	1	3	便秘の為
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	不眠のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	6	食事開始となったため
1	1	2	2	2	1	1	PT-INR管理
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR低値のため
1	1	2	2	2	1	1	肝機能悪化の為
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR低値のため
1	1	2	2	2	6	1	PT-INR高値のため
1	1	2	2	2	6	1	PT-INR管理
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR管理
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR管理
1	1	1	2	2	1	2	てんかんのため
1	1	1	2	2	1	6	MRSA根治のため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	5	1	PT-INRのため
1	1	1	2	2	3	4	INR上昇せず、効果不良の為
1	1	1	2	2	1	1	Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	4	6	状態安定のため
1	1	1	2	2	1	1	尿細菌+のため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気の為
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置として
1	1	1	2	2	1	3	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	流動食開始の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	6	腸管運動改善
1	1	1	2	2	2	5	本人より飲みづらさ訴え
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	2	薬疹の治療
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	血清ナトリウム低値の為
1	1	1	2	2	1	6	DIVより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	5	1	血清ナトリウム低値の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値のため
1	1	1	2	2	5	1	血糖値高値のため
1	1	1	2	2	6	1	血清ナトリウム高値のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	6	術後不整脈出現したため
1	1	1	2	2	1	6	DIVより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	3	胃部不快感消失のため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防、疼痛管理
1	1	1	2	2	1	1	尿路感染症+のため
1	1	2	2	2	1	6	ウイルス治療、神経症狀改善
1	1	1	2	2	1	3	術後疼痛管理

1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため (130-170/60-90)
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	5	3	便秘が続くため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気のため
1	1	1	2	2	6	3	吐き気の訴えないため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	術後栄養管理
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	風邪のため
1	1	1	2	2	2	6	風邪症状なくなったため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧が高いため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	2	呼吸苦の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	4	6	状態回復の為
1	1	1	2	2	2	2	呼吸状態改善の為
1	1	1	2	2	1	1	鉄欠乏性貧血の為
1	1	1	2	2	1	3	呼吸状態改善目的
1	1	1	2	2	1	2	呼吸状態改善目的
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	2	1	CRP改善しないため
1	1	1	2	2	1	1	甲状腺機能低下のため
1	1	1	2	2	2	1	脱水傾向
1	1	2	2	2	2	2	CFのため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	認知症状みられるため
1	1	2	2	2	1	1	ヘモグロビン低値の為
1	1	2	2	2	1	1	肝機能数値以上
1	1	2	2	2	2	6	経口不可となったため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	2	腹水、腹膜炎疑い
1	1	2	2	2	3	7	ENT薬としてビオフェルミンRから変更
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	2	出血症状に對して
1	1	1	2	2	1	6	難治性の逆流性食道炎として処方
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	1	高TGのため
1	1	1	2	2	1	1	低カルシウム血症の為
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	CDトキシン(+)のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	腹部不快感のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	尿懸濁のため
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	2	術後低血圧の為
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	5	1	INR1.19のため増量
1	1	1	2	2	4	6	狭心症既往ある為
1	1	1	2	2	6	1	INR2.03のため減量
1	1	1	2	2	1	3	不眠症のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	5	6	心房細動と診断の為
1	1	1	2	2	1	7	胸痛訴えに対し、精神面からフォローするため
1	1	1	2	2	1	6	心房細動と診断の為
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値で再梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	1	TG高値のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	3	7	Drの指示により

1	1	1	2	2	5	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	2	認知症進行の為
1	1	1	2	2	2	7	家族からの申し出により
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	骨粗鬆症治療
1	1	1	2	2	1	1	高血糖のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	7	6	寝れずに、連日服用しているため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	胆石治療の為
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	2	2	下痢症状あり、状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	2	吐血のため
1	1	1	2	2	1	6	冠挙縮予防目的
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	不穏のため
1	1	1	2	2	1	2	高血圧のため
1	1	1	2	2	1	2	高血圧のため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能数値悪化の為
1	1	1	2	2	2	2	上部消化管穿孔の為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	3	6	骨粗鬆症治療の為
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	3	めまい、耳鳴りの為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	7	3	頻尿で夜間トイレが心配なため、頻用へ
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	3	4	効果不十分のため変更
1	1	1	2	2	1	1	細菌感染に対して
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	1	貧血のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	5	1	Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	2	1	3	下痢のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	鉄低値のため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	夜間不穏症状あるため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム低値のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	6	1	低血糖の為
1	1	1	2	2	2	1	肝機能低下のため
1	1	1	2	2	1	1	低血糖の為
1	1	1	2	2	2	1	カリウム高値のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	2	6	状態安定のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛緩和のため

1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	1	尿検査細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	6	術後栄養のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	1	高血糖のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	2	下痢のため
1	1	2	2	2	1	1	肝機能低下により
1	1	1	2	2	4	6	オペ終了のため
1	1	1	2	2	1	6	慢性硬膜下血腫のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状に対して
1	1	1	2	2	6	2	効果強かったため、半錠に減量
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	術後疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	手術を行えなかったため
1	1	1	2	2	1	6	術後感染予防のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	ステロイドに対する副作用対策
1	1	1	2	2	1	1	A1C高値のため
1	1	1	2	2	1	2	高血圧のため
1	1	1	2	2	1	1	高血糖の為
1	1	1	2	2	1	6	脳出血予防のため
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	6	経腸栄養開始
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	2	6	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	6	状態回復の為
1	1	1	2	2	1	2	食欲不振
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧コントロールのため
1	1	1	2	2	2	2	血圧変動が不安定なため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	2	1	6	肝硬変の治療
1	1	2	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	2	癌が強いため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状
1	1	1	2	2	1	6	オペ後疼痛改善のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	3	下肢冷感強いため
1	1	2	2	2	1	6	解熱の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能低下の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	4	胸痛時の発作対応のため
1	1	1	2	2	1	3	両脚痙攣のため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	7	1	血糖低値のため
1	1	1	2	2	2	1	低血糖発現のため
1	1	1	2	2	6	1	低血糖発現のため
1	1	1	2	2	2	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	3	2	不穏が強いため
1	1	1	2	2	1	3	不眠傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	血栓防止の為
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	6	手術後、動けるようになったため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	1	6	急性胃腸炎のため

1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	6	てんかん発作の為
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	2	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	結石破碎のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	2	風邪のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養状態改善の為
1	1	1	2	2	6	2	血圧低下、尿量保持されているため
1	1	1	2	2	1	6	栄養状態改善の為
1	1	1	2	2	2	1	脱水傾向のため
1	1	1	2	2	6	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	糖尿病治療のため
1	1	1	2	2	1	6	冠動脈CTのため
1	1	1	2	2	1	6	大腸検査のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	2	2	血圧低値のため
1	1	1	2	2	6	1	低血糖発現のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	6	ESWLの約束処方
1	1	1	2	2	1	1	高血糖
1	1	1	2	2	1	2	入院時より血圧高値の為
1	1	1	2	2	3	2	血圧コントロールのため
1	1	1	2	2	3	7	医師の指示
1	1	1	2	2	6	1	血糖低値が続いているため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	3	不眠傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	吐き気予防
1	1	1	2	2	2	6	肺炎にて内服不可
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	1	総コレステロール値高値のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理のため
1	1	1	2	2	1	1	K低下のため
1	1	1	2	2	2	2	出血のため
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	3	疼痛管理のため
1	1	2	2	2	7	3	不眠のため
1	1	2	2	2	1	3	下痢のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌陽性のため
1	1	1	2	2	3	6	発熱のためDivへ切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査より最近陽性のため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	導尿の消毒のため
1	1	1	2	2	4	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	4	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	手術前処置
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	経管栄養開始の為
1	1	1	2	2	2	6	食事開始により
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	6	食事開始により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	6	吐き気予防の為
1	1	1	2	2	1	2	風邪気味のため
1	1	1	2	2	1	6	ケモの吐き気予防のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理

1	1	1	2	2	1	6	ESWL後の約束処方
1	1	2	2	2	1	2	発熱の為
1	1	2	2	2	1	5	カロナールシロップ服用不可のため
1	1	1	2	2	1	6	内視鏡検査後
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	胃痛
1	1	1	2	2	1	6	骨密度増加目的
1	1	1	2	2	1	2	呼吸改善のため
1	1	1	2	2	1	3	痰が絡むため
1	1	1	2	2	5	4	治療用量まで增量
1	1	1	2	2	1	6	ent処方
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	1	肝機能悪化
1	1	1	2	2	1	3	頭痛のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	3	腹痛のため
1	1	1	2	2	1	6	狭心症管理
1	1	1	2	2	1	2	腹水と血圧高値
1	1	1	2	2	1	3	搔痒感
1	1	1	2	2	6	2	浮腫改善により減量
1	1	1	2	2	5	1	血清Ca高値の為
1	1	1	2	2	2	1	血清Na低値の為
1	1	1	2	2	1	1	血清Na低値の為
1	1	1	2	2	2	1	血清Na改善の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	胸痛発作管理のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	内視鏡にて胃炎が見られたため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処方
1	1	1	2	2	1	6	経管栄養開始の為
1	1	2	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	6	主病に対して
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	3	めまい
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	骨密度増加効果
1	1	1	2	2	2	5	散剤内服困難
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	2	腹部、背部に湿疹あるため
1	1	1	2	2	1	6	注射での美形治療
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向のため
1	1	2	2	2	1	1	甲状腺ホルモン低下
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	5	6	利尿効果不十分の為
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞治療
1	1	1	2	2	1	2	解熱のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	真菌(+)のため
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	2	1	血清K上昇みられるため
1	1	1	2	2	3	6	インスリン注からの切り替え
1	1	1	2	2	1	1	高カリウム血症のため
1	1	1	2	2	1	1	高尿酸のため
1	1	1	2	2	1	3	頻尿の為
1	1	1	2	2	3	1	血糖低下がみられるため
1	1	1	2	2	5	3	便秘症状のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	甲状腺機能亢進のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖値管理の為

1	1	1	2	2	2	2	血圧コントロール不良のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	1	尿路感染症の疑いのため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	6	骨密度増加を目的として
1	1	2	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫、利尿の確保のため
1	1	1	2	2	1	6	内視鏡検査前
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	喘息コントロール
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘、疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	痰の増加のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	2	1	6	注射からの切り替え
1	1	1	2	2	1	6	食事再開に伴う処方
1	1	1	2	2	1	6	肺炎治療
1	1	1	2	2	1	6	呼吸状態改善目的
1	1	1	2	2	3	4	プレドニンによる倦怠感のため
1	1	1	2	2	2	6	術前中止
1	1	1	2	2	1	1	Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	1	Na低値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値の為
1	1	1	2	2	1	3	喉が痛いため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化の為
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	2	急性咽頭炎のため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状出現のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	6	血流改善の為
1	1	2	2	2	1	3	めまいのため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	3	6	プラザキサへ切り替え
1	1	1	2	2	3	6	ワーファリンに切り替え
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	6	潰瘍の為
1	1	1	2	2	1	1	鉄欠乏の為
1	1	1	2	2	1	3	痰のため
1	1	1	2	2	1	6	肺炎のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	2	6	発熱のため、Divへ切り替え
1	1	1	2	2	1	6	血腫改善の為
1	1	1	2	2	1	6	痙攣抑制の為
1	1	1	2	2	2	1	高アンモニア血症の為
1	1	1	2	2	1	6	自己導尿開始のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	咳の為
1	1	1	2	2	5	1	肝機能低下の為
1	1	2	2	2	1	6	嚙縮予防の為

1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため (150台)
1	1	2	2	2	1	1	血圧高値のため
1	1	2	2	2	2	2	Hb低値のため
1	1	2	2	2	1	3	嚥縮見られないため
1	1	2	2	2	1	3	痰のため
1	1	2	2	2	1	2	痙攣発作の為
1	1	2	2	2	1	3	アレルギー症状の為
1	1	2	2	2	1	2	体液貯留のため
1	1	2	2	2	2	6	尿量過剰のため
1	1	2	2	2	1	2	尿量増量の為
1	1	2	2	2	1	2	上部消化管出血の為
1	1	2	2	2	2	2	血圧低下の為
1	1	1	2	2	1	6	下血疑い
1	1	1	2	2	1	3	意欲低下に対して
1	1	1	2	2	1	2	痙攣
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	6	2	血圧低下したため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下したため
1	1	1	2	2	1	2	透析時昇圧剤
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防のため
1	1	1	2	2	4	1	血糖値高いため
1	1	1	2	2	5	1	血糖値高いため
1	1	1	2	2	4	6	全身状態悪化の為
1	1	1	2	2	4	6	イレウス改善のため
1	1	1	2	2	1	6	経腸栄養剤開始
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	便祕のため
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	1	2	2	4	6	継続処方のため
1	1	1	2	2	1	7	Dr指示より
1	1	2	2	2	1	6	痛みのコントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	感染管理
1	1	2	2	2	1	6	主症状治療
1	1	2	2	2	1	7	Dr指示より
1	1	2	2	2	1	3	バルーンカテーテル留置によるカテ痛および、腰痛に対して
1	1	2	2	2	1	2	BP150-160/80-100のため
1	1	2	2	2	1	7	Dr指示より
1	1	2	2	2	1	6	心不全に対して
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養として
1	1	1	2	2	1	3	本人の希望により
1	1	1	2	2	1	3	腹痛管理
1	1	1	2	2	1	6	DIVから切り替え
1	1	1	2	2	7	3	本人の希望により
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	6	Dr指示より
1	1	1	2	2	2	2	リハビリ開始でBP低値となったため
1	1	1	2	2	1	6	OPE後の血栓予防のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	3	6	ENTに向け変更
1	1	1	2	2	6	1	PT-INR3.85のため
1	1	1	2	2	6	2	血圧低下のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘、不眠のため
1	1	1	2	2	3	1	脈が速いため
1	1	1	2	2	2	6	動脈瘤があるため
1	1	1	2	2	1	6	ノルスパンテープを扱っていないため
1	1	1	2	2	3	6	処置に備えて
1	1	1	2	2	2	6	バイアスピリン
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	6	胆汁の改善
1	1	1	2	2	4	6	術後再開
1	1	1	2	2	3	7	Dr指示より
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールの為

1	1	1	2	2	2	1	低血糖のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	6	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	5	1	血糖コントロールの為
1	1	2	2	2	1	3	不眠に對して
1	1	2	2	2	5	2	興奮状態のため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	Dr指示より
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	6	消化器症状改善のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	内服ができないため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	5	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	5	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	5	4	適正用量へ増量
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	2	認知症のため
1	1	1	2	2	1	2	手のしびれのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧コントロールのため
1	1	1	2	2	5	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫悪化のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	2	2	2	1	6	脳梗塞予防、脂質高値のため
1	1	1	2	2	2	2	脱水のため
1	1	1	2	2	2	1	脳機能低下のため
1	1	1	2	2	3	6	効果不十分のため
1	1	1	2	2	1	3	主症状治療
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	6	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	2	6	全息状態悪化の為
1	1	2	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養状態改善の為
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	2	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	1	6	心筋梗塞治療のため
1	1	1	2	2	1	6	Dlvより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	足の痛みのため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	2	2	BP低下のため
1	1	1	2	2	1	1	K値低下のため
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	1	2	喘息のため
1	1	2	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	2	痙攣抑制のT前
1	1	1	2	2	2	6	意識回復が認められないため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	1	6	心房細動所見があるため
1	1	1	2	2	3	4	心原性ではないため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	1	2	痙攣抑制の為
1	1	1	2	2	1	3	疼痛、しびれコントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	5	1	[INR上昇がみられないため

1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	3	6	効果がみられないため
1	1	1	2	2	3	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	1	K値低下のため
1	1	2	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	1	2	咳止めのため
1	1	1	2	2	1	2	薬疹出現のため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞の治療のため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞の治療のため
1	1	2	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	2	2	2	2	2	消化管出血のため
1	1	2	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞の治療のため
1	1	1	2	2	4	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	2	2	鎮眠傾向のため
1	1	1	2	2	1	6	血栓予防のため
1	1	1	2	2	1	2	体液貯留のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下のため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	2	2	2	1	7	持参薬がないため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	2	痙攣抑制のため
1	1	1	2	2	3	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	2	BP低下のため
1	1	1	2	2	1	1	BS管理のため
1	1	1	2	2	1	1	血清Na低値のため
1	1	1	2	2	5	1	Na低値のため
1	1	1	2	2	2	1	低BSのため
1	1	1	2	2	2	3	下痢のため
1	1	1	2	2	1	3	痙攣が出るため
1	1	1	2	2	1	6	胃切のため
1	1	1	2	2	1	3	咳止めのため
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	7	4	失禁の副作用の為
1	1	1	2	2	3	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	食事不可のため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	2	BP上昇のため
1	1	1	2	2	2	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	2	1	脱水のため
1	1	2	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	5	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫、利尿目的のため
1	1	1	2	2	6	1	脱水が強すぎたため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	4	1	血糖高値の為
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	6	胃炎のため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	BS高値のため
1	1	1	2	2	1	3	たんがらみがあるため
1	1	2	2	2	1	3	座位で右殿部痛あるため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	BPコントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため

1	1	1	2	2	1	6	胃腸障害治療のため
1	1	2	2	2	1	7	D r の指示より
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞再発防止のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	1	3	頭痛のため
1	1	2	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	2	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	2	2	2	1	2	BP低値のため
1	1	2	2	2	1	3	排尿困難のため
1	1	2	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	2	2	2	1	1	BS高値のため
1	1	1	2	2	6	6	食事量減少のため
1	1	1	2	2	5	6	食事量増加のため
1	1	1	2	2	6	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	2	1	WBC4100のため
1	1	1	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留のため
1	1	1	2	2	1	2	喘息のため
1	1	1	2	2	2	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	2	喘息のため
1	1	2	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	2	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	1	N a , C l 低値のため
1	1	1	2	2	1	1	K値低下のため
1	1	1	2	2	5	1	K値低下のため
1	1	1	2	2	2	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	2	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	2	咳のため
1	1	1	2	2	1	2	けいれんの疑いのため
1	1	1	2	2	2	1	WBC低下のため
1	1	1	2	2	6	6	出血をさけるため
1	1	1	2	2	3	6	プラザキサ効果不十分のため
1	1	1	2	2	5	1	IN R 上昇させるため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	6	発熱、イレウスのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	ESWLの約束処方
1	1	1	2	2	1	6	胃部不快予防のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	喉の痛みのため
1	1	1	2	2	2	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	1	甲状腺機能低下のため
1	1	1	2	2	1	3	咳そう時屯用として
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	6	PEG後の対応として
1	1	1	2	2	1	3	下痢のため
1	1	1	2	2	1	1	CD陽性のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP、BT上昇のため
1	1	1	2	2	2	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	2	3	下痢のため
1	1	1	2	2	1	6	糖尿病治療のため
1	1	1	2	2	1	1	鉄低値のため
1	1	1	2	2	2	1	CRP改善傾向により
1	1	1	2	2	1	6	消化管出血のため
1	1	1	2	2	1	7	ENT 処方
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	6	Divから変更
1	1	2	2	2	1	1	肝機能改善目的
1	1	2	2	2	7	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	2	6	内服不可能のため
1	1	1	2	2	5	1	IN R 低下のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP 上昇のため

1	1	1	2	2	5	1	INR上昇させるため
1	1	1	2	2	1	1	マイコプラズマ(+) のため
1	1	1	2	2	1	6	肺炎に対して
1	1	1	2	2	1	1	K値低下のため
1	1	1	2	2	1	6	てんかん再発防止のため
1	1	1	2	2	1	6	退院に向けて薬剤変更
1	1	2	2	2	1	3	しづれのため
1	1	1	2	2	1	6	糖尿病のため
1	1	1	2	2	1	2	ベット上で眠れるため
1	1	1	2	2	6	2	待ち越すため
1	1	1	2	2	1	2	尿量減少のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	BSの低下みられるため、内服へ切り替え
1	1	1	2	2	2	1	BS低値のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	6	ファンガードへ変更のため
1	1	1	2	2	4	6	ファンガード中止のため
1	1	1	2	2	1	6	発熱時、頃用として
1	1	1	2	2	1	3	患者の訴えにより
1	1	1	2	2	7	3	患者の希望により
1	1	1	2	2	7	3	患者の希望により
1	1	1	2	2	7	3	患者の希望により
1	1	1	2	2	6	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	3	咳が出るため
1	1	1	2	2	1	3	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	肺炎の疑いのため
1	1	1	2	2	1	2	抗生素による痒みのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	腰痛に対して
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	胃切3分粥スタートのため
1	1	2	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	ope後疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	6	前立腺がんに対して
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	ope後の疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	3	胃部不快感をもつため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	痰が出るため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	ESWL後のため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	血栓予防剤のため
1	1	1	2	2	2	1	BS低値のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	6	脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	2	下血のため
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留のため
1	1	1	2	2	2	2	利尿過多のため
1	1	1	2	2	4	6	利尿目的のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	6	ope後の止血のため
1	1	2	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫、利尿目的のため

1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	2	2	2	1	1	BPコントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	1	6	大腸検査のため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌(+)のため
1	1	1	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛増強のため
1	1	1	2	2	2	1	BS低値のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	尿酸直上昇のため
1	1	1	2	2	2	1	K値低下のため
1	1	1	2	2	1	2	BP上昇のため
1	1	1	2	2	1	2	微熱のため
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	5	2	BP上昇のため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	2	BPコントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	内服可能になったため
1	1	1	2	2	1	1	カルニチン欠乏症のため
1	1	1	2	2	1	2	BP上昇のため
1	1	1	2	2	2	1	脱水傾向のため
1	1	1	2	2	6	1	脱水傾向のため
1	1	1	2	2	1	2	不穏のため
1	1	1	2	2	2	1	BUN上昇のため
1	1	1	2	2	6	2	日中、見当識混濁のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	2	BP上昇のため
1	1	1	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	1	Na, Cl低値のため
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	1	2	BPコントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	内服不可のため
1	1	1	2	2	6	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	夜間の不眠、興奮が強いため
1	1	1	2	2	1	2	夜間興奮、不穏があるため
1	1	1	2	2	5	1	Pt-Apttが1.56となったため
1	1	1	2	2	2	6	opeのため
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	6	ope後の血栓防止のため
1	1	2	2	2	2	6	リハビリ開始となり、動けるようになつたため
1	1	1	2	2	2	3	嘔気、めまいのため
1	1	1	2	2	1	3	嘔気、めまいのため
1	1	1	2	2	1	3	嘔気、めまいのため
1	1	1	2	2	1	1	尿、混濁のため
1	1	1	2	2	2	1	ALP, γGTP上昇のため
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	3	3	便秘改善なく、切り替え
1	1	1	2	2	1	6	前立腺肥大症に対して
1	1	1	2	2	1	6	インスリンより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	骨粗鬆症の予防のため開始
1	1	1	2	2	1	1	BS高値のため
1	1	1	2	2	1	6	アピドラより切り替え
1	1	1	2	2	5	6	ランタス中止となるため、内服増量
1	1	1	2	2	1	1	BS高値のため
1	1	1	2	2	1	2	心運動低下のため

1	1	1	2	2	5	6	プレタール100、1TでSEないため、增量
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	OPE後の血栓防止のため
1	1	1	2	2	5	1	INR1.08のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	3	風邪の訴えのため
1	1	1	2	2	1	6	メジコン、効果不十分のため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	2	2	2	1	2	皮疹に対してステロイド開始
1	1	2	2	2	1	2	高熱のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	6	2	浮腫のため
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	5	2	浮腫、利尿目的のため
1	1	1	2	2	6	7	D r の指示により
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	6	Divから変更
1	1	2	2	2	1	2	のどのはれに対して
1	1	2	2	2	1	3	咽頭痛に対して
1	1	2	2	2	1	3	ロキソプロフェン服用で胃痛ありのため
1	1	1	2	2	1	6	ope後血栓予防のため
1	1	1	2	2	2	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	3	めまいがあるため
1	1	1	2	2	4	6	状態安定したため
1	1	1	2	2	1	2	喘息のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	呼吸苦改善みられないため
1	1	1	2	2	5	2	呼吸苦改善みられないため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	2	てんかんのため
1	1	1	2	2	2	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	2	1	BUN上昇のため
1	1	1	2	2	2	2	薬疹のため
1	1	1	2	2	1	2	てんかんのため
1	1	1	2	2	1	2	薬疹のため
1	1	1	2	2	1	2	BS高値のため
1	1	1	2	2	1	6	インスリンより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	BS高値のため
1	1	1	2	2	1	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	1	6	FOLFIRINOX施行のため
1	1	1	2	2	5	7	D r の指示により
1	1	1	2	2	7	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	口内炎のため
1	1	1	2	2	3	3	疼痛コントロールのため、ロキソプロフェンより変更
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロール不良のため
1	1	1	2	2	2	6	内服困難のため
1	1	1	2	2	1	5	内服できないために外用に切り替え
1	1	1	2	2	2	6	内服困難のため
1	1	1	2	2	1	6	血栓予防のため
1	1	1	2	2	1	6	肺炎悪化、浮腫のため
1	1	1	2	2	5	6	調剤しやすいようにするため
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	2	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	2	4	出血助長のため
1	1	1	2	2	1	6	D i vよりセフォチアム開始のため
1	1	1	2	2	1	6	検査前処置として
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	軟便のため
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	6	2	喘息コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	検査前処置として
1	1	1	2	2	1	6	ESD後
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛強いため
1	1	1	2	2	1	6	アンペックのレスキューとして
1	1	1	2	2	1	3	イレウスによる疼痛のため