

1	1	1	2	2	1	2	浮腫、利尿目的のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	慢性偽性腸閉塞のため
1	1	1	2	2	1	2	帯状疱疹のため
1	1	1	2	2	1	6	急性胃腸炎の疑いのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値、便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	BPコントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	心拡大のため
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	ホルモン療法開始のため
1	1	1	2	2	1	1	貧血のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divから変更
1	1	1	2	2	1	6	前立腺がんのため
1	1	1	2	2	1	1	総ビリルビン高値のため
1	1	1	2	2	1	1	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	腰痛のため
1	1	1	2	2	1	6	副作用の疑いのため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	6	生検の感染、止血予防のため
1	1	2	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	4	6	検査後抗凝薬再開
1	1	1	2	2	1	3	胃部症状の為
1	1	1	2	2	1	6	術後感染予防
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	6	潰瘍治療の為
1	1	1	2	2	1	6	潰瘍治療の為
1	1	1	2	2	4	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘改善のため
1	1	2	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	4	6	栄養管理の為
1	1	1	2	2	4	6	状態回復により再開
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気止めとして
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理
1	1	1	2	2	2	6	全身状態悪化の為
1	1	1	2	2	1	3	呼吸器管理の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	術後感染予防、止血の為
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	1	2	術後イレウス疑い
1	1	1	2	2	3	3	下痢続いているため
1	1	1	2	2	4	7	医師の指示
1	1	1	2	2	4	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム低値のため
1	1	2	2	2	1	2	解熱のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛改善のため

処方変更 有.1 265枚	2.薬剤師	持参薬 有.1 無.2	処方提案 有.1 無.2	情報提供 有.1 無.2	1.追加 2.中止 3.薬剤変更 4.再開 5.用量増 6.用量減 7.用法変更	1.検査値 2.身体所見 3.自覚症状 4.薬学管理 5.アドヒア 6.治療指針 7.その他	処方変更の根拠
1	2	2	1	1	3	4	プレタールによる頭痛SE s/o
1	2	1	1	1	6	4	HD導入によるもの
1	2	1	1	1	7	3	Ptの希望をDrへ報告し許可される
1	2	1	1	1	1	3	便秘の訴えがあったため
1	2	1	1	1	5	3	食欲低下と胃痙より経管栄養剤開始したため
1	2	1	1	1	2	4	相互作用（効果重複）
1	2	1	1	1	3	4	経口投与不可のため、胃痙から投与
1	2	1	1	1	2	3	かゆみ訴え消失のため
1	2	1	1	1	1	4	食欲不振のため
1	2	1	1	1	1	1	BSコントロールのため

1	2	1	1	1	1	4	剤形変更提案のため
1	2	1	1	1	5	4	4w経過のため
1	2	1	1	1	5	4	4w経過のため
1	2	1	1	1	2	4	認知症改善が期待できないため
1	2	1	1	1	1	1	尿酸値上昇の為
1	2	1	1	1	2	3	痛み消失の為
1	2	1	1	1	1	4	液剤からの切り替え提案
1	2	1	1	1	2	1	INR高値のため
1	2	2	1	1	1	3	めまい増強時の頓用として
1	2	1	1	1	6	3	しびれ改善がみられるため
1	2	1	1	1	1	4	認知症進行抑制効果増強の為
1	2	2	1	1	1	2	高血圧のため
1	2	1	1	1	1	3	誤嚥予防があるため
1	2	1	1	1	1	4	以前飲んでいた為
1	2	1	1	1	1	3	嘔気時頓用のため
1	2	1	1	1	2	4	重複投与のため
1	2	1	1	1	1	1	K値補正のため
1	2	1	1	1	1	6	服薬していたため
1	2	1	1	1	1	1	炎症マーカー+のため
1	2	1	1	1	1	2	血圧高値のため
1	2	1	1	1	5	2	血圧高いため、肝機能悪化の為
1	2	1	1	1	1	2	血圧高いため
1	2	1	1	1	1	3	お尻が痛いと言えがあったため
1	2	1	1	1	7	3	疼痛治まってきたと言えあったため
1	2	1	1	1	1	3	腹痛のため
1	2	1	1	1	1	4	消化器系副作用予防の為
1	2	1	1	1	2	3	胃痛発現のため
1	2	1	1	1	1	4	胃腸障害が少ない薬剤へ変更
1	2	1	1	1	1	1	血糖値上昇あり
1	2	1	1	1	2	3	症状消失のため
1	2	1	1	1	7	4	マグミット服用中で吸収低下の可能性があるので
1	2	1	1	1	3	6	抗菌薬投与終了のため
1	2	1	1	1	2	4	既往歴に緑内障あるため
1	2	1	1	1	1	7	ベレックス代替のため
1	2	1	1	1	7	3	疼痛緩和の為
1	2	1	1	1	1	3	不眠改善の為
1	2	1	1	1	1	1	血清カリウム低値の為
1	2	1	1	1	2	4	座位が保てないため
1	2	1	1	1	1	3	痰(+)のため
1	2	1	1	1	2	4	定期的にレバミピド服用しているため
1	2	1	1	1	5	3	胃部不快感(+)のため
1	2	1	1	1	5	3	疼痛管理のため
1	2	1	1	1	1	3	下痢のため
1	2	1	1	1	4	3	疼痛管理のため
1	2	1	1	1	5	4	便秘改善ないため
1	2	1	1	1	1	2	呼吸状態改善の為
1	2	1	1	1	4	4	手術後の再開を提案
1	2	1	1	1	1	6	入院前も使っていたため
1	2	1	1	1	1	3	胸焼け訴え有
1	2	1	1	1	1	3	扁桃腺が腫れていると訴え有
1	2	1	1	1	1	3	不眠改善の為
1	2	1	1	1	2	3	吐き気+より
1	2	1	1	1	1	1	ピロリ菌+より
1	2	1	1	1	7	4	鉄剤との吸収阻害を回避するため
1	2	1	1	1	3	3	胃痛訴えたためCOX2選択阻害薬に変更
1	2	1	1	1	6	4	漸減していく予定となったため
1	2	1	1	1	1	4	5-FU+CDDP施行のため
1	2	1	1	1	2	4	日中傾眠傾向が強いため
1	2	1	1	1	3	1	血清カリウム低下の為
1	2	1	1	1	5	2	現在の用量では不十分のため
1	2	2	1	1	2	3	胃痛症状が消失したため
1	2	2	1	1	1	2	高血圧のため
1	2	2	1	1	1	4	処方止めていたため、小用量から開始
1	2	2	1	1	5	4	中止する前の用量に戻すため
1	2	2	1	1	2	2	血圧安定傾向のため
1	2	1	1	1	7	4	持続的な疼痛が見られないため頓用へ変更提案
1	2	1	1	1	3	3	セレコックスで疼痛管理不十分のため
1	2	1	1	1	6	3	軟便傾向のため
1	2	1	1	1	1	3	眠りが浅いと訴えあるため
1	2	1	1	1	4	6	術後ワーファリン再開を依頼
1	2	1	1	1	1	3	便秘のため
1	2	1	1	1	5	2	鼻汁改善なしのため
1	2	1	1	1	4	1	貧血治療の為
1	2	2	1	1	3	4	緑内障既往があるため抗コリン作用の少ない薬剤へ変更

1	2	1	1	1	2	4	座位保でないため
1	2	1	1	1	1	1	Na,Cl,Hr低値
1	2	1	1	1	4	2	血圧高値のため
1	2	1	1	1	1	3	鎮痛補助剤として処方提案
1	2	1	1	1	6	6	歩行訓練が始まったため
1	2	1	1	1	1	3	食欲低下、吐き気のため
1	2	1	1	1	5	4	添付文書に沿った増量を提案
1	2	1	1	1	2	4	味覚異常の原因と推測されるため
1	2	1	1	1	6	1	血中濃度高値のため
1	2	1	1	1	1	3	不眠の為
1	2	1	1	1	2	3	下痢症状のため
1	2	1	1	1	2	6	ステント留置で不要になるため
1	2	1	1	1	2	1	低カリウムのため
1	2	1	1	1	7	4	朝食食後へ
1	2	1	1	1	5	4	添付文書に基づく増量
1	2	1	1	1	5	4	添付文書に基づく増量
1	2	1	1	1	4	2	血圧高値傾向のため
1	2	1	1	1	3	4	アスパラ酸Kが吸湿し、崩壊気味であるため
1	2	1	1	1	1	2	血圧高値のため
1	2	1	1	1	1	6	てんかん疑いの為
1	2	1	1	1	3	4	使用感による剤形変更
1	2	1	1	1	7	3	めまい強いため定時処方へ
1	2	1	1	1	7	2	心拍数低下の為、屯用に変更
1	2	1	1	1	2	2	心拍数低下のため
1	2	1	1	1	1	2	血圧高値の為
1	2	1	1	1	2	3	本人より自覚症状なし
1	2	1	1	1	6	1	尿クリアランス低下の為
1	2	1	1	1	6	1	INR値：2.9と高値の為
1	2	1	1	1	2	1	血清カリウム高値の為
1	2	1	1	1	3	4	副作用歴より薬剤変更を提案
1	2	1	1	1	2	1	血糖低下のため
1	2	1	1	1	1	3	便秘の為
1	2	1	1	1	7	3	吐き気がないため
1	2	1	1	1	5	1	PT-INRのため
1	2	1	1	1	1	3	排便管理の為
1	2	1	1	1	3	4	抗菌薬投与終了のため
1	2	1	1	1	1	7	記載漏れのため
1	2	2	1	1	2	3	胃部不快感消失の為
1	2	1	1	1	4	2	血圧高値のため再開
1	2	1	1	1	1	1	尿酸値高値の為
1	2	1	1	1	7	3	疼痛なくなったため
1	2	1	1	1	1	3	疼痛増強のため
1	2	1	1	1	7	3	疼痛改善のため
1	2	2	1	1	1	1	肝機能改善目的
1	2	1	1	1	1	3	不眠のため
1	2	1	1	1	2	3	不眠のため
1	2	1	1	1	7	3	便秘改善の為定時処方へ
1	2	1	1	1	1	3	便秘のため
1	2	1	1	1	1	7	Drの指示により
1	2	1	1	1	3	2	けいれん発作のため
1	2	2	1	1	1	3	胃のむかつきのため
1	2	1	1	1	3	4	抗生剤中止により変更
1	2	1	1	1	2	4	オパ後の安全性が確立されていないため
1	2	1	1	1	3	2	血圧高値のため
1	2	1	1	1	1	2	血圧が低い傾向の為
1	2	1	1	1	5	3	不眠症状が強いため
1	2	1	1	1	1	4	抗菌薬による下痢に対して
1	2	1	1	1	7	5	アドヒアランス向上のため
1	2	2	1	1	7	3	患者の希望により、頓用へ
1	2	1	1	1	4	4	抗鬱剤の継続を提案
1	2	1	1	1	5	4	治療量への増量を提案
1	2	1	1	1	2	4	セロケンによる心拍数低下疑い
1	2	1	1	1	3	3	吐き気、めまいにより変更
1	2	1	1	1	4	4	バイアスピリンの再開を提案
1	2	1	1	1	5	1	血清カリウム低値のため
1	2	1	1	1	3	4	INR値が上昇しないため
1	2	1	1	1	4	3	不眠
1	2	1	1	1	7	3	便秘の為週一回内服へ
1	2	1	1	1	3	4	腎障害回避のため
1	2	1	1	1	5	1	尿酸改善が見られないため
1	2	1	1	1	1	3	不眠症状改善のため
1	2	1	1	1	1	3	不眠症状改善のため
1	2	1	1	1	1	1	腎機能による調節
1	2	1	1	1	6	4	テイコプラニンTDMにより

1	2	1	1	1	1	4	腎機能による用量調節	
1	2	1	1	1	3	4	食事による薬剤再開	
1	2	1	1	1	1	2	喘息コントロール	
1	2	1	1	1	4	6	骨密度増加	
1	2	1	1	1	3	4	注射からの切り替えの際の用量	
1	2	1	1	1	1	1	尿酸値高値の為	
1	2	1	1	1	2	2	呼吸状態改善により中止を提案	
1	2	1	1	1	2	5	紛体が内服しにくいと本人より	
1	2	1	1	1	2	4	ペロテックにて副作用歴有	
1	2	1	1	1	3	1	血清カリウム低下により	
1	2	1	1	1	4	4	止血確認によりブラビックス再開を提案	
1	2	1	1	1	5	4	血中濃度測定結果よりユニコン増量提案	
1	2	1	1	1	1	3	胃痛予防	
1	2	1	1	1	3	4	効果不十分の為抗生剤変更	
1	2	1	1	1	7	3	胃痛改善の為頓用へ変更	
1	2	1	1	1	1	6	頓用処方を提案	
1	2	2	1	1	1	2	腹部ガス多量の為	
1	2	1	1	1	1	3	4	酸化マグネシウムとの相互作用
1	2	1	1	1	2	6	消化管出血の疑いがなくなったため	
1	2	1	1	1	1	2	血尿のため	
1	2	1	1	1	1	3	血痰?のため	
1	2	1	1	1	1	5	3	便秘のため
1	2	1	1	1	1	6	骨折予防のため	
1	2	1	1	1	2	4	緑内障による中止	
1	2	1	1	1	2	3	胃の違和感がないため	
1	2	1	1	1	5	3	便通不良のため	
1	2	1	1	1	2	3	めまいがないため	
1	2	1	1	1	2	3	症状改善のため	
1	2	1	1	1	7	3	症状改善のため	
1	2	1	1	1	1	3	便秘のため	
1	2	1	1	1	1	6	内服ができないため	
1	2	1	1	1	2	4	既往より中止を提案	
1	2	1	1	1	4	6	流動食開始に合わせて再開	
1	2	1	1	1	6	1	腎機能低下のため	
1	2	1	1	1	2	4	薬効重複のため	
1	2	2	1	1	2	2	症状軽快のため	
1	2	2	1	1	2	3	自覚症状チェックにより中止を提案	
1	2	1	1	1	2	4	CD(+)のため	
1	2	1	1	1	4	4	全身状態を評価し再開を提案	
1	2	1	1	1	1	6	抗菌薬使用で下痢出現のため	
1	2	1	1	1	3	1	腎機能の悪化のため	
1	2	1	1	1	2	4	出血助長するため	
1	2	1	1	1	1	1	TCH.LDL高値のため	
1	2	1	1	1	6	4	意識消失あり薬剤性を疑う	
1	2	1	1	1	5	1	LDL高値のため	
1	2	1	1	1	5	1	INR上昇がみられないため	
1	2	1	1	1	2	2	咳症状安定のため	
1	2	1	1	1	1	2	BP高値のため	
1	2	1	1	1	1	3	鼻閉傾向(患者訴え)	
1	2	1	1	1	1	3	手指の乾燥のため	
1	2	1	1	1	1	3	食欲低下のため	
1	2	1	1	1	1	1	貧血傾向(胃全摘出のため)	
1	2	1	1	1	6	4	高齢者の為減量を提案	
1	2	1	1	1	6	4	高齢者の為減量を提案	
1	2	1	1	1	1	1	K値低下のため	
1	2	1	1	1	6	4	TDMにより減量を提案	
1	2	1	1	1	7	4	相互作用回避のため	
1	2	1	1	1	2	4	ブラビックス併用中のため	
1	2	1	1	1	1	3	痰がからみ、吸入困難なため	
1	2	1	1	1	7	3	疼痛軽減のため	
1	2	2	1	1	1	3	便秘のため	
1	2	1	1	1	1	1	TCH.LDL高値のため	
1	2	1	1	1	2	4	めまい、下痢等の副作用出現のため	
1	2	1	1	1	3	5	アドヒアランス改善のため	
1	2	1	1	1	3	3	胃痛のため	
1	2	1	1	1	2	1	腎機能低下のため	
1	2	1	1	1	1	6	疼痛コントロールのため	
1	2	1	1	1	6	4	8週を超えるため	
1	2	1	1	1	3	4	抗菌薬終了のため	
1	2	1	1	1	2	6	痒みが出るため	
1	2	2	1	1	2	1	TG低下、安定してきたため	
1	2	1	1	1	2	6	腎不全により蓄積する可能性があるため	
1	2	1	1	1	3	1	尿酸値コントロール不良のため	
1	2	1	1	1	2	6	opeのため	

1	2	1	1	1	7	3	疼痛訴えなくなったため、頓用へ
1	2	1	1	1	1	6	咳のため
1	2	1	1	1	2	6	風邪症状がアレルギー性でないため
1	2	1	1	1	2	6	効果不十分のため
1	2	1	1	1	6	3	便通が良いため
1	2	1	1	1	2	3	便通が良いため
1	2	2	1	1	2	3	症状が落ち着いたので
1	2	1	1	1	2	2	長時間起き上がれないため
1	2	1	1	1	7	5	アドヒアランス改善のため
1	2	1	1	1	3	3	ロキソプロフェンで痛みが治まらないため
1	2	1	1	1	1	2	口内炎のため
1	2	1	1	1	1	3	痰がからむため
1	2	1	1	1	1	3	胃がムカムカするため
1	2	1	1	1	3	3	抗がん剤による嘔気、嘔吐のため
1	2	1	1	1	1	3	腹部膨満感があるため
1	2	1	1	1	2	3	疼痛コントロール薬変更のため
1	2	1	1	1	3	3	痛みが強いため
1	2	1	1	1	3	3	抗菌薬終了後も軟便続いているため
1	2	1	1	1	5	7	Drの指示により
1	2	1	1	1	7	4	早朝の空腹を防ぐために寝る前に変更
1	2	1	1	1	2	4	禁食で低血糖のリスクがあるため
1	2	1	1	1	4	6	食事再開したため
1	2	1	1	1	6	1	腎機能低下のため
1	2	1	1	1	2	4	緑内障の患者には禁忌のため
1	2	1	1	1	3	6	抗生剤の点滴を打っているため
1	2	1	1	1	3	5	飲みにくい
1	2	1	1	1	2	4	効果重複のため
1	2	1	1	1	4	3	自覚症状に基づき定時服用
1	2	1	1	1	1	3	便秘改善みられないため
1	2	1	1	1	2	1	腎機能の悪化
1	2	1	1	1	2	1	尿酸値低値のため中止を提案
1	2	1	1	1	2	7	Drの指示により
1	2	1	1	1	1	3	リリカ開始後、痛み変化ないため

処方変更 有.1 112枚	3. 看護師	持参薬 有.1 無.2	処方提 案 有. 1 無.2	情報提供 有.1 無.2	1. 追加 2. 中止 3. 薬剤変更 4. 再開 5. 用量増 6. 用量減 7. 用法変更							処方変更の根拠
					1. 検査値	2. 身体所見	3. 自覚症状	4. 薬学管理	5. アドヒア	6. 治療指針	7. その他	
1	3	2	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	5	3	胃痛の訴えがあったため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	1	3	不眠のため					
1	3	1	2	2	1	3	不眠のため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘改善の為					
1	3	1	2	2	1	2	発熱のため					
1	3	1	2	2	1	3	疼痛あるため					
1	3	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため					
1	3	2	2	2	1	3	疼痛管理の為					
1	3	2	2	2	1	3	便秘改善の為					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	1	3	不眠の為					
1	3	1	2	2	1	3	不眠のため					
1	3	1	2	2	1	3	下痢のため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	3	4	アモバンでは眠りが浅いため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	1	3	不眠のため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘の為					
1	3	1	2	2	1	3	不眠のため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	1	6	疼痛管理の為					
1	3	1	2	2	7	5	夕食2時間だと忘れやすい					
1	3	1	2	2	1	3	不眠症状改善の為					
1	3	1	2	2	2	6	内服不可のため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため					
1	3	1	2	2	7	3	下痢のため					
1	3	2	2	2	1	3	便秘の為					
1	3	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため					
1	3	1	2	2	1	3	便秘の為					
1	3	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため					
1	3	1	2	2	1	3	不眠改善の為					

1	3	1	2	2	1	3	吐気の為
1	3	1	2	2	1	2	便が硬いため
1	3	1	2	2	1	3	吃逆時の頓用として
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	2	2	2	1	3	便秘の為
1	3	2	2	2	1	3	便秘の為
1	3	1	2	2	1	3	疼痛管理
1	3	1	2	2	1	3	便秘の訴えがあったため
1	3	1	2	2	1	2	鼻汁の治療
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	2	発熱のため
1	3	1	2	2	1	3	不眠
1	3	1	2	2	1	6	吐き気対応の為
1	3	1	2	2	1	3	便秘改善の為
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	3	1	2	2	1	3	不眠のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	3	4	経鼻投与に変更の為
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	2	2	2	3	5	シロップ拒否のため
1	3	1	2	2	2	2	血圧低下の為
1	3	1	2	2	3	2	脈拍低下の為
1	3	1	2	2	2	6	食事中止のため
1	3	1	2	2	1	3	頭痛のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	6	2	覚醒悪化の為
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘の為
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	2	3	下痢の為
1	3	1	2	2	2	3	下痢の為
1	3	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	3	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘の訴えがある為
1	3	1	2	2	1	3	疼痛の訴えがあったため
1	3	1	2	2	1	3	便秘の訴えがあったため
1	3	1	2	2	1	3	膝の痛みのため
1	3	1	2	2	1	3	不眠の為
1	3	1	2	2	1	3	便秘の為
1	3	2	2	2	2	3	下痢の為
1	3	1	2	2	1	3	不眠の訴えあるため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	2	3	水様便のため
1	3	1	2	2	1	2	発熱に対して
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	7	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	2	2	2	1	3	不眠のため
1	3	1	2	2	1	2	解熱の為
1	3	1	2	2	1	3	便秘の為
1	3	1	2	2	1	3	不眠のため
1	3	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	3	1	2	2	1	2	便秘症状
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	2	2	2	1	3	腰痛(本人希望)
1	3	2	2	2	1	3	腰痛(本人希望)
1	3	1	2	2	1	3	疼痛のため
1	3	1	2	2	1	7	以前飲んでた薬が欲しいと言われたため
1	3	1	2	2	1	3	Pt希望
1	3	1	2	2	1	6	自己導尿のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	2	2	2	1	3	口内炎に対して
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため

1	3	1	2	2	1	3	便秘のため
1	3	1	2	2	6	3	便秘コントロール良好のため
1	3	1	2	2	1	3	便秘のため

処方変更 無2 426/570 枚	薬剤師 2	持参薬 有1 無2	処方提 案 有 1 無2	情報提供 有.1 無.2	1. 追加 2. 中止 3. 薬剤変更 4. 再開 5. 用量増 6. 用量減 7. 用法変更	1. 検査値 2. 身体所見 3. 自覚症状 4. 薬学管理 5. アドヒア 6. 治療指針 7. その他	処方変更の根拠
2	2	2	1	1			患者の希望により、痛み止めの処方提案
2	2	1	1	1			血圧高値のため降圧薬の処方提案
2	2	1	1	1			痒みの訴え継続、皮膚科受診が必要
2	2	1	1	1			服用薬剤で副作用の可能性有。処方変更の提案
2	2	1	1	1			AST/LDH高値のため、プレタールの継続の可否について提案
2	2	1	1	1			ロゼザム、アローゼンアロプリノールの継続可否について提案
2	2	1	1	1			エレクタールの継続の可否について提案
2	2	1	1	1			皮下出血あるが、パファリン継続するか否かの提案
2	2	1	1	1			ワーファリン処方提案
2	2	1	1	1			トラマールと同成分への薬剤へ処方変更提案
2	2	1	1	1			化学療法の痺れに対しての処方を提案
2	2	1	1	1			インスリン単位増量を提案
2	2	1	1	1			ピカルタミドによる副作用について
2	2	1	1	1			低Kのためダイアートを中止または他剤への変更提案
2	2	1	1	1			テイコプラニンTDM（血中濃度測定）
2	2	2	1	1			降圧薬の処方の有無について提案
2	2	1	1	1			ピカルタミド減量について
2	2	1	1	1			血圧高値のため、処方提案
2	2	1	1	1			入院時血圧低下傾向
2	2	1	1	1			抗精神病薬によるイレウス（主病）悪化の可能性
2	2	1	1	1			リバスタッチ増量を提案
2	2	1	1	1			リバスタッチ増量を提案
2	2	1	1	1			眼の乾燥にヒアレイン処方提案
2	2	1	1	1			肝機能上昇
2	2	1	1	1			CTRXの減量を提案
2	2	1	1	1			菌培養の結果に対して抗生剤変更を提案
2	2	1	1	1			血圧低値のため、ラシックス減量を提案
2	2	1	1	1			偏頭痛治療薬の処方を提案
2	2	1	1	1			肝機能低下のため降圧剤を多剤に変更
2	2	1	1	1			ノイロトロピンを提案
2	2	1	1	1			降圧剤の追加、抗生剤の投与の提案
2	2	1	1	1			コカール→キソプロフェンへの変更を提案
2	2	1	1	1			ペロリックを頓用へ
2	2	1	1	1			ヘモグロビン低値はピカルタミドの影響ではないか？
2	2	1	1	1			オキシコンチンの増量を提案
2	2	1	1	1			エクア、トラゼンタの処方提案
2	2	2	1	1			下痢の為減量を提案
2	2	1	1	1			検査値に基づいて塩化ナトリウムの提案
2	2	1	1	2			剤形変更（錠剤へ）
2	2	1	1	1			去痰目的で提案
2	2	1	1	1			クレアチニンに基づき、他剤の提案
2	2	1	1	1			副作用評価
2	2	1	1	1			過去の内服薬レミニール、ボナロンの再開を提案
2	2	2	1	1			トリグリセリド高値のため治療薬処方を提案
2	2	2	1	1			K値低値のため、K製剤提案
2	2	1	1	1			DM治療薬の調製
2	2	1	1	1			腎障害回避を目的として
2	2	1	1	1			腎機能に対するアロプリノールの用量調節
2	2	1	1	1			アミノフィリンのTDMを提案
2	2	1	1	1			テオフィリン血中濃度測定提案
2	2	1	1	1			間質性肺炎を疑いKL-6 検査を提案
2	2	1	1	1			ブラビックス中止のためヘパリン投与を提案
2	2	1	1	1			INR値に伴うワーファリン増量を提案
2	2	1	1	1			カバサールの用量変更の提案
2	2	1	1	1			疼痛管理
2	2	1	1	1			フェノバルビタールTDMを提案
2	2	1	1	1			トラムセット中止を提案
2	2	2	1	1			昼間の眠気ありと訴えあったため、ソルピデム中止を提案
2	2	2	1	1			腎機能に基づきオキシコンチンの減量を提案
2	2	1	1	1			血圧評価、血清カリウムを評価しARB中止を提案
2	2	1	1	1			肝機能悪化のため
2	2	1	1	1			アムロジピンの服用回数の変更を提案

2	2	1	1	1	Hb低下のため
2	2	1	1	1	血清カリウム値
2	2	1	1	1	K値低値より、ラシックスをアルダクトンに変更提案
2	2	1	1	1	バンコマイシンの減量提案
2	2	1	1	1	K値低値のため、処方継続提案
2	2	1	1	1	血圧140-150で持参薬のニフェジピンの再開を提案
2	2	1	1	1	BUN、Cr 低下より、ジャヌビアの減量提案
2	2	1	1	1	脱水のためリユープリンの投与の見送り
2	2	1	1	1	鼻血の出血が確認されるためワーファリン減量を提案
2	2	1	1	1	呼吸器用薬の減量を提案
2	2	1	1	1	ジゴキシン増量提案
2	2	1	1	1	TG高値のためリパロ増量提案
2	2	1	1	1	薬剤投与量の調節提案
2	2	1	1	1	排泄遅延を考慮し、提案
2	2	1	1	1	ドルミカム減速（減量）を提案
2	2	1	1	1	食事量に伴うラコール中止を提案
2	2	1	2	1	疼痛コントロール
2	2	1	2	1	血液データ
2	2	1	2	1	血圧変動
2	2	1	2	1	尿酸値チェック
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	入院中の血糖推移
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	抗血栓剤の継続の可否
2	2	1	2	1	腎機能低下について
2	2	1	2	1	腎機能・肝機能評価
2	2	1	2	1	出血傾向の副作用が無い事を報告
2	2	1	2	1	血糖値安定、低血糖症状なし
2	2	1	2	1	腎機能、肝機能
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	PT-INR
2	2	1	2	1	肝機能、腎機能
2	2	1	2	1	血圧評価
2	2	1	2	1	肝機能
2	2	1	2	1	血清ナトリウム値
2	2	1	2	1	肝機能
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	薬剤性血球減少の疑いを報告
2	2	1	2	1	肝機能・腎機能評価
2	2	1	2	1	血糖値評価
2	2	1	2	1	肝機能
2	2	1	2	1	腎機能、血球成分
2	2	1	2	1	フェニトイン血中濃度
2	2	1	2	1	ジゴキシン血中濃度
2	2	1	2	1	腎機能、血清Ca値
2	2	1	2	1	リリカによる副作用なし
2	2	1	2	1	腎機能とジゴキシン評価
2	2	1	2	1	タクロリムス血中濃度
2	2	1	2	1	肝機能
2	2	1	2	1	血清カリウム値低値
2	2	1	2	1	血清カリウム低値の為
2	2	1	2	1	肝機能
2	2	1	2	1	PT-INR
2	2	1	2	1	肝機能
2	2	1	2	1	肝機能、腎機能
2	2	1	2	1	血清カリウム値
2	2	1	2	1	ファモチジンでの腎機能への影響
2	2	1	2	1	抗生剤の肝機能への影響
2	2	1	2	1	ALP上昇について
2	2	1	2	1	テイコプランニンTDM（初期投与設計）
2	2	1	2	1	アルベカシンTDM（初期投与設計）
2	2	1	2	1	アルベカシンTDM（血中濃度測定）
2	2	1	2	1	腎機能
2	2	1	2	1	腎機能、肝機能
2	2	1	2	1	腎機能、肝機能
2	2	1	2	1	血圧
2	2	1	2	1	血清Na低値、貧血、
2	2	1	2	1	血小板増加傾向
2	2	1	2	1	血小板値正常化
2	2	1	2	1	めまい、ふらつき等の副作用なし
2	2	1	2	1	血清カリウム値安定
2	2	1	2	1	CRP低値、コリンエステラーゼ低値、肝機能

2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		バイタル評価
2	2	1	2	1		バイタル評価
2	2	1	2	1		バイタル評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		薬剤副作用評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		持参薬情報提供
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		TDM評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		漢方薬の継続投与について
2	2	1	2	1		血圧高値のため処方提案
2	2	1	2	1		腎機能に対する用量調節
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		継続評価
2	2	1	2	1		血圧安定
2	2	1	2	1		バイタル、副作用評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		血圧コントロール
2	2	1	2	1		血圧コントロール
2	2	1	2	1		血圧コントロール
2	2	1	2	1		血圧コントロール
2	2	1	2	1		バイタル評価
2	2	1	2	1		血圧コントロール
2	2	1	2	1		血圧コントロール
2	2	1	2	1		注射薬継続評価
2	2	1	2	1		電解質、炎症反応
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	2	2	1		抗生剤の副作用
2	2	1	2	1		腎機能
2	2	1	2	1		腎機能
2	2	1	2	1		持参薬の破棄について
2	2	2	2	1		肝機能上昇
2	2	2	2	1		肝機能上昇
2	2	1	2	1		薬学的相互作用の提供
2	2	1	2	1		血糖値、HbA1C改善傾向
2	2	2	2	1		検査値と副作用評価
2	2	2	2	1		検査値評価
2	2	2	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		血圧安定
2	2	2	2	1		副作用評価
2	2	2	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		バルプロ酸のTDM実施を提案
2	2	1	2	1		デオフィリンのTDM実施を提案
2	2	1	2	1		血色素量
2	2	1	2	1		β-D-グルカン
2	2	1	2	1		肝機能
2	2	1	2	1		フェロミアの用法について
2	2	1	2	1		検査値評価
2	2	1	2	1		副作用評価
2	2	1	2	1		検査値評価

2	2	1	2	1	検査値評価
2	2	1	2	1	炎症性蛋白の低下
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	血清Kの上昇について
2	2	1	2	1	血液データ評価
2	2	1	2	1	血液データ評価
2	2	1	2	1	腎機能、肝機能
2	2	1	2	1	血圧著変なし
2	2	1	2	1	ヘモグロビン低下
2	2	1	2	1	鼻出血様のものが確認されたため、プラビックス減量を提案
2	2	1	2	1	K値と副作用について情報提供
2	2	1	2	1	K値変動について情報提供
2	2	1	2	1	肝機能
2	2	1	2	1	検査値に基づく副作用評価
2	2	1	2	1	副作用評価
2	2	1	2	1	検査値評価
2	2	1	2	1	検査値評価
2	2	1	2	1	肝酵素系数値高値
2	2	1	2	1	セフトリアキソンによる副作用チェック
2	2	2	2	1	血液データに著変なし
2	2	1	2	1	疼痛の程度について
2	2	2	2	1	肝酵素数値
2	2	1	2	1	肝酵素数値
2	2	2	2	1	肝酵素数値
2	2	1	2	1	抗生剤による肝機能評価
2	2	1	2	1	腎機能、肝機能評価
2	2	1	2	1	検査値評価
2	2	1	2	1	肝機能・腎機能
2	2	1	2	1	血圧値、赤血球、ヘモグロビン
2	2	1	2	1	検査値評価
2	2	1	2	1	血圧評価
2	2	2	2	1	腎機能、肝機能評価
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	血圧評価
2	2	1	2	1	血圧評価
2	2	1	2	1	自覚症状チェック
2	2	1	2	1	血圧評価
2	2	1	2	1	ジゴキシン血中濃度チェック
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	INR値の評価
2	2	2	2	1	肝機能、貧血評価
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	2	2	1	血清値評価
2	2	1	2	1	赤血球、ヘモグロビン値低値
2	2	1	2	1	経過観察のため
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	白血球、赤血球評価
2	2	2	2	1	血清電解質評価（利尿剤服用中）
2	2	1	2	1	電解質評価
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	腎機能評価（脱水傾向）
2	2	1	2	1	ジゴキシンTDM依頼
2	2	1	2	1	高血糖により薬剤再開を検討
2	2	1	2	1	電解質評価
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	2	2	1	肝機能評価
2	2	2	2	1	腎機能評価
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	1	2	1	血圧評価
2	2	1	2	1	血清カリウム値評価
2	2	1	2	1	血清ヘモグロビン評価
2	2	1	2	1	肝機能評価
2	2	2	2	1	肝機能に対する処方薬の投与注意
2	2	1	2	1	検査値に基づく副作用評価
2	2	1	2	1	副作用評価
2	2	1	2	1	検査値評価
2	2	1	2	1	検査値評価
2	2	1	2	1	検査値評価

