

資料-2 入院患者処方変更一覧（処方変更提案、情報提供も含む）

処方変更 有.1 2120枚	1. 医師	持参薬 有1 無2	処方提 案 有. 1 無.2	情報提供 有.1 (64 枚) 無.2	1. 追加 2. 中止 3. 薬剤変更 4. 再開 5. 用量増 6. 用量減 7. 用法変更	1. 検査値 2. 身体所見 3. 自覚症状 4. 薬学管理 5. アドヒア 6. 治療指針 7. その他	処方変更の根拠
1	1	1	2	1	1	7	医師の指示
1	1	1	2	1	1	3	吐き気のため
1	1	1	2	1	1	2	血圧が高いため
1	1	1	2	1	1	6	治療薬変更
1	1	1	2	1	1	6	疼痛管理、痰排泄目的
1	1	2	2	1	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	1	1	2	腹部症状改善のため
1	1	1	2	1	3	1	血糖値安定してきたため
1	1	1	2	1	1	6	抗菌薬投与
1	1	1	2	1	1	3	痰が多量のため
1	1	1	2	1	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	1	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	1	1	6	リハビリの疼痛管理
1	1	2	2	1	1	1	高アンモニアのため
1	1	1	2	1	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	1	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	1	1	1	K値低下のため
1	1	2	2	1	7	1	肝機能悪化のため
1	1	2	2	1	1	1	肝機能悪化のため
1	1	2	2	1	1	2	そう状態に対して
1	1	1	2	1	1	1	WBC,CRP高値のため
1	1	1	2	1	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	1	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	1	1	7	持参薬がないため
1	1	1	2	1	1	2	うっ血のため
1	1	1	2	1	2	1	脱水のため
1	1	1	2	1	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	1	1	1	K値低下のため
1	1	1	2	1	4	2	BP高値のため
1	1	1	2	1	1	2	edema+のため
1	1	1	2	1	6	1	脱水のため
1	1	1	2	1	2	1	脱水のため
1	1	1	2	1	1	1	鉄低値のため
1	1	1	2	1	6	7	Drの指示より
1	1	2	2	1	1	6	心不全に対し
1	1	1	2	1	1	7	Drの指示より
1	1	2	2	1	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	1	1	1	K値を下げるため
1	1	1	2	1	1	6	脳梗塞、てんかんの治療のため
1	1	2	2	1	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	1	1	6	肺炎に対して
1	1	1	2	1	1	1	尿酸値上昇のため
1	1	1	2	1	1	1	K値低下のため
1	1	1	2	1	1	1	CRP上昇に伴い、褥瘡感染の疑いのため
1	1	2	2	1	1	3	しびれのため
1	1	1	2	1	1	2	高血圧に対して
1	1	1	2	1	1	2	浮腫に対して
1	1	1	2	1	1	1	BSコントロールのため
1	1	1	2	1	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	1	1	2	不整脈があるため
1	1	1	2	1	2	2	浮腫見られないため
1	1	1	2	1	5	2	BP上昇のため
1	1	1	2	1	1	2	BP上昇のため
1	1	1	2	1	1	2	BP上昇のため
1	1	1	2	1	1	2	BP上昇のため
1	1	1	2	1	1	1	尿酸値上昇のため
1	1	1	2	1	1	1	BSコントロールのため
1	1	1	2	1	1	6	ope後血栓予防のため
1	1	2	2	1	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	1	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	1	1	6	呼吸状態改善目的
1	1	1	2	1	4	1	INR低下したため
1	1	1	2	1	1	6	肺気腫治療のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため

1	1	1	2	2	1	3	しびれのため
1	1	2	2	2	1	8	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	しびれのため
1	1	2	2	2	1	6	梗塞防止
1	1	2	2	2	1	1	コレステロール低下させ梗塞予防
1	1	2	2	2	1	1	UA高値の為
1	1	2	2	2	1	6	ope前処置
1	1	2	2	2	1	3	ロキソプロフェンが効かず追加希望
1	1	2	2	2	1	3	不眠
1	1	1	2	2	4	6	食事摂取可能になり再開
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	尿細菌(+++)のため
1	1	1	2	2	1	3	下痢のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養不十分のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ後の疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	Ptより痙(+)との訴えより
1	1	1	2	2	1	6	Divから内服に切り換え
1	1	1	2	2	1	4	肺切除より心臓への負担軽減
1	1	1	2	2	1	3	頭痛時治療の為
1	1	1	2	2	1	3	めまい改善の為
1	1	1	2	2	1	2	てんかん症状改善
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	3	認知症状がみられるため
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置
1	1	2	2	2	1	1	肝機能低下により処方
1	1	1	2	2	4	2	胃カメラより出血ないことが確認されたため
1	1	1	2	2	3	3	腹満があったため
1	1	1	2	2	1	6	腰部疼痛に対して
1	1	1	2	2	5	6	疼痛緩和目的のため
1	1	1	2	2	2	6	全身状態悪化のため
1	1	1	2	2	4	6	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	自己導尿のカテーテル洗浄のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	嘔吐
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール不十分のため
1	1	1	2	2	7	6	尿管が詰ったため定時へ
1	1	1	2	2	1	1	血液検査高値が続いていたため
1	1	1	2	2	1	1	Hb低下のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘、腹痛のため
1	1	1	2	2	1	3	手の痺みのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	ケモによる吐き気改善のため
1	1	1	2	2	1	2	結膜炎のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	BS, BPコントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	1	K低下のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	便中CD+
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	2	むくみ改善の為
1	1	1	2	2	1	6	心房細動による脳梗塞予防のため
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	2	6	意識障害みられるため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	2	2	じんましん悪化の為
1	1	1	2	2	1	2	吐き気、身体所見のうため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	アレルギー症状のため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	連れ訴えだため
1	1	1	2	2	1	1	尿中細菌(+++)のため
1	1	1	2	2	1	1	内視鏡にて胃潰瘍診断の為
1	1	1	2	2	1	6	検査前処置

1	1	1	2	2	5	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	4	6	状態安定のため
1	1	1	2	2	1	6	D i vから切り替え
1	1	1	2	2	1	6	D i vから切り替え
1	1	2	2	2	1	3	めまい治療のため
1	1	2	2	2	1	3	めまい治療のため
1	1	2	2	2	1	6	褥瘡防止のため
1	1	2	2	2	1	2	B P高値のため
1	1	2	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	2	2	2	5	2	B P高値のため
1	1	2	2	2	1	2	B P高値のため
1	1	2	2	2	3	1	クレアチニン上昇したため
1	1	2	2	2	1	3	めまい改善のため
1	1	1	2	2	2	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	6	肺炎改善のため
1	1	1	2	2	1	6	再発予防の為
1	1	1	2	2	1	2	降圧のため
1	1	1	2	2	1	3	瘦れ改善の為
1	1	2	2	2	1	3	腹部膨満改善のため
1	1	1	2	2	1	2	降圧のため
1	1	1	2	2	5	7	D rの指示により
1	1	1	2	2	1	6	肺炎のため
1	1	1	2	2	1	3	腹痛のため
1	1	2	2	2	1	6	感冒のため
1	1	2	2	2	1	6	D I Vより切り替えのため
1	1	1	2	2	3	7	D rの指示により
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	7	D rの指示により
1	1	1	2	2	1	2	降圧のため
1	1	1	2	2	1	2	降圧のため
1	1	1	2	2	1	2	降圧のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	呼吸苦時使用
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	解熱の為
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	2	2	2	3	3	下痢が続くため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	2	2	2	1	6	血栓予防の為
1	1	2	2	2	1	3	不眠改善の為
1	1	2	2	2	5	3	不穏状態改善されないため
1	1	1	2	2	1	6	吐気予防の為
1	1	1	2	2	1	6	吐気予防の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	D I Vより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	D i vからの切り替え
1	1	2	2	2	1	7	D rの指示により
1	1	2	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	3	体動により、痛みが強くなるため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	1	ヘルペスウイルス同定のため
1	1	2	2	2	1	6	D i vより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	B P高値のため
1	1	1	2	2	1	1	アシドーシス改善目的
1	1	1	2	2	1	2	血圧低下のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧が高いため
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	3	めまい改善の為
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	2	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	B P高値のため
1	1	1	2	2	2	2	イレウスのため
1	1	1	2	2	1	6	CFのための前処理
1	1	1	2	2	2	6	緊急O p eのため
1	1	1	2	2	4	6	状態安定のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	狭心症のため
1	1	1	2	2	1	2	A S Oの疑いのため

1	1	1	2	2	1	1	カリウム値高値のため
1	1	1	2	2	2	6	Divに切り替えたため
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	2	てんかん症状改善の為
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	1	Na値補正のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP値高値の為
1	1	1	2	2	1	1	CRP値高値の為
1	1	2	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	風邪気味のため
1	1	1	2	2	1	3	咳症状のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛改善の為
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	5	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	4	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	1	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	4	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	オベ後血栓防止のため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌+のため
1	1	1	2	2	2	5	食欲低下のため
1	1	1	2	2	6	5	食欲低下のため
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞防止のため
1	1	1	2	2	1	1	カリウム値高値の為
1	1	1	2	2	6	1	血圧安定の為
1	1	1	2	2	2	1	PT-INR値が高いため
1	1	1	2	2	1	6	嘔吐予防のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	腹部膨満のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘改善の為
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	オベ後管理のため
1	1	1	2	2	1	6	オベ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧高いため
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	1	6	血栓防止のため
1	1	1	2	2	2	6	Drの指示により
1	1	1	2	2	3	7	持参薬ないため
1	1	1	2	2	1	3	不眠改善の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	禁食のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	3	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	残尿感あるため
1	1	1	2	2	1	3	咽頭痛のため
1	1	1	2	2	1	2	イレウス改善のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	心嚙補給のため
1	1	1	2	2	1	3	腹痛のため
1	1	1	2	2	1	2	むくみ、胸水ひかないため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール

1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	血糖値コントロールの為
1	1	1	2	2	1	1	Na低値のため
1	1	1	2	2	2	4	PEG増設のため
1	1	1	2	2	1	1	BSコントロールのため
1	1	1	2	2	2	2	BP低下のため
1	1	1	2	2	1	3	頭痛のため
1	1	1	2	2	1	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	1	2	胸水コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	5	2	胸水コントロールのため
1	1	1	2	2	6	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	1	1	BS高値のため
1	1	1	2	2	2	1	クレアチニン、血清K、高値のため
1	1	1	2	2	6	2	血圧低下の為
1	1	1	2	2	2	1	腎機能低下の為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	心不全既往ある為
1	1	1	2	2	1	6	抗がん剤による悪心嘔吐予防の為
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	血栓予防の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	点滴抗生剤からの切り替え
1	1	1	2	2	7	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	肺炎治療の為
1	1	1	2	2	1	3	下痢のため
1	1	1	2	2	2	6	手術の為
1	1	1	2	2	4	6	手術後再開
1	1	1	2	2	1	1	尿培養検査細菌 (+)
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	6	尿混濁のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	6	手術のため
1	1	1	2	2	4	6	手術後再開
1	1	1	2	2	1	3	かゆみのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	6	手術前管理なし
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状改善の為
1	1	1	2	2	1	3	発熱のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	2	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留有
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	2	2	2	1	6	ope後のため
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	3	めまい改善の為
1	1	1	2	2	1	3	めまい改善の為
1	1	2	2	2	1	3	疼痛緩和の為
1	1	1	2	2	1	3	痺れ症状出現の為
1	1	1	2	2	1	3	左下肢に痛み出現するため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛緩和の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	2	Kt上昇のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱により
1	1	2	2	2	1	3	下痢症状の為
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	6	下肢チアノーゼ予防のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低値のため
1	1	1	2	2	4	1	血糖安定したため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム低値の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	下痢が続いているため

1	1	2	2	2	1	6	術後血栓予防の為
1	1	2	2	2	1	1	PT-INR低値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	3	吐気のため
1	1	1	2	2	1	3	吐気のため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状があったため
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状(+)のため
1	1	1	2	2	1	1	酸素飽和度低下の為
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	高血圧と喘息の治療のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	6	出血予防の為
1	1	1	2	2	1	2	高血圧の為
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	2	痙攣治療の為
1	1	1	2	2	1	4	内服不可能ため、外用剤で疼痛管理
1	1	1	2	2	1	3	吐き気十より
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	6	食事開始のため
1	1	1	2	2	1	3	胃部不快感改善目的
1	1	1	2	2	1	6	禁食のため
1	1	1	2	2	4	6	退院のため、中止薬を再開
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	血清ナトリウム値低値
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	レイノー症による、末梢動脈硬化改善のため
1	1	1	2	2	1	1	尿路感染症治療目的
1	1	1	2	2	1	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘に対して
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため追加
1	1	2	2	2	1	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	腹痛、便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	痛み十より
1	1	1	2	2	2	6	食事開始より
1	1	1	2	2	1	3	痛み十より
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	4	2	BP高値のため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値のため
1	1	1	2	2	1	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	6	ope後の疼痛緩和のため
1	1	1	2	2	1	3	患者の希望により
1	1	1	2	2	4	6	出血リスクに問題ないため
1	1	1	2	2	1	6	経腸栄養開始の為
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	6	化学療法の吐気の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	吐気が続くため
1	1	1	2	2	1	3	排尿痛あるため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧が高いため
1	1	1	2	2	1	2	血圧が高いため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	WBC,CRP上昇のため
1	1	2	2	2	1	6	胆石治療の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	1	電解質異常がみられるため
1	1	1	2	2	2	6	内服困難なため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため

1	1	1	2	2	2	6	経口投与困難なため
1	1	1	2	2	1	6	opeのため
1	1	1	2	2	1	3	味覚異常治療のため
1	1	1	2	2	1	3	冷え性治療のため
1	1	2	2	2	1	6	抗ウイルス療法
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	2	3	疼痛軽減のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱時服用
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	4	6	症状回復により
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	7	2	血圧安定したため頓用へ
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	2	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロール不良の為
1	1	1	2	2	2	6	全身状態悪化の為
1	1	1	2	2	1	3	痺れ感改善の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ後の疼痛緩和
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	経腸栄養へ移行
1	1	1	2	2	2	6	流動食開始のため中止
1	1	1	2	2	1	6	疼痛時頓用のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛緩和の為
1	1	1	2	2	1	2	腹水貯留あり、血圧高値のため
1	1	1	2	2	2	1	腎機能低下の為
1	1	1	2	2	2	2	意識レベル低下のため
1	1	1	2	2	1	6	経口投与不可のため
1	1	2	2	2	1	3	鎮痛の為
1	1	1	2	2	1	3	下痢の治療の為
1	1	1	2	2	1	1	検査の結果、骨密度低下が判明したため
1	1	1	2	2	2	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	6	化学療法時に予想される吐き気に対して
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置
1	1	1	2	2	1	2	咽頭炎の為
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置
1	1	1	2	2	2	6	ope後のため必要なし
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム低値のため
1	1	1	2	2	1	6	吐き気等の予防の為
1	1	1	2	2	1	6	経口栄養開始するため
1	1	1	2	2	2	6	流動食開始するため
1	1	1	2	2	1	6	経口栄養開始するため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	化学療法による吐き気に対して
1	1	1	2	2	3	6	ゾフランからの切り替え
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置
1	1	1	2	2	1	6	疼痛時の頓用の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	2	1	血糖値低下の為
1	1	1	2	2	1	5	インスリン療法へ切り替え
1	1	1	2	2	2	4	インスリン療法へ切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛の訴えがあるため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で菌+のため
1	1	1	2	2	1	2	骨粗鬆症治療
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	5	3	排便コントロールのため
1	1	1	2	2	6	3	下痢のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため

1	1	1	2	2	2	2	薬疹がでたため
1	1	1	2	2	1	2	胃出血の為
1	1	1	2	2	1	4	オメプラゾールで効果不十分の為
1	1	1	2	2	1	6	CFのための前処置
1	1	1	2	2	4	6	出血がみられなくなったため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	尿中細菌(+)のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールの為
1	1	1	2	2	4	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気の為
1	1	1	2	2	2	2	状態悪化のため
1	1	2	2	2	1	6	胸痛時の頓用として
1	1	1	2	2	1	2	誤嚥性肺炎のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP経度上昇のため
1	1	1	2	2	1	2	胸水(+)のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛緩和目的
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	不眠時頓用のため
1	1	1	2	2	1	3	めまい改善のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	6	4	高齢者で腎機能低下しているため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	2	2	2	1	3	疼痛管理のため
1	1	2	2	2	3	4	ロキソプロフェン用中に胃痛が発現したためセレコックスを
1	1	2	2	2	1	6	注射剤から同成分内服へ変更
1	1	2	2	2	6	1	血小板減少の為
1	1	2	2	2	1	6	利胆目的
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	1	6	術後疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	禁食のため
1	1	1	2	2	2	6	食事開始となるため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	吃逆に対して
1	1	1	2	2	1	1	肝機能改善の為
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	1	Na低値のため
1	1	1	2	2	5	1	INR低値のため
1	1	1	2	2	1	6	パーキンソン様症状発現のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	5	1	Na低値のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	利胆目的
1	1	2	2	2	1	6	経腸栄養管理とするため
1	1	2	2	2	1	4	整腸剤
1	1	2	2	2	2	6	食事開始により
1	1	2	2	2	1	6	胃炎治療により
1	1	2	2	2	1	6	ope前処置として
1	1	1	2	2	1	6	発熱時頓用
1	1	1	2	2	1	2	食事開始に伴う下痢症状のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	疼痛緩和目的
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	3	頭痛時頓用
1	1	2	2	2	1	3	本人の希望により
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	7	7	不明
1	1	1	2	2	1	1	浮腫(++),カリウム低下、血圧高値のため
1	1	1	2	2	2	7	不明

1	1	1	2	2	1	2	消化管蠕動亢進のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養補給のため
1	1	1	2	2	1	3	痰が絡むため
1	1	2	2	2	1	6	心不全治療
1	1	2	2	2	1	6	心不全治療
1	1	2	2	2	6	2	血圧低下の為
1	1	1	2	2	1	6	血栓防止の為
1	1	1	2	2	4	6	入院前より中止していたため再開
1	1	1	2	2	1	1	クロストリジウム陽性のため
1	1	1	2	2	2	6	敗血症により内服不可
1	1	1	2	2	1	1	酸素飽和度低下の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	体温37℃、CRP0.38で改善なしの為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞治療の為
1	1	1	2	2	1	6	発作抑制の為
1	1	1	2	2	1	6	耳鼻科ドクターの指示
1	1	1	2	2	1	3	患者の希望により
1	1	1	2	2	1	6	梗塞が見つかったため
1	1	1	2	2	1	3	しびれ改善のため
1	1	1	2	2	1	6	経管栄養療法はじまるため
1	1	1	2	2	1	1	Hb低下のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	消化器症状改善のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	opeのための前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	2	2	2	1	6	鎮痛のため
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	2	6	内服から注射に切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	痙攣治療の為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	発熱治療の為
1	1	1	2	2	1	2	舌炎治療の為
1	1	1	2	2	1	1	真菌治療
1	1	2	2	2	1	6	呼吸状態悪化のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	5	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛緩和の為
1	1	1	2	2	1	2	浮腫治療
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低値のため
1	1	1	2	2	4	6	出血が見られなくなったため再開
1	1	1	2	2	1	1	尿酸値高値のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫改善のため
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留のため
1	1	1	2	2	1	4	サムス力による口渇のため
1	1	1	2	2	1	3	胃部不快感の緩和のため
1	1	1	2	2	1	6	ope後疼痛緩和のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛緩和
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	経鼻管挿入、内服中止
1	1	1	2	2	1	2	消化不良改善のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	6	状態よくなったため
1	1	1	2	2	5	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	2	2	誤嚥性肺炎の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	6	食事開始したため
1	1	2	2	2	1	2	薬疹(+)のため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向
1	1	1	2	2	1	6	CF前処置
1	1	1	2	2	1	2	逆流性食道炎のため
1	1	1	2	2	1	6	化学療法による吐き気の為
1	1	1	2	2	1	6	吐き気予防

1	1	1	2	2	1	3	ふらつき防止のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	7	3	疼痛治まってきたため
1	1	1	2	2	1	6	骨粗鬆症治療
1	1	1	2	2	3	7	転院先でフォルテオを施行できないため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	1	3	整腸のため
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	1	2	解熱のため
1	1	1	2	2	1	6	感染症治療の為
1	1	2	2	2	1	3	咳痰治療のため
1	1	1	2	2	1	6	偽膜性腸炎疑われるため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	1	血糖低下のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	opeのため内服止め指示のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	創傷感染予防のため
1	1	2	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	リウマチによる関節痛
1	1	2	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	尿路感染症
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	消化管機能改善のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養状態改善の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	2	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	2	4	味覚異常の原因と推測されるため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	2	2	2	1	3	軟便のため
1	1	2	2	2	1	3	軟便のため
1	1	2	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	7	不明
1	1	2	2	2	1	7	不明
1	1	2	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	2	2	2	1	2	皮膚炎のため
1	1	2	2	2	1	2	吐血の為
1	1	1	2	2	2	1	腎機能低下のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値の為
1	1	1	2	2	1	3	めまいの為
1	1	2	2	2	1	6	梗塞予防のため
1	1	1	2	2	3	4	プレタルで頭痛の副作用のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	2	带状疱疹のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	偏頭痛の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールの為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	不明
1	1	1	2	2	1	2	誤嚥性肺炎のため
1	1	2	2	2	1	6	肺炎治療の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処置
1	1	1	2	2	2	2	寝ているため

1	1	1	2	2	1	6	オベ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能低下のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	2	尿の混濁が見られたため
1	1	1	2	2	1	1	低ナトリウム血症のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	4	プラザキサ服用中のため
1	1	1	2	2	2	1	血糖低下が見られたため
1	1	1	2	2	2	1	血糖上昇が見られたため
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防
1	1	1	2	2	1	6	ステロイド性胃潰瘍予防の為
1	1	1	2	2	1	1	コレステロール値高いため
1	1	1	2	2	2	2	内服困難の為
1	1	1	2	2	5	2	胸水コントロールのため
1	1	1	2	2	2	1	血清カリウム低値のため
1	1	1	2	2	4	6	イレウス改善の為
1	1	1	2	2	1	6	消化管機能改善の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	6	オベ前処置
1	1	1	2	2	1	6	発作性上室性頻脈のため
1	1	1	2	2	2	1	肝機能回復したため
1	1	1	2	2	1	1	尿細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	6	術前処置
1	1	1	2	2	2	2	吐血のため
1	1	1	2	2	4	6	状態改善の為
1	1	1	2	2	2	1	尿酸値低下の為
1	1	1	2	2	4	6	状態改善のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫のため
1	1	1	2	2	5	2	浮腫のため
1	1	1	2	2	1	2	浮腫のため
1	1	1	2	2	1	1	低カリウムのため
1	1	1	2	2	1	6	結核治療の為
1	1	1	2	2	1	6	副作用回避のため
1	1	1	2	2	1	6	結核治療の為
1	1	1	2	2	2	4	食欲不振の副作用の為
1	1	1	2	2	2	6	肝障害の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状完全の為
1	1	1	2	2	2	4	投与開始2ヶ月となるため
1	1	1	2	2	2	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	6	状態回復してきたため
1	1	1	2	2	1	1	高血糖状態の為
1	1	1	2	2	6	1	血糖安定してきたため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	胸水増加傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	栄養剤開始
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	下肢浮腫のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠改善の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠改善の為
1	1	1	2	2	1	3	痺れの為
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向の為
1	1	1	2	2	2	2	HD時、血圧低下するため
1	1	1	2	2	1	1	血清Na値定値の為
1	1	1	2	2	5	1	血清Na値改善みられないため
1	1	1	2	2	3	6	心原性C1予防のため
1	1	1	2	2	1	2	心拍数上昇のため
1	1	1	2	2	3	2	心拍数低下したため
1	1	1	2	2	2	1	INR：5.4と高値のため
1	1	1	2	2	4	1	INR：1.26に低下したため
1	1	1	2	2	2	4	ジゴキシン中毒の可能性あり
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	6	1	INR高値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛緩和目的
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オベ後、血栓防止のため

1	1	1	2	2	1	3	不眠を訴えるため
1	1	1	2	2	2	6	術後状態が安定して、動けるようになってきたため
1	1	1	2	2	1	2	発熱しているため
1	1	2	2	2	1	1	血清鉄低下
1	1	1	2	2	1	6	肺梗塞のため
1	1	1	2	2	1	2	薬疹のため
1	1	1	2	2	1	6	肺塞栓症のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	3	頭痛のため
1	1	2	2	2	1	6	術後経腸栄養
1	1	1	2	2	1	6	ピオスリーからの切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	術後経腸栄養
1	1	1	2	2	1	3	腹痛のため
1	1	1	2	2	1	6	潰瘍性腸炎疑いの為
1	1	1	2	2	1	1	低ナトリウム傾向のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	5	1	血清ナトリウム低値の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	経腸栄養管理のため
1	1	1	2	2	4	6	血栓防止のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	嘔吐、下痢のため
1	1	2	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	感染症治療のため
1	1	1	2	2	1	3	咳が出るため
1	1	1	2	2	1	2	発熱の為
1	1	1	2	2	1	1	骨密度改善のため
1	1	1	2	2	1	2	尿混濁（+）のため
1	1	1	2	2	2	6	経口薬投与不可の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	腎盂腎炎のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	発熱しているため
1	1	1	2	2	2	2	誤嚥のため
1	1	1	2	2	1	2	発熱の為
1	1	1	2	2	1	6	抗がん剤吐き気の為
1	1	1	2	2	1	3	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	2	3	めまい強いため中止
1	1	1	2	2	4	3	中止後、幻覚症状再発のため
1	1	1	2	2	1	1	尿より、細菌検出されたため
1	1	1	2	2	1	3	呼吸苦改善目的
1	1	1	2	2	1	3	膝痛、腰痛あるため
1	1	1	2	2	1	2	痰が多いため
1	1	1	2	2	1	2	胃腸障害防止の為
1	1	1	2	2	1	2	痙攣のため
1	1	1	2	2	7	5	傾眠傾向により夕食後に変更
1	1	1	2	2	1	3	便通管理の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	2	2	2	1	3	下痢の為
1	1	2	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	3	頭痛の為
1	1	1	2	2	4	6	全身状態安定の為
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	オパ前処置
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	3	下痢症状続いているため
1	1	2	2	2	1	2	扁桃腺の腫れにより
1	1	2	2	2	1	3	頭痛改善の為
1	1	2	2	2	1	3	痰のため
1	1	2	2	2	1	6	梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	1	血清カリウム値低下のため
1	1	2	2	2	1	1	ヘモグロビン値低下のため
1	1	2	2	2	3	4	プレタルで頭痛の副作用の為
1	1	2	2	2	5	1	血清カリウム値低下のため
1	1	1	2	2	1	2	てんかん症状発現の為
1	1	1	2	2	2	1	INR値高値の為
1	1	1	2	2	6	1	血中バルプロ酸高値の為

1	1	1	2	2	1	6	利尿目的
1	1	1	2	2	1	6	胃酸分泌亢進のため
1	1	1	2	2	1	6	胃酸分泌亢進のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	1	ヘモグロビン低値の為
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	4	6	PEG増設のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下の為
1	1	1	2	2	4	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	5	1	ヘモグロビン低地の為、血清ナトリウム低地の為
1	1	1	2	2	1	6	オベ前処置
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	4	6	オベ後再開のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オベ前処置
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	胆摘オベ後の胆汁うっ滞改善のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	5	食事開始と同時に服用開始
1	1	1	2	2	2	1	I NR値：3.02と高値のため
1	1	1	2	2	4	1	I NR値：1.85と低下したため
1	1	1	2	2	1	6	期外収縮出現の為
1	1	1	2	2	1	2	体動（硬縮）改善
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防の為
1	1	1	2	2	2	2	脈拍低下の為
1	1	1	2	2	2	1	I NR値：4.19と高値の為
1	1	1	2	2	4	1	I NR値：1.46と低下の為
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	血糖値コントロールのため
1	1	1	2	2	3	1	腎機能悪化の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖値コントロールのため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	1	腎機能悪化の為
1	1	1	2	2	2	1	血糖値低下の為
1	1	1	2	2	4	6	PEG延期のため
1	1	1	2	2	4	2	血圧上昇の為
1	1	1	2	2	1	1	血清ナトリウム低下の為
1	1	1	2	2	5	1	I NR値：1.27と低地の為
1	1	1	2	2	2	1	BS高値のため
1	1	1	2	2	6	1	血糖コントロールの為
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留の為
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値の為
1	1	1	2	2	2	6	D I C発症の為
1	1	1	2	2	1	1	総コレステロール高値の為
1	1	1	2	2	1	1	低カリウム血症の為
1	1	1	2	2	1	7	持参薬から切り替え
1	1	1	2	2	1	1	K低値のため
1	1	1	2	2	1	2	胸水貯留のため
1	1	1	2	2	2	6	経口困難のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	2	胸水改善のため
1	1	1	2	2	6	1	脱水傾向のため
1	1	1	2	2	1	6	イレウスのため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	6	イレウスのため
1	1	1	2	2	1	6	消化管動かすため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	6	炎症性腸疾患
1	1	1	2	2	1	2	解熱目的
1	1	1	2	2	1	2	蕁麻疹十より
1	1	1	2	2	1	3	便秘改善
1	1	1	2	2	1	3	便秘改善
1	1	1	2	2	1	3	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化の為
1	1	1	2	2	2	2	利尿作用が強く発現しているため
1	1	1	2	2	1	6	内視鏡術後
1	1	2	2	2	1	6	ERCP後の疼痛管理
1	1	2	2	2	1	4	ロキソプロフェンでの胃腸障害予防
1	1	1	2	2	1	6	慢性肝炎のため
1	1	1	2	2	1	1	Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため

1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	腹部症状改善の為
1	1	1	2	2	1	3	痰除去
1	1	1	2	2	1	6	疼痛、発熱コントロールのため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	2	風邪のため
1	1	1	2	2	6	6	ステロイド減量
1	1	1	2	2	1	3	OABと不眠のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	2	てんかんのため
1	1	1	2	2	1	6	心不全のため
1	1	1	2	2	1	1	RBC、Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	4	6	オペ後のため
1	1	1	2	2	1	4	胃腸炎
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠状態の為
1	1	2	2	2	1	6	うっ血性心不全治療
1	1	2	2	2	6	2	血圧低下の為
1	1	2	2	2	1	4	禁食のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防
1	1	1	2	2	1	6	入院前服用薬のうち、必要と判断
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	6	CF前処置
1	1	1	2	2	1	1	CD (+) のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	嘔気のため
1	1	1	2	2	2	3	血痰 (+) のため
1	1	1	2	2	1	6	止血効果の為
1	1	1	2	2	1	3	嘔気のため
1	1	1	2	2	4	3	血痰消失したため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	2	止血確認の為、
1	1	1	2	2	1	6	胆のう炎のため
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	2	7	Dr の指示により
1	1	1	2	2	1	6	逆流性食道炎
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	ステロイドによる骨量低下予防
1	1	1	2	2	1	6	感染治療のため
1	1	1	2	2	2	1	血糖値低下の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	1	PT-INR高値のため
1	1	1	2	2	4	1	PT-INR安定したため
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	4	1	状態回復、血清カリウム低下、Hb低下の為
1	1	1	2	2	5	1	PT-INR低値のため
1	1	2	2	2	1	6	耳鳴り、難聴改善目的
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値につき
1	1	1	2	2	4	6	術後止血確認
1	1	1	2	2	1	3	整腸のため
1	1	1	2	2	1	6	多発性脳梗塞のため
1	1	1	2	2	2	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	2	2	血圧低値の為
1	1	1	2	2	5	1	INR低値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	3	癌性疼痛のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	3	3	疼痛緩和の為セシロックス→トラムセット
1	1	1	2	2	3	6	トラムセットで精神症状現れたため
1	1	1	2	2	2	6	効果が表れていないと判断したため
1	1	1	2	2	1	6	精神症状緩和の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	1	3	持続する痛みあり
1	1	1	2	2	1	3	脚の痛み緩和のため
1	1	1	2	2	5	3	疼痛が激しいため
1	1	1	2	2	2	2	血圧低いため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	胃痛の為

1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	6	糖尿病改善の為
1	1	2	2	2	2	7	医師の指示
1	1	2	2	2	2	6	痙攣発作が消失したため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム高値のため
1	1	1	2	2	5	1	血清カリウム高値のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	胃部不快感
1	1	1	2	2	1	6	前立腺癌
1	1	1	2	2	1	2	体温上昇のため
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置のため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	6	1	INR：2.62のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	5	1	INR0.98のため
1	1	2	2	2	1	3	便秘の為
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	不眠のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	6	食事開始となったため
1	1	2	2	2	1	1	PT-INR管理
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR低値のため
1	1	2	2	2	1	1	肝機能悪化の為
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR低値のため
1	1	2	2	2	6	1	PT-INR高値のため
1	1	2	2	2	6	1	PT-INR管理
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR管理
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR管理
1	1	2	2	2	5	1	PT-INR管理
1	1	1	2	2	1	2	てんかんのため
1	1	1	2	2	1	6	MRSA根治のため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	5	1	PT-INRのため
1	1	1	2	2	3	4	INR上昇せず、効果不良の為
1	1	1	2	2	1	1	Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	4	6	状態安定のため
1	1	1	2	2	1	1	尿細菌+のため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気の為
1	1	1	2	2	1	6	ope前処置として
1	1	1	2	2	1	3	便通コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	流動食開始の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	6	腸管運動改善
1	1	1	2	2	2	5	本人より飲みづらさ訴え
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	2	薬疹の治療
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	血清ナトリウム低値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	5	1	血清ナトリウム低値の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値のため
1	1	1	2	2	5	1	血糖値高値のため
1	1	1	2	2	6	1	血清ナトリウム高値のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	6	術後不整脈出現したため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	2	3	胃部不快感消失のため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防、疼痛管理
1	1	1	2	2	1	1	尿路感染症+のため
1	1	2	2	2	1	6	ウイルス治療、神経症状改善
1	1	1	2	2	1	3	術後疼痛管理

1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため(130-170/60-90)
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	5	3	便秘が続くため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気のため
1	1	1	2	2	6	3	吐き気の訴えないため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	2	2	2	1	6	術後栄養管理
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	風邪のため
1	1	1	2	2	2	6	風邪症状なくなったため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧が高いため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	2	呼吸苦の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	4	6	状態回復の為
1	1	1	2	2	2	2	呼吸状態改善の為
1	1	1	2	2	1	1	鉄欠乏性貧血の為
1	1	1	2	2	1	3	呼吸状態改善目的
1	1	1	2	2	1	2	呼吸状態改善目的
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	2	1	CRP改善しないため
1	1	1	2	2	1	1	甲状腺機能低下のため
1	1	1	2	2	2	1	脱水傾向
1	1	2	2	2	2	2	CFのため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	認知症状みられるため
1	1	2	2	2	1	1	ヘモグロビン低値の為
1	1	2	2	2	1	1	肝機能数値以上
1	1	2	2	2	2	6	経口不可となったため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	2	2	2	1	2	腹水、腹膜炎疑い
1	1	2	2	2	3	7	ENT薬としてピオフェルミンRから変更
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防の為
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	2	出血症状に対して
1	1	1	2	2	1	6	難治性の逆流性食道炎として処方
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	2	2	2	1	1	高TGのため
1	1	1	2	2	1	1	低カルシウム血症の為
1	1	1	2	2	1	3	下痢の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	CDトキシシン(+)のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	胃部不快感のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	尿懸濁のため
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	2	術後低血圧の為
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	5	1	INR1.19のため増量
1	1	1	2	2	4	6	狭心症既往ある為
1	1	1	2	2	6	1	INR2.03のため減量
1	1	1	2	2	1	3	不眠症のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	5	6	心筋細動と診断の為
1	1	1	2	2	1	7	胸痛訴えに対し、精神面からフォローするため
1	1	1	2	2	1	6	心筋細動と診断の為
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値で再梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	1	TG高値のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	3	7	Drの指示により

1	1	1	2	2	5	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	2	認知症進行の為
1	1	1	2	2	2	7	家族からの申し出により
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	骨粗鬆症治療
1	1	1	2	2	1	1	高血糖のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	7	6	寝れずに、連日服用しているため
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	胆石治療の為
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化
1	1	1	2	2	2	6	状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示より
1	1	1	2	2	2	2	下痢症状あり、状態悪化のため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	2	2	吐血のため
1	1	1	2	2	1	6	冠攣縮予防目的
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	2	不穏のため
1	1	1	2	2	1	2	高血圧のため
1	1	1	2	2	1	2	高血圧のため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能数値悪化の為
1	1	1	2	2	2	2	上部消化管穿孔の為
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理の為
1	1	1	2	2	3	6	骨粗鬆症治療の為
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	3	めまい、耳鳴りの為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替えのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	7	3	頻尿で夜間トイレが心配なため、頓用へ
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	1	3	頻尿のため
1	1	1	2	2	3	4	効果不十分のため変更
1	1	1	2	2	1	1	細菌感染に対して
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	1	貧血のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	5	1	Hb低値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	2	1	3	下痢のため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	鉄低値のため
1	1	1	2	2	1	2	感冒症状のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	夜間不穏症状あるため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	1	血清カリウム低地のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	6	1	低血糖の為
1	1	1	2	2	2	1	肝機能低下のため
1	1	1	2	2	1	1	低血糖の為
1	1	1	2	2	2	1	カリウム高値のため
1	1	1	2	2	1	1	CRP上昇のため
1	1	1	2	2	2	6	状態安定のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛緩和のため

1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	1	尿検査細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	6	術後栄養のため
1	1	1	2	2	2	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	1	高血糖のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	2	下痢のため
1	1	2	2	2	1	1	肝機能低下により
1	1	1	2	2	4	6	オペ終了のため
1	1	1	2	2	1	6	慢性硬膜下血腫のため
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状に対して
1	1	1	2	2	6	2	効果強かったため、半錠に減量
1	1	1	2	2	1	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	術後疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	2	6	手術を行えなかったため
1	1	1	2	2	1	6	術後感染予防のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	ステロイドに対する副作用対策
1	1	1	2	2	1	1	A1C:高値のため
1	1	1	2	2	1	2	高血圧のため
1	1	1	2	2	1	1	高血糖の為
1	1	1	2	2	1	6	脳出血予防のため
1	1	1	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	6	経腸栄養開始
1	1	1	2	2	1	3	不眠の為
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	2	6	Drの指示により
1	1	1	2	2	4	6	状態回復の為
1	1	1	2	2	1	2	食欲不振
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧コントロールのため
1	1	1	2	2	2	2	血圧変動が不安定なため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	2	1	6	肝硬変の治療
1	1	2	2	2	1	3	不眠のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	2	痰が強いため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	不眠症状
1	1	1	2	2	1	6	オペ後疼痛改善のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	3	下肢冷感強いため
1	1	2	2	2	1	6	解熱の為
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	肝機能低下の為
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	4	胸痛時の発作寛解のため
1	1	1	2	2	1	3	両脚疼痛のため
1	1	1	2	2	1	3	吐き気の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	7	1	血糖低値のため
1	1	1	2	2	2	1	低血糖発現のため
1	1	1	2	2	6	1	低血糖発現のため
1	1	1	2	2	2	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	3	2	不穏が強いため
1	1	1	2	2	1	3	不眠傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	血栓防止の為
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌陽性のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	2	6	手術後、動けるようになったため
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	2	7	不明
1	1	1	2	2	1	6	急性胃腸炎のため

1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	1	6	てんかん発作の為
1	1	1	2	2	1	1	肝機能悪化のため
1	1	1	2	2	2	2	発熱のため
1	1	1	2	2	1	6	結石破砕のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	1	2	風邪のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	栄養状態改善の為
1	1	1	2	2	6	2	血圧低下、尿量保持されているため
1	1	1	2	2	1	6	栄養状態改善の為
1	1	1	2	2	2	1	脱水傾向のため
1	1	1	2	2	6	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	糖尿病治療のため
1	1	1	2	2	1	6	冠動脈CTのため
1	1	1	2	2	1	6	大腸検査のため
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	2	2	2	1	3	疼痛コントロール
1	1	2	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	1	6	再梗塞予防の為
1	1	1	2	2	2	2	血圧低値のため
1	1	1	2	2	6	1	低血糖発現のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロール
1	1	1	2	2	1	6	ESWLの約束処方
1	1	1	2	2	1	1	高血糖
1	1	1	2	2	1	2	入院時より血圧高値の為
1	1	1	2	2	3	2	血圧コントロールのため
1	1	1	2	2	3	7	医師の指示
1	1	1	2	2	6	1	血糖低値が続いているため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	3	不眠傾向の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	吐き気予防
1	1	1	2	2	2	6	肺炎にて内服不可
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	1	総コレステロール値高値のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理のため
1	1	1	2	2	1	1	K低下のため
1	1	1	2	2	2	2	出血のため
1	1	1	2	2	1	6	梗塞予防の為
1	1	2	2	2	1	3	疼痛管理のため
1	1	2	2	2	7	3	不眠のため
1	1	2	2	2	1	3	下痢のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査で細菌陽性のため
1	1	1	2	2	3	6	発熱のためDivへ切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	1	尿検査より最近陽性のため
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	導尿の消毒のため
1	1	1	2	2	4	1	血糖高値のため
1	1	1	2	2	4	7	医師の指示
1	1	1	2	2	1	6	手術前処置
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	6	経管栄養開始の為
1	1	1	2	2	2	6	食事開始により
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	胃痛のため
1	1	1	2	2	1	6	食事開始により
1	1	1	2	2	1	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	便秘の為
1	1	1	2	2	1	6	吐き気予防の為
1	1	1	2	2	1	2	風邪気味のため
1	1	1	2	2	1	6	ケモの吐き気予防のため
1	1	1	2	2	1	3	疼痛管理

1	1	1	2	2	1	6	ESWL後の約束処方
1	1	2	2	2	1	2	発熱の為
1	1	2	2	2	1	5	カロナールシロップ服用不可のため
1	1	1	2	2	1	6	内視鏡検査後
1	1	2	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	胃痛
1	1	1	2	2	1	6	骨密度増加目的
1	1	1	2	2	1	2	呼吸改善のため
1	1	1	2	2	1	3	痰が絡むため
1	1	1	2	2	5	4	治療用量まで増量
1	1	1	2	2	1	6	ent処方
1	1	1	2	2	1	6	オペ前の処置として
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	2	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	6	疼痛コントロールのため
1	1	2	2	2	1	1	肝機能悪化
1	1	1	2	2	1	3	頭痛のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	3	腹痛のため
1	1	1	2	2	1	6	狭心症管理
1	1	1	2	2	1	2	腹水と血圧高値
1	1	1	2	2	1	3	掻痒感
1	1	1	2	2	6	2	浮腫改善により減量
1	1	1	2	2	5	1	血清Ca高値の為
1	1	1	2	2	2	1	血清Na低値の為
1	1	1	2	2	1	1	血清Na低値の為
1	1	1	2	2	2	1	血清Na改善の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	胸痛発作管理のため
1	1	1	2	2	2	7	Drの指示により
1	1	1	2	2	1	3	便秘のため
1	1	1	2	2	1	6	内視鏡にて胃炎が見られたため
1	1	1	2	2	1	6	オペ前処方
1	1	1	2	2	1	6	経管栄養開始の為
1	1	2	2	2	1	2	整腸のため
1	1	1	2	2	1	6	主病に対して
1	1	1	2	2	1	6	術後血栓予防
1	1	1	2	2	1	3	めまい
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	1	血糖値高値の為
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	6	骨密度増加効果
1	1	1	2	2	2	5	散剤内服困難
1	1	1	2	2	1	6	疼痛管理
1	1	1	2	2	1	2	腹部、背部に湿疹あるため
1	1	1	2	2	1	6	注射での薬疹治療
1	1	1	2	2	1	6	Divから切り替え
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値の為
1	1	1	2	2	2	2	血圧低下傾向のため
1	1	2	2	2	1	1	甲状腺ホルモン低下
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	1	2	血圧高値のため
1	1	1	2	2	5	6	利尿効果不十分の為
1	1	1	2	2	1	6	脳梗塞治療
1	1	1	2	2	1	2	解熱のため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	1	6	Divより切り替え
1	1	1	2	2	1	1	真菌(+)のため
1	1	1	2	2	1	3	めまいのため
1	1	1	2	2	2	1	血清K上昇みられるため
1	1	1	2	2	3	6	インスリン注からの切り替え
1	1	1	2	2	1	1	高カリウム血症のため
1	1	1	2	2	1	1	高尿酸のため
1	1	1	2	2	1	3	頻尿の為
1	1	1	2	2	3	1	血糖低下がみられるため
1	1	1	2	2	5	3	便秘症状のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖コントロールのため
1	1	1	2	2	1	1	甲状腺機能亢進のため
1	1	1	2	2	1	1	血糖値管理の為