

表14. 居住地別にみた飲酒・喫煙状況 (n=3076)

	居住地											
	北海道		東北		関東		北陸		東山		東海	
	n=131	n=250	n=948	n=154	n=150	n=328	n	(%)	n	(%)	n	(%)
生涯飲酒経験												
なし	4	(3.1)	20	(8.0)	68	(7.2)	6	(3.9)	9	(6.0)	15	(4.6)
あり	127	(96.9)	230	(92.0)	880	(92.8)	148	(96.1)	141	(94.0)	313	(95.4)
初飲酒年齢												
飲酒経験無し	4	(3.1)	20	(8.0)	65	(6.9)	6	(3.9)	9	(6.0)	15	(4.6)
9歳か、それ以前	8	(6.1)	7	(2.8)	46	(4.9)	4	(2.6)	8	(5.3)	9	(2.7)
10～11歳	3	(2.3)	2	(.8)	17	(1.8)	4	(2.6)	4	(2.7)	7	(2.1)
12～13歳	6	(4.6)	2	(.8)	26	(2.7)	4	(2.6)	4	(2.7)	11	(3.4)
14～15歳	16	(12.2)	10	(4.0)	46	(4.9)	12	(7.8)	7	(4.7)	24	(7.3)
16～17歳	23	(17.6)	33	(13.2)	138	(14.6)	19	(12.3)	13	(8.7)	40	(12.2)
18～19歳	40	(30.5)	79	(31.6)	316	(33.3)	55	(35.7)	44	(29.3)	95	(29.0)
20歳以降	30	(22.9)	96	(38.4)	289	(30.5)	49	(31.8)	61	(40.7)	123	(37.5)
年齢不明	1	(.8)	1	(.4)	2	(.2)	1	(.6)	0	(.0)	4	(1.2)
習慣的飲酒開始年齢												
飲酒経験無し	4	(3.1)	19	(7.6)	66	(7.0)	6	(3.9)	8	(5.3)	15	(4.6)
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
10～11歳	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
12～13歳	1	(.8)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
14～15歳	1	(.8)	1	(.4)	2	(.2)	1	(.6)	0	(.0)	4	(1.2)
16～17歳	5	(3.8)	7	(2.8)	26	(2.7)	3	(1.9)	1	(.7)	6	(1.8)
18～19歳	26	(19.8)	47	(18.8)	156	(16.5)	28	(18.2)	24	(16.0)	64	(19.5)
20歳以降	83	(63.4)	163	(65.2)	622	(65.6)	103	(66.9)	104	(69.3)	204	(62.2)
年齢不明	11	(8.4)	12	(4.8)	74	(7.8)	13	(8.4)	12	(8.0)	35	(10.7)
過去1年飲酒経験												
なし	19	(14.5)	57	(22.8)	177	(18.7)	21	(13.6)	29	(19.3)	72	(22.0)
あり	111	(84.7)	193	(77.2)	771	(81.3)	133	(86.4)	120	(80.0)	256	(78.0)
過去30日間飲酒日数												
0日	41	(31.3)	87	(34.8)	286	(30.2)	48	(31.2)	53	(35.3)	107	(32.6)
1～2日	20	(15.3)	49	(19.6)	164	(17.3)	26	(16.9)	25	(16.7)	65	(19.8)
3～5日	17	(13.0)	22	(8.8)	130	(13.7)	9	(5.8)	15	(10.0)	35	(10.7)
6～9日	15	(11.5)	6	(2.4)	73	(7.7)	10	(6.5)	12	(8.0)	23	(7.0)
10～19日	12	(9.2)	19	(7.6)	88	(9.3)	10	(6.5)	12	(8.0)	23	(7.0)
20～29日	17	(13.0)	32	(12.8)	104	(11.0)	24	(15.6)	19	(12.7)	38	(11.6)
毎日	8	(6.1)	35	(14.0)	102	(10.8)	27	(17.5)	13	(8.7)	37	(11.3)
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
生涯喫煙経験												
なし	28	(21.4)	102	(40.8)	372	(39.2)	51	(33.1)	67		140	(42.7)
あり	102	(77.9)	148	(59.2)	575	(60.7)	103	(66.9)	83	(55.3)	188	(57.3)
初喫煙年齢												
喫煙経験無し	26	(19.8)	99	(39.6)	364	(38.4)	51	(33.1)	64	(42.7)	136	(41.5)
9歳か、それ以前	1	(.8)	1	(.4)	9	(.9)	0	(.0)	2	(1.3)	0	(.0)
10～11歳	0	(.0)	5	(2.0)	4	(.4)	0	(.0)	2	(1.3)	4	(1.2)
12～13歳	4	(3.1)	5	(2.0)	19	(2.0)	5	(3.2)	1	(.7)	8	(2.4)
14～15歳	13	(9.9)	12	(4.8)	54	(5.7)	7	(4.5)	7	(4.7)	23	(7.0)
16～17歳	16	(12.2)	29	(11.6)	114	(12.0)	22	(14.3)	11	(7.3)	36	(11.0)
18～19歳	31	(23.7)	47	(18.8)	162	(17.1)	23	(14.9)	31	(20.7)	52	(15.9)
20歳以降	37	(28.2)	49	(19.6)	209	(22.0)	44	(28.6)	28	(18.7)	65	(19.8)
年齢不明	0	(.0)	0	(.0)	4	(.4)	2	(1.3)	1	(.7)	0	(.0)
習慣的喫煙開始年齢												
喫煙経験無し	26	(19.8)	98	(39.2)	364	(38.4)	50	(32.5)	64	(42.7)	137	(41.8)
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
10～11歳	0	(.0)	1	(.4)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
12～13歳	0	(.0)	0	(.0)	3	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)
14～15歳	4	(3.1)	6	(2.4)	19	(2.0)	4	(2.6)	3	(2.0)	4	(1.2)
16～17歳	4	(3.1)	14	(5.6)	57	(6.0)	11	(7.1)	4	(2.7)	21	(6.4)
18～19歳	24	(18.3)	36	(14.4)	127	(13.4)	23	(14.9)	24	(16.0)	43	(13.1)
20歳以降	44	(33.6)	64	(25.6)	249	(26.3)	45	(29.2)	33	(22.0)	81	(24.7)
年齢不明	26	(19.8)	27	(10.8)	118	(12.4)	20	(13.0)	19	(12.7)	37	(11.3)
過去1年喫煙経験												
なし	82	(62.6)	175	(70.0)	694	(73.2)	109	(70.8)	116	(77.3)	238	(72.6)
あり	48	(36.6)	74	(29.6)	250	(26.4)	45	(29.2)	33	(22.0)	89	(27.1)
過去30日間喫煙日数												
0日	86	(65.6)	177	(70.8)	717	(75.6)	113	(73.4)	116	(77.3)	249	(75.9)
1～2日	1	(.8)	5	(2.0)	5	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)
3～5日	1	(.8)	2	(.8)	5	(.5)	1	(.6)	1	(.7)	1	(.3)
6～9日	1	(.8)	1	(.4)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)
10～19日	2	(1.5)	0	(.0)	8	(.8)	3	(1.9)	2	(1.3)	2	(.6)
20～29日	3	(2.3)	2	(.8)	9	(.9)	2	(1.3)	2	(1.3)	3	(.9)
毎日	36	(27.5)	61	(24.4)	197	(20.8)	35	(22.7)	27	(18.0)	68	(20.7)
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙までに行っていない者を含む

表14. 居住地別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076) 続き

	居住地										p-value		
	近畿		中国		四国		北九州		南九州			合計	
	n=442	n=191	n=88	n=229	n=165	n=3076	n	(%)	n	(%)		n	(%)
生涯飲酒経験													0.032
なし	27	(6.1)	20	(10.5)	1	(1.1)	20	(8.7)	14	(8.5)	204	(6.6)	
あり	415	(93.9)	171	(89.5)	87	(98.9)	209	(91.3)	151	(91.5)	2,872	(93.4)	
初飲酒年齢													0.001
飲酒経験無し	27	(6.1)	18	(9.4)	1	(1.1)	19	(8.3)	14	(8.5)	198	(6.4)	
9歳か、それ以前	24	(5.4)	6	(3.1)	1	(1.1)	16	(7.0)	4	(2.4)	133	(4.3)	
10～11歳	10	(2.3)	1	(.5)	3	(3.4)	8	(3.5)	2	(1.2)	61	(2.0)	
12～13歳	15	(3.4)	7	(3.7)	1	(1.1)	9	(3.9)	5	(3.0)	90	(2.9)	
14～15歳	20	(4.5)	11	(5.8)	8	(9.1)	8	(3.5)	11	(6.7)	173	(5.6)	
16～17歳	44	(10.0)	25	(13.1)	13	(14.8)	22	(9.6)	10	(6.1)	380	(12.4)	
18～19歳	128	(29.0)	48	(25.1)	23	(26.1)	71	(31.0)	52	(31.5)	951	(30.9)	
20歳以降	170	(38.5)	73	(38.2)	37	(42.0)	75	(32.8)	67	(40.6)	1,070	(34.8)	
年齢不明	4	(.9)	0	(.0)	1	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	14	(.5)	
習慣的飲酒開始年齢													0.050
飲酒経験無し	26	(5.9)	19	(9.9)	1	(1.1)	19	(8.3)	14	(8.5)	197	(6.4)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
10～11歳	2	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.6)	3	(.1)	
12～13歳	1	(.2)	0	(.0)	1	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
14～15歳	0	(.0)	2	(1.0)	0	(.0)	3	(1.3)	1	(.6)	15	(.5)	
16～17歳	7	(1.6)	2	(1.0)	2	(2.3)	1	(.4)	4	(2.4)	64	(2.1)	
18～19歳	68	(15.4)	20	(10.5)	18	(20.5)	45	(19.7)	23	(13.9)	519	(16.9)	
20歳以降	289	(65.4)	124	(64.9)	56	(63.6)	139	(60.7)	110	(66.7)	1,997	(64.9)	
年齢不明	48	(10.9)	23	(12.0)	10	(11.4)	21	(9.2)	12	(7.3)	271	(8.8)	
過去1年飲酒経験													0.072
なし	103	(23.3)	43	(22.5)	17	(19.3)	45	(19.7)	34	(20.6)	617	(20.1)	
あり	339	(76.7)	147	(77.0)	70	(79.5)	183	(79.9)	131	(79.4)	2,454	(79.8)	
過去30日間飲酒日数													0.171
0日	160	(36.2)	73	(38.2)	34	(38.6)	71	(31.0)	48	(29.1)	1,008	(32.8)	
1～2日	73	(16.5)	27	(14.1)	11	(12.5)	34	(14.8)	32	(19.4)	526	(17.1)	
3～5日	52	(11.8)	26	(13.6)	9	(10.2)	33	(14.4)	17	(10.3)	365	(11.9)	
6～9日	37	(8.4)	7	(3.7)	4	(4.5)	15	(6.6)	10	(6.1)	212	(6.9)	
10～19日	33	(7.5)	11	(5.8)	7	(8.0)	21	(9.2)	20	(12.1)	256	(8.3)	
20～29日	43	(9.7)	26	(13.6)	10	(11.4)	27	(11.8)	18	(10.9)	358	(11.6)	
毎日	43	(9.7)	20	(10.5)	13	(14.8)	26	(11.4)	20	(12.1)	344	(11.2)	
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
生涯喫煙経験													0.002
なし	196	(44.3)	83	(43.5)	29	(33.0)	94	(41.0)	74	(44.8)	1,236	(40.2)	
あり	246	(55.7)	108	(56.5)	59	(67.0)	135	(59.0)	91	(55.2)	1,838	(59.8)	
初喫煙年齢													0.136
喫煙経験無し	190	(43.0)	81	(42.4)	28	(31.8)	91	(39.7)	74	(44.8)	1,204	(39.1)	
9歳か、それ以前	5	(1.1)	2	(1.0)	0	(.0)	3	(1.3)	0	(.0)	23	(.7)	
10～11歳	7	(1.6)	0	(.0)	1	(1.1)	1	(.4)	1	(.6)	25	(.8)	
12～13歳	12	(2.7)	4	(2.1)	1	(1.1)	3	(1.3)	3	(1.8)	65	(2.1)	
14～15歳	26	(5.9)	6	(3.1)	11	(12.5)	14	(6.1)	9	(5.5)	182	(5.9)	
16～17歳	47	(10.6)	23	(12.0)	10	(11.4)	24	(10.5)	16	(9.7)	348	(11.3)	
18～19歳	62	(14.0)	34	(17.8)	20	(22.7)	33	(14.4)	26	(15.8)	521	(16.9)	
20歳以降	85	(19.2)	38	(19.9)	16	(18.2)	56	(24.5)	36	(21.8)	663	(21.6)	
年齢不明	2	(.5)	1	(.5)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	11	(.4)	
習慣的喫煙開始年齢													0.444
喫煙経験無し	190	(43.0)	81	(42.4)	28	(31.8)	91	(39.7)	73	(44.2)	1,202	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	2	(.1)	
10～11歳	0	(.0)	0	(.0)	1	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	3	(.7)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.4)	2	(1.2)	11	(.4)	
14～15歳	10	(2.3)	4	(2.1)	4	(4.5)	4	(1.7)	4	(2.4)	66	(2.1)	
16～17歳	20	(4.5)	14	(7.3)	7	(8.0)	14	(6.1)	10	(6.1)	176	(5.7)	
18～19歳	63	(14.3)	29	(15.2)	19	(21.6)	31	(13.5)	22	(13.3)	441	(14.3)	
20歳以降	103	(23.3)	45	(23.6)	19	(21.6)	59	(25.8)	38	(23.0)	780	(25.4)	
年齢不明	47	(10.6)	16	(8.4)	9	(10.2)	25	(10.9)	15	(9.1)	359	(11.7)	
過去1年喫煙経験													0.653
なし	333	(75.3)	139	(72.8)	60	(68.2)	171	(74.7)	120	(72.7)	2,237	(72.7)	
あり	108	(24.4)	51	(26.7)	28	(31.8)	56	(24.5)	45	(27.3)	827	(26.9)	
過去30日間喫煙日数													0.635
0日	345	(78.1)	144	(75.4)	62	(70.5)	174	(76.0)	127	(77.0)	2,310	(75.1)	
1～2日	3	(.7)	2	(1.0)	0	(.0)	2	(.9)	0	(.0)	20	(.7)	
3～5日	1	(.2)	1	(.5)	0	(.0)	1	(.4)	1	(.6)	15	(.5)	
6～9日	0	(.0)	0	(.0)	1	(1.1)	1	(.4)	0	(.0)	6	(.2)	
10～19日	2	(.5)	1	(.5)	1	(1.1)	0	(.0)	2	(1.2)	23	(.7)	
20～29日	9	(2.0)	0	(.0)	0	(.0)	6	(2.6)	4	(2.4)	40	(1.3)	
毎日	81	(18.3)	41	(21.5)	24	(27.3)	42	(18.3)	30	(18.2)	642	(20.9)	
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで行っていない者を含む

表15. 性別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076)

	性別						p-value
	男性		女性		合計		
	n=1466		n=1610		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
生涯飲酒経験							0.448
なし	92	(6.3)	112	(7.0)	204	(6.6)	
あり	1,374	(93.7)	1,498	(93.0)	2,872	(93.4)	
初飲酒年齢							<0.001
飲酒経験無し	90	(6.1)	108	(6.7)	198	(6.4)	
9歳か、それ以前	67	(4.6)	66	(4.1)	133	(4.3)	
10～11歳	35	(2.4)	26	(1.6)	61	(2.0)	
12～13歳	57	(3.9)	33	(2.0)	90	(2.9)	
14～15歳	107	(7.3)	66	(4.1)	173	(5.6)	
16～17歳	242	(16.5)	138	(8.6)	380	(12.4)	
18～19歳	507	(34.6)	444	(27.6)	951	(30.9)	
20歳以降	353	(24.1)	717	(44.5)	1,070	(34.8)	
年齢不明	6	(.4)	8	(.5)	14	(.5)	
習慣的飲酒開始年齢							<0.001
飲酒経験無し	89	(6.1)	108	(6.7)	197	(6.4)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
10～11歳	0	(.0)	3	(.2)	3	(.1)	
12～13歳	3	(.2)	0	(.0)	3	(.1)	
14～15歳	11	(.8)	4	(.2)	15	(.5)	
16～17歳	41	(2.8)	23	(1.4)	64	(2.1)	
18～19歳	325	(22.2)	194	(12.0)	519	(16.9)	
20歳以降	888	(60.6)	1,109	(68.9)	1,997	(64.9)	
年齢不明	106	(7.2)	165	(10.2)	271	(8.8)	
過去1年飲酒経験							<0.001
なし	227	(15.5)	390	(24.2)	617	(20.1)	
あり	1,237	(84.4)	1,217	(75.6)	2,454	(79.8)	
過去30日間飲酒日数							<0.001
0日	363	(24.8)	645	(40.1)	1,008	(32.8)	
1～2日	201	(13.7)	325	(20.2)	526	(17.1)	
3～5日	159	(10.8)	206	(12.8)	365	(11.9)	
6～9日	105	(7.2)	107	(6.6)	212	(6.9)	
10～19日	143	(9.8)	113	(7.0)	256	(8.3)	
20～29日	234	(16.0)	124	(7.7)	358	(11.6)	
毎日	258	(17.6)	86	(5.3)	344	(11.2)	
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
生涯喫煙経験							<0.001
なし	348	(23.7)	888	(55.2)	1,236	(40.2)	
あり	1,117	(76.2)	721	(44.8)	1,838	(59.8)	
初喫煙年齢							<0.001
喫煙経験無し	343	(23.4)	861	(53.5)	1,204	(39.1)	
9歳か、それ以前	13	(.9)	10	(.6)	23	(.7)	
10～11歳	19	(1.3)	6	(.4)	25	(.8)	
12～13歳	45	(3.1)	20	(1.2)	65	(2.1)	
14～15歳	134	(9.1)	48	(3.0)	182	(5.9)	
16～17歳	242	(16.5)	106	(6.6)	348	(11.3)	
18～19歳	334	(22.8)	187	(11.6)	521	(16.9)	
20歳以降	325	(22.2)	338	(21.0)	663	(21.6)	
年齢不明	5	(.3)	6	(.4)	11	(.4)	
習慣的喫煙開始年齢							<0.001
喫煙経験無し	344	(23.5)	858	(53.3)	1,202	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	2	(.1)	2	(.1)	
10～11歳	3	(.2)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	7	(.5)	4	(.2)	11	(.4)	
14～15歳	58	(4.0)	8	(.5)	66	(2.1)	
16～17歳	120	(8.2)	56	(3.5)	176	(5.7)	
18～19歳	326	(22.2)	115	(7.1)	441	(14.3)	
20歳以降	456	(31.1)	324	(20.1)	780	(25.4)	
年齢不明	147	(10.0)	212	(13.2)	359	(11.7)	
過去1年喫煙経験							<0.001
なし	864	(58.9)	1,373	(85.3)	2,237	(72.7)	
あり	600	(40.9)	227	(14.1)	827	(26.9)	
過去30日間喫煙日数							<0.001
0日	904	(61.7)	1,406	(87.3)	2,310	(75.1)	
1～2日	11	(.8)	9	(.6)	20	(.7)	
3～5日	13	(.9)	2	(.1)	15	(.5)	
6～9日	4	(.3)	2	(.1)	6	(.2)	
10～19日	17	(1.2)	6	(.4)	23	(.7)	
20～29日	31	(2.1)	9	(.6)	40	(1.3)	
毎日	480	(32.7)	162	(10.1)	642	(20.9)	
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙までに行っていない者を含む

表16. 年代別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076)

	年齢階級												p-value		
	10代		20代		30代		40代		50代		60代			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
生涯飲酒経験															<0.001
なし	142	(64.0)	11	(2.9)	8	(1.4)	9	(1.2)	16	(2.3)	18	(3.8)	204	(6.6)	
あり	80	(36.0)	371	(97.1)	545	(98.6)	742	(98.8)	679	(97.7)	455	(96.2)	2,872	(93.4)	
初飲酒年齢															<0.001
飲酒経験無し	142	(64.0)	10	(2.6)	8	(1.4)	8	(1.1)	14	(2.0)	16	(3.4)	198	(6.4)	
9歳か、それ以前	11	(5.0)	19	(5.0)	25	(4.5)	30	(4.0)	32	(4.6)	16	(3.4)	133	(4.3)	
10～11歳	8	(3.6)	5	(1.3)	9	(1.6)	15	(2.0)	21	(3.0)	3	(.6)	61	(2.0)	
12～13歳	12	(5.4)	10	(2.6)	20	(3.6)	25	(3.3)	18	(2.6)	5	(1.1)	90	(2.9)	
14～15歳	12	(5.4)	25	(6.5)	53	(9.6)	44	(5.9)	29	(4.2)	10	(2.1)	173	(5.6)	
16～17歳	14	(6.3)	36	(9.4)	79	(14.3)	113	(15.0)	90	(12.9)	48	(10.1)	380	(12.4)	
18～19歳	20	(9.0)	102	(26.7)	167	(30.2)	249	(33.2)	254	(36.5)	159	(33.6)	951	(30.9)	
20歳以降	0	(.0)	173	(45.3)	190	(34.4)	265	(35.3)	231	(33.2)	211	(44.6)	1,070	(34.8)	
年齢不明	3	(1.4)	1	(.3)	2	(.4)	1	(.1)	4	(.6)	3	(.6)	14	(.5)	
習慣的飲酒開始年齢															<0.001
飲酒経験無し	141	(63.5)	11	(2.9)	8	(1.4)	7	(.9)	15	(2.2)	15	(3.2)	197	(6.4)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
10～11歳	1	(.5)	0	(.0)	1	(.2)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	0	(.0)	1	(.3)	2	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
14～15歳	2	(.9)	3	(.8)	2	(.4)	3	(.4)	2	(.3)	3	(.6)	15	(.5)	
16～17歳	8	(3.6)	11	(2.9)	21	(3.8)	15	(2.0)	4	(.6)	5	(1.1)	64	(2.1)	
18～19歳	27	(12.2)	66	(17.3)	93	(16.8)	131	(17.4)	142	(20.4)	60	(12.7)	519	(16.9)	
20歳以降	1	(.5)	280	(73.3)	388	(70.2)	552	(73.5)	455	(65.5)	321	(67.9)	1,997	(64.9)	
年齢不明	41	(18.5)	10	(2.6)	38	(6.9)	41	(5.5)	75	(10.8)	66	(14.0)	271	(8.8)	
過去1年飲酒経験															<0.001
なし	165	(74.3)	37	(9.7)	89	(16.1)	106	(14.1)	126	(18.1)	94	(19.9)	617	(20.1)	
あり	56	(25.2)	345	(90.3)	464	(83.9)	645	(85.9)	568	(81.7)	376	(79.5)	2,454	(79.8)	
過去30日間飲酒日数															<0.001
0日	188	(84.7)	89	(23.3)	165	(29.8)	210	(28.0)	206	(29.6)	150	(31.7)	1,008	(32.8)	
1～2日	16	(7.2)	115	(30.1)	113	(20.4)	126	(16.8)	92	(13.2)	64	(13.5)	526	(17.1)	
3～5日	8	(3.6)	78	(20.4)	73	(13.2)	93	(12.4)	74	(10.6)	39	(8.2)	365	(11.9)	
6～9日	4	(1.8)	48	(12.6)	52	(9.4)	51	(6.8)	36	(5.2)	21	(4.4)	212	(6.9)	
10～19日	3	(1.4)	28	(7.3)	51	(9.2)	66	(8.8)	71	(10.2)	37	(7.8)	256	(8.3)	
20～29日	2	(.9)	16	(4.2)	57	(10.3)	111	(14.8)	107	(15.4)	65	(13.7)	358	(11.6)	
毎日	0	(.0)	8	(2.1)	41	(7.4)	93	(12.4)	109	(15.7)	93	(19.7)	344	(11.2)	
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
生涯喫煙経験															<0.001
なし	207	(93.2)	218	(57.1)	173	(31.3)	243	(32.4)	223		172	(36.4)	1,236	(40.2)	
あり	15	(6.8)	164	(42.9)	380	(68.7)	508	(67.6)	472	(67.9)	299	(63.2)	1,838	(59.8)	
初喫煙年齢															<0.001
喫煙経験無し	205	(92.3)	217	(56.8)	171	(30.9)	233	(31.0)	217	(31.2)	161	(34.0)	1,204	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	1	(.3)	3	(.5)	11	(1.5)	7	(1.0)	1	(.2)	23	(.7)	
10～11歳	0	(.0)	3	(.8)	7	(1.3)	6	(.8)	8	(1.2)	1	(.2)	25	(.8)	
12～13歳	1	(.5)	7	(1.8)	20	(3.6)	22	(2.9)	13	(1.9)	2	(.4)	65	(2.1)	
14～15歳	6	(2.7)	22	(5.8)	49	(8.9)	57	(7.6)	36	(5.2)	12	(2.5)	182	(5.9)	
16～17歳	3	(1.4)	26	(6.8)	79	(14.3)	93	(12.4)	103	(14.8)	44	(9.3)	348	(11.3)	
18～19歳	3	(1.4)	40	(10.5)	78	(14.1)	118	(15.7)	165	(23.7)	117	(24.7)	521	(16.9)	
20歳以降	0	(.0)	63	(16.5)	141	(25.5)	198	(26.4)	139	(20.0)	122	(25.8)	663	(21.6)	
年齢不明	2	(.9)	2	(.5)	3	(.5)	3	(.4)	1	(.1)	0	(.0)	11	(.4)	
習慣的喫煙開始年齢															<0.001
喫煙経験無し	205	(92.3)	217	(56.8)	169	(30.6)	234	(31.2)	217	(31.2)	160	(33.8)	1,202	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	1	(.3)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.1)	
10～11歳	0	(.0)	1	(.3)	0	(.0)	2	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	0	(.0)	0	(.0)	4	(.7)	5	(.7)	2	(.3)	0	(.0)	11	(.4)	
14～15歳	2	(.9)	12	(3.1)	22	(4.0)	22	(2.9)	4	(.6)	4	(.8)	66	(2.1)	
16～17歳	3	(1.4)	10	(2.6)	54	(9.8)	59	(7.9)	37	(5.3)	13	(2.7)	176	(5.7)	
18～19歳	2	(.9)	35	(9.2)	82	(14.8)	86	(11.5)	156	(22.4)	80	(16.9)	441	(14.3)	
20歳以降	0	(.0)	71	(18.6)	143	(25.9)	229	(30.5)	180	(25.9)	157	(33.2)	780	(25.4)	
年齢不明	8	(3.6)	34	(8.9)	75	(13.6)	104	(13.8)	93	(13.4)	45	(9.5)	359	(11.7)	
過去1年喫煙経験															<0.001
なし	210	(94.6)	279	(73.0)	371	(67.1)	518	(69.0)	494	(71.1)	365	(77.2)	2,237	(72.7)	
あり	10	(4.5)	102	(26.7)	181	(32.7)	232	(30.9)	200	(28.8)	102	(21.6)	827	(26.9)	
過去30日間喫煙日数															<0.001
0日	213	(95.9)	292	(76.4)	390	(70.5)	534	(71.1)	509	(73.2)	372	(78.6)	2,310	(75.1)	
1～2日	0	(.0)	8	(2.1)	6	(1.1)	2	(.3)	1	(.1)	3	(.6)	20	(.7)	
3～5日	1	(.5)	1	(.3)	4	(.7)	5	(.7)	4	(.6)	0	(.0)	15	(.5)	
6～9日	0	(.0)	3	(.8)	0	(.0)	2	(.3)	0	(.0)	1	(.2)	6	(.2)	
10～19日	1	(.5)	5	(1.3)	5	(.9)	4	(.5)	4	(.6)	4	(.8)	23	(.7)	
20～29日	1	(.5)	4	(1.0)	10	(1.8)	9	(1.2)	10	(1.4)	6	(1.3)	40	(1.3)	
毎日	3	(1.4)	67	(17.5)	136	(24.6)	191	(25.4)	165	(23.7)	80	(16.9)	642	(20.9)	
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的飲酒まで(に)いたっていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで(に)いたっていない者を含む

表17. 職業別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076)

	職業									
	自営業		正社員		非正社員		学生		主婦(主夫)	
	n=248	n=1406	n=394	n=271	n=436	n	(%)	n	(%)	
生涯飲酒経験										
なし	6	(2.4)	15	(1.1)	9	(2.3)	135	(49.8)	18	(4.1)
あり	242	(97.6)	1,391	(98.9)	385	(97.7)	136	(50.2)	418	(95.9)
初飲酒年齢										
飲酒経験無し	5	(2.0)	14	(1.0)	8	(2.0)	135	(49.8)	16	(3.7)
9歳か、それ以前	9	(3.6)	66	(4.7)	19	(4.8)	14	(5.2)	11	(2.5)
10～11歳	9	(3.6)	25	(1.8)	7	(1.8)	7	(2.6)	6	(1.4)
12～13歳	8	(3.2)	48	(3.4)	7	(1.8)	13	(4.8)	10	(2.3)
14～15歳	18	(7.3)	93	(6.6)	18	(4.6)	13	(4.8)	19	(4.4)
16～17歳	46	(18.5)	209	(14.9)	35	(8.9)	19	(7.0)	42	(9.6)
18～19歳	81	(32.7)	477	(33.9)	138	(35.0)	36	(13.3)	118	(27.1)
20歳以降	70	(28.2)	468	(33.3)	161	(40.9)	31	(11.4)	208	(47.7)
年齢不明	1	(.4)	5	(.4)	0	(.0)	3	(1.1)	4	(.9)
習慣的飲酒開始年齢										
飲酒経験無し	5	(2.0)	14	(1.0)	8	(2.0)	134	(49.4)	17	(3.9)
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
10～11歳	1	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)
12～13歳	1	(.4)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
14～15歳	3	(1.2)	7	(.5)	0	(.0)	2	(.7)	1	(.2)
16～17歳	3	(1.2)	31	(2.2)	5	(1.3)	6	(2.2)	9	(2.1)
18～19歳	57	(23.0)	298	(21.2)	50	(12.7)	29	(10.7)	47	(10.8)
20歳以降	160	(64.5)	968	(68.8)	293	(74.4)	58	(21.4)	307	(70.4)
年齢不明	17	(6.9)	85	(6.0)	37	(9.4)	40	(14.8)	54	(12.4)
過去1年飲酒経験										
なし	27	(10.9)	143	(10.2)	69	(17.5)	158	(58.3)	133	(30.5)
あり	221	(89.1)	1,261	(89.7)	325	(82.5)	112	(41.3)	302	(69.3)
過去30日間飲酒日数										
0日	50	(20.2)	307	(21.8)	133	(33.8)	186	(68.6)	205	(47.0)
1～2日	32	(12.9)	260	(18.5)	72	(18.3)	40	(14.8)	68	(15.6)
3～5日	23	(9.3)	175	(12.4)	54	(13.7)	22	(8.1)	50	(11.5)
6～9日	14	(5.6)	110	(7.8)	27	(6.9)	14	(5.2)	32	(7.3)
10～19日	24	(9.7)	139	(9.9)	38	(9.6)	3	(1.1)	28	(6.4)
20～29日	42	(16.9)	223	(15.9)	36	(9.1)	4	(1.5)	27	(6.2)
毎日	62	(25.0)	191	(13.6)	34	(8.6)	1	(.4)	24	(5.5)
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
生涯喫煙経験										
なし	52	(21.0)	434	(30.9)	162	(41.1)	247	(91.1)	233	
あり	196	(79.0)	971	(69.1)	231	(58.6)	24	(8.9)	203	(46.6)
初喫煙年齢										
喫煙経験無し	48	(19.4)	422	(30.0)	158	(40.1)	245	(90.4)	227	(52.1)
9歳か、それ以前	4	(1.6)	12	(.9)	3	(.8)	1	(.4)	1	(.2)
10～11歳	5	(2.0)	16	(1.1)	2	(.5)	0	(.0)	1	(.2)
12～13歳	7	(2.8)	39	(2.8)	4	(1.0)	1	(.4)	7	(1.6)
14～15歳	22	(8.9)	107	(7.6)	17	(4.3)	5	(1.8)	13	(3.0)
16～17歳	48	(19.4)	199	(14.2)	36	(9.1)	2	(.7)	24	(5.5)
18～19歳	51	(20.6)	273	(19.4)	78	(19.8)	5	(1.8)	62	(14.2)
20歳以降	58	(23.4)	320	(22.8)	90	(22.8)	8	(3.0)	94	(21.6)
年齢不明	1	(.4)	5	(.4)	1	(.3)	2	(.7)	1	(.2)
習慣的喫煙開始年齢										
喫煙経験無し	48	(19.4)	422	(30.0)	158	(40.1)	245	(90.4)	226	(51.8)
9歳か、それ以前	0	(.0)	1	(.1)	1	(.3)	0	(.0)	0	(.0)
10～11歳	1	(.4)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
12～13歳	4	(1.6)	4	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
14～15歳	6	(2.4)	44	(3.1)	3	(.8)	2	(.7)	4	(.9)
16～17歳	21	(8.5)	108	(7.7)	13	(3.3)	1	(.4)	15	(3.4)
18～19歳	59	(23.8)	240	(17.1)	58	(14.7)	2	(.7)	41	(9.4)
20歳以降	70	(28.2)	402	(28.6)	102	(25.9)	4	(1.5)	86	(19.7)
年齢不明	35	(14.1)	170	(12.1)	54	(13.7)	15	(5.5)	57	(13.1)
過去1年喫煙経験										
なし	151	(60.9)	927	(65.9)	300	(76.1)	257	(94.8)	382	(87.6)
あり	95	(38.3)	475	(33.8)	92	(23.4)	12	(4.4)	53	(12.2)
過去30日間喫煙日数										
0日	154	(62.1)	964	(68.6)	310	(78.7)	263	(97.0)	388	(89.0)
1～2日	4	(1.6)	8	(.6)	3	(.8)	1	(.4)	0	(.0)
3～5日	1	(.4)	13	(.9)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.2)
6～9日	0	(.0)	2	(.1)	0	(.0)	1	(.4)	1	(.2)
10～19日	1	(.4)	10	(.7)	5	(1.3)	0	(.0)	1	(.2)
20～29日	5	(2.0)	20	(1.4)	6	(1.5)	1	(.4)	1	(.2)
毎日	79	(31.9)	380	(27.0)	68	(17.3)	2	(.7)	43	(9.9)
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで行っていない者を含む

表17. 職業別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076) 続き

	職業								p-value
	無職		その他		無回答・不明		合計		
	n=179	n=138	n=4	n=3076	n	(%)	n	(%)	
生涯飲酒経験									<0.001
なし	14	(7.8)	7	(5.1)	0	(.0)	204	(6.6)	
あり	165	(92.2)	131	(94.9)	4	(100.0)	2,872	(93.4)	
初飲酒年齢									<0.001
飲酒経験無し	13	(7.3)	7	(5.1)	0	(.0)	198	(6.4)	
9歳か、それ以前	6	(3.4)	8	(5.8)	0	(.0)	133	(4.3)	
10～11歳	2	(1.1)	5	(3.6)	0	(.0)	61	(2.0)	
12～13歳	2	(1.1)	2	(1.4)	0	(.0)	90	(2.9)	
14～15歳	5	(2.8)	7	(5.1)	0	(.0)	173	(5.6)	
16～17歳	17	(9.5)	12	(8.7)	0	(.0)	380	(12.4)	
18～19歳	53	(29.6)	47	(34.1)	1	(25.0)	951	(30.9)	
20歳以降	79	(44.1)	50	(36.2)	3	(75.0)	1,070	(34.8)	
年齢不明	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	14	(.5)	
習慣的飲酒開始年齢									<0.001
飲酒経験無し	12	(6.7)	7	(5.1)	0	(.0)	197	(6.4)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
10～11歳	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
14～15歳	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	15	(.5)	
16～17歳	4	(2.2)	6	(4.3)	0	(.0)	64	(2.1)	
18～19歳	22	(12.3)	16	(11.6)	0	(.0)	519	(16.9)	
20歳以降	114	(63.7)	93	(67.4)	4	(100.0)	1,997	(64.9)	
年齢不明	23	(12.8)	15	(10.9)	0	(.0)	271	(8.8)	
過去1年飲酒経験									<0.001
なし	57	(31.8)	29	(21.0)	1	(25.0)	617	(20.1)	
あり	121	(67.6)	109	(79.0)	3	(75.0)	2,454	(79.8)	
過去30日間飲酒日数									<0.001
0日	72	(40.2)	53	(38.4)	2	(50.0)	1,008	(32.8)	
1～2日	27	(15.1)	26	(18.8)	1	(25.0)	526	(17.1)	
3～5日	21	(11.7)	20	(14.5)	0	(.0)	365	(11.9)	
6～9日	8	(4.5)	7	(5.1)	0	(.0)	212	(6.9)	
10～19日	14	(7.8)	10	(7.2)	0	(.0)	256	(8.3)	
20～29日	17	(9.5)	9	(6.5)	0	(.0)	358	(11.6)	
毎日	19	(10.6)	13	(9.4)	0	(.0)	344	(11.2)	
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
生涯喫煙経験									<0.001
なし	61	(34.1)	45	(32.6)	2	(50.0)	1,236	(40.2)	
あり	118	(65.9)	93	(67.4)	2	(50.0)	1,838	(59.8)	
初喫煙年齢									<0.001
喫煙経験無し	59	(33.0)	43	(31.2)	2	(50.0)	1,204	(39.1)	
9歳か、それ以前	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	23	(.7)	
10～11歳	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	25	(.8)	
12～13歳	3	(1.7)	4	(2.9)	0	(.0)	65	(2.1)	
14～15歳	13	(7.3)	5	(3.6)	0	(.0)	182	(5.9)	
16～17歳	23	(12.8)	15	(10.9)	1	(25.0)	348	(11.3)	
18～19歳	28	(15.6)	24	(17.4)	0	(.0)	521	(16.9)	
20歳以降	49	(27.4)	43	(31.2)	1	(25.0)	663	(21.6)	
年齢不明	0	(.0)	1	(.7)	0	(.0)	11	(.4)	
習慣的喫煙開始年齢									<0.001
喫煙経験無し	58	(32.4)	43	(31.2)	2	(50.0)	1,202	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.1)	
10～11歳	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	1	(.6)	2	(1.4)	0	(.0)	11	(.4)	
14～15歳	3	(1.7)	4	(2.9)	0	(.0)	66	(2.1)	
16～17歳	14	(7.8)	4	(2.9)	0	(.0)	176	(5.7)	
18～19歳	23	(12.8)	18	(13.0)	0	(.0)	441	(14.3)	
20歳以降	61	(34.1)	53	(38.4)	2	(50.0)	780	(25.4)	
年齢不明	16	(8.9)	12	(8.7)	0	(.0)	359	(11.7)	
過去1年喫煙経験									<0.001
なし	120	(67.0)	98	(71.0)	2	(50.0)	2,237	(72.7)	
あり	58	(32.4)	40	(29.0)	2	(50.0)	827	(26.9)	
過去30日間喫煙日数									<0.001
0日	125	(69.8)	104	(75.4)	2	(50.0)	2,310	(75.1)	
1～2日	2	(1.1)	2	(1.4)	0	(.0)	20	(.7)	
3～5日	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	15	(.5)	
6～9日	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	6	(.2)	
10～19日	4	(2.2)	2	(1.4)	0	(.0)	23	(.7)	
20～29日	3	(1.7)	4	(2.9)	0	(.0)	40	(1.3)	
毎日	43	(24.0)	25	(18.1)	2	(50.0)	642	(20.9)	
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで行っていない者を含む

表18. 最終学歴別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076)

	中学校 n=194		高等学校 n=1186		専門学校 n=406		短大・大学 n=929		大学院 n=66	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
生涯飲酒経験										
なし	15	(7.7)	28	(2.4)	8	(2.0)	14	(1.5)	0	(0)
あり	179	(92.3)	1158	(97.6)	398	(98.0)	915	(98.5)	66	(100.0)
初飲酒年齢										
飲酒経験無し	14	(7.2)	25	(2.1)	8	(2.0)	13	(1.4)	0	(0)
9歳か、それ以前	7	(3.6)	40	(3.4)	27	(6.7)	42	(4.5)	2	(3.0)
10～11歳	4	(2.1)	21	(1.8)	10	(2.5)	19	(2.0)	0	(0)
12～13歳	12	(6.2)	26	(2.2)	10	(2.5)	28	(3.0)	1	(1.5)
14～15歳	23	(11.9)	65	(5.5)	22	(5.4)	44	(4.7)	4	(6.1)
16～17歳	34	(17.5)	153	(12.9)	52	(12.8)	107	(11.5)	12	(18.2)
18～19歳	43	(22.2)	389	(32.8)	111	(27.3)	341	(36.7)	28	(42.4)
20歳以降	55	(28.4)	457	(38.5)	166	(40.9)	331	(35.6)	19	(28.8)
年齢不明	1	(.5)	7	(.6)	0	(0)	3	(.3)	0	(0)
習慣的飲酒開始年齢										
飲酒経験無し	14	(7.2)	25	(2.1)	8	(2.0)	13	(1.4)	0	(0)
9歳か、それ以前	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
10～11歳	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(.2)	0	(0)
12～13歳	2	(1.0)	0	(0)	1	(.2)	0	(0)	0	(0)
14～15歳	5	(2.6)	4	(.3)	0	(0)	3	(.3)	0	(0)
16～17歳	19	(9.8)	24	(2.0)	7	(1.7)	7	(.8)	1	(1.5)
18～19歳	35	(18.0)	224	(18.9)	57	(14.0)	159	(17.1)	14	(21.2)
20歳以降	91	(46.9)	803	(67.7)	298	(73.4)	682	(73.4)	49	(74.2)
年齢不明	27	(13.9)	103	(8.7)	35	(8.6)	62	(6.7)	2	(3.0)
過去1年飲酒経験										
なし	48	(24.7)	186	(15.7)	67	(16.5)	145	(15.6)	7	(10.6)
あり	146	(75.3)	997	(84.1)	339	(83.5)	783	(84.3)	59	(89.4)
過去30日間飲酒日数										
0日	76	(39.2)	334	(28.2)	130	(32.0)	262	(28.2)	12	(18.2)
1～2日	26	(13.4)	196	(16.5)	75	(18.5)	174	(18.7)	11	(16.7)
3～5日	16	(8.2)	146	(12.3)	50	(12.3)	115	(12.4)	11	(16.7)
6～9日	6	(3.1)	70	(5.9)	30	(7.4)	82	(8.8)	8	(12.1)
10～19日	10	(5.2)	105	(8.9)	35	(8.6)	95	(10.2)	8	(12.1)
20～29日	16	(8.2)	159	(13.4)	50	(12.3)	117	(12.6)	10	(15.2)
毎日	44	(22.7)	173	(14.6)	35	(8.6)	84	(9.0)	6	(9.1)
飲酒頻度不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
生涯喫煙経験										
なし	43	(22.2)	386	(32.5)	140	(34.5)	375	(40.4)	34	
あり	151	(77.8)	798	(67.3)	266	(65.5)	554	(59.6)	32	(48.5)
初喫煙年齢										
喫煙経験無し	41	(21.1)	371	(31.3)	137	(33.7)	365	(39.3)	34	(51.5)
9歳か、それ以前	4	(2.1)	7	(.6)	4	(1.0)	7	(.8)	0	(0)
10～11歳	4	(2.1)	11	(.9)	2	(.5)	8	(.9)	0	(0)
12～13歳	15	(7.7)	28	(2.4)	9	(2.2)	12	(1.3)	0	(0)
14～15歳	26	(13.4)	79	(6.7)	29	(7.1)	38	(4.1)	1	(1.5)
16～17歳	33	(17.0)	173	(14.6)	52	(12.8)	85	(9.1)	2	(3.0)
18～19歳	40	(20.6)	232	(19.6)	62	(15.3)	173	(18.6)	8	(12.1)
20歳以降	29	(14.9)	262	(22.1)	107	(26.4)	229	(24.7)	21	(31.8)
年齢不明	0	(0)	6	(.5)	1	(.2)	2	(.2)	0	(0)
習慣的喫煙開始年齢										
喫煙経験無し	41	(21.1)	370	(31.2)	137	(33.7)	364	(39.2)	34	(51.5)
9歳か、それ以前	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(.2)	0	(0)
10～11歳	2	(1.0)	1	(.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
12～13歳	6	(3.1)	4	(.3)	1	(.2)	0	(0)	0	(0)
14～15歳	18	(9.3)	27	(2.3)	8	(2.0)	10	(1.1)	0	(0)
16～17歳	33	(17.0)	90	(7.6)	23	(5.7)	29	(3.1)	0	(0)
18～19歳	43	(22.2)	210	(17.7)	53	(13.1)	125	(13.5)	6	(9.1)
20歳以降	37	(19.1)	352	(29.7)	117	(28.8)	247	(26.6)	17	(25.8)
年齢不明	12	(6.2)	114	(9.6)	64	(15.8)	141	(15.2)	9	(13.6)
過去1年喫煙経験										
なし	90	(46.4)	783	(66.0)	298	(73.4)	728	(78.4)	60	(90.9)
あり	104	(53.6)	397	(33.5)	106	(26.1)	199	(21.4)	6	(9.1)
過去30日間喫煙日数										
0日	94	(48.5)	814	(68.6)	307	(75.6)	750	(80.7)	61	(92.4)
1～2日	2	(1.0)	12	(1.0)	1	(.2)	3	(.3)	0	(0)
3～5日	1	(.5)	7	(.6)	3	(.7)	4	(.4)	0	(0)
6～9日	1	(.5)	1	(.1)	1	(.2)	2	(.2)	0	(0)
10～19日	2	(1.0)	10	(.8)	4	(1.0)	7	(.8)	0	(0)
20～29日	3	(1.5)	18	(1.5)	3	(.7)	14	(1.5)	1	(1.5)
毎日	91	(46.9)	313	(26.4)	85	(20.9)	145	(15.6)	4	(6.1)
喫煙頻度不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで行っていない者を含む

表18. 最終学歴別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076) 続き

	最終学歴								p-value
	その他		在学中		無回答・不明		合計		
	n=16		n=271		n=8		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
生涯飲酒経験									<0.001
なし	2	(12.5)	135	(49.8)	2	(25.0)	204	(6.6)	
あり	14	(87.5)	136	(50.2)	6	(75.0)	2872	(93.4)	
初飲酒年齢									<0.001
飲酒経験無し	1	(6.3)	135	(49.8)	2	(25.0)	198	(6.4)	
9歳か、それ以前	1	(6.3)	14	(5.2)	0	(.0)	133	(4.3)	
10～11歳	0	(.0)	7	(2.6)	0	(.0)	61	(2.0)	
12～13歳	0	(.0)	13	(4.8)	0	(.0)	90	(2.9)	
14～15歳	2	(12.5)	13	(4.8)	0	(.0)	173	(5.6)	
16～17歳	3	(18.8)	19	(7.0)	0	(.0)	380	(12.4)	
18～19歳	2	(12.5)	36	(13.3)	1	(12.5)	951	(30.9)	
20歳以降	6	(37.5)	31	(11.4)	5	(62.5)	1070	(34.8)	
年齢不明	0	(.0)	3	(1.1)	0	(.0)	14	(.5)	
習慣的飲酒開始年齢									<0.001
飲酒経験無し	1	(6.3)	134	(49.4)	2	(25.0)	197	(6.4)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
10～11歳	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
14～15歳	1	(6.3)	2	(.7)	0	(.0)	15	(.5)	
16～17歳	0	(.0)	6	(2.2)	0	(.0)	64	(2.1)	
18～19歳	1	(6.3)	29	(10.7)	0	(.0)	519	(16.9)	
20歳以降	11	(68.8)	58	(21.4)	5	(62.5)	1997	(64.9)	
年齢不明	1	(6.3)	40	(14.8)	1	(12.5)	271	(8.8)	
過去1年飲酒経験									<0.001
なし	3	(18.8)	158	(58.3)	3	(37.5)	617	(20.1)	
あり	13	(81.3)	112	(41.3)	5	(62.5)	2454	(79.8)	
過去30日間飲酒日数									<0.001
0日	4	(25.0)	186	(68.6)	4	(50.0)	1008	(32.8)	
1～2日	2	(12.5)	40	(14.8)	2	(25.0)	526	(17.1)	
3～5日	4	(25.0)	22	(8.1)	1	(12.5)	365	(11.9)	
6～9日	2	(12.5)	14	(5.2)	0	(.0)	212	(6.9)	
10～19日	0	(.0)	3	(1.1)	0	(.0)	256	(8.3)	
20～29日	2	(12.5)	4	(1.5)	0	(.0)	358	(11.6)	
毎日	1	(6.3)	1	(.4)	0	(.0)	344	(11.2)	
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
生涯喫煙経験									<0.001
なし	6	(37.5)	247	(91.1)	5	(62.5)	1236	(40.2)	
あり	10	(62.5)	24	(8.9)	3	(37.5)	1838	(59.8)	
初喫煙年齢									<0.001
喫煙経験無し	6	(37.5)	245	(90.4)	5	(62.5)	1204	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	23	(.7)	
10～11歳	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	25	(.8)	
12～13歳	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	65	(2.1)	
14～15歳	4	(25.0)	5	(1.8)	0	(.0)	182	(5.9)	
16～17歳	1	(6.3)	2	(.7)	0	(.0)	348	(11.3)	
18～19歳	0	(.0)	5	(1.8)	1	(12.5)	521	(16.9)	
20歳以降	5	(31.3)	8	(3.0)	2	(25.0)	663	(21.6)	
年齢不明	0	(.0)	2	(.7)	0	(.0)	11	(.4)	
習慣的喫煙開始年齢									<0.001
喫煙経験無し	6	(37.5)	245	(90.4)	5	(62.5)	1202	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.1)	
10～11歳	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	11	(.4)	
14～15歳	1	(6.3)	2	(.7)	0	(.0)	66	(2.1)	
16～17歳	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	176	(5.7)	
18～19歳	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	441	(14.3)	
20歳以降	4	(25.0)	4	(1.5)	2	(25.0)	780	(25.4)	
年齢不明	3	(18.8)	15	(5.5)	1	(12.5)	359	(11.7)	
過去1年喫煙経験									<0.001
なし	14	(87.5)	257	(94.8)	7	(87.5)	2237	(72.7)	
あり	2	(12.5)	12	(4.4)	1	(12.5)	827	(26.9)	
過去30日間喫煙日数									<0.001
0日	14	(87.5)	263	(97.0)	7	(87.5)	2310	(75.1)	
1～2日	1	(6.3)	1	(.4)	0	(.0)	20	(.7)	
3～5日	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	15	(.5)	
6～9日	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	6	(.2)	
10～19日	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	23	(.7)	
20～29日	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	40	(1.3)	
毎日	1	(6.3)	2	(.7)	1	(12.5)	642	(20.9)	
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで行っていない者を含む



表19. 学校中退歴別にみた飲酒・喫煙状況 (n=3076)

	学校中退歴						p-value		
	あり		なし		無回答・不明			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
生涯飲酒経験									<0.001
なし	7	(3.3)	193	(6.8)	4	(30.8)	204	(6.6)	
あり	204	(96.7)	2659	(93.2)	9	(69.2)	2872	(93.4)	
初飲酒年齢									0.025
飲酒経験無し	7	(3.3)	187	(6.6)	4	(30.8)	198	(6.4)	
9歳か、それ以前	12	(5.7)	119	(4.2)	2	(15.4)	133	(4.3)	
10～11歳	6	(2.8)	55	(1.9)	0	(.0)	61	(2.0)	
12～13歳	10	(4.7)	79	(2.8)	1	(7.7)	90	(2.9)	
14～15歳	15	(7.1)	158	(5.5)	0	(.0)	173	(5.6)	
16～17歳	25	(11.8)	355	(12.4)	0	(.0)	380	(12.4)	
18～19歳	59	(28.0)	891	(31.2)	1	(7.7)	951	(30.9)	
20歳以降	76	(36.0)	989	(34.7)	5	(38.5)	1070	(34.8)	
年齢不明	1	(.5)	13	(.5)	0	(.0)	14	(.5)	
習慣的飲酒開始年齢									<0.001
飲酒経験無し	7	(3.3)	186	(6.5)	4	(30.8)	197	(6.4)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
10～11歳	0	(.0)	3	(.1)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	0	(.0)	3	(.1)	0	(.0)	3	(.1)	
14～15歳	2	(.9)	13	(.5)	0	(.0)	15	(.5)	
16～17歳	12	(5.7)	52	(1.8)	0	(.0)	64	(2.1)	
18～19歳	35	(16.6)	484	(17.0)	0	(.0)	519	(16.9)	
20歳以降	136	(64.5)	1856	(65.1)	5	(38.5)	1997	(64.9)	
年齢不明	19	(9.0)	248	(8.7)	4	(30.8)	271	(8.8)	
過去1年飲酒経験									0.046
なし	41	(19.4)	569	(20.0)	7	(53.8)	617	(20.1)	
あり	170	(80.6)	2278	(79.9)	6	(46.2)	2454	(79.8)	
過去30日間飲酒日数									<0.001
0日	73	(34.6)	927	(32.5)	8	(61.5)	1008	(32.8)	
1～2日	40	(19.0)	483	(16.9)	3	(23.1)	526	(17.1)	
3～5日	25	(11.8)	339	(11.9)	1	(7.7)	365	(11.9)	
6～9日	7	(3.3)	205	(7.2)	0	(.0)	212	(6.9)	
10～19日	19	(9.0)	237	(8.3)	0	(.0)	256	(8.3)	
20～29日	11	(5.2)	347	(12.2)	0	(.0)	358	(11.6)	
毎日	36	(17.1)	308	(10.8)	0	(.0)	344	(11.2)	
飲酒頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
生涯喫煙経験									<0.001
なし	42	(19.9)	1184	(41.5)	10	(76.9)	1236	(40.2)	
あり	169	(80.1)	1666	(58.4)	3	(23.1)	1838	(59.8)	
初喫煙年齢									<0.001
喫煙経験無し	39	(18.5)	1155	(40.5)	10	(76.9)	1204	(39.1)	
9歳か、それ以前	2	(.9)	21	(.7)	0	(.0)	23	(.7)	
10～11歳	3	(1.4)	22	(.8)	0	(.0)	25	(.8)	
12～13歳	11	(5.2)	54	(1.9)	0	(.0)	65	(2.1)	
14～15歳	22	(10.4)	160	(5.6)	0	(.0)	182	(5.9)	
16～17歳	39	(18.5)	309	(10.8)	0	(.0)	348	(11.3)	
18～19歳	40	(19.0)	480	(16.8)	1	(7.7)	521	(16.9)	
20歳以降	51	(24.2)	610	(21.4)	2	(15.4)	663	(21.6)	
年齢不明	1	(.5)	10	(.4)	0	(.0)	11	(.4)	
習慣的喫煙開始年齢									<0.001
喫煙経験無し	38	(18.0)	1154	(40.5)	10	(76.9)	1202	(39.1)	
9歳か、それ以前	0	(.0)	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)	
10～11歳	0	(.0)	3	(.1)	0	(.0)	3	(.1)	
12～13歳	3	(1.4)	8	(.3)	0	(.0)	11	(.4)	
14～15歳	9	(4.3)	57	(2.0)	0	(.0)	66	(2.1)	
16～17歳	25	(11.8)	151	(5.3)	0	(.0)	176	(5.7)	
18～19歳	53	(25.1)	388	(13.6)	0	(.0)	441	(14.3)	
20歳以降	63	(29.9)	715	(25.1)	2	(15.4)	780	(25.4)	
年齢不明	16	(7.6)	342	(12.0)	1	(7.7)	359	(11.7)	
過去1年喫煙経験									<0.001
なし	107	(50.7)	2118	(74.3)	12	(92.3)	2237	(72.7)	
あり	103	(48.8)	723	(25.4)	1	(7.7)	827	(26.9)	
過去30日間喫煙日数									<0.001
0日	112	(53.1)	2186	(76.6)	12	(92.3)	2310	(75.1)	
1～2日	5	(2.4)	15	(.5)	0	(.0)	20	(.7)	
3～5日	1	(.5)	14	(.5)	0	(.0)	15	(.5)	
6～9日	0	(.0)	6	(.2)	0	(.0)	6	(.2)	
10～19日	2	(.9)	21	(.7)	0	(.0)	23	(.7)	
20～29日	5	(2.4)	35	(1.2)	0	(.0)	40	(1.3)	
毎日	82	(38.9)	559	(19.6)	1	(7.7)	642	(20.9)	
喫煙頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで行っていない者を含む

表20. 薬物使用経験別にみた飲酒・喫煙状況(n=3076)

	薬物使用経験								p-value
	生涯経験あり		生涯経験なし		無回答・不明		合計		
	n=78	n=2940	n=58	n=3076	n=78	n=2940	n=58	n=3076	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
生涯飲酒経験									0.050
なし	0	(0)	199	(6.8)	5	(8.6)	204	(6.6)	
あり	78	(100.0)	2741	(93.2)	53	(91.4)	2872	(93.4)	
初飲酒年齢									<0.001
飲酒経験無し	0	(0)	194	(6.6)	4	(6.9)	198	(6.4)	
9歳か、それ以前	8	(10.3)	125	(4.3)	0	(0)	133	(4.3)	
10～11歳	4	(5.1)	56	(1.9)	1	(1.7)	61	(2.0)	
12～13歳	10	(12.8)	79	(2.7)	1	(1.7)	90	(2.9)	
14～15歳	16	(20.5)	153	(5.2)	4	(6.9)	173	(5.6)	
16～17歳	20	(25.6)	352	(12.0)	8	(13.8)	380	(12.4)	
18～19歳	15	(19.2)	917	(31.2)	19	(32.8)	951	(30.9)	
20歳以降	4	(5.1)	1046	(35.6)	20	(34.5)	1070	(34.8)	
年齢不明	1	(1.3)	13	(.4)	0	(0)	14	(.5)	
習慣的飲酒開始年齢									<0.001
飲酒経験無し	0	(0)	193	(6.6)	4	(6.9)	197	(6.4)	
9歳か、それ以前	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
10～11歳	0	(0)	3	(.1)	0	(0)	3	(.1)	
12～13歳	2	(2.6)	1	(0.03)	0	(0)	3	(.1)	
14～15歳	4	(5.1)	10	(.3)	1	(1.7)	15	(.5)	
16～17歳	10	(12.8)	54	(1.8)	0	(0)	64	(2.1)	
18～19歳	29	(37.2)	478	(16.3)	12	(20.7)	519	(16.9)	
20歳以降	31	(39.7)	1933	(65.7)	33	(56.9)	1997	(64.9)	
年齢不明	2	(2.6)	262	(8.9)	7	(12.1)	271	(8.8)	
過去1年飲酒経験									0.001
なし	6	(7.7)	595	(20.2)	16	(27.6)	617	(20.1)	
あり	72	(92.3)	2341	(79.6)	41	(70.7)	2454	(79.8)	
過去30日間飲酒日数									0.001
0日	15	(19.2)	972	(33.1)	21	(36.2)	1008	(32.8)	
1～2日	6	(7.7)	513	(17.4)	7	(12.1)	526	(17.1)	
3～5日	11	(14.1)	350	(11.9)	4	(6.9)	365	(11.9)	
6～9日	5	(6.4)	205	(7.0)	2	(3.4)	212	(6.9)	
10～19日	7	(9.0)	243	(8.3)	6	(10.3)	256	(8.3)	
20～29日	18	(23.1)	331	(11.3)	9	(15.5)	358	(11.6)	
毎日	16	(20.5)	320	(10.9)	8	(13.8)	344	(11.2)	
飲酒頻度不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
生涯喫煙経験									<0.001
なし	1	(1.3)	1213	(41.3)	22	(37.9)	1236	(40.2)	
あり	77	(98.7)	1725	(58.7)	36	(62.1)	1838	(59.8)	
初喫煙年齢									<0.001
喫煙経験無し	1	(1.3)	1182	(40.2)	21	(36.2)	1204	(39.1)	
9歳か、それ以前	4	(5.1)	19	(.6)	0	(0)	23	(.7)	
10～11歳	6	(7.7)	18	(.6)	1	(1.7)	25	(.8)	
12～13歳	10	(12.8)	55	(1.9)	0	(0)	65	(2.1)	
14～15歳	21	(26.9)	157	(5.3)	4	(6.9)	182	(5.9)	
16～17歳	24	(30.8)	318	(10.8)	6	(10.3)	348	(11.3)	
18～19歳	7	(9.0)	504	(17.1)	10	(17.2)	521	(16.9)	
20歳以降	5	(6.4)	643	(21.9)	15	(25.9)	663	(21.6)	
年齢不明	0	(0)	11	(.4)	0	(0)	11	(.4)	
習慣的喫煙開始年齢									<0.001
喫煙経験無し	1	(1.3)	1180	(40.1)	21	(36.2)	1202	(39.1)	
9歳か、それ以前	1	(1.3)	1	(0.03)	0	(0)	2	(.1)	
10～11歳	2	(2.6)	1	(0.03)	0	(0)	3	(.1)	
12～13歳	8	(10.3)	3	(.1)	0	(0)	11	(.4)	
14～15歳	13	(16.7)	52	(1.8)	1	(1.7)	66	(2.1)	
16～17歳	24	(30.8)	151	(5.1)	1	(1.7)	176	(5.7)	
18～19歳	18	(23.1)	411	(14.0)	12	(20.7)	441	(14.3)	
20歳以降	9	(11.5)	755	(25.7)	16	(27.6)	780	(25.4)	
年齢不明	2	(2.6)	351	(11.9)	6	(10.3)	359	(11.7)	
過去1年喫煙経験									<0.001
なし	32	(41.0)	2172	(73.9)	33	(56.9)	2237	(72.7)	
あり	46	(59.0)	757	(25.7)	24	(41.4)	827	(26.9)	
過去30日間喫煙日数									<0.001
0日	34	(43.6)	2239	(76.2)	37	(63.8)	2310	(75.1)	
1～2日	1	(1.3)	18	(.6)	1	(1.7)	20	(.7)	
3～5日	1	(1.3)	13	(.4)	1	(1.7)	15	(.5)	
6～9日	0	(0)	6	(.2)	0	(0)	6	(.2)	
10～19日	2	(2.6)	21	(.7)	0	(0)	23	(.7)	
20～29日	1	(1.3)	37	(1.3)	2	(3.4)	40	(1.3)	
毎日	39	(50.0)	587	(20.0)	16	(27.6)	642	(20.9)	
喫煙頻度不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	

無回答・不明の者は掲載せず。習慣的飲酒開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な飲酒までに行っていない者を含む、習慣的喫煙開始年齢における「年齢不明」には、習慣的な喫煙にまで行っていない者を含む

表21. 居住地別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076)

	居住地											
	北海道		東北		関東		北陸		東山		東海	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
家庭の常備薬												
特にない	14	(10.7)	34	(13.6)	107	(11.3)	11	(7.1)	19	(12.7)	35	(10.7)
風邪薬	101	(77.1)	179	(71.6)	672	(70.9)	122	(79.2)	111	(74.0)	229	(69.8)
解熱鎮痛薬	73	(55.7)	127	(50.8)	529	(55.8)	85	(55.2)	79	(52.7)	192	(58.5)
鼻炎薬(アレルギー薬)	39	(29.8)	79	(31.6)	313	(33.0)	44	(28.6)	53	(35.3)	106	(32.3)
乗り物酔い止め	22	(16.8)	35	(14.0)	155	(16.4)	27	(17.5)	17	(11.3)	48	(14.6)
胃腸薬	77	(58.8)	143	(57.2)	533	(56.2)	102	(66.2)	84	(56.0)	185	(56.4)
便秘薬	25	(19.1)	41	(16.4)	134	(14.1)	27	(17.5)	25	(16.7)	51	(15.5)
咳止め	27	(20.6)	55	(22.0)	196	(20.7)	35	(22.7)	30	(20.0)	78	(23.8)
漢方薬	18	(13.7)	35	(14.0)	139	(14.7)	26	(16.9)	28	(18.7)	55	(16.8)
ビタミン薬	25	(19.1)	40	(16.0)	191	(20.1)	25	(16.2)	25	(16.7)	57	(17.4)
サプリメント	29	(22.1)	60	(24.0)	234	(24.7)	37	(24.0)	27	(18.0)	82	(25.0)
その他	3	(2.3)	9	(3.6)	25	(2.6)	10	(6.5)	5	(3.3)	6	(1.8)
無回答・不明	2	(1.5)	2	(.8)	6	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)
過去1年に使用した医薬品												
特にない	4	(3.1)	26	(10.4)	69	(7.3)	10	(6.5)	13	(8.7)	23	(7.0)
風邪薬	92	(70.2)	165	(66.0)	635	(67.0)	100	(64.9)	97	(64.7)	208	(63.4)
解熱鎮痛薬	96	(73.3)	151	(60.4)	599	(63.2)	96	(62.3)	88	(58.7)	217	(66.2)
鼻炎薬(アレルギー薬)	32	(24.4)	72	(28.8)	315	(33.2)	42	(27.3)	42	(28.0)	100	(30.5)
乗り物酔い止め	10	(7.6)	14	(5.6)	66	(7.0)	13	(8.4)	7	(4.7)	19	(5.8)
胃腸薬	56	(42.7)	93	(37.2)	369	(38.9)	57	(37.0)	51	(34.0)	113	(34.5)
便秘薬	23	(17.6)	29	(11.6)	80	(8.4)	20	(13.0)	17	(11.3)	37	(11.3)
咳止め	26	(19.8)	48	(19.2)	204	(21.5)	23	(14.9)	23	(15.3)	57	(17.4)
漢方薬	23	(17.6)	26	(10.4)	150	(15.8)	17	(11.0)	30	(20.0)	41	(12.5)
ビタミン薬	24	(18.3)	31	(12.4)	176	(18.6)	20	(13.0)	24	(16.0)	49	(14.9)
サプリメント	24	(18.3)	55	(22.0)	222	(23.4)	33	(21.4)	32	(21.3)	68	(20.7)
その他	12	(9.2)	24	(9.6)	73	(7.7)	14	(9.1)	8	(5.3)	25	(7.6)
無回答・不明	2	(1.5)	1	(.4)	3	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表21. 居住地別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076) 続き

	居住地										p-value		
	近畿		中国		四国		北九州		南九州			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
家庭の常備薬													
特にない	66	(14.9)	21	(11.0)	9	(10.2)	38	(16.6)	27	(16.4)	381	(12.4)	0.250
風邪薬	318	(71.9)	146	(76.4)	61	(69.3)	151	(65.9)	102	(61.8)	2192	(71.3)	0.066
解熱鎮痛薬	234	(52.9)	109	(57.1)	52	(59.1)	125	(54.6)	96	(58.2)	1701	(55.3)	0.808
鼻炎薬(アレルギー薬)	149	(33.7)	55	(28.8)	28	(31.8)	57	(24.9)	49	(29.7)	972	(31.6)	0.634
乗り物酔い止め	86	(19.5)	30	(15.7)	16	(18.2)	28	(12.2)	16	(9.7)	480	(15.6)	0.262
胃腸薬	231	(52.3)	107	(56.0)	40	(45.5)	123	(53.7)	86	(52.1)	1711	(55.6)	0.267
便秘薬	85	(19.2)	43	(22.5)	13	(14.8)	29	(12.7)	22	(13.3)	495	(16.1)	0.237
咳止め	91	(20.6)	54	(28.3)	20	(22.7)	46	(20.1)	27	(16.4)	659	(21.4)	0.559
漢方薬	77	(17.4)	30	(15.7)	15	(17.0)	35	(15.3)	21	(12.7)	479	(15.6)	0.872
ビタミン薬	87	(19.7)	32	(16.8)	12	(13.6)	34	(14.8)	26	(15.8)	554	(18.0)	0.672
サプリメント	100	(22.6)	45	(23.6)	21	(23.9)	53	(23.1)	34	(20.6)	722	(23.5)	0.877
その他	13	(2.9)	4	(2.1)	1	(1.1)	10	(4.4)	2	(1.2)	88	(2.9)	0.329
無回答・不明	1	(.2)	2	(1.0)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	16	(.5)	0.635
過去1年に使用した医薬品													
特にない	40	(9.0)	21	(11.0)	5	(5.7)	19	(8.3)	16	(9.7)	246	(8.0)	0.147
風邪薬	270	(61.1)	113	(59.2)	55	(62.5)	150	(65.5)	105	(63.6)	1990	(64.7)	0.215
解熱鎮痛薬	257	(58.1)	112	(58.6)	63	(71.6)	148	(64.6)	110	(66.7)	1937	(63.0)	0.019
鼻炎薬(アレルギー薬)	127	(28.7)	44	(23.0)	22	(25.0)	56	(24.5)	47	(28.5)	899	(29.2)	0.062
乗り物酔い止め	33	(7.5)	17	(8.9)	7	(8.0)	14	(6.1)	17	(10.3)	217	(7.1)	0.332
胃腸薬	161	(36.4)	68	(35.6)	32	(36.4)	79	(34.5)	63	(38.2)	1142	(37.1)	0.420
便秘薬	57	(12.9)	24	(12.6)	8	(9.1)	14	(6.1)	18	(10.9)	327	(10.6)	0.016
咳止め	73	(16.5)	32	(16.8)	13	(14.8)	50	(21.8)	30	(18.2)	579	(18.8)	0.143
漢方薬	68	(15.4)	29	(15.2)	13	(14.8)	41	(17.9)	24	(14.5)	462	(15.0)	0.113
ビタミン薬	77	(17.4)	25	(13.1)	13	(14.8)	36	(15.7)	33	(20.0)	508	(16.5)	0.156
サプリメント	94	(21.3)	40	(20.9)	19	(21.6)	45	(19.7)	40	(24.2)	672	(21.8)	0.565
その他	49	(11.1)	18	(9.4)	8	(9.1)	23	(10.0)	8	(4.8)	262	(8.5)	0.178
無回答・不明	0	(.0)	2	(1.0)	1	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	10	(.3)	0.153

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表22. 性別にみた常備薬および医薬品使用 (n=3076)

	性別						p-value
	男性		女性		合計		
	n=1466	n=1610	n=3076	n (%)	n (%)	n (%)	
家庭の常備薬							
特にない	212	(14.5)	169	(10.5)	381	(12.4)	0.002
風邪薬	1031	(70.3)	1161	(72.1)	2192	(71.3)	0.309
解熱鎮痛薬	681	(46.5)	1020	(63.4)	1701	(55.3)	<0.001
鼻炎薬(アレルギー薬)	446	(30.4)	526	(32.7)	972	(31.6)	0.216
乗り物酔い止め	196	(13.4)	284	(17.6)	480	(15.6)	0.003
胃腸薬	824	(56.2)	887	(55.1)	1711	(55.6)	0.379
便秘薬	165	(11.3)	330	(20.5)	495	(16.1)	<0.001
咳止め	303	(20.7)	356	(22.1)	659	(21.4)	0.319
漢方薬	214	(14.6)	265	(16.5)	479	(15.6)	0.188
ビタミン薬	247	(16.8)	307	(19.1)	554	(18.0)	0.145
サプリメント	306	(20.9)	416	(25.8)	722	(23.5)	0.003
その他	38	(2.6)	50	(3.1)	88	(2.9)	0.346
無回答・不明	10	(.7)	6	(.4)	16	(.5)	0.233
過去1年に使用した医薬品							
特にない	142	(9.7)	104	(6.5)	246	(8.0)	0.003
風邪薬	923	(63.0)	1067	(66.3)	1990	(64.7)	0.129
解熱鎮痛薬	777	(53.0)	1160	(72.0)	1937	(63.0)	<0.001
鼻炎薬(アレルギー薬)	379	(25.9)	520	(32.3)	899	(29.2)	<0.001
乗り物酔い止め	75	(5.1)	142	(8.8)	217	(7.1)	<0.001
胃腸薬	537	(36.6)	605	(37.6)	1142	(37.1)	0.647
便秘薬	65	(4.4)	262	(16.3)	327	(10.6)	<0.001
咳止め	228	(15.6)	351	(21.8)	579	(18.8)	<0.001
漢方薬	161	(11.0)	301	(18.7)	462	(15.0)	<0.001
ビタミン薬	202	(13.8)	306	(19.0)	508	(16.5)	<0.001
サプリメント	270	(18.4)	402	(25.0)	672	(21.8)	<0.001
その他	124	(8.5)	138	(8.6)	262	(8.5)	0.733
無回答・不明	6	(.4)	4	(.2)	10	(.3)	0.434

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く  
家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表23. 年代別にみた常備薬および医薬品使用 (n=3076)

	年齢階級												p-value		
	10代		20代		30代		40代		50代		60代			合計	
	n=222	n=382	n=553	n=751	n=695	n=473	n=3076	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)		n (%)	
家庭の常備薬															
特にない	40	(18.0)	54	(14.1)	61	(11.0)	80	(10.7)	81	(11.7)	65	(13.7)	381	(12.4)	0.008
風邪薬	133	(59.9)	266	(69.6)	407	(73.6)	542	(72.2)	502	(72.2)	342	(72.3)	2192	(71.3)	0.004
解熱鎮痛薬	100	(45.0)	201	(52.6)	319	(57.7)	448	(59.7)	403	(58.0)	230	(48.6)	1701	(55.3)	<0.001
鼻炎薬(アレルギー薬)	73	(32.9)	116	(30.4)	174	(31.5)	263	(35.0)	223	(32.1)	123	(26.0)	972	(31.6)	0.012
乗り物酔い止め	70	(31.5)	56	(14.7)	78	(14.1)	148	(19.7)	91	(13.1)	37	(7.8)	480	(15.6)	<0.001
胃腸薬	94	(42.3)	176	(46.1)	278	(50.3)	432	(57.5)	436	(62.7)	295	(62.4)	1711	(55.6)	<0.001
便秘薬	45	(20.3)	55	(14.4)	68	(12.3)	109	(14.5)	134	(19.3)	84	(17.8)	495	(16.1)	0.001
咳止め	51	(23.0)	65	(17.0)	108	(19.5)	150	(20.0)	172	(24.7)	113	(23.9)	659	(21.4)	0.006
漢方薬	25	(11.3)	47	(12.3)	93	(16.8)	127	(16.9)	120	(17.3)	67	(14.2)	479	(15.6)	0.020
ビタミン薬	30	(13.5)	56	(14.7)	107	(19.3)	139	(18.5)	137	(19.7)	85	(18.0)	554	(18.0)	0.038
サプリメント	36	(16.2)	62	(16.2)	125	(22.6)	174	(23.2)	192	(27.6)	133	(28.1)	722	(23.5)	<0.001
その他	3	(1.4)	3	(.8)	10	(1.8)	24	(3.2)	30	(4.3)	18	(3.8)	88	(2.9)	0.001
無回答・不明	4	(1.8)	3	(.8)	2	(.4)	2	(.3)	1	(.1)	4	(.8)	16	(.5)	0.040
過去1年に使用した医薬品															
特にない	30	(13.5)	40	(10.5)	41	(7.4)	44	(5.9)	47	(6.8)	44	(9.3)	246	(8.0)	0.003
風邪薬	134	(60.4)	260	(68.1)	394	(71.2)	504	(67.1)	425	(61.2)	273	(57.7)	1990	(64.7)	<0.001
解熱鎮痛薬	127	(57.2)	239	(62.6)	389	(70.3)	499	(66.4)	438	(63.0)	245	(51.8)	1937	(63.0)	<0.001
鼻炎薬(アレルギー薬)	81	(36.5)	115	(30.1)	168	(30.4)	234	(31.2)	201	(28.9)	100	(21.1)	899	(29.2)	0.002
乗り物酔い止め	42	(18.9)	32	(8.4)	31	(5.6)	54	(7.2)	39	(5.6)	19	(4.0)	217	(7.1)	<0.001
胃腸薬	54	(24.3)	121	(31.7)	188	(34.0)	291	(38.7)	289	(41.6)	199	(42.1)	1142	(37.1)	<0.001
便秘薬	17	(7.7)	44	(11.5)	41	(7.4)	75	(10.0)	87	(12.5)	63	(13.3)	327	(10.6)	0.016
咳止め	46	(20.7)	76	(19.9)	110	(19.9)	141	(18.8)	112	(16.1)	94	(19.9)	579	(18.8)	0.324
漢方薬	21	(9.5)	58	(15.2)	99	(17.9)	118	(15.7)	104	(15.0)	62	(13.1)	462	(15.0)	0.071
ビタミン薬	23	(10.4)	61	(16.0)	98	(17.7)	130	(17.3)	121	(17.4)	75	(15.9)	508	(16.5)	0.158
サプリメント	23	(10.4)	57	(14.9)	117	(21.2)	171	(22.8)	184	(26.5)	120	(25.4)	672	(21.8)	<0.001
その他	3	(1.4)	12	(3.1)	29	(5.2)	69	(9.2)	86	(12.4)	63	(13.3)	262	(8.5)	<0.001
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	1	(.2)	2	(.3)	3	(.4)	4	(.8)	10	(.3)	0.252

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く  
家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表24. 職業別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076)

	職業										
	自営業		正社員		非正社員		学生		主婦(主夫)		p-value
	n=248	n=1406	n=394	n=271	n=436	n	(%)	n	(%)		
家庭の常備薬	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
特にない	38	(15.3)	159	(11.3)	36	(9.1)	47	(17.3)	46	(10.6)	
風邪薬	169	(68.1)	1,021	(72.6)	298	(75.6)	169	(62.4)	325	(74.5)	
解熱鎮痛薬	125	(50.4)	767	(54.6)	258	(65.5)	125	(46.1)	274	(62.8)	
鼻炎薬(アレルギー薬)	73	(29.4)	457	(32.5)	137	(34.8)	90	(33.2)	135	(31.0)	
乗り物酔い止め	32	(12.9)	193	(13.7)	80	(20.3)	79	(29.2)	72	(16.5)	
胃腸薬	152	(61.3)	791	(56.3)	230	(58.4)	119	(43.9)	255	(58.5)	
便秘薬	45	(18.1)	179	(12.7)	84	(21.3)	53	(19.6)	85	(19.5)	
咳止め	58	(23.4)	280	(19.9)	97	(24.6)	60	(22.1)	100	(22.9)	
漢方薬	50	(20.2)	213	(15.1)	65	(16.5)	31	(11.4)	79	(18.1)	
ビタミン薬	45	(18.1)	263	(18.7)	71	(18.0)	41	(15.1)	76	(17.4)	
サプリメント	64	(25.8)	314	(22.3)	101	(25.6)	42	(15.5)	131	(30.0)	
その他	10	(4.0)	31	(2.2)	13	(3.3)	3	(1.1)	24	(5.5)	
無回答・不明	0	(0)	7	(.5)	1	(.3)	4	(1.5)	2	(.5)	
過去1年に使用した医薬品											
特にない	28	(11.3)	87	(6.2)	27	(6.9)	38	(14.0)	31	(7.1)	
風邪薬	142	(57.3)	958	(68.1)	259	(65.7)	171	(63.1)	286	(65.6)	
解熱鎮痛薬	141	(56.9)	893	(63.5)	267	(67.8)	152	(56.1)	312	(71.6)	
鼻炎薬(アレルギー薬)	58	(23.4)	419	(29.8)	132	(33.5)	101	(37.3)	127	(29.1)	
乗り物酔い止め	15	(6.0)	82	(5.8)	29	(7.4)	48	(17.7)	35	(8.0)	
胃腸薬	102	(41.1)	528	(37.6)	160	(40.6)	71	(26.2)	166	(38.1)	
便秘薬	22	(8.9)	110	(7.8)	56	(14.2)	21	(7.7)	75	(17.2)	
咳止め	44	(17.7)	250	(17.8)	78	(19.8)	54	(19.9)	101	(23.2)	
漢方薬	38	(15.3)	197	(14.0)	65	(16.5)	29	(10.7)	89	(20.4)	
ビタミン薬	35	(14.1)	238	(16.9)	64	(16.2)	35	(12.9)	81	(18.6)	
サプリメント	60	(24.2)	307	(21.8)	95	(24.1)	27	(10.0)	115	(26.4)	
その他	22	(8.9)	108	(7.7)	32	(8.1)	5	(1.8)	53	(12.2)	
無回答・不明	1	(.4)	5	(.4)	1	(.3)	0	(0)	1	(.2)	

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表24. 職業別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076) 続き

	職業									
	無職		その他		無回答・不明		合計		p-value	
	n=179	n=138	n=4	n=3076	n	(%)	n	(%)		
家庭の常備薬	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
特にない	34	(19.0)	21	(15.2)	0	(0)	381	(12.4)	0.003	
風邪薬	110	(61.5)	97	(70.3)	3	(75.0)	2,192	(71.3)	0.002	
解熱鎮痛薬	75	(41.9)	74	(53.6)	3	(75.0)	1,701	(55.3)	<0.001	
鼻炎薬(アレルギー薬)	44	(24.6)	36	(26.1)	0	(0)	972	(31.6)	0.134	
乗り物酔い止め	11	(6.1)	13	(9.4)	0	(0)	480	(15.6)	<0.001	
胃腸薬	87	(48.6)	75	(54.3)	2	(50.0)	1,711	(55.6)	0.005	
便秘薬	23	(12.8)	24	(17.4)	2	(50.0)	495	(16.1)	<0.001	
咳止め	32	(17.9)	32	(23.2)	0	(0)	659	(21.4)	0.274	
漢方薬	24	(13.4)	16	(11.6)	1	(25.0)	479	(15.6)	0.104	
ビタミン薬	27	(15.1)	30	(21.7)	1	(25.0)	554	(18.0)	0.536	
サプリメント	31	(17.3)	37	(26.8)	2	(50.0)	722	(23.5)	0.001	
その他	3	(1.7)	4	(2.9)	0	(0)	88	(2.9)	0.018	
無回答・不明	2	(1.1)	0	(0)	0	(0)	16	(.5)	0.279	
過去1年に使用した医薬品										
特にない	25	(14.0)	10	(7.2)	0	(0)	246	(8.0)	<0.001	
風邪薬	82	(45.8)	91	(65.9)	1	(25.0)	1,990	(64.7)	<0.001	
解熱鎮痛薬	86	(48.0)	84	(60.9)	2	(50.0)	1,937	(63.0)	<0.001	
鼻炎薬(アレルギー薬)	29	(16.2)	32	(23.2)	1	(25.0)	899	(29.2)	0.001	
乗り物酔い止め	2	(1.1)	6	(4.3)	0	(0)	217	(7.1)	<0.001	
胃腸薬	61	(34.1)	53	(38.4)	1	(25.0)	1,142	(37.1)	0.043	
便秘薬	19	(10.6)	23	(16.7)	1	(25.0)	327	(10.6)	<0.001	
咳止め	21	(11.7)	31	(22.5)	0	(0)	579	(18.8)	0.138	
漢方薬	23	(12.8)	20	(14.5)	1	(25.0)	462	(15.0)	0.084	
ビタミン薬	21	(11.7)	33	(23.9)	1	(25.0)	508	(16.5)	0.177	
サプリメント	27	(15.1)	39	(28.3)	2	(50.0)	672	(21.8)	<0.001	
その他	29	(16.2)	13	(9.4)	0	(0)	262	(8.5)	<0.001	
無回答・不明	2	(1.1)	0	(0)	0	(0)	10	(.3)	0.649	

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表25. 最終学歴別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076)

	中学校 n=194		高等学校 n=1186		専門学校 n=406		短大・大学 n=929		大学院 n=66	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
家庭の常備薬										
特にない	41	(21.1)	144	(12.1)	45	(11.1)	89	(9.6)	9	(13.6)
風邪薬	112	(57.7)	870	(73.4)	297	(73.2)	688	(74.1)	42	(63.6)
解熱鎮痛薬	81	(41.8)	659	(55.6)	251	(61.8)	539	(58.0)	36	(54.5)
鼻炎薬(アレルギー薬)	40	(20.6)	376	(31.7)	137	(33.7)	306	(32.9)	21	(31.8)
乗り物酔い止め	15	(7.7)	152	(12.8)	68	(16.7)	150	(16.1)	13	(19.7)
胃腸薬	93	(47.9)	685	(57.8)	226	(55.7)	541	(58.2)	39	(59.1)
便秘薬	21	(10.8)	201	(16.9)	82	(20.2)	134	(14.4)	2	(3.0)
咳止め	49	(25.3)	253	(21.3)	89	(21.9)	194	(20.9)	9	(13.6)
漢方薬	16	(8.2)	158	(13.3)	79	(19.5)	180	(19.4)	11	(16.7)
ビタミン薬	19	(9.8)	192	(16.2)	80	(19.7)	200	(21.5)	19	(28.8)
サプリメント	28	(14.4)	276	(23.3)	106	(26.1)	250	(26.9)	15	(22.7)
その他	3	(1.5)	33	(2.8)	12	(3.0)	33	(3.6)	2	(3.0)
無回答・不明	2	(1.0)	4	(.3)	3	(.7)	3	(.3)	0	(.0)
過去1年に使用した医薬品										
特にない	25	(12.9)	104	(8.8)	18	(4.4)	52	(5.6)	4	(6.1)
風邪薬	114	(58.8)	752	(63.4)	265	(65.3)	625	(67.3)	51	(77.3)
解熱鎮痛薬	109	(56.2)	757	(63.8)	286	(70.4)	588	(63.3)	35	(53.0)
鼻炎薬(アレルギー薬)	33	(17.0)	322	(27.2)	120	(29.6)	296	(31.9)	22	(33.3)
乗り物酔い止め	7	(3.6)	73	(6.2)	26	(6.4)	58	(6.2)	4	(6.1)
胃腸薬	61	(31.4)	446	(37.6)	164	(40.4)	359	(38.6)	34	(51.5)
便秘薬	13	(6.7)	150	(12.6)	58	(14.3)	82	(8.8)	1	(1.5)
咳止め	34	(17.5)	205	(17.3)	78	(19.2)	194	(20.9)	10	(15.2)
漢方薬	16	(8.2)	152	(12.8)	67	(16.5)	186	(20.0)	10	(15.2)
ビタミン薬	20	(10.3)	165	(13.9)	79	(19.5)	189	(20.3)	16	(24.2)
サプリメント	24	(12.4)	264	(22.3)	100	(24.6)	234	(25.2)	16	(24.2)
その他	16	(8.2)	96	(8.1)	36	(8.9)	94	(10.1)	10	(15.2)
無回答・不明	1	(.5)	5	(.4)	1	(.2)	3	(.3)	0	(.0)

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表25. 最終学歴別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076) 続き

	最終学歴								
	その他 n=16		在学中 n=271		無回答・不明 n=8		合計 n=3076		p-value
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
家庭の常備薬									
特にない	5	(31.3)	47	(17.3)	1	(12.5)	381	(12.4)	<0.001
風邪薬	9	(56.3)	169	(62.4)	5	(62.5)	2192	(71.3)	<0.001
解熱鎮痛薬	7	(43.8)	125	(46.1)	3	(37.5)	1701	(55.3)	<0.001
鼻炎薬(アレルギー薬)	2	(12.5)	90	(33.2)	0	(.0)	972	(31.6)	0.018
乗り物酔い止め	3	(18.8)	79	(29.2)	0	(.0)	480	(15.6)	<0.001
胃腸薬	6	(37.5)	119	(43.9)	2	(25.0)	1711	(55.6)	0.001
便秘薬	1	(6.3)	53	(19.6)	1	(12.5)	495	(16.1)	0.004
咳止め	4	(25.0)	60	(22.1)	1	(12.5)	659	(21.4)	0.508
漢方薬	3	(18.8)	31	(11.4)	1	(12.5)	479	(15.6)	<0.001
ビタミン薬	1	(6.3)	41	(15.1)	2	(25.0)	554	(18.0)	0.001
サプリメント	3	(18.8)	42	(15.5)	2	(25.0)	722	(23.5)	0.002
その他	2	(12.5)	3	(1.1)	0	(.0)	88	(2.9)	0.152
無回答・不明	0	(.0)	4	(1.5)	0	(.0)	16	(.5)	0.326
過去1年に使用した医薬品									
特にない	3	(18.8)	38	(14.0)	2	(25.0)	246	(8.0)	<0.001
風邪薬	9	(56.3)	171	(63.1)	3	(37.5)	1990	(64.7)	0.298
解熱鎮痛薬	8	(50.0)	152	(56.1)	2	(25.0)	1937	(63.0)	0.006
鼻炎薬(アレルギー薬)	5	(31.3)	101	(37.3)	0	(.0)	899	(29.2)	0.003
乗り物酔い止め	1	(6.3)	48	(17.7)	0	(.0)	217	(7.1)	<0.001
胃腸薬	5	(31.3)	71	(26.2)	2	(25.0)	1142	(37.1)	0.014
便秘薬	1	(6.3)	21	(7.7)	1	(12.5)	327	(10.6)	0.016
咳止め	4	(25.0)	54	(19.9)	0	(.0)	579	(18.8)	0.799
漢方薬	1	(6.3)	29	(10.7)	1	(12.5)	462	(15.0)	0.001
ビタミン薬	3	(18.8)	35	(12.9)	1	(12.5)	508	(16.5)	0.006
サプリメント	5	(31.3)	27	(10.0)	2	(25.0)	672	(21.8)	<0.001
その他	4	(25.0)	5	(1.8)	1	(12.5)	262	(8.5)	0.007
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	10	(.3)	0.969

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表26. 学校中退歴別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076)

	学校中退歴								
	あり		なし		無回答・不明		合計		p-value
	n=211	n=2852	n=13	n=3076	n	n	n	n	
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
家庭の常備薬									
特になし	35	(16.6)	344	(12.1)	2	(15.4)	381	(12.4)	0.422
風邪薬	142	(67.3)	2042	(71.6)	8	(61.5)	2192	(71.3)	0.633
解熱鎮痛薬	115	(54.5)	1580	(55.4)	6	(46.2)	1701	(55.3)	0.961
鼻炎薬(アレルギー薬)	57	(27.0)	913	(32.0)	2	(15.4)	972	(31.6)	0.407
乗り物酔い止め	24	(11.4)	454	(15.9)	2	(15.4)	480	(15.6)	0.529
胃腸薬	112	(53.1)	1594	(55.9)	5	(38.5)	1711	(55.6)	0.672
便秘薬	30	(14.2)	463	(16.2)	2	(15.4)	495	(16.1)	0.954
咳止め	39	(18.5)	616	(21.6)	4	(30.8)	659	(21.4)	0.757
漢方薬	33	(15.6)	444	(15.6)	2	(15.4)	479	(15.6)	0.999
ビタミン薬	33	(15.6)	517	(18.1)	4	(30.8)	554	(18.0)	0.676
サプリメント	37	(17.5)	681	(23.9)	4	(30.8)	722	(23.5)	0.300
その他	3	(1.4)	85	(3.0)	0	(0)	88	(2.9)	0.701
無回答・不明	1	(.5)	15	(.5)	0	(0)	16	(.5)	0.961
過去1年に使用した医薬品									
特になし	22	(10.4)	220	(7.7)	4	(30.8)	246	(8.0)	0.018
風邪薬	137	(64.9)	1847	(64.8)	6	(46.2)	1990	(64.7)	0.590
解熱鎮痛薬	137	(64.9)	1796	(63.0)	4	(30.8)	1937	(63.0)	0.138
鼻炎薬(アレルギー薬)	50	(23.7)	847	(29.7)	2	(15.4)	899	(29.2)	0.235
乗り物酔い止め	8	(3.8)	209	(7.3)	0	(0)	217	(7.1)	0.232
胃腸薬	71	(33.6)	1068	(37.4)	3	(23.1)	1142	(37.1)	0.523
便秘薬	20	(9.5)	306	(10.7)	1	(7.7)	327	(10.6)	0.869
咳止め	41	(19.4)	536	(18.8)	2	(15.4)	579	(18.8)	0.920
漢方薬	35	(16.6)	426	(14.9)	1	(7.7)	462	(15.0)	0.784
ビタミン薬	36	(17.1)	470	(16.5)	2	(15.4)	508	(16.5)	0.933
サプリメント	41	(19.4)	628	(22.0)	3	(23.1)	672	(21.8)	0.806
その他	12	(5.7)	249	(8.7)	1	(7.7)	262	(8.5)	0.528
無回答・不明	0	(0)	10	(.4)	0	(0)	10	(.3)	0.674

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表27. 薬物使用経験別にみた常備薬および医薬品使用(n=3076)

	薬物使用経験								
	生涯経験あり		生涯経験なし		無回答・不明		合計		p-value
	n=78	n=2940	n=58	n=3076	n	n	n	n	
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
家庭の常備薬									
特になし	8	(10.3)	358	(12.2)	15	(25.9)	381	(12.4)	0.024
風邪薬	52	(66.7)	2,108	(71.7)	32	(55.2)	2,192	(71.3)	0.043
解熱鎮痛薬	49	(62.8)	1,633	(55.5)	19	(32.8)	1,701	(55.3)	0.004
鼻炎薬(アレルギー薬)	24	(30.8)	936	(31.8)	12	(20.7)	972	(31.6)	0.334
乗り物酔い止め	9	(11.5)	467	(15.9)	4	(6.9)	480	(15.6)	0.224
胃腸薬	43	(55.1)	1,637	(55.7)	31	(53.4)	1,711	(55.6)	0.856
便秘薬	13	(16.7)	476	(16.2)	6	(10.3)	495	(16.1)	0.610
咳止め	22	(28.2)	628	(21.4)	9	(15.5)	659	(21.4)	0.322
漢方薬	10	(12.8)	462	(15.7)	7	(12.1)	479	(15.6)	0.698
ビタミン薬	16	(20.5)	535	(18.2)	3	(5.2)	554	(18.0)	0.085
サプリメント	18	(23.1)	697	(23.7)	7	(12.1)	722	(23.5)	0.234
その他	3	(3.8)	83	(2.8)	2	(3.4)	88	(2.9)	0.817
無回答・不明	1	(1.3)	15	(.5)	0	(0)	16	(.5)	0.553
過去1年に使用した医薬品									
特になし	4	(5.1)	232	(7.9)	10	(17.2)	246	(8.0)	<0.001
風邪薬	50	(64.1)	1,908	(64.9)	32	(55.2)	1,990	(64.7)	0.005
解熱鎮痛薬	53	(67.9)	1,854	(63.1)	30	(51.7)	1,937	(63.0)	0.002
鼻炎薬(アレルギー薬)	18	(23.1)	872	(29.7)	9	(15.5)	899	(29.2)	0.001
乗り物酔い止め	6	(7.7)	208	(7.1)	3	(5.2)	217	(7.1)	0.012
胃腸薬	23	(29.5)	1,109	(37.7)	10	(17.2)	1,142	(37.1)	<0.001
便秘薬	7	(9.0)	315	(10.7)	5	(8.6)	327	(10.6)	0.012
咳止め	18	(23.1)	549	(18.7)	12	(20.7)	579	(18.8)	0.008
漢方薬	8	(10.3)	447	(15.2)	7	(12.1)	462	(15.0)	0.007
ビタミン薬	15	(19.2)	488	(16.6)	5	(8.6)	508	(16.5)	0.003
サプリメント	22	(28.2)	644	(21.9)	6	(10.3)	672	(21.8)	0.001
その他	6	(7.7)	250	(8.5)	6	(10.3)	262	(8.5)	0.012
無回答・不明	2	(2.6)	8	(.3)	0	(0)	10	(.3)	0.002

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「サプリメント」はビタミン薬を除く

家庭の常備薬および過去1年に使用した医薬品における「胃腸薬」には整腸剤、下痢止めを含む

表28. 居住地別にみた鎮痛薬使用状況 (n=3076)

	居住地											
	北海道		東北		関東		北陸		東山		東海	
	n=131	n=250	n=948	n=154	n=150	n=328	n	(%)	n	(%)	n	(%)
過去1年鎮痛薬使用経験												
なし	34	(26.0)	99	(39.6)	346	(36.5)	58	(37.7)	62	(41.3)	111	(33.8)
あり	96	(73.3)	151	(60.4)	599	(63.2)	96	(62.3)	88	(58.7)	217	(66.2)
無回答・不明	1	(.8)	0	(.0)	3	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
過去1年鎮痛薬使用頻度												
なし	34	(26.0)	99	(39.6)	346	(36.5)	58	(37.7)	62	(41.3)	111	(33.8)
年間5回以内	52	(39.7)	90	(36.0)	330	(34.8)	49	(31.8)	49	(32.7)	115	(35.1)
年間約6～11回	7	(5.3)	15	(6.0)	76	(8.0)	11	(7.1)	9	(6.0)	27	(8.2)
年間約12～24回	17	(13.0)	18	(7.2)	75	(7.9)	11	(7.1)	15	(10.0)	42	(12.8)
年間約25～51回	13	(9.9)	8	(3.2)	47	(5.0)	9	(5.8)	8	(5.3)	16	(4.9)
週に1～2回程度	3	(2.3)	3	(1.2)	22	(2.3)	5	(3.2)	1	(.7)	5	(1.5)
週に3～6回程度	0	(.0)	3	(1.2)	7	(.7)	2	(1.3)	2	(1.3)	2	(.6)
ほとんど毎日	2	(1.5)	4	(1.6)	19	(2.0)	4	(2.6)	2	(1.3)	3	(.9)
使用頻度不明	2	(1.5)	10	(4.0)	23	(2.4)	5	(3.2)	2	(1.3)	7	(2.1)
無回答・不明	1	(.8)	0	(.0)	3	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
鎮痛薬の常用的使用												
なし	126	(96.2)	233	(93.2)	896	(94.5)	143	(92.9)	144	(96.0)	316	(96.3)
あり	2	(1.5)	7	(2.8)	26	(2.7)	6	(3.9)	4	(2.7)	5	(1.5)
無回答・不明	3	(2.3)	10	(4.0)	26	(2.7)	5	(3.2)	2	(1.3)	7	(2.1)
鎮痛薬入手先												
入手なし	27	(20.6)	84	(33.6)	294	(31.0)	49	(31.8)	55	(36.7)	91	(27.7)
常備薬から	15	(11.5)	35	(14.0)	134	(14.1)	23	(14.9)	22	(14.7)	43	(13.1)
家族から	10	(7.6)	8	(3.2)	39	(4.1)	4	(2.6)	5	(3.3)	15	(4.6)
医院・病院から	43	(32.8)	57	(22.8)	228	(24.1)	35	(22.7)	35	(23.3)	95	(29.0)
薬局・薬店から	58	(44.3)	81	(32.4)	388	(40.9)	60	(39.0)	57	(38.0)	145	(44.2)
友人・知人から	0	(.0)	2	(.8)	12	(1.3)	1	(.6)	0	(.0)	1	(.3)
愛人・恋人から	0	(.0)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
インターネットから	1	(.8)	1	(.4)	2	(.2)	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)
その他	0	(.0)	0	(.0)	4	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
入手先不明	3	(2.3)	8	(3.2)	13	(1.4)	3	(1.9)	2	(1.3)	5	(1.5)
無回答・不明	2	(1.5)	2	(.8)	9	(.9)	3	(1.9)	1	(.7)	2	(.6)
鎮痛薬使用理由												
なし	34	(26.0)	99	(39.6)	346	(36.5)	58	(37.7)	62	(41.3)	111	(33.8)
頭痛	59	(45.0)	76	(30.4)	377	(39.8)	54	(35.1)	60	(40.0)	137	(41.8)
歯痛	16	(12.2)	40	(16.0)	94	(9.9)	19	(12.3)	9	(6.0)	32	(9.8)
腰痛	10	(7.6)	17	(6.8)	70	(7.4)	10	(6.5)	11	(7.3)	25	(7.6)
生理痛	14	(10.7)	32	(12.8)	125	(13.2)	15	(9.7)	14	(9.3)	37	(11.3)
胃痛	6	(4.6)	5	(2.0)	31	(3.3)	5	(3.2)	2	(1.3)	11	(3.4)
肩こり	4	(3.1)	7	(2.8)	46	(4.9)	5	(3.2)	6	(4.0)	18	(5.5)
遊び(快感)目的で	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
その他	14	(10.7)	22	(8.8)	101	(10.7)	17	(11.0)	19	(12.7)	32	(9.8)
使用目的不明	4	(3.1)	8	(3.2)	20	(2.1)	5	(3.2)	2	(1.3)	6	(1.8)
無回答・不明	1	(.8)	0	(.0)	3	(.3)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
過去30日間の鎮痛薬使用												
なし	90	(68.7)	202	(80.8)	682	(71.9)	114	(74.0)	113	(75.3)	230	(70.1)
あり	40	(30.5)	48	(19.2)	261	(27.5)	38	(24.7)	36	(24.0)	98	(29.9)
無回答・不明	1	(.8)	0	(.0)	5	(.5)	2	(1.3)	1	(.7)	0	(.0)
使用した鎮痛薬カテゴリ												
非オピオイド鎮痛薬	29	(100.0)	39	(100.0)	225	(97.4)	35	(100.0)	30	(100.0)	85	(97.7)
オピオイド鎮痛薬	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
補助鎮痛薬	0	(.0)	1	(2.6)	5	(2.2)	1	(2.9)	0	(.0)	2	(2.3)
その他	0	(.0)	1	(2.6)	6	(2.6)	0	(.0)	0	(.0)	3	(3.4)
鎮痛薬使用に対する考え												
使う必要がないので、考えたことがない	33	(25.2)	104	(41.6)	302	(31.9)	57	(37.0)	53	(35.3)	96	(29.3)
必要な時には、心配せずに使う	65	(49.6)	94	(37.6)	393	(41.5)	63	(40.9)	53	(35.3)	138	(42.1)
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	27	(20.6)	36	(14.4)	195	(20.6)	28	(18.2)	31	(20.7)	72	(22.0)
必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない	6	(4.6)	11	(4.4)	49	(5.2)	4	(2.6)	9	(6.0)	16	(4.9)
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	0	(.0)	2	(.8)	5	(.5)	1	(.6)	2	(1.3)	3	(.9)
無回答・無効回答	0	(.0)	3	(1.2)	4	(.4)	1	(.6)	2	(1.3)	3	(.9)

鎮痛薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む  
 使用鎮痛薬数(平均)および使用した鎮痛薬カテゴリは、過去30日間の状況



表28. 居住地別にみた鎮痛薬使用状況(n=3076) 続き

	居住地										p-value		
	近畿		中国		四国		北九州		南九州			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
過去1年鎮痛薬使用経験													0.097
なし	185	(41.9)	78	(40.8)	25	(28.4)	81	(35.4)	55	(33.3)	1,134	(36.9)	
あり	257	(58.1)	112	(58.6)	63	(71.6)	148	(64.6)	110	(66.7)	1,937	(63.0)	
無回答・不明	0	(0)	1	(.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(.2)	
過去1年鎮痛薬使用頻度													0.707
なし	185	(41.9)	78	(40.8)	25	(28.4)	81	(35.4)	55	(33.3)	1,134	(36.9)	
年間5回以内	140	(31.7)	62	(32.5)	32	(36.4)	82	(35.8)	63	(38.2)	1,064	(34.6)	
年間約6～11回	31	(7.0)	15	(7.9)	7	(8.0)	18	(7.9)	16	(9.7)	232	(7.5)	
年間約12～24回	37	(8.4)	19	(9.9)	8	(9.1)	18	(7.9)	13	(7.9)	273	(8.9)	
年間約25～51回	21	(4.8)	9	(4.7)	10	(11.4)	14	(6.1)	8	(4.8)	163	(5.3)	
週に1～2回程度	6	(1.4)	1	(.5)	1	(1.1)	7	(3.1)	4	(2.4)	58	(1.9)	
週に3～6回程度	3	(.7)	2	(1.0)	2	(2.3)	1	(.4)	1	(.6)	25	(.8)	
ほとんど毎日	7	(1.6)	2	(1.0)	2	(2.3)	5	(2.2)	2	(1.2)	52	(1.7)	
使用頻度不明	12	(2.7)	2	(1.0)	1	(1.1)	3	(1.3)	3	(1.8)	70	(2.3)	
無回答・不明	0	(0)	1	(.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(.2)	
鎮痛薬の常用的使用													0.893
なし	420	(95.0)	184	(96.3)	83	(94.3)	220	(96.1)	159	(96.4)	2,924	(95.1)	
あり	10	(2.3)	4	(2.1)	4	(4.5)	6	(2.6)	3	(1.8)	77	(2.5)	
無回答・不明	12	(2.7)	3	(1.6)	1	(1.1)	3	(1.3)	3	(1.8)	75	(2.4)	
鎮痛薬入手先													
入手なし	156	(35.3)	67	(35.1)	21	(23.9)	73	(31.9)	48	(29.1)	965	(31.4)	0.078
常備薬から	52	(11.8)	21	(11.0)	11	(12.5)	26	(11.4)	15	(9.1)	397	(12.9)	0.637
家族から	20	(4.5)	9	(4.7)	3	(3.4)	6	(2.6)	12	(7.3)	131	(4.3)	0.329
医院・病院から	94	(21.3)	59	(30.9)	37	(42.0)	65	(28.4)	44	(26.7)	792	(25.7)	0.004
薬局・薬店から	171	(38.7)	53	(27.7)	30	(34.1)	95	(41.5)	70	(42.4)	1,208	(39.3)	0.031
友人・知人から	4	(.9)	1	(.5)	1	(1.1)	1	(.4)	4	(2.4)	27	(.9)	0.362
愛人・恋人から	1	(.2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(.1)	0.840
インターネットから	0	(0)	1	(.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(.2)	0.526
その他	0	(0)	1	(.5)	0	(0)	1	(.4)	1	(.6)	7	(.2)	0.584
入手先不明	8	(1.8)	2	(1.0)	0	(0)	2	(.9)	1	(.6)	47	(1.5)	0.532
無回答・不明	3	(.7)	5	(2.6)	1	(1.1)	0	(0)	2	(1.2)	30	(1.0)	0.380
鎮痛薬使用理由													
なし	185	(41.9)	78	(40.8)	25	(28.4)	81	(35.4)	55	(33.3)	1,134	(36.9)	0.097
頭痛	157	(35.5)	78	(40.8)	46	(52.3)	92	(40.2)	79	(47.9)	1,215	(39.5)	0.018
歯痛	30	(6.8)	12	(6.3)	9	(10.2)	26	(11.4)	18	(10.9)	305	(9.9)	0.045
腰痛	20	(4.5)	8	(4.2)	9	(10.2)	14	(6.1)	13	(7.9)	207	(6.7)	0.607
生理痛	43	(9.7)	9	(4.7)	5	(5.7)	28	(12.2)	13	(7.9)	335	(10.9)	0.108
胃痛	19	(4.3)	5	(2.6)	1	(1.1)	7	(3.1)	6	(3.6)	98	(3.2)	0.730
肩こり	11	(2.5)	6	(3.1)	8	(9.1)	9	(3.9)	5	(3.0)	125	(4.1)	0.287
遊び(快感)目的で	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0.554
その他	39	(8.8)	19	(9.9)	8	(9.1)	31	(13.5)	10	(6.1)	312	(10.1)	0.605
使用目的不明	12	(2.7)	4	(2.1)	1	(1.1)	3	(1.3)	4	(2.4)	69	(2.2)	0.895
無回答・不明	0	(0)	1	(.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(.2)	0.554
過去30日間の鎮痛薬使用													0.206
なし	323	(73.1)	141	(73.8)	62	(70.5)	167	(72.9)	117	(70.9)	2,241	(72.9)	
あり	116	(26.2)	47	(24.6)	26	(29.5)	62	(27.1)	48	(29.1)	820	(26.7)	
無回答・不明	3	(.7)	3	(1.6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	15	(.5)	
使用した鎮痛薬カテゴリ													
非オピオイド鎮痛薬	99	(97.1)	41	(100.0)	20	(95.2)	57	(100.0)	40	(93.0)	700	(97.9)	0.331
オピオイド鎮痛薬	3	(2.9)	0	(0)	1	(4.8)	0	(0)	0	(0)	4	(.6)	0.025
補助鎮痛薬	1	(1.0)	1	(2.4)	0	(0)	1	(1.8)	0	(0)	12	(1.7)	0.962
その他	5	(4.9)	0	(0)	1	(4.8)	1	(1.8)	3	(7.0)	20	(2.8)	0.419
鎮痛薬使用に対する考え													0.011
使う必要がないので、考えたことがない	157	(35.5)	62	(32.5)	19	(21.6)	86	(37.6)	50	(30.3)	1,019	(33.1)	
必要な時には、心配せずに使う	142	(32.1)	86	(45.0)	36	(40.9)	82	(35.8)	73	(44.2)	1,225	(39.8)	
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	110	(24.9)	30	(15.7)	25	(28.4)	43	(18.8)	34	(20.6)	631	(20.5)	
必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない	24	(5.4)	9	(4.7)	4	(4.5)	17	(7.4)	5	(3.0)	154	(5.0)	
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	6	(1.4)	1	(.5)	3	(3.4)	1	(.4)	3	(1.8)	27	(.9)	
無回答・無効回答	3	(.7)	3	(1.6)	1	(1.1)	0	(0)	0	(0)	20	(.7)	

鎮痛薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む  
 使用鎮痛薬数(平均)および使用した鎮痛薬カテゴリは、過去30日間の状況

表29. 性別にみた鎮痛薬使用状況(n=3076)

	性別						p-value
	男性		女性		合計		
	n=1466		n=1610		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
過去1年鎮痛薬使用経験							<0.001
なし	685	(46.7)	449	(27.9)	1,134	(36.9)	
あり	777	(53.0)	1,160	(72.0)	1,937	(63.0)	
無回答・不明	4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)	
過去1年鎮痛薬使用頻度							<0.001
なし	685	(46.7)	449	(27.9)	1,134	(36.9)	
年間5回以内	520	(35.5)	544	(33.8)	1,064	(34.6)	
年間約6～11回	89	(6.1)	143	(8.9)	232	(7.5)	
年間約12～24回	54	(3.7)	219	(13.6)	273	(8.9)	
年間約25～51回	34	(2.3)	129	(8.0)	163	(5.3)	
週に1～2回程度	16	(1.1)	42	(2.6)	58	(1.9)	
週に3～6回程度	9	(.6)	16	(1.0)	25	(.8)	
ほとんど毎日	20	(1.4)	32	(2.0)	52	(1.7)	
使用頻度不明	35	(2.4)	35	(2.2)	70	(2.3)	
無回答・不明	4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)	
鎮痛薬の常用的使用							0.159
なし	1,398	(95.4)	1,526	(94.8)	2,924	(95.1)	
あり	29	(2.0)	48	(3.0)	77	(2.5)	
無回答・不明	39	(2.7)	36	(2.2)	75	(2.4)	
鎮痛薬入手先							
入手なし	597	(40.7)	368	(22.9)	965	(31.4)	<0.001
常備薬から	168	(11.5)	229	(14.2)	397	(12.9)	0.002
家族から	63	(4.3)	68	(4.2)	131	(4.3)	0.018
医院・病院から	300	(20.5)	492	(30.6)	792	(25.7)	<0.001
薬局・薬店から	457	(31.2)	751	(46.6)	1,208	(39.3)	<0.001
友人・知人から	7	(.5)	20	(1.2)	27	(.9)	0.001
愛人・恋人から	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)	0.018
インターネットから	2	(.1)	4	(.2)	6	(.2)	0.014
その他	2	(.1)	5	(.3)	7	(.2)	0.011
入手先不明	25	(1.7)	22	(1.4)	47	(1.5)	0.444
無回答・不明	22	(1.5)	8	(.5)	30	(1.0)	0.005
鎮痛薬使用理由							
なし	685	(46.7)	449	(27.9)	1,134	(36.9)	<0.001
頭痛	433	(29.5)	782	(48.6)	1,215	(39.5)	<0.001
歯痛	160	(10.9)	145	(9.0)	305	(9.9)	0.071
腰痛	98	(6.7)	109	(6.8)	207	(6.7)	0.349
生理痛	0	(.0)	335	(20.8)	335	(10.9)	<0.001
胃痛	38	(2.6)	60	(3.7)	98	(3.2)	0.072
肩こり	30	(2.0)	95	(5.9)	125	(4.1)	<0.001
遊び(快感)目的で	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0.147
その他	132	(9.0)	180	(11.2)	312	(10.1)	0.050
使用目的不明	41	(2.8)	28	(1.7)	69	(2.2)	0.048
無回答・不明	4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)	0.147
過去30日間の鎮痛薬使用							<0.001
なし	1,230	(83.9)	1,011	(62.8)	2,241	(72.9)	
あり	226	(15.4)	594	(36.9)	820	(26.7)	
無回答・不明	10	(.7)	5	(.3)	15	(.5)	
使用した鎮痛薬カテゴリ							
非オピオイド鎮痛薬	178	(97.3)	522	(98.1)	700	(97.9)	<0.001
オピオイド鎮痛薬	1	(.5)	3	(.6)	4	(.6)	0.364
補助鎮痛薬	6	(3.3)	6	(1.1)	12	(1.7)	0.871
その他	4	(2.2)	16	(3.0)	20	(2.8)	0.013
鎮痛薬使用に対する考え							<0.001
使う必要がないので、考えたことがない	640	(43.7)	379	(23.5)	1,019	(33.1)	
必要な時には、心配せずに使う	560	(38.2)	665	(41.3)	1,225	(39.8)	
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	202	(13.8)	429	(26.6)	631	(20.5)	
必要な時でも、心配だから、どちらかというに使わない	43	(2.9)	111	(6.9)	154	(5.0)	
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	7	(.5)	20	(1.2)	27	(.9)	
無回答・無効回答	14	(1.0)	6	(.4)	20	(.7)	

鎮痛薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む  
 使用鎮痛薬数(平均)および使用した鎮痛薬カテゴリは、過去30日間の状況

表30. 年代別にみた鎮痛薬使用状況(n=3076)

	年齢階級												p-value		
	10代		20代		30代		40代		50代		60代			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
過去1年鎮痛薬使用経験														<0.001	
なし	95	(42.8)	143	(37.4)	164	(29.7)	250	(33.3)	257	(37.0)	225	(47.6)	1,134	(36.9)	
あり	127	(57.2)	239	(62.6)	389	(70.3)	499	(66.4)	438	(63.0)	245	(51.8)	1,937	(63.0)	
無回答・不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(3)	0	(0)	3	(6)	5	(2)	
過去1年鎮痛薬使用頻度														<0.001	
なし	95	(42.8)	143	(37.4)	164	(29.7)	250	(33.3)	257	(37.0)	225	(47.6)	1,134	(36.9)	
年間5回以内	63	(28.4)	119	(31.2)	192	(34.7)	273	(36.4)	250	(36.0)	167	(35.3)	1,064	(34.6)	
年間約6～11回	14	(6.3)	32	(8.4)	41	(7.4)	67	(8.9)	60	(8.6)	18	(3.8)	232	(7.5)	
年間約12～24回	34	(15.3)	44	(11.5)	72	(13.0)	68	(9.1)	41	(5.9)	14	(3.0)	273	(8.9)	
年間約25～51回	9	(4.1)	26	(6.8)	44	(8.0)	40	(5.3)	30	(4.3)	14	(3.0)	163	(5.3)	
週に1～2回程度	1	(.5)	2	(.5)	19	(3.4)	17	(2.3)	15	(2.2)	4	(.8)	58	(1.9)	
週に3～6回程度	0	(0)	4	(1.0)	3	(.5)	6	(.8)	10	(1.4)	2	(.4)	25	(.8)	
ほとんど毎日	0	(0)	3	(.8)	6	(1.1)	14	(1.9)	14	(2.0)	15	(3.2)	52	(1.7)	
使用頻度不明	6	(2.7)	9	(2.4)	12	(2.2)	14	(1.9)	18	(2.6)	11	(2.3)	70	(2.3)	
無回答・不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(3)	0	(0)	3	(6)	5	(2)	
鎮痛薬の常用的使用														0.159	
なし	216	(97.3)	366	(95.8)	532	(96.2)	715	(95.2)	653	(94.0)	442	(93.4)	2,924	(95.1)	
あり	0	(0)	7	(1.8)	9	(1.6)	20	(2.7)	24	(3.5)	17	(3.6)	77	(2.5)	
無回答・不明	6	(2.7)	9	(2.4)	12	(2.2)	16	(2.1)	18	(2.6)	14	(3.0)	75	(2.4)	
鎮痛薬入手先															
入手なし	87	(39.2)	126	(33.0)	143	(25.9)	203	(27.0)	211	(30.4)	195	(41.2)	965	(31.4)	<0.001
常備薬から	27	(12.2)	51	(13.4)	73	(13.2)	96	(12.8)	100	(14.4)	50	(10.6)	397	(12.9)	0.459
家族から	37	(16.7)	40	(10.5)	23	(4.2)	14	(1.9)	11	(1.6)	6	(1.3)	131	(4.3)	<0.001
医院・病院から	36	(16.2)	93	(24.3)	150	(27.1)	200	(26.6)	192	(27.6)	121	(25.6)	792	(25.7)	0.033
薬局・薬店から	54	(24.3)	154	(40.3)	269	(48.6)	328	(43.7)	259	(37.3)	144	(30.4)	1,208	(39.3)	<0.001
友人・知人から	1	(.5)	9	(2.4)	8	(1.4)	4	(.5)	4	(.6)	1	(.2)	27	(.9)	0.013
愛人・恋人から	0	(0)	1	(.3)	0	(0)	1	(.1)	0	(0)	0	(0)	2	(.1)	0.420
インターネットから	0	(0)	0	(0)	1	(.2)	3	(.4)	1	(.1)	1	(.2)	6	(.2)	0.524
その他	0	(0)	0	(0)	3	(.5)	4	(.5)	0	(0)	0	(0)	7	(.2)	0.109
入手先不明	5	(2.3)	7	(1.8)	8	(1.4)	12	(1.6)	10	(1.4)	5	(1.1)	47	(1.5)	0.877
無回答・不明	1	(.5)	2	(.5)	4	(.7)	8	(1.1)	6	(.9)	9	(1.9)	30	(1.0)	0.290
鎮痛薬使用理由															
なし	95	(42.8)	143	(37.4)	164	(29.7)	250	(33.3)	257	(37.0)	225	(47.6)	1,134	(36.9)	<0.001
頭痛	73	(32.9)	144	(37.7)	265	(47.9)	334	(44.5)	276	(39.7)	123	(26.0)	1,215	(39.5)	<0.001
歯痛	14	(6.3)	33	(8.6)	49	(8.9)	83	(11.1)	78	(11.2)	48	(10.1)	305	(9.9)	0.071
腰痛	11	(5.0)	11	(2.9)	33	(6.0)	57	(7.6)	51	(7.3)	44	(9.3)	207	(6.7)	0.002
生理痛	52	(23.4)	99	(25.9)	92	(16.6)	81	(10.8)	11	(1.6)	0	(0)	335	(10.9)	<0.001
胃痛	5	(2.3)	14	(3.7)	18	(3.3)	22	(2.9)	24	(3.5)	15	(3.2)	98	(3.2)	0.340
肩こり	4	(1.8)	8	(2.1)	32	(5.8)	36	(4.8)	29	(4.2)	16	(3.4)	125	(4.1)	0.013
遊び(快感)目的で	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0.075
その他	13	(5.9)	25	(6.5)	59	(10.7)	73	(9.7)	86	(12.4)	56	(11.8)	312	(10.1)	0.004
使用目的不明	8	(3.6)	11	(2.9)	11	(2.0)	17	(2.3)	11	(1.6)	11	(2.3)	69	(2.2)	0.529
無回答・不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(.3)	0	(0)	3	(6)	5	(2)	0.075
過去30日間の鎮痛薬使用														<0.001	
なし	167	(75.2)	275	(72.0)	369	(66.7)	534	(71.1)	517	(74.4)	379	(80.1)	2,241	(72.9)	
あり	55	(24.8)	107	(28.0)	181	(32.7)	215	(28.6)	176	(25.3)	86	(18.2)	820	(26.7)	
無回答・不明	0	(0)	0	(0)	3	(.5)	2	(.3)	2	(.3)	8	(1.7)	15	(.5)	
使用した鎮痛薬カテゴリ															
非オピオイド鎮痛薬	47	(100.0)	97	(100.0)	164	(99.4)	181	(97.8)	145	(94.8)	66	(97.1)	700	(97.9)	<0.001
オピオイド鎮痛薬	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(.5)	3	(2.0)	0	(0)	4	(.6)	0.221
補助鎮痛薬	0	(0)	0	(0)	2	(1.2)	3	(1.6)	1	(.7)	6	(8.8)	12	(1.7)	0.025
その他	0	(0)	0	(0)	4	(2.4)	4	(2.2)	10	(6.5)	2	(2.9)	20	(2.8)	0.047
鎮痛薬使用に対する考え														<0.001	
使う必要がないので、考えたことがない	93	(41.9)	125	(32.7)	141	(25.5)	229	(30.5)	234	(33.7)	197	(41.6)	1,019	(33.1)	
必要な時には、心配せずに使う	86	(38.7)	157	(41.1)	258	(46.7)	297	(39.5)	275	(39.6)	152	(32.1)	1,225	(39.8)	
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	35	(15.8)	71	(18.6)	123	(22.2)	170	(22.6)	140	(20.1)	92	(19.5)	631	(20.5)	
必要な時でも、心配だから、どちらかというと使わない	4	(1.8)	20	(5.2)	24	(4.3)	47	(6.3)	38	(5.5)	21	(4.4)	154	(5.0)	
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	2	(.9)	7	(1.8)	6	(1.1)	4	(.5)	3	(.4)	5	(1.1)	27	(.9)	
無回答・無効回答	2	(.9)	2	(.5)	1	(.2)	4	(.5)	5	(.7)	6	(1.3)	20	(.7)	

鎮痛薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む  
 使用鎮痛薬数(平均)および使用した鎮痛薬カテゴリは、過去30日間の状況

表31. 職業別にみた鎮痛薬使用状況(n=3076)

	職業									
	自営業 n=248		正社員 n=1406		非正社員 n=394		学生 n=271		主婦(主夫) n=436	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
過去1年鎮痛薬使用経験										
なし	105	(42.3)	511	(36.3)	127	(32.2)	119	(43.9)	124	(28.4)
あり	141	(56.9)	893	(63.5)	267	(67.8)	152	(56.1)	312	(71.6)
無回答・不明	2	(.8)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
過去1年鎮痛薬使用頻度										
なし	105	(42.3)	511	(36.3)	127	(32.2)	119	(43.9)	124	(28.4)
年間5回以内	91	(36.7)	517	(36.8)	144	(36.5)	71	(26.2)	150	(34.4)
年間約6～11回	15	(6.0)	114	(8.1)	29	(7.4)	17	(6.3)	37	(8.5)
年間約12～24回	10	(4.0)	112	(8.0)	36	(9.1)	40	(14.8)	52	(11.9)
年間約25～51回	7	(2.8)	63	(4.5)	26	(6.6)	16	(5.9)	41	(9.4)
週に1～2回程度	4	(1.6)	22	(1.6)	12	(3.0)	1	(.4)	11	(2.5)
週に3～6回程度	1	(.4)	10	(.7)	6	(1.5)	0	(.0)	5	(1.1)
ほとんど毎日	4	(1.6)	22	(1.6)	7	(1.8)	0	(.0)	10	(2.3)
使用頻度不明	9	(3.6)	33	(2.3)	7	(1.8)	7	(2.6)	6	(1.4)
無回答・不明	2	(.8)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
鎮痛薬の常用的使用										
なし	232	(93.5)	1,339	(95.2)	374	(94.9)	264	(97.4)	415	(95.2)
あり	5	(2.0)	32	(2.3)	13	(3.3)	0	(.0)	15	(3.4)
無回答・不明	11	(4.4)	35	(2.5)	7	(1.8)	7	(2.6)	6	(1.4)
鎮痛薬入手先										
入手なし	88	(35.5)	436	(31.0)	98	(24.9)	109	(40.2)	104	(23.9)
常備薬から	31	(12.5)	190	(13.5)	64	(16.2)	29	(10.7)	57	(13.1)
家族から	9	(3.6)	54	(3.8)	11	(2.8)	40	(14.8)	8	(1.8)
医院・病院から	67	(27.0)	355	(25.2)	109	(27.7)	45	(16.6)	140	(32.1)
薬局・薬店から	74	(29.8)	560	(39.8)	180	(45.7)	71	(26.2)	211	(48.4)
友人・知人から	2	(.8)	12	(.9)	3	(.8)	1	(.4)	2	(.5)
愛人・恋人から	0	(.0)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
インターネットから	1	(.4)	2	(.1)	1	(.3)	0	(.0)	2	(.5)
その他	0	(.0)	5	(.4)	0	(.0)	2	(.7)	0	(.0)
入手先不明	5	(2.0)	22	(1.6)	7	(1.8)	6	(2.2)	5	(1.1)
無回答・不明	5	(2.0)	14	(1.0)	3	(.8)	1	(.4)	3	(.7)
鎮痛薬使用理由										
なし	105	(42.3)	511	(36.3)	127	(32.2)	119	(43.9)	124	(28.4)
頭痛	76	(30.6)	535	(38.1)	185	(47.0)	83	(30.6)	226	(51.8)
歯痛	32	(12.9)	158	(11.2)	39	(9.9)	15	(5.5)	33	(7.6)
腰痛	22	(8.9)	101	(7.2)	17	(4.3)	13	(4.8)	32	(7.3)
生理痛	6	(2.4)	126	(9.0)	61	(15.5)	68	(25.1)	52	(11.9)
胃痛	11	(4.4)	43	(3.1)	18	(4.6)	6	(2.2)	11	(2.5)
肩こり	11	(4.4)	57	(4.1)	13	(3.3)	4	(1.5)	28	(6.4)
遊び(快感)目的で	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
その他	26	(10.5)	143	(10.2)	35	(8.9)	17	(6.3)	60	(13.8)
使用目的不明	7	(2.8)	35	(2.5)	6	(1.5)	8	(3.0)	5	(1.1)
無回答・不明	2	(.8)	2	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
過去30日間の鎮痛薬使用										
なし	203	(81.9)	1,044	(74.3)	275	(69.8)	200	(73.8)	268	(61.5)
あり	42	(16.9)	357	(25.4)	116	(29.4)	71	(26.2)	166	(38.1)
無回答・不明	3	(1.2)	5	(.4)	3	(.8)	0	(.0)	2	(.5)
使用した鎮痛薬カテゴリ										
非オピオイド鎮痛薬	27	(90.0)	316	(99.4)	97	(97.0)	60	(100.0)	144	(98.0)
オピオイド鎮痛薬	1	(3.3)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.7)
補助鎮痛薬	1	(3.3)	4	(1.3)	1	(1.0)	0	(.0)	4	(2.7)
その他	2	(6.7)	5	(1.6)	3	(3.0)	0	(.0)	6	(4.1)
鎮痛薬使用に対する考え										
使う必要がないので、考えたことがない	107	(43.1)	469	(33.4)	102	(25.9)	115	(42.4)	100	(22.9)
必要な時には、心配せずに使う	94	(37.9)	597	(42.5)	165	(41.9)	101	(37.3)	163	(37.4)
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	34	(13.7)	259	(18.4)	92	(23.4)	45	(16.6)	134	(30.7)
必要な時でも、心配だから、どちらかという使わない	7	(2.8)	67	(4.8)	26	(6.6)	5	(1.8)	35	(8.0)
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	2	(.8)	8	(.6)	5	(1.3)	3	(1.1)	2	(.5)
無回答・無効回答	4	(1.6)	6	(.4)	4	(1.0)	2	(.7)	2	(.5)

鎮痛薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む  
使用鎮痛薬数(平均)および使用した鎮痛薬カテゴリは、過去30日間の状況