

記載する項目は記載を、選択する項目はあてはまる項目に丸をつけてください								
患者背景								
	患者番号(施設ごとにわかる番号をつけてください)たとえばSE-1など	No.						
	年齢(現在)	歳						
	性別	男:女						
	遺伝子検査結果	両親由来のKATP変異	父親由来のKATP変異(ABCC8)	父親由来のKATP変異(KCNJ11)	遺伝子異常なし	未実施	その他()	
手術前								
	手術決定の要因	内科治療の限界	病変の拡がり	その他()				
	PET結果							
	局在	限局型膵頭部・鉤部	限局型:膵体部	限局型:膵尾部	限局型:頭・鉤・体部	限局型:体・尾部	びまん型	局在不明
	病型	限局型	びまん型					
	ASVS	した:しない; 有効・無効	コメント:					
	最終術前診断	局在型(局在)	びまん型					
	手術時年齢	歳 力月						
	予定術式	膵頭(鉤)部切除	膵体部切除	膵尾部切除	膵頭体部切除	膵体尾部切除	膵部分切除	膵垂全摘(%) 膵頭十二指腸切除
手術								
	術中診断	エコー した:しない; 有効:無効	迅速病理 した:しない; 有効:無効	肉眼所見 有効:無効				
	切除範囲	膵頭・鉤部切除	膵体部切除	膵尾部切除	膵頭・鉤・体部切除	膵体尾部切除	膵部分切除(切除部位)	膵垂全摘(%) 膵頭十二指腸切除
	再建術	空腸ルーワイ再建	Child	Whipple				
* 手術記載のコピーを名前やIDなど個人情報を含まない形で同封してください								
手術後								
	病理診断(病変のある部位にすべて丸をつけてください)	局在:頭部・鉤部・体部・尾部						
* 病理報告のコピーを名前やIDなど個人情報を含まない形で同封してください								
	術後早期合併症	膵液瘻	胆管炎	胆道狭窄	膵空腸吻合瘻	局所感染	創部感染	十二指腸壊死 その他()
	糖尿病発症	あり:なし						
	低血糖発症	あり:なし						
	治癒した場合の時期	歳						