

ATR症候群の手引き

		新生児期 (出生時)	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月	12ヶ月	15ヶ月	18ヶ月	2歳	2歳5ヶ月	3歳	6歳~	12歳~	15歳~	18歳~
		生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後	生後
症状															
症状によると、～2ヵ月の年齢が早い。															
言葉	ど	発音現るな	発音												
位置	位置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
匂四	匂四	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
運動	運動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
精神	精神	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
生活	生活	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
評議	評議	必要に応じて評議する	○												
消化器機能	消化器機能	精神状態で最も直	○												
生長状態	生長状態	体重、血球測定など	○												
検査	検査	検査の必要と経	○												
CT・MRI	CT・MRI	脊髄、頸椎骨の危険性と変	○												
尿液	尿液	特に何かなど	△												
心電図	心電図	心電図がなければ	○												
心電	心電	心電図(ASDなど)が	○												
生物学検査	生物学検査	成人期に難化す	○												
精神	精神	精神の評価(健	○												
ABR	ABR	脳波(EEG)	○												
一般検査	一般検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
血液ガス	血液ガス	呼吸困難低下	○												
二二一	二二一	心電図に応じて評	○												
毛子子発育	毛子子発育	○													
色彩辨認	色彩辨認	GATTAGGTGAG	○												
BCS染色	BCS染色	定期的な検査は不	△												△
眼	眼	定期的に見て3-	○												
耳鼻喉科	耳鼻喉科	6ヵ月位にフォロー	○												
歯科	歯科	6ヵ月位にフォロー	○												
皮膚	皮膚	皮膚疾患に応じて	○												
PIT	PIT	皮膚疾患に応じて	○												
SST	SST	感染病なども含	○												
OT	OT	四肢の筋弛緩に応じ	○												
化成透析室	化成透析室	尿量より、漏出ご	○												
透析	透析	尿量と透析を取る	○												

基礎からのもの、定期的な実績が必要
基礎からのもの、定期的な実績が必要