

表1. 回答者の属性・背景(年齢階級、恋愛対象性別、クラブ利用目的、悩みストレス、献血経験)

	男性(n=514)		女性(n=305)		全体(n=819)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>■年齢階級</b>							<.01
20代	452	(87.9)	291	(95.4)	743	(90.7)	
30代	59	(11.5)	13	(4.3)	72	(8.8)	
40歳以上	3	(.6)	1	(.3)	4	(.5)	
<b>■恋愛対象・性的魅力を感じる相手</b>							<.001
男性	36	(7.0)	273	(89.5)	309	(37.7)	
女性	469	(91.2)	22	(7.2)	491	(60.0)	
男女両方	3	(.6)	8	(2.6)	11	(1.3)	
誰に対しても感じない	3	(.6)	2	(.7)	5	(.6)	
その他	3	(.6)	0	(.0)	3	(.4)	
<b>■クラブ利用目的(複数回答)</b>							
音楽を楽しむため	309	(60.1)	246	(80.7)	555	(67.8)	<.001
友達や仲間と会うため	155	(30.2)	120	(39.3)	275	(33.6)	<.01
恋人と楽しむため	33	(6.4)	12	(3.9)	45	(5.5)	n. s.
ダンスを楽しむため	107	(20.8)	92	(30.2)	199	(24.3)	<.01
ナンパするため	177	(34.4)	7	(2.3)	184	(22.5)	<.001
ナンパされるため	33	(6.4)	19	(6.2)	52	(6.3)	n. s.
お酒を楽しむため	102	(19.8)	122	(40.0)	224	(27.4)	<.001
日常生活とは違う雰囲気を楽しむため	55	(10.7)	52	(17.0)	107	(13.1)	<.01
その他	14	(2.7)	4	(1.3)	18	(2.2)	n. s.
<b>■現在悩んでいること・ストレスに感じること(複数回答)</b>							
仕事や学業に関すること	252	(49.0)	172	(56.4)	424	(51.8)	<.01
友人関係	39	(7.6)	24	(7.9)	63	(7.7)	n. s.
恋愛関係	85	(16.5)	70	(23.0)	155	(18.9)	<.01
お金のこと	81	(15.8)	61	(20.0)	142	(17.3)	<.05
心身の健康	15	(2.9)	16	(5.2)	31	(3.8)	<.05
セックスに関すること	32	(6.2)	16	(5.2)	48	(5.9)	n. s.
夜の街でトラブルに遭う不安	12	(2.3)	2	(.7)	14	(1.7)	<.05
つきまといやストーカー被害	5	(1.0)	3	(1.0)	8	(1.0)	n. s.
上記いずれもない	108	(21.0)	52	(17.0)	160	(19.5)	<.05
<b>■献血経験あり(生涯)</b>	146	(28.4)	56	(18.4)	202	(24.7)	<.01

表2. 出会いの場・出会い系サイト利用

■出会いを求めて利用した場や方法（過去1年間）複数回答

	男性 (n=514)		女性 (n=305)		全体 (n=819)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
過去1年間は出会いを求めている	119	(23.2)	74	(24.3)	193	(23.6)	n. s.
合コン	155	(30.2)	93	(30.5)	248	(30.3)	n. s.
クラブ	209	(40.7)	98	(32.1)	307	(37.5)	<.05
遊びバー	62	(12.1)	35	(11.5)	97	(11.8)	n. s.
HUB	64	(12.5)	36	(11.8)	100	(12.2)	n. s.
相席居酒屋	47	(9.1)	49	(16.1)	96	(11.7)	<.01
出会い系アプリやSNS	42	(8.2)	31	(10.2)	73	(8.9)	n. s.
その他	97	(18.9)	81	(26.6)	178	(21.7)	<.05

■出会い目的でのアプリ・SNS使用経験（複数回答）

	男性 (n=42)		女性 (n=31)		全体 (n=73)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
Pairs	8	(19.0)	9	(29.0)	17	(23.9)	n. s.
Instagram	7	(16.7)	4	(12.9)	11	(15.1)	n. s.
Twitter	11	(26.2)	4	(12.9)	15	(20.5)	n. s.
YCC	2	(4.8)	1	(3.2)	3	(4.1)	n. s.
facebook	6	(14.3)	3	(9.7)	9	(12.3)	n. s.
Tinder	17	(40.5)	8	(25.8)	25	(34.2)	n. s.
タップル誕生	9	(21.4)	9	(29.0)	18	(24.7)	n. s.
その他	10	(23.8)	14	(45.2)	24	(32.9)	n. s.




図1. 知識項目における誤答率

表3. HIV抗体検査受検行動（生涯）

	男性 (n=514)		女性 (n=305)		全体 (n=819)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■HIV抗体検査受検経験あり	70	(13.6)	25	(8.2)	95	(11.6)	<.05
■受検場所（複数回答）	男性 (n=70)		女性 (n=25)		全体 (n=95)		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
保健所・保健センター	38	(54.3)	11	(44.0)	49	(51.6)	n. s.
病院・診療所など	21	(30.0)	13	(52.0)	34	(35.8)	n. s.
郵送検査	4	(5.7)	1	(4.0)	5	(5.3)	n. s.
その他	6	(8.6)	1	(4.0)	7	(7.4)	n. s.

表4. セックス相手人数・性別・種別（過去6カ月）

	男性 (n=514)		女性 (n=305)		全体 (n=819)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■セックス人数							<.05
これまでの人生でセックスの経験はない	31	(6.0)	15	(4.9)	46	(5.6)	
（過去6か月間では）0人	33	(6.4)	12	(3.9)	45	(5.5)	
1人	93	(18.1)	86	(28.2)	179	(21.9)	
2人～3人	134	(26.1)	86	(28.2)	220	(26.9)	
4人～9人	87	(16.9)	43	(14.1)	130	(15.9)	
10人以上	86	(16.7)	34	(11.1)	120	(14.7)	
答えたくない	50	(9.7)	29	(9.5)	79	(9.6)	
■セックス相手性別							<.001
男性	13	(2.5)	237	(77.7)	250	(30.5)	
女性	372	(72.4)	10	(3.3)	382	(46.6)	
男女両方	7	(1.4)	1	(.3)	8	(1.0)	
その他	8	(1.6)	1	(.3)	9	(1.1)	
非該当	114	(22.2)	56	(18.4)	170	(20.8)	
■セックスありの場合 相手種別	男性 (n=400)		女性 (n=249)		全体 (n=649)		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	p
特定の相手	189	(47.3)	151	(60.6)	340	(52.4)	<.01
友達やセフレと	197	(49.3)	99	(39.8)	296	(45.6)	<.05
お金を払った相手と	39	(9.8)	2	(.8)	41	(6.3)	<.001
お金をくれた相手と	5	(1.3)	10	(4.0)	15	(2.3)	<.05
SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	9	(2.3)	5	(2.0)	14	(2.2)	n. s.
街やクラブでナンパした（された）相手と	52	(13.0)	36	(14.5)	88	(13.6)	n. s.
その他	18	(4.5)	6	(2.4)	24	(3.7)	n. s.




図2. セックス相手人数と挿入時コンドーム常用の人の割合(過去6か月間)

表5. コンドーム目的意識

	男性 (n=433)		女性 (n=261)		全体 (n=694)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
避妊のため	264	(61.0)	148	(56.7)	412	(59.4)	<.05
性感染症予防のため	59	(13.6)	31	(11.9)	90	(13.0)	
両方(避妊と性感染症予防)のため	77	(17.8)	72	(27.6)	149	(21.5)	
上記いずれもあてはまらない	25	(5.8)	8	(3.1)	33	(4.8)	
無回答	8	(1.8)	2	(.8)	10	(1.4)	

表6. コンドーム不使用の理由(複数回答・無回答除く)

	男性 (n=167)		女性 (n=128)		全体 (n=291)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
つけない方が気持ちいいから	93	(55.7)	35	(27.3)	128	(43.4)	<.001
手元になかったから	31	(18.6)	41	(32.0)	72	(24.4)	<.001
一体感が欲しいから	28	(16.8)	12	(9.4)	40	(13.6)	<.01
「つけよう」と言えなかったから	8	(4.8)	21	(16.4)	29	(9.8)	<.01
外出しすれば大丈夫	8	(4.8)	19	(14.8)	27	(9.2)	<.01
自分または相手がビールを飲んでいるから	14	(8.4)	8	(6.3)	22	(7.5)	n. s.
今までつけなくても大丈夫だったから	9	(5.4)	10	(7.8)	19	(6.4)	n. s.
相手がつけなくても大丈夫と言うから	15	(9.0)	3	(2.3)	18	(6.1)	<.05
子どもがほしいから付けなかった	7	(4.2)	6	(4.7)	13	(4.4)	n. s.
今よりもっと好きになって欲しいから	2	(1.2)	1	(.8)	3	(1.0)	n. s.
上記いずれも当てはまらない	13	(7.8)	20	(15.6)	33	(11.2)	<.05

表7. 既往歴（生涯・複数回答）

	男性 (n=433)		女性 (n=261)		全体 (n=694)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
梅毒	49	(11.3)	9	(3.4)	58	(8.4)	<.01
B型肝炎	14	(3.2)	12	(4.6)	26	(3.7)	n. s.
淋菌感染症	33	(7.6)	13	(5.0)	46	(6.6)	n. s.
クラミジア	43	(9.9)	42	(16.1)	85	(12.2)	<.05
HIV感染症（エイズ）	12	(2.8)	5	(1.9)	17	(2.4)	n. s.
上記いずれも診断を受けた経験はない	303	(70.0)	194	(74.3)	497	(71.6)	n. s.

表8. アルコール・薬物使用経験（生涯・複数回答）

	男性 (n=500)		女性 (n=302)		全体 (n=802)		p
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
酔いつぶれ	74	(14.8)	65	(21.5)	139	(17.3)	<.05
睡眠薬・睡眠導入剤	17	(3.4)	8	(2.6)	25	(3.1)	n. s.
覚せい剤	8	(1.6)	0	(.0)	8	(1.0)	<.05
大麻	6	(1.2)	1	(.3)	7	(.9)	n. s.
MDMA(エクスタシー)	6	(1.2)	1	(.3)	7	(.9)	n. s.
コカイン	6	(1.2)	1	(.3)	7	(.9)	n. s.
危険ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)	4	(.8)	2	(.7)	6	(.7)	n. s.
種類不明の薬物	3	(.6)	1	(.3)	4	(.5)	n. s.