


図2 JMed-LexGridによる症状所見等の用語を自動アノテーション（抽出と意味づけ）

1. 大動脈弁狭窄, 僧帽弁狭窄のある患者, 肺高血圧のある患者 [血管拡張作用により重篤な血行動態の悪化を招くおそれがある.]
2. 過度に血圧の低い患者 [更に血圧が低下するおそれがある.]
3. 血液透析療法中の循環血液量減少を伴う高血圧患者 [過度に血圧が低下するおそれがある.]
4. 重篤な腎機能障害のある患者 [急速な降圧等により腎機能が悪化するおそれがある. (「薬物動態」の項参照)]
5. 重篤な肝機能障害のある患者 [血中濃度が上昇することがある. また門脈圧が上昇するおそれがある.]
6. うっ血性心不全 (特に高度の左室収縮機能障害) のある患者 [心不全が悪化するおそれがある.]



用語	リソース	テーブル	代表表記	コード体系	コード
大動脈	解剖学用語	解剖学用語	大動脈	TA	A12.2.02.001
大動脈	日本医学会医学用語辞典	日本医学会医学用語辞典	大動脈		
大動脈	ICD10対応標準病名マスター	索引テーブル	大動脈	byomei_master_code	4232
大動脈	ICD10対応標準病名マスター	修飾語テーブル	大動脈	byomei_master_code	4232
大動脈弁	解剖学用語	解剖学用語	大動脈弁	TA	A12.1.04.012
大動脈弁	日本医学会医学用語辞典	日本医学会医学用語辞典	大動脈弁		
大動脈弁	ICD10対応標準病名マスター	索引テーブル	大動脈弁	LiL	000818
大動脈弁	ICD10対応標準病名マスター	修飾語テーブル	大動脈弁	byomei_master_code	3097
大動脈弁狭窄	日本医学会医学用語辞典	日本医学会医学用語辞典	大動脈弁狭窄		
大動脈弁狭窄	T辞書	医薬同義T辞書	大動脈弁狭窄	Tdic	S03547
大動脈弁狭窄	MedDRA/J	level_term_j	大動脈弁狭窄	MedDRA	10041974
大動脈弁狭窄	MedDRA/J	l_pref_term_j	大動脈弁狭窄	MedDRA	10002918
大動脈弁狭窄	ICD10対応標準病名マスター	索引テーブル	大動脈弁狭窄症	byomei_master_code	J37G
狭窄	日本医学会医学用語辞典	日本医学会医学用語辞典	狭窄		
狭窄,僧帽弁	T辞書	医薬同義T辞書	僧帽弁狭窄	Tdic	S03390

大動脈弁狭窄,僧帽弁狭窄のある患者,肺高血圧のある患者[血管拡張作用により重篤な血行動態の悪化を招くおそれがある.]2.過度に血圧の低い患者[更に血圧が低下するおそれがある.]3.血液透析療法中の循環血液量減少を伴う高血圧患者[過度に血圧が低下するおそれがある.]4.重篤な腎機能障害のある患者[急速な降圧等により腎機能が悪化するおそれがある.(「薬物動態」の項参照)]5.重篤な肝機能障害のある患者[血中濃度が上昇することがある.また門脈圧が上昇するおそれがある.]6.うっ血性心不全(特に高度の左室収縮機能障害)のある患者[心不全が悪化するおそれがある.]

医学用語がほぼ100%抽出できている

抽出語

コード

言語リソース名

元の代表語