

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索

コラム

ダウンロード

本サイトは一般用漢方製剤を安全に服用していただくための
情報提供サイトです。

- ・漢方薬ってどうやって選べばいいの？
- ・本当に効くの？副作用はないの？
- ・市販薬にはどんな漢方薬が含まれているの？

漢方薬は副作用が少ないといわれていますが、「証」に合わない
薬を服用すれば、場合によっては具合が悪くなることもあります。

本サイトで用意されている「鑑別シート」と「確認票」を利用して、
是非漢方を安全に服用するための知識を見つけてください。



厚生労働科学研究費「漢方製剤の安全性確保に関する研究」研究班

鑑別シートへ進む

代表的な症状から自分に適した
漢方薬を探せます

確認票へ進む

漢方薬を安全に服用できるか
確認できます

「厚生労働科学研究費「漢方製剤の安全性確保に関する研究」について

一般用漢方製剤は、一般用医薬品販売制度のリスク区分において第2類医薬品に分類されていますが、漢方医学には特有の「証」という考え方があることから、平成23年のリスク区分の見直し過程において、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全性対策調査会から情報提供用補助ツールの必要性が指摘されました。これを受けて、厚生労働科学研究（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）「一般用医薬品における、化学合成品等のリスク区分の見直しと漢方製剤の安全性確保に関する研究」（研究代表者：国立医薬品食品衛生研究所生薬部長（当時）合田幸広）の分担研究「漢方製剤の安全性確保に関する研究」（研究分担者：国立医薬品食品衛生研究所生薬部第二室長（当時）袴塚高志がスタートし、「安全に使うための漢方処方の確認票」（以下、「確認票」）及び「安全に使うための一般用漢方処方の鑑別シート」（以下、「鑑別シート」）が作成されました。

当研究班は、漢方薬学を専門とする医師、薬剤師、大学及び国立研究機関の研究者から構成され、その作業は、日本漢方生薬製剤協会（日漢協）一般用漢方製剤委員会及び厚生労働省医薬生活衛生局安全対策課の協力のもと実施されました。

このホームページは、国立医薬品食品衛生研究所生薬部が管理しています。

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索


コラム

ダウンロード

「鑑別シート」について

「鑑別シート」は、「確認票」の39 処方を使い分けを念頭に、類似した効能効果を有する処方の中から、使用者に適した処方の選択を支援することを目的として作成されました。漢方処方名がわからなくても、使用者の症状と体力を基に、使い分けのコメントに従って適した処方を視覚的に選択することができます。「鑑別シート」で処方を選択した後、「確認票」で服用の可否を判定することによって、より安全かつ効果的に一般用漢方製剤を使用していただけれます。

ご使用方法



<次の中からお悩みの症状をお選びください>



胃のトラブル



腸のトラブル



頭痛



カゼ(症状別)



カゼ(経過別)



尿のトラブル



女性の体調



神経症

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索

コラム

ダウンロード

胃のトラブルに対する漢方対策ガイド

| 証 (体力・体質) | 食欲不振・胃腸虚弱 |
|---------------------|--|
| <p>虚弱</p> <p>充実</p> | <p>十全大補湯</p> <p>○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</p> <p>●●●●</p> <p>○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</p> <p>●●●●</p> <p>○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</p> <p>●●●●</p> <p>○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</p> <p>●●●●</p> <p>○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</p> |

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索

コラム

ダウンロード



「確認票」について

「確認票」は、一般用漢方製剤の適切な使用を促し、副作用の発現回避を支援することを目的として、売上げの多い処方を中心に、39 処方の「確認票」が作成されています。漢方製剤の購入前に使用者の体質や症状の確認をすることで、使用者のセルフチェックや販売者の情報提供にご利用いただけます。

あう りん げ どく とう
黄連解毒湯

あつ じ とう
乙字湯

かつ こん とう
葛根湯

かつ こん とう か せん きゅう しん い
葛根湯加川芎辛夷

か み き ひ とう
加味帰脾湯

か み しょう ほう さん
加味逍遙散

きょう せい ぼ てき がん
響声破笛丸

く ふう げ どく さん
驅風解毒散

けい し ぶく りょう がん
桂枝茯苓丸

ご ことう
五虎湯

ご しゃ じん き がん
牛車腎気丸

ご りん さん
五淋散

ご れい さん
五苓散

さい こ か りゅう こつ ほ れい とう
柴胡加竜骨牡蛎湯

さい こ けい し とう
柴胡桂枝湯

しゃく やく かん そう とう
芍薬甘草湯

じゅう ぜん たい ほ とう
十全大補湯

しょう さい こ とう
小柴胡湯

しょう せい りゅう とう
小青竜湯

しん い せい ぱい とう
辛夷清肺湯

せい しん れん し いん
清心蓮子飲

そ けい かつ げつ とう
疎経活血湯

たい ふう かん そう とう
大黃甘草湯

たい さい こ とう
大柴胡湯

かしょう とう さん
釣藤散

ちよ れい とう
猪苓湯

とう かく じょう き とう
桃核承気湯

とう き しゃく やく さん
当归芍薬散

どっ かつ かつ こん とう
独活葛根湯

ばく もん とう とう
麦門冬湯

はち み じ ふう がん
八味地黄丸

はん げ とう ほう とう
半夏厚朴湯

はん げ しゃ しん とう
半夏瀉心湯

ほう い ふう せ とう
防己黄耆湯

ほう ふう つう しょう さん
防風通聖散

ほ ちゅう えい き とう
補中益気湯

ま ふう とう
麻黄湯

りっ くん し とう
六君子湯

りょう けい じゅう かん とう
苓桂朮甘湯

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索

コラム

ダウンロード

処方を選んだら、**さあ、確認票でチェック!!**

戻る

安全に
使うための

じゅう ぜん たい ほ とう
十全大補湯の確認票

使用上の注意

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に十全大補湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

1.今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
2.日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
3.妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ いいえ

次のような症状がありますか？

- 1.病後・術後の体力低下
- 2.手足の冷え
- 3.寝あせ
- 4.疲労倦怠(けんたい)感
- 5.食欲不振
- 6.貧血

↓ 1つ以上「はい」

胃腸が弱いですか？

↓ いいえ

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

↓ 虚弱／わからない



服用できます

印刷する

もう一度チェックする

胃のトラブル

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索

コラム

ダウンロード

一般用漢方製剤インデックス

>>商品名から探す

処方から探す

あ行

ウチダの十全大補 ウチダ和漢薬 [十全大補湯](#)

か行

さ行

JPS十全大補湯エキス錠N ジェーピーエス製薬 [十全大補湯](#)
ジュゼンS「コタロー」(十全大補湯エキス錠) 小太郎漢方製薬 [十全大補湯](#)
十全大補湯Aエキス細粒「分包」 三和生薬三和生薬 [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス顆粒KM カーヤ [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス〔細粒〕36 松浦薬業 [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス散〔勝昌〕 東洋薬行 [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業 [十全大補湯](#)
ジュホトウ大杉製薬 [十全大補湯](#)
錠剤 十全大補湯 一元製薬 [十全大補湯](#)

漢方セルフメディケーション

[ホーム](#)[鑑別シート](#)[確認票](#)[市販薬検索](#)[コラム](#)[ダウンロード](#)

一般用漢方製剤インデックス

商品名から探す

>>処方から探す

十全大補湯

ウチダの十全大補湯 ウチダ和漢薬 [十全大補湯](#)
JPS十全大補湯エキス錠N ジェーピーエス製薬 [十全大補湯](#)
ジュゼンS「コタロー」(十全大補湯エキス錠) 小太郎漢方製薬 [十全大補湯](#)
十全大補湯Aエキス細粒「分包」三和生薬三和生薬 [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス顆粒KM カーヤ [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス〔細粒〕36 松浦薬業 [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス散〔勝昌〕東洋薬行 [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス錠〔大峰〕大峰堂薬品工業 [十全大補湯](#)
十全大補湯「タキザワ」タキザワ漢方廠 [十全大補湯](#)
十全大補湯エキス錠 クラシエクラシエ薬品 [十全大補湯](#)
ジュホトウ 大杉製薬 [十全大補湯](#)
錠剤 十全大補湯 一元製薬 [十全大補湯](#)
ホノミジュンケツ錠 剤盛堂薬品 [十全大補湯](#)
本草十全大補湯エキス顆粒-M 本草製薬 [十全大補湯](#)
離雲(エキス顆粒) 建林松鶴堂 [十全大補湯](#)

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索

コラム

ダウンロード

コラム1

証とは？(仮)

証とは中医学・漢方医学の治療指針となるものです……………

コラム2

虚証と実証(仮)

虚証と実証の見分け方は……………

体力の低下して疲れやすい方は「虚証」、体力のある元気な方は「実証」になります……………

コラム3

○○○○○○○○

×××
××

漢方セルフメディケーション

ホーム

鑑別シート

確認票

市販薬検索

コラム

ダウンロード

本サイトを制作する上で基になった「鑑別シート」「確認票」をPDFでダウンロードいただけます。

「鑑別シート」のダウンロード

全8症状の「鑑別シート」PDFファイルを一括ダウンロード

胃のトラブル

腸のトラブル

頭痛

カゼ(症状別)

カゼ(経過別)

尿のトラブル

女性の体調

神経症

「確認票」のダウンロード

全39処方「確認票」PDFファイルを一括ダウンロード

葛連解毒湯

乙字湯

葛根湯

葛根湯加川芎辛夷

加味帰脾湯

加味逍遙散

響声破笛丸

駆風解毒散

桂枝茯苓丸

五虎湯

牛車腎気丸

五淋散

五苓散

柴胡加竜骨牡蛎湯

柴胡桂枝湯

芍薬甘草湯

十全大補湯

小柴胡湯

小青竜湯

辛夷清肺湯

清心蓮子飲

疎経活血湯

大黃甘草湯

大柴胡湯

釣藤散

猪苓湯

桃核承気湯

当帰芍薬散

独活葛根湯

麦門冬湯

八味地黄丸

半夏厚朴湯

半夏瀉心湯

防己黄耆湯

防風通聖散

補中益気湯

麻黄湯

六君子湯

苓桂朮甘湯

安全に
使うための

おう れん げ どく とう

黄連解毒湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に黄連解毒湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 鼻血
- 不眠症
- 胃炎
- 神経症（いらいらして落ち着かない）
- 二日酔
- 月経や出産に伴う体調不良
- めまい・ふらつき
- 動悸
- 更年期障害
- 湿疹・皮膚炎
- 皮膚のかゆみ
- 口内炎

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は充実していますか？

中等度／充実

虚弱

- のぼせ気味ですか？
- 顔色が赤いですか？
- いらいらして落ち着かないことがありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

鼻血、二日酔に使用する場合には、5～6回まで服用しても症状がよくなる時は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------------|---------|--------------------|-----------|
| ウチダの黄連解毒丸 | ウチダ和漢薬 | 黄連解毒湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 黄解A錠 | 一元製薬 | オースギコーミン | 大杉製薬 |
| オウゲEP錠 | 劑盛堂薬品 | 大峰エキス錠黄連解毒湯A | 大峰堂薬品工業 |
| オウゲインN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | 「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒 | クラシエ薬品 |
| 黄連解毒湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | JPS黄連解毒湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| 黄連解毒湯エキス顆粒KM-2 | カーヤ | ツムラ漢方黄連解毒湯エキス顆粒A | ツムラ |
| 黄連解毒湯エキス顆粒SA | 湧永製薬 | トチモトの黄連解毒湯 | 栃本天海堂 |
| 黄連解毒湯エキス〔細粒〕4 | 松浦薬業 | 花扇黄解丸 | 小西製薬 |
| 黄連解毒湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|----------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 |

- 3ヵ月位（鼻出血、二日酔に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

黄連、黄芩、黄柏、山梔子

黄連解毒湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

おつじとう 乙字湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に乙字湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**大黄を含む漢方薬****を服用して、激しい腹痛を伴う下痢やひどい腹痛を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 痔（いぼ痔、きれ痔など）
- 軽度の脱肛
- 便秘

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 下痢をしやすいですか？
- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力はひどく虚弱ですか？

やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱

普段から便がかたく、便秘がちですか？

はい

いいえ

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

きれ痔、便秘に使用する場合には、5～6日くらい服用しても症状がよくなる時は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

本剤を服用中は他の下剤（瀉下剤）は服用しないでください。

効能・効果

体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症：痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|---------|----------------------|-----------|
| 一元乃錠剤乙字湯 | 一元製薬 | 乙字湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| ウチダの天地通暢 | ウチダ和漢薬 | オツジンス「コタロー」（乙字湯エキス錠） | 小太郎漢方製薬 |
| 乙字湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | JPS乙字湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| 乙字湯エキス顆粒KM | カーヤ | ツムラ漢方乙字湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 乙字湯エキス〔細粒〕3 | 松浦薬業 | トチモトの乙字湯 | 栃本天海堂 |
| 乙字湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 | ブリザ漢方内服薬 | 大正製薬 |
| 乙字湯エキス錠クラシエ | クラシエ薬品 | モリ タイゼン | 大杉製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

処方構成生薬

当帰、柴胡、黄芩、甘草、升麻、大黄

乙字湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位（きれ痔、便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

安全に
使うための

葛根湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に葛根湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に麻黄を含む漢方薬**を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> かぜ | <input type="checkbox"/> 肩こり |
| <input type="checkbox"/> 鼻づまり | <input type="checkbox"/> 筋肉痛 |
| <input type="checkbox"/> 頭痛 | <input type="checkbox"/> 手や肩の痛み |
| <input type="checkbox"/> 発熱 | |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

心臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？
 (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
 胃腸が弱いですか？
 現在、たくさん汗をかいていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| ウチダの解表舒筋 | ウチダ和漢薬 | 阪本漢法の葛根湯エキス顆粒 | 阪本漢法製薬 |
| オオクサ葛根湯エキス顆粒（分包） | 大草薬品 | サトウ葛根湯エキス顆粒 | 佐藤製薬 |
| カコナル | 第一三共ヘルスケア | 三宝葛根湯エキス顆粒 | 三宝製薬 |
| カゼコール内服液 | 大草薬品 | JPS葛根湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| カッコンV「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | 錠剤 葛根湯 | イスクラ産業 |
| 葛根湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | 錠剤 葛根湯 | 一元製薬 |
| 葛根湯エキス顆粒 S クラシエ | クラシエ薬品 | ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒A | ツムラ |
| 葛根湯エキス顆粒（大峰） | 大峰堂薬品工業 | トチモトのカッコン湯 | 栃本天海堂 |
| 葛根湯エキス顆粒KM | カーヤ | ハイ・カッコー | 大杉製薬 |
| 葛根湯エキス顆粒「至聖」 | 北日本製薬 | ピュアドリップ葛根湯 | 湧永製薬 |
| 葛根湯エキス顆粒「東洋」分包 | 東洋薬行 | 風治散 | 和漢薬研究所 |
| 葛根湯エキス〔細粒〕7 | 松浦薬業 | ホノミキシュ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 葛根湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | 本草葛根湯エキス顆粒-H | 本草製薬 |
| 漢方濃縮煎剤葛根湯1 | 松浦薬業 | 山本漢方「葛根湯エキス顆粒」 | 山本漢方製薬 |
| 生隆「分包」 | 太虎精堂製薬 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

葛根、麻黄、大棗、桂皮、芍薬、甘草、生姜

葛根湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

かっ こん とう か せん きゅう しん い

葛根湯加川芎辛夷の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に葛根湯（加川芎辛夷）を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬**を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 鼻づまり
- 副鼻腔炎（ちくのう症）
- 粘った鼻水

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 現在、たくさん汗をかいていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

比較的体力があるものの次の諸症：鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|---------|----------------------|-----------|
| ウチダの太陽爽鼻湯（分包） | ウチダ和漢薬 | サンワ葛根湯加川芎辛夷エキス細粒「分包」 | 三和生薬 |
| オオクサ鼻優S | 大草薬品 | JPS葛根湯加川芎辛夷エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| 葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒KM | カーヤ | ツムラ漢方葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒 | ツムラ |
| 葛根湯加川芎辛夷エキス〔細粒〕77 | 松浦薬業 | ノーザA「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 葛根湯加川芎辛夷エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | ノンパースA | 一元製薬 |
| 葛根湯加川芎辛夷エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 | 本草葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒-H | 本草製薬 |
| 葛根湯加川芎辛夷「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | モリ チクノン | 大杉製薬 |
| 「クラシエ」葛根湯加川芎辛夷エキス錠 | クラシエ薬品 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

葛根、麻黄、大棗、桂皮、芍薬、甘草、生姜、川芎、辛夷

葛根湯加川芎辛夷の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

かみきひとう 加味帰脾湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に加味帰脾湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- 貧血
- 不眠
- 精神不安
- 健忘、動悸、ヒステリー、神経衰弱、神経症

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？

中等度／虚弱

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- 胃腸が弱いですか？
- 心身ともに疲れていますか？
- 貧血ぎみで、血色が悪いですか？
- なんとなく熱っぽく、熱感がありますか？
- イライラや不安、のぼせ感がありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：貧血、不眠症、精神不安、神経症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|----------------|--------|---------------|-----------|
| 加味帰脾湯エキス顆粒クラシエ | クラシエ薬品 | 加味帰脾湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 加味帰脾湯エキス顆粒KM | カーヤ | JPS加味帰脾湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| 加味帰脾湯エキス〔細粒〕9 | 松浦薬業 | ユクリズム | ロート製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人參、白朮または蒼朮、茯苓、酸棗仁、竜眼肉、黄耆、当歸、遠志、柴胡、山梔子、甘草、木香、大棗、生姜、(牡丹皮)

加味帰脾湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

かみしょうようさん 加味逍遙散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に加味逍遙散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- のぼせ感
- 肩こり
- 疲れやすい
- 不安、イライラ
- 寝付きが悪い、眠れないことがある
- 月経不順、月経困難
- 更年期障害

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

気分がムラがあって落ち着かず、上記の症状だけでなく、頭痛やめまいなどいろいろと気になる症状がありますか？

はい

いいえ

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------|
| ウチダの加味逍遙散 | ウチダ和漢薬 | カミセーヌN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 加味逍遙散エキス顆粒〔東洋〕 分包 | イスクラ産業 | 漢方濃縮煎剤加味逍遙散 24 | 松浦薬業 |
| 加味逍遙散エキス顆粒〔東洋〕 分包 | 東洋薬行 | サン・コーミン | 大杉製薬 |
| 加味逍遙散エキス〔細粒〕 8 | 松浦薬業 | 錠剤 加味逍遙散 | 一元製薬 |
| 加味逍遙散エキス細粒〔分包〕 三和生薬 | 三和生薬 | ツムラ漢方加味逍遙散エキス顆粒 | ツムラ |
| 加味逍遙散錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 | トチモトの加味逍遙散 | 栃本天海堂 |
| 加味逍遙散料エキス顆粒KM | カーヤ | ホノミチョウケイ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 加味逍遙散料エキス錠クラシエ | クラシエ薬品 | レディシトルG | ジェーピーエス製薬 |
| 加味逍遙散料「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | | |

使用上の注意（平成24年9月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、芍薬、白朮または蒼朮、茯苓、柴胡、牡丹皮、山梔子、甘草、生姜、薄荷葉

加味逍遙散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



きょうせい は てき がん

響声破笛丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に響声破笛丸を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
 現在、授乳中ですか？#

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に**大黄を含む漢方薬****を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？#
 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？
 しわがれ声（声がれ） のどの不快な症状

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

心臓に不具合はありますか？
 腎臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？
 下痢をしやすいですか？#

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください
** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください
響声破笛丸には大黄が配合されていない商品もありますが、この確認票は大黄を含む商品を念頭に作られています。

5～6日くらい服用しても症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

しわがれ声、咽喉不快

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|--------|
| 響声破笛丸エキス顆粒G | ジェーピーエス製薬 | 響声破笛丸料エキス〔細粒〕45 | 松浦薬業 |
| 響声破笛丸料エキス顆粒KM | 北日本製薬 | ササクールA | 和漢薬研究所 |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢
- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

連翹、桔梗、甘草、(大黄)、縮砂、川芎、訶子、阿仙薬、薄荷葉

響声破笛丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

くふうげどくさん 駆風解毒散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に駆風解毒散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- のどの腫れ
- のどの痛み
- 扁桃（へんとう）炎、扁桃（へんとう）周囲炎

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

5～6回服用しても症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|-----------|
| 駆風解毒散エキス〔細粒〕79 | 松浦薬業 | サトウ駆風解毒湯エキス顆粒 | 佐藤製薬 |
| 駆風解毒湯Aエキス細粒〔分包〕三和生薬 | 三和生薬 | JPS漢方顆粒-60号 | ジェーピーエス製薬 |
| 駆風解毒湯エキス顆粒KM | 北日本製薬 | トチモトの駆風解毒湯 | 栃本天海堂 |
| 駆風解毒湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 3～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

防風、牛蒡子、連翹、荊芥、羌活、甘草、桔梗、石膏

駆風解毒散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

けい し ぶく りょう がん

桂枝茯苓丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に桂枝茯苓丸を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 月経不順、月経困難、月経痛
- 下腹部痛
- 月経に伴う精神不安、イライラなど
- 更年期障害
- 産後の体調不良や精神不安
- 肩こり
- めまい
- 頭重
- 打ち身
- しもやけ
- しみ
- 湿疹や皮膚炎
- にきび
- のぼせて足が冷える

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

【参考事項】

- ・漢方の「瘀血（おけつ）」に対応する代表的な処方です。
- ・便秘がある場合は、桃核承気湯の確認票もご覧ください。

効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|----------------------|------------|-------------------|-----------|
| ウチダの桂枝茯苓丸 | ウチダ和漢薬 | 桂枝茯苓丸料「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| オオクサ桂枝茯苓丸 | 大草薬品 | ケイブツクN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料エキス錠 | クラシエ薬品 | JPS桂枝茯苓丸料エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| 桂枝茯苓丸エキス錠OM | 大峰堂薬品工業漢方廠 | 錠剤 桂枝茯苓丸 | 一元製薬 |
| 桂枝茯苓丸ダイコー | 大晃生薬 | ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒A | ツムラ |
| 桂枝茯苓丸料Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | トチモトの桂枝茯苓丸料 | 栃本天海堂 |
| 桂枝茯苓丸料エキス顆粒KM-2 | カーヤ | 花扇桂枝茯苓丸 | 小西製薬 |
| 桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69 | 松浦薬業 | ホノミフックツEX錠 | 劑盛堂薬品 |
| 桂枝茯苓丸料エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | モリ ビーシャン | 大杉製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

桂皮、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍薬

桂枝茯苓丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に五虎湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬**を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- せき
- 気管支炎
- かぜ
- 気管支ぜんそく
- 小児ぜんそく

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度以上で、せきが強くでるものの次の諸症：せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | |
|-------------------|--------|
| 「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒A | クラシエ薬品 |
|-------------------|--------|

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人で軟便下痢になりやすい人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

麻黄、杏仁、甘草、石膏、桑白皮

五虎湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ご しゃ じん き がん

牛車腎気丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に牛車腎気丸を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**附子を含む漢方薬****を服用して、気持ちが悪くなったり、のぼせたり、動悸がしたり、手足や舌がしびれたりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> しびれ | <input type="checkbox"/> むくみ | <input type="checkbox"/> 腰痛、足の痛み |
| <input type="checkbox"/> 尿が出にくい | <input type="checkbox"/> 頻尿 | <input type="checkbox"/> かすみ目 |
| <input type="checkbox"/> かゆみ | <input type="checkbox"/> 肩こり | <input type="checkbox"/> 頭重 |
| <input type="checkbox"/> 耳鳴り | | |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？
- 体力が充実していて暑がりですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

- 疲れやすいですか？
- 手足が冷えやすいですか？
- 口や舌が乾きやすいですか？
- 足などがむくみやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------|---------|
| 一元乃錠剤牛車腎気丸 | 一元製薬 | 牛車腎気丸エキス細粒G「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| ウロバランス Uro Balance | 佐藤製薬 | 牛車腎気丸料エキス顆粒KM | カーヤ |
| 漢方濃縮煎剤牛車腎気丸107 | 松浦薬業 | 牛車腎気丸料「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 【救心漢方】金匱腎気丸料エキス顆粒 | 救心製薬 | 精華牛車腎気丸 | イスクラ産業 |
| 【クラシエ】漢方牛車腎気丸料エキス錠 | クラシエ薬品 | 精華牛車腎気丸 | ハッ目製薬 |
| 牛車腎気丸エキス〔細粒〕98 | 松浦薬業 | ロート牛車腎気丸錠II | ロート製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| その他 | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

地黄、山茱萸、山薬、沢瀉、茯苓、牡丹皮、桂皮、加工ブシ、牛膝、車前子

牛車腎気丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ごりんさん 五淋散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に五淋散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- 頻尿
- 残尿感がある
- 排尿痛
- 尿がにごる

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 血圧はひどく高いですか？
- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度のものの次の諸症：頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------|---------|-----------|-------|
| ゴリンサンN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | 腫経（エキス顆粒） | 建林松鶴堂 |
| 五淋散料エキス〔細粒〕80 | 松浦薬業 | ポーコレン | 小林製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。 むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

茯苓、当帰、黄芩、甘草、芍薬、山梔子、(地黄、沢瀉、木通、滑石、車前子)

五淋散の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ご れい さん 五苓散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に五苓散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 水様性下痢
- 急性胃腸炎
- 暑気あたり
- むくみ
- 二日酔
- 頭痛

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

残便感があり、繰り返し腹痛を伴う便意を催す状態（しぶり腹）ですか？

いいえ

はい

服用できません
医療機関への受診をおすすめします

- のどが渇いて尿の量が少ないですか？
- めまいがありますか？
- 吐き気や嘔吐、腹痛がありますか？
- 頭痛がありますか？
- むくみがありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの
体質・症状に合わない
かもしれませんが、あなたの
意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

急性胃腸炎、二日酔の場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりの場合には5～6日くらい服用しても症状がよくなる時は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量がすくないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|---------|----------------|------------|
| アルピタン | 小林製薬 | 五苓散料エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| ウチダの五苓散 | ウチダ和漢薬 | 五苓散料エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| 〔救心漢方〕五苓散 | 救心製薬 | 五苓散料〔タキザワ〕 | タキザワ漢方廠 |
| 〔クラシエ〕漢方五苓散料エキス顆粒 | クラシエ薬品 | JPS五苓散料エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| ゴレーンN〔コタロー〕 | 小太郎漢方製薬 | 錠剤 五苓散 | 一元製薬 |
| 五苓散エキス顆粒SA | 湧永製薬 | スイギャクEP錠 | 劑盛堂薬品 |
| 五苓散料A | 大杉製薬 | ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒 | ツムラ |
| 五苓散料Aエキス細粒〔分包〕三和生薬 | 三和生薬 | トチモトの五苓湯 | 栃本天海堂 |
| 五苓散料エキス〔細粒〕16 | 松浦薬業 | ミオンライフ五苓散エキス顆粒 | テイコクファルマケア |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

沢瀉、猪苓、茯苓、蒼朮または白朮、桂皮

五苓散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

さい こ かりゅう こつ ぼ れい とう

柴胡加竜骨牡蛎湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に柴胡加竜骨牡蛎湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？#

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**大黃を含む漢方薬****を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？#
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 精神不安、驚きやすい、イライラ感、不眠、円形脱毛症、神経症
- 動悸 小児夜泣き
- 更年期障害 便秘

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

下痢をしやすいですか？#

いいえ

はい

平素の体力は虚弱ですか？

充実／中等度

虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

*最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

**該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

#柴胡加竜骨牡蛎湯には大黃が配合されていない商品もありますが、この確認票は大黃を含む商品を念頭に作られています

【参考事項】本剤は、次のいずれかの方に特に適しています。

- ・わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがある
- ・口が苦いとか、口がねばる感じがある
- ・寝返りを打ちにくいほど、身体が重く感じる
- ・よく夢を見る

効能・効果

体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------|
| ウチダの竜化順清 | ウチダ和漢薬 | サンワ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒「分包」 | 三和生薬 |
| オオクサ柴胡加龍骨牡蠣湯エキス錠 | 大草薬品 | JPS柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| 「クラシエ」漢方柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | クラシエ薬品 | 錠剤 柴胡加竜骨牡蠣湯 | 一元製薬 |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒KM | カーヤ | ツムラ漢方柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕22 | 松浦薬業 | トチモトの柴胡加竜骨牡蛎湯 | 栃本天海堂 |
| 柴胡加龍骨牡蠣湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | ホノミサイキ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 | モリ コーミニ | 大杉製薬 |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | ロート柴胡加竜骨牡蠣湯錠 | ロート製薬 |
| サイリユンN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は
授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
- 1ヵ月位（小児夜泣き、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、茯苓、桂皮、大棗、人参、竜骨、牡蛎、生姜、(大黄、黄芩、甘草)

柴胡加竜骨牡蛎湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

さい こ けい し とう

柴胡桂枝湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に柴胡桂枝湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- かぜの諸症状：微熱、悪寒（さむけ）、頭痛、倦怠（けんたい）感
- 胃腸の不調の諸症状：胃のむかつき、吐き気、胃痛、胃のつかえ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがしますか？
- 口が苦いとか、口がねばる感じがしますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------|-----------|
| ウチダの半裏回陽 | ウチダ和漢薬 | 柴胡桂枝湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| オオクサ柴胡桂枝湯エキス顆粒（分包） | 大草薬品 | 三宝柴胡桂枝湯エキス顆粒 | 三宝製薬 |
| 「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒 A | クラシエ薬品 | JPS柴胡桂枝湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 |
| サイケットN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | 錠剤 柴胡桂枝湯 | 一元製薬 |
| 柴胡桂枝湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | ツムラ漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒 A | ツムラ |
| 柴胡桂枝湯エキス顆粒SA | 湧永製薬 | トチモトの柴胡桂枝湯 | 栃本天海堂 |
| 柴胡桂枝湯エキス顆粒KM | カーヤ | ハイ・カンポール | 大杉製薬 |
| 柴胡桂枝湯エキス細粒（東洋） | 東洋薬行 | ホノミキョウカン錠 | 劑盛堂薬品 |
| 柴胡桂枝湯エキス（細粒）23 | 松浦薬業 | 本草柴胡桂枝湯エキス顆粒-H | 本草製薬 |
| 柴胡桂枝湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| その他 | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、人參、大棗、甘草、生姜

柴胡桂枝湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



しゃく やく かん ぞう とう

芍薬甘草湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に芍薬甘草湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

心臓に不具合はありますか？
 腎臓に不具合はありますか？
 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？
 こむらがえり 筋肉のけいれん、痛み
 腹痛 腰痛

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

血圧はひどく高いですか？
 足などがむくみやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

服用後に、手足のだるさ、むくみ、息苦しさを感じたときは、服用を中止して、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないこと

効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|------------|
| ウチダの解筋止痛湯（分包） | ウチダ和漢薬 | 錠剤 芍薬甘草湯 | 一元製薬 |
| 「クラシエ」漢方芍薬甘草湯エキス顆粒 | クラシエ薬品 | 太虎堂の仙敢「分包」 | 太虎精堂製薬 |
| コムレケア | 小林製薬 | ツムラ漢方芍薬甘草湯エキス顆粒 | ツムラ |
| JPS漢方顆粒-20号 | ジェーピーエス製薬 | ツラレス | ロート製薬 |
| 芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34 | 松浦薬業 | トチモトの芍薬甘草湯 | 栃本天海堂 |
| 芍薬甘草湯エキス細粒G「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | ドルチェ顆粒 | 阪本漢法製薬 |
| 芍薬甘草湯エキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | 本草芍薬甘草湯エキス顆粒-H | 本草製薬 |
| 芍薬甘草湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | 松浦の芍薬甘草湯ゼリー | 松浦薬業 |
| 芍薬甘草湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | ミオンライフ芍薬甘草湯エキス顆粒 | ティコクファルマケア |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
 - 生後3ヵ月未満の乳児。
 - 次の診断を受けた人。 心臓病
- 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| うっ血性心不全、心室頻拍 | 全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

芍薬、甘草

芍薬甘草湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



じゅう ぜん たい ほ とう

十全大補湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に十全大補湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？
 病後・術後の体力低下 疲労倦怠（けんたい）感
 手足の冷え 食欲不振
 寝あせ 貧血

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

胃腸が弱いですか？

いいえ

はい

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱／わからない

充実／中等度



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力虚弱なもの次の諸症：病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------|---------|
| ウチダの十全大補湯 | ウチダ和漢薬 | 十全大補湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| JPS十全大補湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 十全大補湯エキス錠クラシエ | クラシエ薬品 |
| ジュゼンS「コタロー」(十全大補湯エキス錠) | 小太郎漢方製薬 | 十全大補湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 十全大補湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | ジュホトウ | 大杉製薬 |
| 十全大補湯エキス顆粒KM | カーヤ | 錠剤 十全大補湯 | 一元製薬 |
| 十全大補湯エキス〔細粒〕36 | 松浦薬業 | ホノミジュンケツ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 十全大補湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人参、黄耆、白朮または蒼朮、茯苓、当帰、芍薬、地黄、川芎、桂皮、甘草

十全大補湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

しょうさいこう

小柴胡湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に小柴胡湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

インターフェロン製剤を投与されていますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- かぜをひいた後、すっきりと治らない
- 胃のむかつき、吐き気
- 熱っぽい
- 胃痛、胃のつかえ
- 食欲不振

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがしますか？
- が苦いとか、□がねばる感じがしますか？
- 熱がある場合、発熱と悪寒（さむけ）が交互に起きたりしますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症：食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------|---------|
| ウチダの小少陽 | ウチダ和漢薬 | 小柴胡湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| オースギカンボール | 大杉製薬 | 小柴胡湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| JPS小柴胡湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 小柴胡湯〔タキザワ〕 | タキザワ漢方廠 |
| 錠剤 小柴胡湯 | 一元製薬 | シヨウサインN〔コタロー〕 | 小太郎漢方製薬 |
| 小柴胡湯Aエキス細粒〔分包〕三和生薬 | 三和生薬 | ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 小柴胡湯エキス顆粒SA | 帝國漢方製薬 | トチモトの小柴胡湯 | 栃本天海堂 |
| 小柴胡湯エキス顆粒SA | 湧永製薬 | ホノミチキョウ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 小柴胡湯エキス顆粒クラシエ | クラシエ薬品 | 本草小柴胡湯エキス顆粒-H | 本草製薬 |
| 小柴胡湯エキス顆粒KM | カーヤ | 力湧仙 | 和漢薬研究所 |
| 小柴胡湯エキス〔細粒〕29 | 松浦薬業 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。むくみ
 - 次の診断を受けた人。肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
 - インターフェロン製剤で治療を受けている人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| その他 | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位（かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、生姜、黄芩、大棗、人參、甘草

小柴胡湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

しょう せい りゅう とう

小青竜湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に小青竜湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 発熱
- 悪寒（さむけ）
- 頭痛
- うすい痰
- 鼻水
- 咳
- くしゃみ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓や腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力はひどく虚弱ですか？

やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱

- 咳が出る場合、からぜきですか？
- 鼻水や痰が出る場合、粘っていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|---------|
| ウチダの小青竜湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | 小青竜湯エキス〔細粒〕 28 | イスクラ産業 |
| オオクサ小青竜湯エキス錠 | 大草薬品 | 小青竜湯エキス〔細粒〕 28 | 松浦薬業 |
| 大峰小青竜湯錠Ⅱ | 大峰堂薬品工業 | 小青竜湯〔タキザワ〕 | タキザワ漢方廠 |
| カコナル小青竜湯＜鼻かぜ・鼻炎用＞ | 第一三共ヘルスケア | ショウセリンN〔コタロー〕 | 小太郎漢方製薬 |
| 阪本漢法の小青竜湯エキス顆粒 | 阪本漢法製薬 | 新・ロート小青竜湯錠Ⅱ | ロート製薬 |
| JPS小青竜湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | ツムラ漢方小青竜湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 錠剤 小青竜湯 | 一元製薬 | トチモトの小青竜湯 | 栃本天海堂 |
| 小青竜湯Aエキス細粒〔分包〕三和生薬 | 三和生薬 | ホノミチンガイン錠 | 劑盛堂薬品 |
| 小青竜湯エキス顆粒Aクラシエ | クラシエ薬品 | 本草小青竜湯エキス錠-H | 本草製薬 |
| 小青竜湯エキス顆粒SA | 湧永製薬 | モリ ゼンチトウ | 大杉製薬 |
| 小青竜湯エキス顆粒KM | カーヤ | 山本漢方〔小青竜湯エキス顆粒〕 | 山本漢方製薬 |
| 小青竜湯エキス顆粒〔創至聖〕 | 北日本製薬 | 呂仁〔分包〕 | 太虎精堂製薬 |
| 小青竜湯エキス細粒〔勝昌〕 分包 | 東洋薬行 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

麻黄、芍薬、乾姜、甘草、桂皮、細辛、五味子、半夏

小青竜湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



しん い せい はい とう 辛夷清肺湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に辛夷清肺湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？
 鼻づまり 慢性鼻炎
 粘った鼻水 副鼻腔炎（ちくのう症）

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

胃腸が弱いですか？
 冷え症ですか？

1つ以上「いいえ」

すべて「はい」

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

鼻づまりがありますか？
 鼻水や痰が出る場合、粘っていますか？
 熱っぽい感じがしますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|------------------|---------|------------|---------|
| ウチダの辛夷清肺湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | ノーザV「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」 | クラシエ薬品 | ノンパースD | 一元製薬 |
| 辛夷清肺湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | ハイビナール | 大杉製薬 |
| チクナイン | 小林製薬 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸虚弱で冷え症の人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|----------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

辛夷、知母、百合、黄芩、山梔子、麦門冬、石膏、升麻、枇杷葉

辛夷清肺湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



せい しん れん し いん

清心蓮子飲の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に清心蓮子飲を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？
 残尿感がある 尿が出にくい
 頻尿 尿がにごる
 排尿痛 (女性の場合) おりものがある

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は充実していますか？

中等度/虚弱

充実

胃腸が弱いですか？
 全身倦怠（けんたい）感がありますか？
 口や舌が乾きやすいですか？
 排尿異常（頻尿・排尿困難）がありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ（おりもの）

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | |
|-------------------|---------|
| 清心蓮子飲エキス細粒G「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| ユリナール | 小林製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

蓮肉、麦門冬、茯苓、人參、車前子、黄芩、黄耆、地骨皮、甘草

清心蓮子飲の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

効能・効果

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|----------------|-----------|--------------|---------|
| ウチダの疎風定痛湯（分包） | ウチダ和漢薬 | 疎経活血湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 散痛楽楽丸 | イスクラ産業 | ソケーカンS「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| JPS疎経活血湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 痛絡丸 | 松浦薬業 |
| 疎経活血湯エキス顆粒OM | 大峰堂薬品工業 | 風濕舒筋丸 | ハッ目製薬 |
| 疎経活血湯エキス細粒〔勝昌〕 | 東洋薬行 | モリ ハイツウン | 大杉製薬 |
| 疎経活血湯エキス錠クラシエ | クラシエ薬品 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、地黄、川芎、蒼朮または白朮、茯苓、桃仁、芍薬、牛膝、威靈仙、防己、羌活、防風、竜胆、生姜、陳皮、白芷、甘草

疎経活血湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

だい おう かん ぞう とう 大黃甘草湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に大黃甘草湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**大黃を含む漢方薬****を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 便秘
- 便秘に伴う諸症状：頭痛、頭重、のぼせ、湿疹、皮膚炎、ふきでもの、にきび、食欲不振、お腹がはる、腸内異常醗酵、痔

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

下痢をしやすいですか？

いいえ

はい



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

5～6日くらい服用しても症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------|
| ウチダの大甘丸 | ウチダ和漢薬 | ダイカーン | 大杉製薬 |
| オオクサ大甘丸 | 大草薬品 | 大正漢方便秘薬 | 大正製薬 |
| 阪本漢法の漢方便秘薬 | 阪本漢法製薬 | タケダ漢方便秘薬 | 武田コンシューマーヘルスケア |
| JPS大黃甘草湯（錠剤） | ジェーピーエス製薬 | ツムラ漢方大黃甘草湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 大黃甘草湯Aエキス錠三和生薬 | 三和生薬 | 東亜漢方便秘薬小粒 | 北日本製薬 |
| 大黃甘草湯エキス細粒G「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | 花扇大甘丸 | 小西製薬 |
| 大黃甘草湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 5～6日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

大黃、甘草

大黃甘草湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

だい さい こと う

大柴胡湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に大柴胡湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**大黃を含む漢方薬****を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 胃のむかつき、吐き気
- 胃痛、胃のつかえ
- 食欲不振
- 血圧が高い
- 便秘がち
- 頭痛、肩こり
- 怒りっぽい、イライラすることがある

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

下痢をしやすいですか？

いいえ

はい

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

充実

虚弱

わからない

- わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがしますか？
- 腹部の緊張感やつかえ（ベルトが苦しい感じ）がありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------|---------|
| ウチダの大少陽 | ウチダ和漢薬 | 大柴胡湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| ココアボG錠 | クラシエ薬品 | ダイサインN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| JPS大柴胡湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | ツムラ漢方大柴胡湯エキス顆粒 | ツムラ |
| 錠剤 大柴胡湯 | 一元製薬 | トチモトの大柴胡湯 | 栃本天海堂 |
| 大柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | ビスラット ゴールド | 小林製薬 |
| 大柴胡湯エキス顆粒KM | カーヤ | ホノミジツキョウ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 大柴胡湯エキス〔細粒〕40 | 松浦薬業 | 本草大柴胡湯エキス錠-H | 本草製薬 |
| 大柴胡湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | モリ カンポールン | 大杉製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 1ヵ月位（常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、生姜、黄芩、芍薬、大棗、枳実、大黄

大柴胡湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ちょうとうさん

釣藤散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に釣藤散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- 慢性頭痛・頭重感
- 肩こり
- 神経症（神経が^{たか}亢ぶりやすい）
- めまい・ふらつき感
- 血圧が高め

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

冷え症ですか？

いいえ

はい

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

平素の体力はひどく虚弱ですか？

やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------|
| 一元乃錠剤釣藤散 | 一元製薬 | 釣藤散「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| ウチダの双鉤順気 | ウチダ和漢薬 | 釣藤散料A | 大杉製薬 |
| クラシエ釣藤散料エキス錠 | クラシエ薬品 | 釣藤散料エキス顆粒KM | カーヤ |
| JPS釣藤散料エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | チョウトーン「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 釣藤散エキス〔細粒〕43 | 松浦薬業 | ツムラ漢方釣藤散エキス顆粒 | ツムラ |
| 釣藤散エキス細粒〔東洋〕 | 東洋薬行 | トチモトの釣藤散 | 栃本天海堂 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸虚弱で冷え症の人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

釣藤鈎、橘皮または陳皮、半夏、麦門冬、茯苓、人參、防風、菊花、甘草、生姜、石膏

釣藤散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ちょ れい とう 猪苓湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に猪苓湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 尿が出にくい
- 残尿感がある
- むくみ
- 排尿痛
- 頻尿

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

ゼラチンに対してアレルギーがありますか？

いいえ

はい



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

【参考事項】

- ・上記の症状に加え、口渇を感じる方が特に適した処方です。

【排尿異常に使用される代表的な処方】

猪苓湯、五淋散、清心蓮子飲、五苓散、牛車腎気丸、八味地黄丸

効能・効果

体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渴くものの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| ウチダの猪苓湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | 猪苓湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| 「クラシエ」漢方猪苓湯エキス錠 | クラシエ薬品 | 猪苓湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| JPS猪苓湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 猪苓湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 錠剤 猪苓湯 | 一元製薬 | チョレインN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 猪苓湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | ツムラ漢方猪苓湯エキス顆粒A | ツムラ |
| 猪苓湯エキス顆粒KM | カーヤ | ホノミボウネツ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 猪苓湯エキス〔細粒〕42 | 松浦薬業 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

猪苓、茯苓、滑石、沢瀉、阿膠

猪苓湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

とう かく じょう き とう

桃核承気湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に桃核承気湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**大黃を含む漢方薬****を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 月経痛、月経不順
- 月経前、月経中、産後のイライラや不安
- 便秘
- 高血圧に伴う頭痛、めまい、肩こり
- 腰痛
- 痔
- 打撲傷、打ち身

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

下痢をしやすいですか？

いいえ

はい

- のぼせやすいですか？
- 便秘がちですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

充実／中等度

わからない

虚弱

服用はおすすめできません*



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| 大峰エキス錠桃核承気湯 | 大峰堂薬品工業 | 桃核承気湯エキス細粒〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| 「クラシエ」漢方桃核承気湯エキス顆粒 | クラシエ薬品 | 桃核承気湯エキス〔細粒〕47 | 松浦薬業 |
| JPS桃核承気湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 桃核承気湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 錠剤 桃核承気湯 | 一元製薬 | トーガックV「コタロー」 (桃核承気湯エキス錠) | 小太郎漢方製薬 |
| ツムラ漢方桃核承気湯エキス顆粒 | ツムラ | トーショキン | 大杉製薬 |
| 桃核承気丸 | ウチダ和漢薬 | ホノミツウケット錠 | 劑盛堂薬品 |
| 桃核承気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | | |
| 桃核承気湯エキス顆粒KM | カーヤ | | |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

桃仁、桂皮、大黄、芒硝、甘草

桃核承気湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



とう き しゃく やく さん

当帰芍薬散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に当帰芍薬散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？
 月経不順、月経異常、月経痛 頭重、肩こり、腰痛、耳鳴り
 更年期障害 足腰の冷え、しもやけ
 めまい・立ちくらみ むくみ、しみ
 産前産後あるいは流産による諸症状：貧血、疲労倦怠（けんたい）感、めまい、むくみ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱

充実／わからない

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

冷えを感じやすいですか？
 貧血ぎみですか？
 疲れやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|------------------|-----------|------------------|---------|
| ウチダの当帰芍薬散 | ウチダ和漢薬 | 当帰芍薬散料Aエキス細粒「分包」 | 三和生薬 |
| カイケツEP錠 | 劑盛堂薬品 | 三和生薬 | |
| 漢方濃縮煎剤当帰芍薬散 23 | 松浦薬業 | 当帰芍薬散料エキス顆粒KM-2 | カーヤ |
| クラシエ当帰芍薬散錠 | クラシエ薬品 | 当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44 | 松浦薬業 |
| JPS当帰芍薬散料エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 当帰芍薬散料エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| 錠剤 当芍散 | 一元製薬 | 当帰芍薬散料「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒 | ツムラ | トウシャンN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 当帰芍薬散エキス顆粒SA | 湧永製薬 | トチモトの当帰芍薬散料 | 栃本天海堂 |
| 当帰芍薬散錠OM | 大峰堂薬品工業 | モリ エーション | 大杉製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、川芎、芍薬、茯苓、白朮または蒼朮、沢瀉

当帰芍薬散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



どっ かつ かつ こん とう

独活葛根湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に独活葛根湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に麻黄を含む漢方薬** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？
 四十肩、五十肩 寝ちがえ 肩こり

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

心臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？
 (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
 胃腸が弱いですか？
 汗をかきやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？またはひどく虚弱ですか？

中等度/やや虚弱

ひどく虚弱/充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください
** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|---------|---------------|--------|
| ガチラック | ロート製薬 | 独活葛根湯エキス錠クラシエ | クラシエ薬品 |
| シジラック | 小林製薬 | パスタントン顆粒 | 阪本漢法製薬 |
| 独活葛根湯エキス細粒G「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

葛根、桂皮、芍薬、麻黄、独活、生姜、地黄、大棗、甘草

独活葛根湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ばくもんどうとう

麦門冬湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に麦門冬湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- からげき
- のどの痛み
- 気管支炎・気管支ぜんそく
- たんが切れにくいせき
- しわがれ声（声がれ）

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？

虚弱／中等度

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- 痰（たん）が出にくい、または少ないですか？
- 顔が赤くなるくらい、激しくせき込みますか？
- のどの乾燥感がありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|---------|
| ウチダの麦門冬湯 | ウチダ和漢薬 | バクニン | 大杉製薬 |
| 漢方濃縮煎剤麦門冬湯 29 | 松浦薬業 | 麦門冬湯エキス顆粒KM | カーヤ |
| 「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒A | クラシエ薬品 | 麦門冬湯エキス〔細粒〕54 | 松浦薬業 |
| 阪本漢法の麦門冬湯顆粒 | 阪本漢法製薬 | 麦門冬湯エキス細粒〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| サンワ麦門冬湯エキス細粒「分包」 | 三和生薬 | 麦門冬湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| JPS麦門冬湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | バックモンS「コタロー」 (麦門冬湯エキス錠) | 小太郎漢方製薬 |
| 錠剤 麦門冬湯 | 一元製薬 | ホノミダイギャク錠 | 劑盛堂薬品 |
| ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 | ツムラ | | |
| トチモトの麦門冬湯 | 栃本天海堂 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水様性の痰の多い人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

処方構成生薬

麦門冬、半夏、粳米、大棗、人参、甘草

麦門冬湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位(からぜきに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



はち み じ おう がん

八味地黄丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に八味地黄丸（八味丸）を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に附子を含む漢方薬**を服用して、気持ちが悪くなったり、のぼせたり、動悸がしたり、手足や舌がしびれたりしたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 尿が出にくい | <input type="checkbox"/> 尿がもれる |
| <input type="checkbox"/> 残尿感がある | <input type="checkbox"/> 夜間尿 |
| <input type="checkbox"/> むくみ | <input type="checkbox"/> 腰痛 |
| <input type="checkbox"/> 関節の痛み | <input type="checkbox"/> しびれ |
| <input type="checkbox"/> かゆみ | <input type="checkbox"/> 耳鳴り |
| <input type="checkbox"/> 頭重 | <input type="checkbox"/> 冷え |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用できません

胃腸が弱いですか？
 下痢をしやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません*

心臓に不具合はありますか？
 体力が充実していて暑がりですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|---------|
| ウェルクスH | テイコクファルマケア | 八味地黄丸〔東洋〕 | 東洋薬行 |
| ウチダの八味丸 | ウチダ和漢薬 | 八味地黄丸料エキス顆粒KM | カーヤ |
| オオクサ八味丸 | 大草薬品 | 八味地黄丸料エキス錠N「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| オースギ八味地黄丸A | 大杉製薬 | 八味地黄丸料「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| クラシエ八味地黄丸A | クラシエ薬品 | 花扇八味地黄丸 | 小西製薬 |
| 三宝八味地黄丸 | 三宝製薬 | 峰寿丸 | 大峰堂薬品工業 |
| サンワロン顆粒 | 三和生薬 | ホノミカツジン錠 | 劑盛堂薬品 |
| JPS八味地黄丸料エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 本草八味地黄丸料エキス錠-H | 本草製薬 |
| 腎陽温補散〔散剤〕68 | 松浦薬業 | 薬師八味地黄末 | 日本薬師堂 |
| ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒A | ツムラ | 蘭州金匱腎気丸 | ハツ目製薬 |
| トチモトの八味地黄丸料 | 栃本天海堂 | 蘭州金匱腎気丸 | イスクラ産業 |
| 八味丸ダイコー | 大晃生薬 | ワクナガ八味地黄丸 | 国産薬品工業 |
| 八味地黄丸錠「創至聖」 | 北日本製薬 | ワクナガ八味地黄丸 | 湧永製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

- (1) 生後3ヵ月未満の乳児。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 下痢しやすい人。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| その他 | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

地黄、山茱萸、山薬、沢瀉、茯苓、牡丹皮、桂皮、加工ブシ

八味地黄丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に半夏厚朴湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 不安神経症 | <input type="checkbox"/> 神経性胃炎 |
| <input type="checkbox"/> つわり | <input type="checkbox"/> せき |
| <input type="checkbox"/> しわがれ声（声がれ） | <input type="checkbox"/> のどのつかえ感 |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱

- 気分が落ち込んだ感じや、ふさいだ感じがしますか？
 のどや、のどの奥にものがつまった感じがありますか？
 めまいや吐き気がありますか？
 胃腸が弱いですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

つわりに使用する場合には、5～6日間が目安です。

症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------|---------|
| ウチダの理気利心 | ウチダ和漢薬 | 半夏厚朴湯エキス顆粒KM | カーヤ |
| 「クラシエ」漢方半夏厚朴湯エキス顆粒 | クラシエ薬品 | 半夏厚朴湯エキス〔細粒〕51 | 松浦薬業 |
| JPS半夏厚朴湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 半夏厚朴湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| 錠剤 半夏厚朴湯 | 一元製薬 | 半夏厚朴湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| ツムラ漢方半夏厚朴湯エキス顆粒 | ツムラ | ハンゲコーN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| トチモトの半夏厚朴湯 | 栃本天海堂 | ホノミアンセイ錠 | 劑盛堂薬品 |
| ハイ・コーミン | 大杉製薬 | ワクナガ半夏厚朴湯エキス細粒 | 湧永製薬 |
| 半夏厚朴湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位（つわりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

半夏、茯苓、厚朴、蘇葉、生姜

半夏厚朴湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

はんげしゃしんとう

半夏瀉心湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に半夏瀉心湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- 急性・慢性胃腸炎
- 胃下垂
- 胸焼け、げっぷ
- 神経症（不眠、いらいらなど）
- 下痢、もしくは軟便
- 神経性胃炎
- 口内炎

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力はひどく虚弱ですか？

やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱

- みぞおちにつかえや違和感がありますか？
- 胃が気持ち悪く、お腹がゴロゴロなったりしますか？
- 悪心や吐き気がありますか？
- 軟便、下痢の傾向がありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------|---------|
| ウチダの中焦健和 | ウチダ和漢薬 | 半夏瀉心湯エキス〔細粒〕53 | 松浦薬業 |
| オオクサ半夏瀉心湯エキス錠 | 大草薬品 | 半夏瀉心湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| 鶴寿（エキス顆粒） | 建林松鶴堂 | 半夏瀉心湯エキス錠Fクラシエ | クラシエ薬品 |
| 三共胃腸薬「漢方」 | 第一三共ヘルスケア | 半夏瀉心湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| JPS半夏瀉心湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 半夏瀉心湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| 錠剤 半夏瀉心湯 | 一元製薬 | ハンシャンN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| ツムラ漢方半夏瀉心湯エキス顆粒 | ツムラ | ホノミイチョウ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 半夏瀉心湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | モリ漢方胃腸薬 | 大杉製薬 |
| 半夏瀉心湯エキス顆粒KM | カーヤ | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

処方構成生薬

半夏、黄芩、乾姜、人参、甘草、大棗、黄連

半夏瀉心湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



ぼういおうぎとう 防已黄耆湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に防已黄耆湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？
 関節の腫れや痛み 多汗症
 むくみ 水ぶとり

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

心臓に不具合はありますか？
 腎臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？

虚弱／中等度

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

疲れやすいですか？
 汗をかきやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| ウェルクスB | テイクファルマケア | 防已黄耆湯エキス顆粒KM | カーヤ |
| ウチダの表湿清澄 | ウチダ和漢薬 | 防已黄耆湯エキス〔細粒〕56 | 松浦薬業 |
| ココアポリ錠 | クラシエ薬品 | 防已黄耆湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| サンワ防已黄耆湯エキス細粒〔分包〕 | 三和生薬 | 防已黄耆湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| JPS防已黄耆湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | ポーキットN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| 錠剤 防已黄耆湯 | 一元製薬 | 本草防已黄耆湯エキス錠-H | 本草製薬 |
| ツムラ漢方防已黄耆湯エキス顆粒 | ツムラ | ラクリア | ロート製薬 |
| ハクスイトウ | 大杉製薬 | ロコフィットGL | 太田胃散 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

防已、黄耆、白朮または蒼朮、生姜、大棗、甘草

防已黄耆湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ぼう ふう ふう しょう さん

防風通聖散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に防風通聖散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？
- 現在、授乳中ですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に大黃を含む漢方薬** を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 高血圧や肥満に伴う動悸、肩こり、
- 湿疹、皮膚炎、ふきでもの、にきび
- のぼせ、むくみ、便秘
- 肥満症
- 副鼻腔炎(ちくのう症)

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 下痢をしやすいですか？
- 血圧はひどく高いですか？
- 心臓や腎臓に不具合はありますか？
- (男性の方)尿の出に不具合はありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

- 便秘がちですか？
- 腹部に脂肪が多いですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱

充実

わからない



服用できます

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません、あなたの意思により服用可能です

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|---------|
| アンラビリゴールド | 阪本漢法製薬 | ナイシトール | 小林製薬 |
| 意発（エキス顆粒） | 建林松鶴堂 | 防風通聖散エキス〔細粒〕57 | 松浦薬業 |
| ウチダの攻肥聖健 | ウチダ和漢薬 | 防風通聖散料Aエキス細粒〔分包〕三和生薬 | 三和生薬 |
| エバユーススリムF | 第一三共ヘルスケア | 防風通聖散料エキス顆粒KM | カーヤ |
| オオクサ防風通聖散エキス錠 | 大草薬品 | 防風通聖散料エキス細粒〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| ココスリム | 佐藤製薬 | 防風通聖散料エキス錠〔東亜〕 | 北日本製薬 |
| ココアポEX錠 | クラシエ薬品 | 防風通聖散料〔タキザワ〕 | タキザワ漢方廠 |
| サンスラット | 大峰堂薬品工業 | ポーツンN〔コタロー〕 | 小太郎漢方製薬 |
| JPS防風通聖散料エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | ホノミサンイン錠 | 劑盛堂薬品 |
| 錠剤 防風通聖散 | 一元製薬 | 本草防風通聖散エキス錠-H | 本草製薬 |
| 新・ロート防風通聖散錠満量 | ロート製薬 | モリ カッコミン | 大杉製薬 |
| ツムラ漢方防風通聖散エキス顆粒 | ツムラ | | |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、芍薬、川芎、山梔子、連翹、薄荷葉、生姜、荊芥、防風、麻黄、大黄、芒硝、（白朮）、桔梗、黄芩、甘草、石膏、滑石

防風通聖散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
| 精神神経系 | めまい |
| その他 | 発汗、動悸、むくみ、頭痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢、便秘
- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

安全に
使うための

ほ ちゅう えっ き とう 補中益気湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に補中益気湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- 疲労、倦怠（けんたい）感
- 微熱、発汗（寝あせ）
- 胃腸症状や食欲不振
- こじれたかぜ症状
- 病後、術後の体力低下

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱／わからない

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

【参考事項】本剤は、次のいずれかの方に特に適しています。

- ・手足がだるい
- ・眼に勢いがない
- ・食事に味がない
- ・声に力がない
- ・口中に白い泡沫（あわ）ができる
- ・口が渴き、熱い飲食物を好む

効能・効果

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------|
| ウチダの保中回帰 | ウチダ和漢薬 | 補中益気湯エキス顆粒〔東洋〕 分包 | 東洋薬行 |
| 悦我〔分包〕 | 太虎精堂製薬 | 補中益気湯エキス〔細粒〕 58 | 松浦薬業 |
| 漢方濃縮煎剤補中益気湯 41 | 松浦薬業 | 補中益気湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| JPS補中益気湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 補中益気湯エキス錠クラシエ | クラシエ薬品 |
| 錠剤 補中益気湯 | 一元製薬 | 補中益気湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| ツムラ漢方補中益気湯エキス顆粒 | ツムラ | ホノミホイオー錠 | 劑盛堂薬品 |
| ホエキンN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 | モリ エーボン | 大杉製薬 |
| 補中益気湯Aエキス細粒〔分包〕 三和生薬 | 三和生薬 | ロート補中益気湯錠 | ロート製薬 |
| 補中益気湯エキス顆粒KM | カーヤ | | |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人参、白朮または蒼朮、黄耆、当帰、陳皮、大棗、柴胡、甘草、生姜、升麻

補中益気湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

ま おう とう 麻黄湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に麻黄湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に**麻黄を含む漢方薬****を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

- 発熱
- 身体の不しぶしの痛み
- 悪寒（さむけ）
- 鼻づまり
- 頭痛
- 咳

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
- 現在、たくさん汗をかいていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか、または虚弱ですか？

充実

わからない

虚弱

この漢方薬はあなたの
体質・症状に合わない
かもしれませんが、あなたの
意思により服用可能です

服用できません



服用できます

短期の服用にとどめ、連用しないこと

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| 一元乃錠剤 麻黄湯 | 一元製薬 | トチモトの麻黄湯 | 栃本天海堂 |
| ウチダの麻黄湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | ホノミキネツ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 「クラシエ」漢方麻黄湯エキス顆粒i | クラシエ薬品 | 麻黄湯エキス顆粒KM | カーヤ |
| サンワ麻黄湯エキス細粒「分包」 | 三和生薬 | 麻黄湯エキス〔細粒〕59 | 松浦薬業 |
| JPS漢方顆粒-47号 | ジェーピーエス製薬 | 麻黄湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒 | ツムラ | ルル内服液<麻黄湯> | 第一三共ヘルスケア |

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 生後3ヵ月未満の乳児。
- 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |
| その他 | 発汗過多、全身脱力感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 3ヵ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

麻黄、桂皮、杏仁、甘草

麻黄湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

安全に
使うための

りっくんしとう

六君子湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に六君子湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- 胃炎、胃痛
- 食欲不振
- 胃下垂
- 胃腸虚弱、消化不良
- 嘔吐

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？

虚弱／中等度

充実

- 普段から胃が弱いですか？
- みぞおちがつかえとか、張るとか、違和感がありますか？
- 疲れやすいですか？
- 貧血ぎみで、手足が冷えやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------------|---------|
| ウチダの六君子湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | ホノミリキ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 漢方濃縮煎剤六君子湯 43 | 松浦薬業 | 本草六君子湯エキス顆粒-M | 本草製薬 |
| ギャクリア | 小林製薬 | リックーンS「コタロー」(六君子湯エキス錠) | 小太郎漢方製薬 |
| 「クラシエ」漢方六君子湯エキス顆粒 | クラシエ薬品 | 六君子湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 |
| JPS六君子湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 六君子湯エキス顆粒KM | カーヤ |
| 錠剤 六君子湯 | 一元製薬 | 六君子湯エキス〔細粒〕65 | 松浦薬業 |
| ツムラ漢方六君子湯エキス顆粒 | ツムラ | 六君子湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 |
| ハイリクン | 大杉製薬 | 六君子湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人参、白朮または蒼朮、茯苓、半夏、陳皮、大棗、甘草、生姜

六君子湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない



りょう けい じゅつ かん とう

苓桂朮甘湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に苓桂朮甘湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？
 立ちくらみ めまい・ふらつき 頭痛
 耳鳴り 動悸・息切れ 神経過敏
 神経症（発作性ののぼせや動悸）

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

心臓に不具合はありますか？
 腎臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

中等度／虚弱

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

めまいやふらつきを感じることはありますか？
 のぼせや動悸を感じることはありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|---------|
| ウチダの苓桂朮甘湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-M | 本草製薬 |
| 「クラシエ」漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒 | クラシエ薬品 | 苓桂朮甘湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 |
| JPS苓桂朮甘湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | 苓桂朮甘湯エキス顆粒KM-2 | カーヤ |
| 錠剤 苓桂朮甘湯 | 一元製薬 | 苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63 | 松浦薬業 |
| ツムラ漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒 | ツムラ | 苓桂朮甘湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| 天祐（エキス顆粒） | 建林松鶴堂 | 苓桂朮甘湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| トチモトの苓桂朮甘湯 | 栃本天海堂 | レイジットN「コタロー」 | 小太郎漢方製薬 |
| ホノミキジョウ錠 | 劑盛堂薬品 | ワクナガ苓桂朮甘湯エキス細粒 | 湧永製薬 |

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

茯苓、白朮または蒼朮、桂皮、甘草

苓桂朮甘湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない

