

表12. クリニック調査(CSW) 基本属性

◆年齢階級(度数分布)		◆性別(度数分布)						
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
有効回答数	96		10代	0	(0.0)	男性	3	(3.1)
平均値	38.24		20代	23	(24.0)	女性	93	(96.9)
中央値	37.50		30代	28	(29.2)	その他	0	(0.0)
標準偏差	10.168		40代	32	(33.3)	全体	96	(100.0)
最小値	20		50歳以上	13	(13.5)			
最大値	59		全体	96	(100.0)			

	10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値				
	n	(%)	n	(%)	n	(%)					
◆職業(複数回答)											
	n=0	n=3	n=0	n=0	n=0	n=3					
①男性											
学生	0	(0.0)	2	(66.7)	0	(0.0)	2	(66.7)	-		
会社員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-		
公務員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-		
自営業	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-		
主婦	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-		
アルバイト・フリーター	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-		
無職	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-		
その他	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-		
②女性											
	n=0	n=20	n=28	n=32	n=13	n=93					
学生	0	(0.0)	2	(10.0)	1	(3.6)	0	(0.0)	3	(3.2)	0.217
会社員	0	(0.0)	1	(5.0)	0	(0.0)	1	(3.1)	0	(0.0)	0.611
公務員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-
自営業	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.6)	0	(0.0)	1	(1.1)	0.504
主婦	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(7.1)	2	(6.3)	2	(15.4)	0.373
アルバイト・フリーター	0	(0.0)	2	(10.0)	2	(7.1)	4	(12.5)	1	(7.7)	0.906
無職	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-
その他	0	(0.0)	1	(5.0)	2	(7.1)	2	(6.3)	1	(7.7)	0.988
①+②全体											
	n=0	n=23	n=28	n=32	n=13	n=96					
学生	0	(0.0)	4	(17.4)	1	(3.6)	0	(0.0)	5	(5.2)	0.023
会社員	0	(0.0)	1	(4.3)	0	(0.0)	1	(3.1)	0	(0.0)	0.655
公務員	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-
自営業	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.6)	0	(0.0)	1	(1.0)	0.484
主婦	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(7.1)	2	(6.3)	2	(15.4)	0.331
アルバイト・フリーター	0	(0.0)	2	(8.7)	2	(7.1)	4	(12.5)	1	(7.7)	0.899
無職	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-
その他	0	(0.0)	1	(4.3)	2	(7.1)	2	(6.3)	1	(7.7)	0.973

◆恋愛対象として性的魅力を感じつ相手													
	n=0	n=3	n=0	n=0	n=0	n=3							
①男性													
男性	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-				
女性	0	(0.0)	1	(33.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(33.3)			
男女両方	0	(0.0)	2	(66.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(66.7)			
誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じない	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)			
その他	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)			
無回答/無効回答	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)			
②女性													
	n=0	n=20	n=28	n=32	n=13	n=93							
男性	0	(0.0)	18	(90.0)	26	(92.9)	29	(90.6)	10	(76.9)	83	(89.2)	0.179
女性	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.6)	0	(0.0)	2	(15.4)	3	(3.2)	
男女両方	0	(0.0)	2	(10.0)	1	(3.6)	2	(6.3)	0	(0.0)	5	(5.4)	
誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じない	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	2	(2.2)	
その他	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
無回答/無効回答	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
①+②全体													
	n=0	n=23	n=28	n=32	n=13	n=96							
男性	0	(0.0)	18	(78.3)	26	(92.9)	29	(90.6)	10	(76.9)	83	(86.5)	0.132
女性	0	(0.0)	1	(4.3)	1	(3.6)	0	(0.0)	2	(15.4)	4	(4.2)	
男女両方	0	(0.0)	4	(17.4)	1	(3.6)	2	(6.3)	0	(0.0)	7	(7.3)	
誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じない	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	2	(2.1)	
その他	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
無回答/無効回答	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	

表13. クリニック調査(CSW) 知識

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆HIV(エイズ)は、感染すると死にいたる														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	そう思う	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	そう思わない(正)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
	わからない	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	そう思う	-	(0.0)	8	(40.0)	10	(35.7)	8	(25.0)	2	(15.4)	28	(30.1)	0.470
	そう思わない(正)	-	(0.0)	7	(35.0)	13	(46.4)	20	(62.5)	8	(61.5)	48	(51.6)	
	わからない	-	(0.0)	5	(25.0)	5	(17.9)	4	(12.5)	3	(23.1)	17	(18.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体	そう思う	-	(0.0)	9	(39.1)	10	(35.7)	8	(25.0)	2	(15.4)	29	(30.2)	0.423
	そう思わない(正)	-	(0.0)	8	(34.8)	13	(46.4)	20	(62.5)	8	(61.5)	49	(51.0)	
	わからない	-	(0.0)	6	(26.1)	5	(17.9)	4	(12.5)	3	(23.1)	18	(18.8)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
◆HIV(エイズ)の検査では、内診(婦人科や産婦人科での膣の診察)やペニスの診察がある														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	そう思う	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	そう思わない(正)	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	
	わからない	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	そう思う	-	(0.0)	8	(40.0)	5	(17.9)	5	(15.6)	5	(38.5)	23	(24.7)	0.188
	そう思わない(正)	-	(0.0)	8	(40.0)	18	(64.3)	22	(68.8)	8	(61.5)	56	(60.2)	
	わからない	-	(0.0)	4	(20.0)	5	(17.9)	5	(15.6)	-	(0.0)	14	(15.1)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体	そう思う	-	(0.0)	8	(34.8)	5	(17.9)	5	(15.6)	5	(38.5)	23	(24.0)	0.251
	そう思わない(正)	-	(0.0)	10	(43.5)	18	(64.3)	22	(68.8)	8	(61.5)	58	(60.4)	
	わからない	-	(0.0)	5	(21.7)	5	(17.9)	5	(15.6)	-	(0.0)	15	(15.6)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
◆性感染症(性病)には、感染すると不妊症になりやすくなるものがある														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	そう思う(正)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	そう思わない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	わからない	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	そう思う(正)	-	(0.0)	13	(65.0)	24	(85.7)	26	(81.3)	13	(100.0)	76	(81.7)	0.189
	そう思わない	-	(0.0)	2	(10.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	3	(3.2)	
	わからない	-	(0.0)	5	(25.0)	4	(14.3)	5	(15.6)	-	(0.0)	14	(15.1)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体	そう思う(正)	-	(0.0)	14	(60.9)	24	(85.7)	26	(81.3)	13	(100.0)	77	(80.2)	0.113
	そう思わない	-	(0.0)	2	(8.7)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	3	(3.1)	
	わからない	-	(0.0)	7	(30.4)	4	(14.3)	5	(15.6)	-	(0.0)	16	(16.7)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

表14. クリニック調査(CSW) HIV/STI検査の受検歴、既往歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでにHIV(エイズ)検査を受けたことがありますか														
①男性	ある	n=0	(0.0)	n=3	(66.7)	n=0	(0.0)	n=0	(0.0)	n=0	(0.0)	n=3	(66.7)	-
	ない	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性	ある	n=0	(0.0)	n=20	(75.0)	n=28	(96.4)	n=32	(96.9)	n=13	(100.0)	n=93	(92.5)	0.010
	ない	-	(0.0)	5	(25.0)	1	(3.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(6.5)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	1	(1.1)	
①+② 全体	ある	n=0	(0.0)	n=23	(73.9)	n=28	(96.4)	n=32	(96.9)	n=13	(100.0)	n=96	(91.7)	0.006
	ない	-	(0.0)	6	(26.1)	1	(3.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(7.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	1	(1.0)	

◆過去1年間にHIV(エイズ)検査を受けたことがありますか

		n=0 ^{※1}		n=2		n=0		n=0		n=0		n=2		p値
①男性	ある	n=0 ^{※1}	(0.0)	n=2	(100.0)	n=0	(0.0)	n=0	(0.0)	n=0	(0.0)	n=2	(100.0)	
	ない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性	ある	n=0	(0.0)	n=15	(100.0)	n=27	(92.6)	n=31	(90.3)	n=13	(69.2)	n=86	(89.5)	0.075
	ない	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.4)	1	(3.2)	1	(7.7)	4	(4.7)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.5)	3	(23.1)	5	(5.8)	
①+② 全体	ある	n=0	(0.0)	n=17	(100.0)	n=27	(92.6)	n=31	(90.3)	n=13	(69.2)	n=88	(89.8)	0.063
	ない	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.4)	1	(3.2)	1	(7.7)	4	(4.5)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.5)	3	(23.1)	5	(5.7)	

※1 これまでにHIV(エイズ)検査を受けたことがあるものを分母とする。

◆これまでにHIV感染症(エイズ)に感染したことがありますか

		n=0 ^{※1}		n=2		n=0		n=0		n=0		n=2		p値
①男性	ある	n=0 ^{※1}	(0.0)	n=2	(0.0)	n=0	(0.0)	n=0	(0.0)	n=0	(0.0)	n=2	(0.0)	
	ない	-	(0.0)	2	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(100.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性	ある	n=0	(0.0)	n=15	(6.7)	n=27	(0.0)	n=31	(6.5)	n=13	(15.4)	n=86	(5.8)	0.134
	ない	-	(0.0)	14	(93.3)	27	(100.0)	29	(93.5)	10	(76.9)	80	(93.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(7.7)	1	(1.2)	
①+② 全体	ある	n=0	(0.0)	n=17	(5.9)	n=27	(0.0)	n=31	(6.5)	n=13	(15.4)	n=88	(5.7)	0.125
	ない	-	(0.0)	16	(94.1)	27	(100.0)	29	(93.5)	10	(76.9)	82	(93.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(7.7)	1	(1.1)	

※1 これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表14. クリニック調査(CSW) HIV/STI検査の受検歴、既往歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでにHIV(エイズ)を除く性感染症(性病)検査を受けたことがありますか														
①男性	ある	n=0	-	n=3	3 (100.0)	n=0	-	n=0	-	n=0	-	n=3	3 (100.0)	-
	ない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
②女性	ある	n=0	-	n=20	18 (90.0)	n=28	28 (100.0)	n=32	31 (96.9)	n=13	12 (92.3)	n=93	89 (95.7)	0.106
	ない	-	(0.0)	-	(10.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	2 (2.2)	-
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	2	(2.2)	-
①+② 全体	ある	n=0	-	n=23	21 (91.3)	n=28	28 (100.0)	n=32	31 (96.9)	n=13	12 (92.3)	n=96	92 (95.8)	0.140
	ない	-	(0.0)	-	(8.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	2 (2.1)	-
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	2	(2.1)	-
◆過去1年間にHIV(エイズ)を除く性感染症(性病)検査を受けたことがありますか														
①男性	ある	n=0 ^{※2}	-	n=3	3 (100.0)	n=0	-	n=0	-	n=0	-	n=3	3 (100.0)	-
	ない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
②女性	ある	n=0	-	n=18	17 (94.4)	n=28	28 (100.0)	n=31	30 (96.8)	n=12	12 (100.0)	n=89	87 (97.8)	0.439
	ない	-	(0.0)	-	(5.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	1 (1.1)	-
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	-	(0.0)	1	(1.1)	-
①+② 全体	ある	n=0	-	n=21	20 (95.2)	n=28	28 (100.0)	n=31	30 (96.8)	n=12	12 (100.0)	n=92	90 (97.8)	0.495
	ない	-	(0.0)	-	(4.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	1 (1.1)	-
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.2)	-	(0.0)	1	(1.1)	-
※2 これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがあるものを分母とする。														
◆これまでに性感染症(性病)かかったことがありますか(複数回答)														
①男性	梅毒	n=0 ^{※2}	-	n=3	-	n=0	-	n=0	-	n=0	-	n=3	-	-
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	淋菌感染症	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
	クラミジア	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
	②女性	梅毒	n=0	-	n=18	3 (16.7)	n=28	8 (28.6)	n=31	3 (9.7)	n=12	1 (8.3)	n=89	15 (16.9)
B型肝炎	-	(0.0)	1	(5.6)	1	(3.6)	3	(9.7)	-	(0.0)	5	(5.6)	0.594	
淋菌感染症	-	(0.0)	12	(66.7)	17	(60.7)	12	(38.7)	6	(50.0)	47	(52.8)	0.204	
クラミジア	-	(0.0)	13	(72.2)	23	(82.1)	26	(83.9)	10	(83.3)	72	(80.9)	0.770	
いずれか感染したことがある	-	(0.0)	15	(83.3)	24	(85.7)	28	(90.3)	10	(83.3)	77	(86.5)	0.882	
①+② 全体	梅毒	n=0	-	n=21	3 (14.3)	n=28	8 (28.6)	n=31	3 (9.7)	n=12	1 (8.3)	n=92	15 (16.3)	0.195
	B型肝炎	-	(0.0)	1	(4.8)	1	(3.6)	3	(9.7)	-	(0.0)	5	(5.4)	0.576
	淋菌感染症	-	(0.0)	14	(66.7)	17	(60.7)	12	(38.7)	6	(50.0)	49	(53.3)	0.185
	クラミジア	-	(0.0)	14	(66.7)	23	(82.1)	26	(83.9)	10	(83.3)	73	(79.3)	0.441
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	17	(81.0)	24	(85.7)	28	(90.3)	10	(83.3)	79	(85.9)	0.804
		-	(0.0)	17	(81.0)	24	(85.7)	28	(90.3)	10	(83.3)	79	(85.9)	0.804
※2 これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがあるものを分母とする。														

表15. クリニック調査(CSW) 病気・検査について考えや対応

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆今後、かかると思う病気(複数回答)													
	n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性													
がん	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
糖尿病	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
脳卒中・心臓病	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
インフルエンザ	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
肺炎	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
HIV感染症(エイズ)以外の性感染症(性病)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
上記以外の病気 (病気に)かからないと思う	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性													
がん	-	(0.0)	7	(35.0)	10	(35.7)	17	(53.1)	3	(23.1)	37	(39.8)	0.366
糖尿病	-	(0.0)	2	(10.0)	6	(21.4)	6	(18.8)	1	(7.7)	15	(16.1)	0.614
脳卒中・心臓病	-	(0.0)	5	(25.0)	5	(17.9)	6	(18.8)	1	(7.7)	17	(18.3)	0.686
インフルエンザ	-	(0.0)	13	(65.0)	20	(71.4)	19	(59.4)	5	(38.5)	57	(61.3)	0.300
肺炎	-	(0.0)	2	(10.0)	5	(17.9)	5	(15.6)	-	(0.0)	12	(12.9)	0.497
HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	3	(15.0)	2	(7.1)	4	(12.5)	1	(7.7)	10	(10.8)	0.776
HIV感染症(エイズ)以外の性感染症(性病)	-	(0.0)	10	(50.0)	13	(46.4)	15	(46.9)	7	(53.8)	45	(48.4)	0.863
上記以外の病気 (病気に)かからないと思う	-	(0.0)	1	(5.0)	3	(10.7)	10	(31.3)	4	(30.8)	18	(19.4)	0.120
	-	(0.0)	2	(10.0)	3	(10.7)	1	(3.1)	1	(7.7)	7	(7.5)	0.691
	n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体													
がん	-	(0.0)	7	(30.4)	10	(35.7)	17	(53.1)	3	(23.1)	37	(38.5)	0.292
糖尿病	-	(0.0)	2	(8.7)	6	(21.4)	6	(18.8)	1	(7.7)	15	(15.6)	0.542
脳卒中・心臓病	-	(0.0)	5	(21.7)	5	(17.9)	6	(18.8)	1	(7.7)	17	(17.7)	0.725
インフルエンザ	-	(0.0)	15	(65.2)	20	(71.4)	19	(59.4)	5	(38.5)	59	(61.5)	0.288
肺炎	-	(0.0)	3	(13.0)	5	(17.9)	5	(15.6)	-	(0.0)	13	(13.5)	0.522
HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	3	(13.0)	2	(7.1)	4	(12.5)	1	(7.7)	10	(10.4)	0.793
HIV感染症(エイズ)以外の性感染症(性病)	-	(0.0)	11	(47.8)	13	(46.4)	15	(46.9)	7	(53.8)	46	(47.9)	0.852
上記以外の病気 (病気に)かからないと思う	-	(0.0)	1	(4.3)	3	(10.7)	10	(31.3)	4	(30.8)	18	(18.8)	0.085
	-	(0.0)	3	(13.0)	3	(10.7)	1	(3.1)	1	(7.7)	8	(8.3)	0.605
◆HIV(エイズ)または性感染症(性病)検査を受けようと思うとき(複数回答)													
	n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性													
体の不調を感じたとき	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
パートナーがHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
知人や友人など周囲の人がHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
HIV(エイズ)または性感染症(性病)についてのニュースや記事を読んだとき	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
金銭的な補助が出ると知ったとき	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
定期的	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
人生の節目(結婚など)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
職場から勧められたとき	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
感染した人の話を聞いたとき	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性													
体の不調を感じたとき	-	(0.0)	5	(25.0)	8	(28.6)	4	(12.5)	2	(15.4)	19	(20.4)	0.417
パートナーがHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	8	(40.0)	8	(28.6)	2	(6.3)	3	(23.1)	21	(22.6)	0.030
知人や友人など周囲の人がHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	2	(10.0)	3	(10.7)	1	(3.1)	3	(23.1)	9	(9.7)	0.233
HIV(エイズ)または性感染症(性病)についてのニュースや記事を読んだとき	-	(0.0)	4	(20.0)	1	(3.6)	1	(3.1)	-	(0.0)	6	(6.5)	0.047
金銭的な補助が出ると知ったとき	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	1	(3.1)	1	(7.7)	4	(4.3)	0.589
定期的	-	(0.0)	13	(65.0)	19	(67.9)	28	(87.5)	10	(76.9)	70	(75.3)	0.208
人生の節目(結婚など)	-	(0.0)	4	(20.0)	3	(10.7)	1	(3.1)	-	(0.0)	8	(8.6)	0.116
職場から勧められたとき	-	(0.0)	3	(15.0)	5	(17.9)	2	(6.3)	3	(23.1)	13	(14.0)	0.415
感染した人の話を聞いたとき	-	(0.0)	2	(10.0)	3	(10.7)	1	(3.1)	-	(0.0)	6	(6.5)	0.433
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(10.7)	-	(0.0)	1	(7.7)	4	(4.3)	0.139
	n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体													
体の不調を感じたとき	-	(0.0)	7	(30.4)	8	(28.6)	4	(12.5)	2	(15.4)	21	(21.9)	0.297
パートナーがHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	9	(39.1)	8	(28.6)	2	(6.3)	3	(23.1)	22	(22.9)	0.030
知人や友人など周囲の人がHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	3	(13.0)	3	(10.7)	1	(3.1)	3	(23.1)	10	(10.4)	0.238
HIV(エイズ)または性感染症(性病)についてのニュースや記事を読んだとき	-	(0.0)	5	(21.7)	1	(3.6)	1	(3.1)	-	(0.0)	7	(7.3)	0.023
金銭的な補助が出ると知ったとき	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	1	(3.1)	1	(7.7)	4	(4.2)	0.549
定期的	-	(0.0)	14	(60.9)	19	(67.9)	28	(87.5)	10	(76.9)	71	(74.0)	0.128
人生の節目(結婚など)	-	(0.0)	4	(17.4)	3	(10.7)	1	(3.1)	-	(0.0)	8	(8.3)	0.172
職場から勧められたとき	-	(0.0)	4	(17.4)	5	(17.9)	2	(6.3)	3	(23.1)	14	(14.6)	0.404
感染した人の話を聞いたとき	-	(0.0)	2	(8.7)	3	(10.7)	1	(3.1)	-	(0.0)	6	(6.3)	0.460
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(10.7)	-	(0.0)	1	(7.7)	4	(4.2)	0.122

表15. クリニック調査(CSW) 病気・検査について考えや対応

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆今後、HIV(エイズ)または性感染症(性病)について体に心配な事がある時の対応(複数回答)														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	病気についてインターネットで調べる	-	(0.0)	3	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(100.0)	-
	パートナーに相談する	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	友人・知人に相談する	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	受診する病院を探す	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	病院を受診する	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
	様子をみる(何もしない)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	病気についてインターネットで調べる	-	(0.0)	11	(55.0)	16	(57.1)	18	(56.3)	5	(38.5)	50	(53.8)	0.695
	パートナーに相談する	-	(0.0)	1	(5.0)	2	(7.1)	2	(6.3)	-	(0.0)	5	(5.4)	0.810
	友人・知人に相談する	-	(0.0)	3	(15.0)	3	(10.7)	4	(12.5)	-	(0.0)	10	(10.8)	0.563
	受診する病院を探す	-	(0.0)	7	(35.0)	4	(14.3)	6	(18.8)	2	(15.4)	19	(20.4)	0.318
	病院を受診する	-	(0.0)	18	(90.0)	27	(96.4)	31	(96.9)	13	(100.0)	89	(95.7)	0.511
	様子をみる(何もしない)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体	病気についてインターネットで調べる	-	(0.0)	14	(60.9)	16	(57.1)	18	(56.3)	5	(38.5)	53	(55.2)	0.609
	パートナーに相談する	-	(0.0)	2	(8.7)	2	(7.1)	2	(6.3)	-	(0.0)	6	(6.3)	0.768
	友人・知人に相談する	-	(0.0)	4	(17.4)	3	(10.7)	4	(12.5)	-	(0.0)	11	(11.5)	0.470
	受診する病院を探す	-	(0.0)	8	(34.8)	4	(14.3)	6	(18.8)	2	(15.4)	20	(20.8)	0.289
	病院を受診する	-	(0.0)	20	(87.0)	27	(96.4)	31	(96.9)	13	(100.0)	91	(94.8)	0.261
	様子をみる(何もしない)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
◆HIV(エイズ)または性感染症(性病)検査を受けるのを妨げる理由(複数回答)														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	健康に自信があり、必要性を感じない	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	時間がない	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	経済的な負担がある	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	診断されるのが怖い	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	検査にともなう苦痛が不安	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	受検するのを忘れてしまう	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	受検する場所が不便	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	検査そのものを知らない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	検査の結果が信用できない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	健康に自信があり、必要性を感じない	-	(0.0)	1	(5.0)	2	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(3.2)	0.054
	時間がない	-	(0.0)	3	(15.0)	5	(17.9)	3	(9.4)	-	(0.0)	11	(11.8)	0.065
	経済的な負担がある	-	(0.0)	2	(10.0)	9	(32.1)	7	(21.9)	5	(38.5)	23	(24.7)	0.014
	診断されるのが怖い	-	(0.0)	7	(35.0)	6	(21.4)	5	(15.6)	1	(7.7)	19	(20.4)	0.031
	検査にともなう苦痛が不安	-	(0.0)	2	(10.0)	1	(3.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(3.2)	0.027
	受検するのを忘れてしまう	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	3	(3.2)	0.042
	受検する場所が不便	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.2)	0.028
	検査そのものを知らない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.016
	検査の結果が信用できない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.016
	その他	-	(0.0)	4	(20.0)	10	(35.7)	8	(25.0)	2	(15.4)	24	(25.8)	0.077
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体	健康に自信があり、必要性を感じない	-	(0.0)	2	(8.7)	2	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(4.2)	0.044
	時間がない	-	(0.0)	4	(17.4)	5	(17.9)	3	(9.4)	-	(0.0)	12	(12.5)	0.062
	経済的な負担がある	-	(0.0)	3	(13.0)	9	(32.1)	7	(21.9)	5	(38.5)	24	(25.0)	0.022
	診断されるのが怖い	-	(0.0)	7	(30.4)	6	(21.4)	5	(15.6)	1	(7.7)	19	(19.8)	0.050
	検査にともなう苦痛が不安	-	(0.0)	2	(8.7)	1	(3.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(3.1)	0.036
	受検するのを忘れてしまう	-	(0.0)	2	(8.7)	-	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	4	(4.2)	0.031
	受検する場所が不便	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.1)	0.028
	検査そのものを知らない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.018
	検査の結果が信用できない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.018
	その他	-	(0.0)	4	(17.4)	10	(35.7)	8	(25.0)	2	(15.4)	24	(25.0)	0.068

表15. クリニック調査(CSW) 病気・検査について考えや対応

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)についての考え(複数回答)															
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3			
①男性	早期発見が大切である	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-	
	怖い病気である	-	(0.0)	3	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(100.0)	-	
	検査は、感染の早期発見と治療につながる	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-	
	早期に発見できれば、治療が可能である	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	
	自分もHIV(エイズ)を含む性感染症(性病)にかかる可能性がある	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-	
	HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)の危険性について常に意識しておく必要がある	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	
	周囲で話題になることが多い病気である	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	
	遺伝する病気である	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	
	自分は感染するリスクが高い	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-	
	自分は感染予防について、きちんとした知識をもっている	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-	
	めったにかかることのない病気である	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	自分にはあまり関係ない病気である	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	病気について、よく分からない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
			n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
	②女性	早期発見が大切である	-	(0.0)	19	(95.0)	27	(96.4)	27	(84.4)	10	(76.9)	83	(89.2)	0.169
怖い病気である		-	(0.0)	16	(80.0)	17	(60.7)	17	(53.1)	7	(53.8)	57	(61.3)	0.245	
検査は、感染の早期発見と治療につながる		-	(0.0)	16	(80.0)	20	(71.4)	25	(78.1)	12	(92.3)	73	(78.5)	0.507	
早期に発見できれば、治療が可能である		-	(0.0)	12	(60.0)	19	(67.9)	19	(59.4)	12	(92.3)	62	(66.7)	0.170	
自分もHIV(エイズ)を含む性感染症(性病)にかかる可能性がある		-	(0.0)	14	(70.0)	23	(82.1)	24	(75.0)	9	(69.2)	70	(75.3)	0.737	
HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)の危険性について常に意識しておく必要がある		-	(0.0)	14	(70.0)	20	(71.4)	22	(68.8)	10	(76.9)	66	(71.0)	0.958	
周囲で話題になることが多い病気である		-	(0.0)	1	(5.0)	5	(17.9)	3	(9.4)	1	(7.7)	10	(10.8)	0.503	
遺伝する病気である		-	(0.0)	3	(15.0)	1	(3.6)	2	(6.3)	-	(0.0)	6	(6.5)	0.295	
自分は感染するリスクが高い		-	(0.0)	5	(25.0)	13	(46.4)	17	(53.1)	8	(61.5)	43	(46.2)	0.141	
自分は感染予防について、きちんとした知識をもっている		-	(0.0)	3	(15.0)	7	(25.0)	6	(18.8)	3	(23.1)	19	(20.4)	0.841	
めったにかかることのない病気である		-	(0.0)	2	(10.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	3	(3.2)	0.230	
自分にはあまり関係ない病気である		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
病気について、よく分からない		-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	1	(3.1)	2	(15.4)	4	(4.3)	0.178	
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96			
①+② 全体		早期発見が大切である	-	(0.0)	21	(91.3)	27	(96.4)	27	(84.4)	10	(76.9)	85	(88.5)	0.244
	怖い病気である	-	(0.0)	19	(82.6)	17	(60.7)	17	(53.1)	7	(53.8)	60	(62.5)	0.132	
	検査は、感染の早期発見と治療につながる	-	(0.0)	18	(78.3)	20	(71.4)	25	(78.1)	12	(92.3)	75	(78.1)	0.519	
	早期に発見できれば、治療が可能である	-	(0.0)	13	(56.5)	19	(67.9)	19	(59.4)	12	(92.3)	63	(65.6)	0.135	
	自分もHIV(エイズ)を含む性感染症(性病)にかかる可能性がある	-	(0.0)	16	(69.6)	23	(82.1)	24	(75.0)	9	(69.2)	72	(75.0)	0.716	
	HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)の危険性について常に意識しておく必要がある	-	(0.0)	15	(65.2)	20	(71.4)	22	(68.8)	10	(76.9)	67	(69.8)	0.898	
	周囲で話題になることが多い病気である	-	(0.0)	2	(8.7)	5	(17.9)	3	(9.4)	1	(7.7)	11	(11.5)	0.654	
	遺伝する病気である	-	(0.0)	4	(17.4)	1	(3.6)	2	(6.3)	-	(0.0)	7	(7.3)	0.163	
	自分は感染するリスクが高い	-	(0.0)	7	(30.4)	13	(46.4)	17	(53.1)	8	(61.5)	45	(46.9)	0.248	
	自分は感染予防について、きちんとした知識をもっている	-	(0.0)	4	(17.4)	7	(25.0)	6	(18.8)	3	(23.1)	20	(20.8)	0.900	
	めったにかかることのない病気である	-	(0.0)	2	(8.7)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	3	(3.1)	0.298	
	自分にはあまり関係ない病気である	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	病気について、よく分からない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	1	(3.1)	2	(15.4)	4	(4.2)	0.157	

表16. クリニック調査(CSW) 性経験

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間にセックスした相手の人数														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
これまでの人生でセックスの経験はない		-		-		-		-		-		-		-
(過去6か月間では)0人		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		-
①男性	1人	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
	2人～3人	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	4人～9人	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	10人以上	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	
	答えたくない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
これまでの人生でセックスの経験はない		-		-		-		-		-		-		0.212
(過去6か月間では)0人		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		
②女性	1人	-	(0.0)	2	(10.0)	-	(0.0)	2	(6.3)	-	(0.0)	4	(4.3)	
	2人～3人	-	(0.0)	2	(10.0)	2	(7.1)	-	(0.0)	1	(7.7)	5	(5.4)	
	4人～9人	-	(0.0)	2	(10.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	4	(4.3)	
	10人以上	-	(0.0)	13	(65.0)	21	(75.0)	22	(68.8)	7	(53.8)	63	(67.7)	
	答えたくない	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(17.9)	7	(21.9)	4	(30.8)	16	(17.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
これまでの人生でセックスの経験はない		-		-		-		-		-		-		0.173
(過去6か月間では)0人		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		(0.0)		
①+② 全体	1人	-	(0.0)	3	(13.0)	-	(0.0)	2	(6.3)	-	(0.0)	5	(5.2)	
	2人～3人	-	(0.0)	2	(8.7)	2	(7.1)	-	(0.0)	1	(7.7)	5	(5.2)	
	4人～9人	-	(0.0)	2	(8.7)	-	(0.0)	1	(3.1)	1	(7.7)	4	(4.2)	
	10人以上	-	(0.0)	15	(65.2)	21	(75.0)	22	(68.8)	7	(53.8)	65	(67.7)	
	答えたくない	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(17.9)	7	(21.9)	4	(30.8)	16	(16.7)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

◆過去6か月間にセックスした相手の性別														
		n=0 ^{※3}		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	男性	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	女性	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
	男女両方	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

		n=0		n=19		n=23		n=25		n=9		n=76		
②女性	男性	-	(0.0)	18	(94.7)	22	(95.7)	25	(100.0)	9	(100.0)	74	(97.4)	0.500
	女性	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.3)	
	男女両方	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.3)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

		n=0		n=22		n=23		n=25		n=9		n=79		
①+② 全体	男性	-	(0.0)	19	(86.4)	22	(95.7)	25	(100.0)	9	(100.0)	75	(94.9)	0.325
	女性	-	(0.0)	2	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.5)	
	男女両方	-	(0.0)	1	(4.5)	1	(4.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.5)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

※3 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上と回答したものを分母とする。

表16. クリニック調査(CSW) 性経験

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
◆過去6か月間にセックスした相手															
	n=0 ^{※3}		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3				
①男性	-														
恋人や配偶者など特手の相手と	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
友達やセフレと	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
(自分が)お金を払った相手と	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
(自分に)お金をくれた相手と	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
街やクラブでナンパした(された)相手と	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
(性風俗店の)客と	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	n=0		n=19		n=23		n=25		n=9		n=76				
②女性	-														
恋人や配偶者など特手の相手と	-	(0.0)	8	(42.1)	13	(56.5)	14	(56.0)	3	(33.3)	38	(50.0)	0.527		
友達やセフレと	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(8.7)	2	(8.0)	-	(0.0)	4	(5.3)	0.480		
(自分が)お金を払った相手と	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
(自分に)お金をくれた相手と	-	(0.0)	1	(5.3)	2	(8.7)	3	(12.0)	1	(11.1)	7	(9.2)	0.889		
SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.3)	0.385		
街やクラブでナンパした(された)相手と	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.3)	0.385		
(性風俗店の)客と	-	(0.0)	15	(78.9)	21	(91.3)	23	(92.0)	8	(88.9)	67	(88.2)	0.548		
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
	n=0		n=22		n=23		n=25		n=9		n=79				
①+②全体	-														
恋人や配偶者など特手の相手と	-	(0.0)	10	(45.5)	13	(56.5)	14	(56.0)	3	(33.3)	40	(50.6)	0.589		
友達やセフレと	-	(0.0)	1	(4.5)	2	(8.7)	2	(8.0)	-	(0.0)	5	(6.3)	0.786		
(自分が)お金を払った相手と	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
(自分に)お金をくれた相手と	-	(0.0)	3	(13.6)	2	(8.7)	3	(12.0)	1	(11.1)	9	(11.4)	0.963		
SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	-	(0.0)	2	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.5)	0.150		
街やクラブでナンパした(された)相手と	-	(0.0)	1	(4.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.3)	0.453		
(性風俗店の)客と	-	(0.0)	17	(77.3)	21	(91.3)	23	(92.0)	8	(88.9)	69	(87.3)	0.415		
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		

※3 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上と回答したものを分母とする。

◆過去6か月間のセックスでのコンドーム使用

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間のセックスでのコンドーム使用													
	n=0 ^{※3}		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	-												
必ず使った	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
使うことが多かった	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
五分五分	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
使わないことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
全く使わなかった	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	n=0		n=19		n=23		n=25		n=9		n=76		
②女性	-												
必ず使った	-	(0.0)	6	(31.6)	6	(26.1)	8	(32.0)	4	(44.4)	24	(31.6)	0.127
使うことが多かった	-	(0.0)	2	(10.5)	8	(34.8)	10	(40.0)	1	(11.1)	21	(27.6)	
五分五分	-	(0.0)	3	(15.8)	2	(8.7)	4	(16.0)	4	(44.4)	13	(17.1)	
使わないことが多かった	-	(0.0)	3	(15.8)	3	(13.0)	2	(8.0)	-	(0.0)	8	(10.5)	
全く使わなかった	-	(0.0)	5	(26.3)	4	(17.4)	1	(4.0)	-	(0.0)	10	(13.2)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	n=0		n=22		n=23		n=25		n=9		n=79		
①+②全体	-												
必ず使った	-	(0.0)	6	(27.3)	6	(26.1)	8	(32.0)	4	(44.4)	24	(30.4)	0.139
使うことが多かった	-	(0.0)	3	(13.6)	8	(34.8)	10	(40.0)	1	(11.1)	22	(27.8)	
五分五分	-	(0.0)	4	(18.2)	2	(8.7)	4	(16.0)	4	(44.4)	14	(17.7)	
使わないことが多かった	-	(0.0)	3	(13.6)	3	(13.0)	2	(8.0)	-	(0.0)	8	(10.1)	
全く使わなかった	-	(0.0)	6	(27.3)	4	(17.4)	1	(4.0)	-	(0.0)	11	(13.9)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

※3 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上と回答したものを分母とする。

表16. クリニック調査(CSW) 性経験

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
◆過去6か月間の膣性交でのコンドーム使用															
	n=0 ^{※4}		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3				
必ず使った	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
使うことが多かった	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
五分五分	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
①男性 使わないことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
全く使わなかった	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	n=0		n=19		n=23		n=25		n=9		n=76				
必ず使った	-	(0.0)	8	(42.1)	5	(21.7)	7	(28.0)	3	(33.3)	23	(30.3)	0.314		
使うことが多かった	-	(0.0)	2	(10.5)	8	(34.8)	10	(40.0)	-	(0.0)	20	(26.3)			
五分五分	-	(0.0)	2	(10.5)	2	(8.7)	3	(12.0)	3	(33.3)	10	(13.2)			
②女性 使わないことが多かった	-	(0.0)	2	(10.5)	2	(8.7)	2	(8.0)	-	(0.0)	6	(7.9)			
全く使わなかった	-	(0.0)	4	(21.1)	4	(17.4)	1	(4.0)	1	(11.1)	10	(13.2)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(5.3)	2	(8.7)	2	(8.0)	2	(22.2)	7	(9.2)			
	n=0		n=22		n=23		n=25		n=9		n=79				
必ず使った	-	(0.0)	9	(40.9)	5	(21.7)	7	(28.0)	3	(33.3)	24	(30.4)	0.297		
使うことが多かった	-	(0.0)	3	(13.6)	8	(34.8)	10	(40.0)	-	(0.0)	21	(26.6)			
五分五分	-	(0.0)	2	(9.1)	2	(8.7)	3	(12.0)	3	(33.3)	10	(12.7)			
①+② 全体 使わないことが多かった	-	(0.0)	2	(9.1)	2	(8.7)	2	(8.0)	-	(0.0)	6	(7.6)			
全く使わなかった	-	(0.0)	5	(22.7)	4	(17.4)	1	(4.0)	1	(11.1)	11	(13.9)			
無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(4.5)	2	(8.7)	2	(8.0)	2	(22.2)	7	(8.9)			
※4 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上(膣性交していないものは除く)と回答したものを分母とする。															
◆過去6か月間のアナルセックスでのコンドーム使用															
	n=0 ^{※5}		n=2		n=0		n=0		n=0		n=2				
必ず使った	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
使うことが多かった	-	(0.0)	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	-		
五分五分	-	(0.0)	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	-		
①男性 使わないことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
全く使わなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
	n=0		n=1		n=3		n=2		n=0		n=6				
必ず使った	-	(0.0)	1	(100.0)	1	(33.3)	2	(100.0)	-	(0.0)	4	(66.7)	0.223		
使うことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
五分五分	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
②女性 使わないことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
全く使わなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(33.3)	-		
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
	n=0		n=3		n=3		n=2		n=0		n=8				
必ず使った	-	(0.0)	1	(33.3)	1	(33.3)	2	(100.0)	-	(0.0)	4	(50.0)	0.238		
使うことが多かった	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(12.5)	-		
五分五分	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(12.5)	-		
①+② 全体 使わないことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
全く使わなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(25.0)	-		
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-		
※5 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上(アナルセックスしていないものは除く)と回答したものを分母とする。															

表16. クリニック調査(CSW) 性経験

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間のセックスでコンドームを使った目的													
	n=0 ^{※7}		n=2		n=0		n=0		n=0		n=2		
①男性	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
避妊のため	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
性感染症予防のため	-	(0.0)	2	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(100.0)	-
両方(避妊と性感染症予防)のため	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	n=0		n=14		n=19		n=24		n=9		n=66		
②女性	-	(0.0)	2	(14.3)	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	3	(4.5)	0.028
避妊のため	-	(0.0)	2	(14.3)	9	(47.4)	10	(41.7)	8	(88.9)	29	(43.9)	
性感染症予防のため	-	(0.0)	8	(57.1)	9	(47.4)	13	(54.2)	1	(11.1)	31	(47.0)	
両方(避妊と性感染症予防)のため	-	(0.0)	2	(14.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(4.5)	
上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	n=0		n=16		n=19		n=24		n=9		n=68		
①+②全体	-	(0.0)	2	(12.5)	-	(0.0)	1	(4.2)	-	(0.0)	3	(4.4)	0.076
避妊のため	-	(0.0)	4	(25.0)	9	(47.4)	10	(41.7)	8	(88.9)	31	(45.6)	
性感染症予防のため	-	(0.0)	8	(50.0)	9	(47.4)	13	(54.2)	1	(11.1)	31	(45.6)	
両方(避妊と性感染症予防)のため	-	(0.0)	2	(12.5)	1	(5.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(4.4)	
上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

※7 過去6か月間のセックスでコンドームを使ったことがあるものを分母とする。

表17. クリニック調査(CSW) 性風俗サービス

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去3か月間に、提供した性風俗サービス(複数回答)													
	n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	-	(0.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	-
店舗型ファッションヘルス	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
派遣型ファッションヘルス	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
派遣型デートクラブ、ホテル、エスコートサービス	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
接客型料理店	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
ストリップ劇場	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
風俗系エステ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
ピンクサロン、ヌキキャバ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
ソープランド	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
出会い系サイト、テレクラなどを通じた援助交際	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
バー、スナック	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
街場(立ちんぼ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
SMクラブ、SMパブ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	-	(0.0)	3	(15.0)	3	(10.7)	10	(31.3)	3	(23.1)	19	(20.4)	0.226
店舗型ファッションヘルス	-	(0.0)	7	(35.0)	8	(28.6)	14	(43.8)	6	(46.2)	35	(37.6)	0.583
派遣型ファッションヘルス	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(10.7)	4	(12.5)	4	(30.8)	11	(11.8)	0.066
派遣型デートクラブ、ホテル、エスコートサービス	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	1	(3.1)	-	(0.0)	2	(2.2)	0.768
接客型料理店	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
ストリップ劇場	-	(0.0)	2	(10.0)	1	(3.6)	1	(3.1)	1	(7.7)	5	(5.4)	0.688
風俗系エステ	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	0.297
ピンクサロン、ヌキキャバ	-	(0.0)	9	(45.0)	15	(53.6)	5	(15.6)	-	(0.0)	29	(31.2)	0.000
ソープランド	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	0.297
出会い系サイト、テレクラなどを通じた援助交際	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	0.297
バー、スナック	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
街場(立ちんぼ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
SMクラブ、SMパブ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
その他	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	2	(2.2)	0.611
	n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+②全体	-	(0.0)	5	(21.7)	3	(10.7)	10	(31.3)	3	(23.1)	21	(21.9)	0.296
店舗型ファッションヘルス	-	(0.0)	8	(34.8)	8	(28.6)	14	(43.8)	6	(46.2)	36	(37.5)	0.578
派遣型ファッションヘルス	-	(0.0)	1	(4.3)	3	(10.7)	4	(12.5)	4	(30.8)	12	(12.5)	0.142
派遣型デートクラブ、ホテル、エスコートサービス	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	1	(3.1)	-	(0.0)	2	(2.1)	0.743
接客型料理店	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
ストリップ劇場	-	(0.0)	2	(8.7)	1	(3.6)	1	(3.1)	1	(7.7)	5	(5.2)	0.762
風俗系エステ	-	(0.0)	1	(4.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	0.361
ピンクサロン、ヌキキャバ	-	(0.0)	9	(39.1)	15	(53.6)	5	(15.6)	-	(0.0)	29	(30.2)	0.001
ソープランド	-	(0.0)	1	(4.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	0.361
出会い系サイト、テレクラなどを通じた援助交際	-	(0.0)	2	(8.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.1)	0.090
バー、スナック	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
街場(立ちんぼ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
SMクラブ、SMパブ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
その他	-	(0.0)	1	(4.3)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	2	(2.1)	0.655

表17. クリニック調査(CSW) 性風俗サービス

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去3か月間に、性風俗サービスを提供した相手(複数回答)														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	母国語が日本語の相手	-	(0.0)	3	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(100.0)	-
	母国語が中国語の相手	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	母国語が韓国語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	母国語が英語の相手	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	母国語が欧州語の相手	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	分からない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	母国語が日本語の相手	-	(0.0)	16	(80.0)	28	(100.0)	32	(100.0)	13	(100.0)	89	(95.7)	0.018
	母国語が中国語の相手	-	(0.0)	6	(30.0)	2	(7.1)	1	(3.1)	-	(0.0)	9	(9.7)	0.010
	母国語が韓国語の相手	-	(0.0)	1	(5.0)	3	(10.7)	2	(6.3)	-	(0.0)	6	(6.5)	0.485
	母国語が英語の相手	-	(0.0)	1	(5.0)	2	(7.1)	1	(3.1)	-	(0.0)	4	(4.3)	0.547
	母国語が欧州語の相手	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	0.280
	分からない	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	0.280
	その他	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	0.280
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体	母国語が日本語の相手	-	(0.0)	19	(82.6)	28	(100.0)	32	(100.0)	13	(100.0)	92	(95.8)	0.039
	母国語が中国語の相手	-	(0.0)	7	(30.4)	2	(7.1)	1	(3.1)	-	(0.0)	10	(10.4)	0.009
	母国語が韓国語の相手	-	(0.0)	1	(4.3)	3	(10.7)	2	(6.3)	-	(0.0)	6	(6.3)	0.527
	母国語が英語の相手	-	(0.0)	2	(8.7)	2	(7.1)	1	(3.1)	-	(0.0)	5	(5.2)	0.536
	母国語が欧州語の相手	-	(0.0)	2	(8.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.1)	0.132
	分からない	-	(0.0)	1	(4.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	0.371
	その他	-	(0.0)	1	(4.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.0)	0.371
◆過去3か月間に、性風俗サービスを提供した相手ののべ人数														
		n=0		n=3		n=0		n=0		n=0		n=3		
①男性	1人～20人	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	21人～40人	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	41人～60人	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	61人～80人	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	81人～100人	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	101人以上	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	-
	分からない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=0		n=20		n=28		n=32		n=13		n=93		
②女性	1人～20人	-	(0.0)	2	(10.0)	1	(3.6)	5	(15.6)	1	(7.7)	9	(9.7)	0.400
	21人～40人	-	(0.0)	1	(5.0)	2	(7.1)	6	(18.8)	4	(30.8)	13	(14.0)	
	41人～60人	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	4	(12.5)	2	(15.4)	8	(8.6)	
	61人～80人	-	(0.0)	4	(20.0)	3	(10.7)	3	(9.4)	-	(0.0)	10	(10.8)	
	81人～100人	-	(0.0)	1	(5.0)	4	(14.3)	3	(9.4)	2	(15.4)	10	(10.8)	
	101人以上	-	(0.0)	7	(35.0)	7	(25.0)	6	(18.8)	2	(15.4)	22	(23.7)	
	分からない	-	(0.0)	5	(25.0)	9	(32.1)	5	(15.6)	2	(15.4)	21	(22.6)	
		n=0		n=23		n=28		n=32		n=13		n=96		
①+② 全体	1人～20人	-	(0.0)	3	(13.0)	1	(3.6)	5	(15.6)	1	(7.7)	10	(10.4)	0.445
	21人～40人	-	(0.0)	2	(8.7)	2	(7.1)	6	(18.8)	4	(30.8)	14	(14.6)	
	41人～60人	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	4	(12.5)	2	(15.4)	8	(8.3)	
	61人～80人	-	(0.0)	4	(17.4)	3	(10.7)	3	(9.4)	-	(0.0)	10	(10.4)	
	81人～100人	-	(0.0)	1	(4.3)	4	(14.3)	3	(9.4)	2	(15.4)	10	(10.4)	
	101人以上	-	(0.0)	8	(34.8)	7	(25.0)	6	(18.8)	2	(15.4)	23	(24.0)	
	分からない	-	(0.0)	5	(21.7)	9	(32.1)	5	(15.6)	2	(15.4)	21	(21.9)	

表17. クリニック調査(CSW) 性風俗サービス

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆過去3か月間に、性風俗サービス提供時のコンドーム使用(複数回答)								
		n=0	n=3	n=0	n=0	n=0	n=3	
①男性	セックス相手が準備したコンドームを使用した	- (0.0)	1 (33.3)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (33.3)	-
	自分が準備したコンドームを使用した	- (0.0)	1 (33.3)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (33.3)	-
	お店のコンドームを使用した	- (0.0)	2 (66.7)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	2 (66.7)	-
	ホテルに備え付けのコンドームを使用した	- (0.0)	1 (33.3)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (33.3)	-
	コンドームを使用しなかった	- (0.0)	2 (66.7)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	2 (66.7)	-
		n=0	n=20	n=28	n=32	n=13	n=93	
②女性	セックス相手が準備したコンドームを使用した	- (0.0)	2 (10.0)	4 (14.3)	1 (3.1)	2 (15.4)	9 (9.7)	0.375
	自分が準備したコンドームを使用した	- (0.0)	6 (30.0)	17 (60.7)	17 (53.1)	8 (61.5)	48 (51.6)	0.231
	お店のコンドームを使用した	- (0.0)	7 (35.0)	6 (21.4)	4 (12.5)	3 (23.1)	20 (21.5)	0.255
	ホテルに備え付けのコンドームを使用した	- (0.0)	4 (20.0)	8 (28.6)	20 (62.5)	11 (84.6)	43 (46.2)	0.001
	コンドームを使用しなかった	- (0.0)	8 (40.0)	11 (39.3)	3 (9.4)	- (0.0)	22 (23.7)	0.005
		n=0	n=23	n=28	n=32	n=13	n=96	
①+②全体	セックス相手が準備したコンドームを使用した	- (0.0)	3 (13.0)	4 (14.3)	1 (3.1)	2 (15.4)	10 (10.4)	0.416
	自分が準備したコンドームを使用した	- (0.0)	7 (30.4)	17 (60.7)	17 (53.1)	8 (61.5)	49 (51.0)	0.236
	お店のコンドームを使用した	- (0.0)	9 (39.1)	6 (21.4)	4 (12.5)	3 (23.1)	22 (22.9)	0.169
	ホテルに備え付けのコンドームを使用した	- (0.0)	5 (21.7)	8 (28.6)	20 (62.5)	11 (84.6)	44 (45.8)	0.001
	コンドームを使用しなかった	- (0.0)	10 (43.5)	11 (39.3)	3 (9.4)	- (0.0)	24 (25.0)	0.003
◆過去3か月間に、性風俗サービス提供時にコンドームを使用しなかった理由(複数回答)								
		n=0 ^{※8}	n=2	n=0	n=0	n=0	n=2	
①男性	コンドームを使用する必要のないサービスだから	- (0.0)	1 (50.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (50.0)	-
	相手が希望したから	- (0.0)	1 (50.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (50.0)	-
	相手が好みのタイプだから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	これまでも関係のある相手だから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	サービスとして当然(暗黙の了解)だから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	一体感がないから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	コンドームが手元になかったから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	コンドームをつけようって言えなかったから	- (0.0)	1 (50.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (50.0)	-
	(お店で)コンドームの使用が禁止されているから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
			n=0	n=8	n=11	n=3	n=0	n=22
②女性	コンドームを使用する必要のないサービスだから	- (0.0)	5 (62.5)	4 (36.4)	3 (100.0)	- (0.0)	12 (54.5)	0.124
	相手が希望したから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (33.3)	- (0.0)	1 (4.5)	0.036
	相手が好みのタイプだから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	これまでも関係のある相手だから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	サービスとして当然(暗黙の了解)だから	- (0.0)	1 (12.5)	3 (27.3)	1 (33.3)	- (0.0)	5 (22.7)	0.671
	一体感がないから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	コンドームが手元になかったから	- (0.0)	1 (12.5)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (4.5)	0.400
	コンドームをつけようって言えなかったから	- (0.0)	1 (12.5)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (4.5)	0.400
	(お店で)コンドームの使用が禁止されているから	- (0.0)	1 (12.5)	5 (45.5)	1 (33.3)	- (0.0)	7 (31.8)	0.313
			n=0	n=10	n=11	n=3	n=0	n=24
①+②全体	コンドームを使用する必要のないサービスだから	- (0.0)	6 (60.0)	4 (36.4)	3 (100.0)	- (0.0)	13 (54.2)	0.130
	相手が希望したから	- (0.0)	1 (10.0)	- (0.0)	1 (33.3)	- (0.0)	2 (8.3)	0.175
	相手が好みのタイプだから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	これまでも関係のある相手だから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	サービスとして当然(暗黙の了解)だから	- (0.0)	1 (10.0)	3 (27.3)	1 (33.3)	- (0.0)	5 (20.8)	0.529
	一体感がないから	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-
	コンドームが手元になかったから	- (0.0)	1 (10.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (4.2)	0.482
	コンドームをつけようって言えなかったから	- (0.0)	2 (20.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	2 (8.3)	0.217
	(お店で)コンドームの使用が禁止されているから	- (0.0)	1 (10.0)	5 (45.5)	1 (33.3)	- (0.0)	7 (29.2)	0.200

※8 過去3か月間の性風俗サービス提供時にコンドームを使用しなかったものを分母とする。