

表18. クリニック調査(非CSW) 基本属性

		◆年齢階級(度数分布)				◆性別(度数分布)								
		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
有効回答数		149		10代	2	(1.3)	男性	106	(71.1)					
平均値		34.35		20代	61	(40.9)	女性	43	(28.9)					
中央値		31.00		30代	40	(26.8)	その他	-	(0.0)					
標準偏差		10.972		40代	30	(20.1)	全体	149	(100.0)					
最小値		18		50歳以上	16	(10.7)								
最大値		65		全体	149	(100.0)								
◆職業(複数回答)														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	学生	1	(50.0)	7	(17.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(7.5)	0.004
	会社員	1	(50.0)	29	(70.7)	16	(64.0)	18	(72.0)	11	(84.6)	75	(70.8)	0.700
	公務員	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(12.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(2.8)	0.040
	自営業	-	(0.0)	1	(2.4)	5	(20.0)	5	(20.0)	2	(15.4)	13	(12.3)	0.144
	主婦	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	アルバイト・フリーター	-	(0.0)	3	(7.3)	2	(8.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	6	(5.7)	0.827
	無職	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	1	(2.4)	-	(0.0)	1	(4.0)	1	(7.7)	3	(2.8)	0.726
-----														
②女性	学生	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.3)	0.758
	会社員	-	(0.0)	8	(40.0)	4	(26.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	12	(27.9)	0.207
	公務員	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.3)	0.758
	自営業	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(40.0)	-	(0.0)	2	(4.7)	0.001
	主婦	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(13.3)	1	(20.0)	1	(33.3)	4	(9.3)	0.167
	アルバイト・フリーター	-	(0.0)	7	(35.0)	7	(46.7)	1	(20.0)	2	(66.7)	17	(39.5)	0.529
	無職	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	3	(15.0)	3	(20.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	7	(16.3)	0.847
-----														
①+②全体	学生	1	(50.0)	8	(13.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(6.0)	0.001
	会社員	1	(50.0)	37	(60.7)	20	(50.0)	18	(60.0)	11	(68.8)	87	(58.4)	0.720
	公務員	-	(0.0)	1	(1.6)	3	(7.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(2.7)	0.274
	自営業	-	(0.0)	1	(1.6)	5	(12.5)	7	(23.3)	2	(12.5)	15	(10.1)	0.024
	主婦	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(5.0)	1	(3.3)	1	(6.3)	4	(2.7)	0.495
	アルバイト・フリーター	-	(0.0)	10	(16.4)	9	(22.5)	2	(6.7)	2	(12.5)	23	(15.4)	0.432
	無職	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	4	(6.6)	3	(7.5)	2	(6.7)	1	(6.3)	10	(6.7)	0.996
◆恋愛対象として性的魅力を感じつ相手														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	男性	1	(50.0)	7	(17.1)	4	(16.0)	4	(16.0)	3	(23.1)	19	(17.9)	0.737
	女性	1	(50.0)	28	(68.3)	18	(72.0)	21	(84.0)	10	(76.9)	78	(73.6)	
	男女両方	-	(0.0)	5	(12.2)	3	(12.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(7.5)	
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じない	-	(0.0)	1	(2.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.9)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
-----														
②女性	男性	-	(0.0)	18	(90.0)	15	(100.0)	4	(80.0)	3	(100.0)	40	(93.0)	0.579
	女性	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	2	(4.7)	
	男女両方	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.3)	
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
-----														
①+②全体	男性	1	(50.0)	25	(41.0)	19	(47.5)	8	(26.7)	6	(37.5)	59	(39.6)	0.502
	女性	1	(50.0)	29	(47.5)	18	(45.0)	22	(73.3)	10	(62.5)	80	(53.7)	
	男女両方	-	(0.0)	6	(9.8)	3	(7.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(6.0)	
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じない	-	(0.0)	1	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
-----														
無回答/無効回答		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

表18. クリニック調査(非CSW) 基本属性

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆婚姻関係にある相手、または特定のパートナーがいますか								
		n=2	n=41	n=25	n=25	n=13	n=106	
①男性	結婚している	- (0.0)	3 (7.3)	9 (36.0)	11 (44.0)	6 (46.2)	29 (27.4)	0.000
	結婚しており、その他にも特定のパートナーがいる	- (0.0)	1 (2.4)	4 (16.0)	3 (12.0)	3 (23.1)	11 (10.4)	
	結婚していない	- (0.0)	3 (7.3)	2 (8.0)	2 (8.0)	2 (15.4)	9 (8.5)	
	結婚していないが、特定のパートナーがいる	- (0.0)	24 (58.5)	4 (16.0)	4 (16.0)	- (0.0)	32 (30.2)	
	特定のパートナーはいない	2 (100.0)	10 (24.4)	6 (24.0)	5 (20.0)	2 (15.4)	25 (23.6)	
無回答/無効回答		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=0	n=20	n=15	n=5	n=3	n=43	
②女性	結婚している	- (0.0)	- (0.0)	3 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	5 (11.6)	0.054
	結婚しており、その他にも特定のパートナーがいる	- (0.0)	- (0.0)	3 (20.0)	1 (20.0)	- (0.0)	4 (9.3)	
	結婚していない	- (0.0)	- (0.0)	3 (20.0)	- (0.0)	- (0.0)	3 (7.0)	
	結婚していないが、特定のパートナーがいる	- (0.0)	15 (75.0)	3 (20.0)	2 (40.0)	1 (33.3)	21 (48.8)	
	特定のパートナーはいない	- (0.0)	5 (25.0)	3 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	10 (23.3)	
無回答/無効回答		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=2	n=61	n=40	n=30	n=16	n=149	
①+② 全体	結婚している	- (0.0)	3 (4.9)	12 (30.0)	12 (40.0)	7 (43.8)	34 (22.8)	0.000
	結婚しており、その他にも特定のパートナーがいる	- (0.0)	1 (1.6)	7 (17.5)	4 (13.3)	3 (18.8)	15 (10.1)	
	結婚していない	- (0.0)	3 (4.9)	5 (12.5)	2 (6.7)	2 (12.5)	12 (8.1)	
	結婚していないが、特定のパートナーがいる	- (0.0)	39 (63.9)	7 (17.5)	6 (20.0)	1 (6.3)	53 (35.6)	
	特定のパートナーはいない	2 (100.0)	15 (24.6)	9 (22.5)	6 (20.0)	3 (18.8)	35 (23.5)	
無回答/無効回答		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	

表19. クリニック調査(非CSW) 知識

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆性感染症にかかっているとHIVに感染しやすい								
		n=2	n=41	n=25	n=25	n=13	n=106	
①男性	そう思う(正)	1 (50.0)	27 (65.9)	18 (72.0)	18 (72.0)	9 (69.2)	73 (68.9)	0.808
	そう思わない	- (0.0)	6 (14.6)	3 (12.0)	5 (20.0)	1 (7.7)	15 (14.2)	
	わからない	1 (50.0)	8 (19.5)	4 (16.0)	2 (8.0)	3 (23.1)	18 (17.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=0	n=20	n=15	n=5	n=3	n=43	
②女性	そう思う(正)	- (0.0)	16 (80.0)	12 (80.0)	4 (80.0)	1 (33.3)	33 (76.7)	0.053
	そう思わない	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (20.0)	- (0.0)	1 (2.3)	
	わからない	- (0.0)	4 (20.0)	3 (20.0)	- (0.0)	2 (66.7)	9 (20.9)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=2	n=61	n=40	n=30	n=16	n=149	
①+② 全体	そう思う(正)	1 (50.0)	43 (70.5)	30 (75.0)	22 (73.3)	10 (62.5)	106 (71.1)	0.372
	そう思わない	- (0.0)	6 (9.8)	3 (7.5)	6 (20.0)	1 (6.3)	16 (10.7)	
	わからない	1 (50.0)	12 (19.7)	7 (17.5)	2 (6.7)	5 (31.3)	27 (18.1)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
◆性感染症に感染しても症状が出ないことがある								
		n=2	n=41	n=25	n=25	n=13	n=106	
①男性	そう思う(正)	1 (50.0)	30 (73.2)	21 (84.0)	20 (80.0)	10 (76.9)	82 (77.4)	0.385
	そう思わない	- (0.0)	7 (17.1)	- (0.0)	3 (12.0)	2 (15.4)	12 (11.3)	
	わからない	1 (50.0)	4 (9.8)	4 (16.0)	2 (8.0)	1 (7.7)	12 (11.3)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=0	n=20	n=15	n=5	n=3	n=43	
②女性	そう思う(正)	- (0.0)	16 (80.0)	12 (80.0)	5 (100.0)	3 (100.0)	36 (83.7)	0.921
	そう思わない	- (0.0)	3 (15.0)	2 (13.3)	- (0.0)	- (0.0)	5 (11.6)	
	わからない	- (0.0)	1 (5.0)	1 (6.7)	- (0.0)	- (0.0)	2 (4.7)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=2	n=61	n=40	n=30	n=16	n=149	
①+② 全体	そう思う(正)	1 (50.0)	46 (75.4)	33 (82.5)	25 (83.3)	13 (81.3)	118 (79.2)	0.439
	そう思わない	- (0.0)	10 (16.4)	2 (5.0)	3 (10.0)	2 (12.5)	17 (11.4)	
	わからない	1 (50.0)	5 (8.2)	5 (12.5)	2 (6.7)	1 (6.3)	14 (9.4)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
◆HIV(エイズ)検査には、その日のうちに結果が分かるものがある								
		n=2	n=41	n=25	n=25	n=13	n=106	
①男性	そう思う(正)	1 (50.0)	24 (58.5)	11 (44.0)	18 (72.0)	4 (30.8)	58 (54.7)	0.173
	そう思わない	- (0.0)	8 (19.5)	9 (36.0)	3 (12.0)	3 (23.1)	23 (21.7)	
	わからない	1 (50.0)	9 (22.0)	5 (20.0)	4 (16.0)	6 (46.2)	25 (23.6)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=0	n=20	n=15	n=5	n=3	n=43	
②女性	そう思う(正)	- (0.0)	10 (50.0)	10 (66.7)	1 (20.0)	1 (33.3)	22 (51.2)	0.403
	そう思わない	- (0.0)	5 (25.0)	2 (13.3)	2 (40.0)	- (0.0)	9 (20.9)	
	わからない	- (0.0)	5 (25.0)	3 (20.0)	2 (40.0)	2 (66.7)	12 (27.9)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
		n=2	n=61	n=40	n=30	n=16	n=149	
①+② 全体	そう思う(正)	1 (50.0)	34 (55.7)	21 (52.5)	19 (63.3)	5 (31.3)	80 (53.7)	0.350
	そう思わない	- (0.0)	13 (21.3)	11 (27.5)	5 (16.7)	3 (18.8)	32 (21.5)	
	わからない	1 (50.0)	14 (23.0)	8 (20.0)	6 (20.0)	8 (50.0)	37 (24.8)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	

表19. クリニック調査(非CSW) 知識

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆HIV(エイズ)は、感染すると死にいたる														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	そう思う	-	(0.0)	24	(58.5)	9	(36.0)	9	(36.0)	4	(30.8)	46	(43.4)	0.274
	そう思わない(正)	1	(50.0)	13	(31.7)	12	(48.0)	12	(48.0)	5	(38.5)	43	(40.6)	
	わからない	1	(50.0)	4	(9.8)	4	(16.0)	4	(16.0)	4	(30.8)	17	(16.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
②女性	そう思う	-	(0.0)	9	(45.0)	9	(60.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	19	(44.2)	0.219
	そう思わない(正)	-	(0.0)	8	(40.0)	3	(20.0)	3	(60.0)	3	(100.0)	17	(39.5)	
	わからない	-	(0.0)	3	(15.0)	3	(20.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	7	(16.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149		
①+② 全体	そう思う	-	(0.0)	33	(54.1)	18	(45.0)	10	(33.3)	4	(25.0)	65	(43.6)	0.324
	そう思わない(正)	1	(50.0)	21	(34.4)	15	(37.5)	15	(50.0)	8	(50.0)	60	(40.3)	
	わからない	1	(50.0)	7	(11.5)	7	(17.5)	5	(16.7)	4	(25.0)	24	(16.1)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
◆HIV(エイズ)の検査では、内診(婦人科や産婦人科での膣の診察)やペニスの診察がある														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	そう思う	-	(0.0)	13	(31.7)	5	(20.0)	3	(12.0)	3	(23.1)	24	(22.6)	0.117
	そう思わない(正)	1	(50.0)	14	(34.1)	12	(48.0)	19	(76.0)	5	(38.5)	51	(48.1)	
	わからない	1	(50.0)	14	(34.1)	8	(32.0)	3	(12.0)	5	(38.5)	31	(29.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
②女性	そう思う	-	(0.0)	9	(45.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	10	(23.3)	0.007
	そう思わない(正)	-	(0.0)	7	(35.0)	13	(86.7)	4	(80.0)	1	(33.3)	25	(58.1)	
	わからない	-	(0.0)	4	(20.0)	2	(13.3)	-	(0.0)	2	(66.7)	8	(18.6)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149		
①+② 全体	そう思う	-	(0.0)	22	(36.1)	5	(12.5)	4	(13.3)	3	(18.8)	34	(22.8)	0.004
	そう思わない(正)	1	(50.0)	21	(34.4)	25	(62.5)	23	(76.7)	6	(37.5)	76	(51.0)	
	わからない	1	(50.0)	18	(29.5)	10	(25.0)	3	(10.0)	7	(43.8)	39	(26.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
◆性感染症(性病)には、感染すると不妊症になりやすくなるものがある														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	そう思う(正)	2	(100.0)	27	(65.9)	18	(72.0)	19	(76.0)	7	(53.8)	73	(68.9)	0.680
	そう思わない	-	(0.0)	3	(7.3)	2	(8.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	6	(5.7)	
	わからない	-	(0.0)	11	(26.8)	5	(20.0)	5	(20.0)	6	(46.2)	27	(25.5)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
②女性	そう思う(正)	-	(0.0)	18	(90.0)	13	(86.7)	5	(100.0)	2	(66.7)	38	(88.4)	0.546
	そう思わない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	わからない	-	(0.0)	2	(10.0)	2	(13.3)	-	(0.0)	1	(33.3)	5	(11.6)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149		
①+② 全体	そう思う(正)	2	(100.0)	45	(73.8)	31	(77.5)	24	(80.0)	9	(56.3)	111	(74.5)	0.560
	そう思わない	-	(0.0)	3	(4.9)	2	(5.0)	1	(3.3)	-	(0.0)	6	(4.0)	
	わからない	-	(0.0)	13	(21.3)	7	(17.5)	5	(16.7)	7	(43.8)	32	(21.5)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

表20. クリニック調査(非CSW) HIV/STI検査の受検歴、既往歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでにHIV(エイズ)検査を受けたことがありますか														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	ある	1	(50.0)	18	(43.9)	15	(60.0)	20	(80.0)	3	(23.1)	57	(53.8)	0.008
	ない	1	(50.0)	23	(56.1)	10	(40.0)	5	(20.0)	10	(76.9)	49	(46.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
②女性	ある	-	(0.0)	12	(60.0)	15	(100.0)	5	(100.0)	3	(100.0)	35	(81.4)	0.010
	ない	-	(0.0)	8	(40.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(18.6)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149		
①+② 全体	ある	1	(50.0)	30	(49.2)	30	(75.0)	25	(83.3)	6	(37.5)	92	(61.7)	0.002
	ない	1	(50.0)	31	(50.8)	10	(25.0)	5	(16.7)	10	(62.5)	57	(38.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
◆過去1年間にHIV(エイズ)検査を受けたことがありますか														
		n=1 <sup>※1</sup>		n=18		n=15		n=20		n=3		n=57		
①男性	ある	1	(100.0)	14	(77.8)	11	(73.3)	6	(30.0)	2	(66.7)	34	(59.6)	0.048
	ない	-	(0.0)	4	(22.2)	3	(20.0)	14	(70.0)	1	(33.3)	22	(38.6)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	
		n=0		n=12		n=15		n=5		n=3		n=35		
②女性	ある	-	(0.0)	11	(91.7)	11	(73.3)	5	(100.0)	3	(100.0)	30	(85.7)	0.313
	ない	-	(0.0)	1	(8.3)	4	(26.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(14.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=1		n=30		n=30		n=25		n=6		n=92		
①+② 全体	ある	1	(100.0)	25	(83.3)	22	(73.3)	11	(44.0)	5	(83.3)	64	(69.6)	0.075
	ない	-	(0.0)	5	(16.7)	7	(23.3)	14	(56.0)	1	(16.7)	27	(29.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	
※1 これまでにHIV(エイズ)検査を受けたことがあるものを分母とする。														
◆これまでにHIV感染症(エイズ)に感染したことがありますか														
		n=1 <sup>※1</sup>		n=18		n=15		n=20		n=3		n=57		
①男性	ある	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	1	(1.8)	0.757
	ない	1	(100.0)	18	(100.0)	15	(100.0)	19	(95.0)	3	(100.0)	56	(98.2)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=0		n=12		n=15		n=5		n=3		n=35		
②女性	ある	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	ない	-	(0.0)	12	(100.0)	15	(100.0)	5	(100.0)	3	(100.0)	35	(100.0)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		n=1		n=30		n=30		n=25		n=6		n=92		
①+② 全体	ある	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	1	(1.1)	0.608
	ない	1	(100.0)	30	(100.0)	30	(100.0)	24	(96.0)	6	(100.0)	91	(98.9)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
※1 これまでにHIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。														

表20. クリニック調査(非CSW) HIV/STI検査の受検歴、既往歴

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでにHIV(エイズ)を除く性感染症(性病)検査を受けたことがありますか														
①男性	ある	1	(50.0)	22	(53.7)	19	(76.0)	22	(88.0)	9	(69.2)	73	(68.9)	0.047
	ない	1	(50.0)	19	(46.3)	6	(24.0)	3	(12.0)	4	(30.8)	33	(31.1)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性	ある	-	(0.0)	17	(85.0)	13	(86.7)	5	(100.0)	3	(100.0)	38	(88.4)	0.734
	ない	-	(0.0)	3	(15.0)	1	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(9.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.3)	
①+② 全体	ある	1	(50.0)	39	(63.9)	32	(80.0)	27	(90.0)	12	(75.0)	111	(74.5)	0.148
	ない	1	(50.0)	22	(36.1)	7	(17.5)	3	(10.0)	4	(25.0)	37	(24.8)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	
◆過去1年間にHIV(エイズ)を除く性感染症(性病)検査を受けたことがありますか														
①男性	ある	1	(100.0)	19	(86.4)	16	(84.2)	13	(59.1)	7	(77.8)	56	(76.7)	0.275
	ない	-	(0.0)	3	(13.6)	2	(10.5)	9	(40.9)	2	(22.2)	16	(21.9)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(5.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.4)	
②女性	ある	-	(0.0)	16	(94.1)	13	(100.0)	5	(100.0)	3	(100.0)	37	(97.4)	0.737
	ない	-	(0.0)	1	(5.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.6)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
①+② 全体	ある	1	(100.0)	35	(89.7)	29	(90.6)	18	(66.7)	10	(83.3)	93	(83.8)	0.149
	ない	-	(0.0)	4	(10.3)	2	(6.3)	9	(33.3)	2	(16.7)	17	(15.3)	
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.9)	
※2 これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがあるものを分母とする。														
◆これまでに性感染症(性病)かかったことがありますか(複数回答)														
①男性	梅毒	-	(0.0)	6	(27.3)	5	(26.3)	6	(27.3)	4	(44.4)	21	(28.8)	0.811
	B型肝炎	-	(0.0)	1	(4.5)	2	(10.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(4.1)	
	淋菌感染症	-	(0.0)	5	(22.7)	2	(10.5)	4	(18.2)	4	(44.4)	15	(20.5)	
	クラミジア	1	(100.0)	11	(50.0)	9	(47.4)	7	(31.8)	6	(66.7)	34	(46.6)	
	いずれか感染したことがある	1	(100.0)	17	(77.3)	14	(73.7)	14	(63.6)	8	(88.9)	54	(74.0)	
②女性	梅毒	-	(0.0)	1	(5.9)	2	(15.4)	1	(20.0)	-	(0.0)	4	(10.5)	0.672
	B型肝炎	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	1	(2.6)	
	淋菌感染症	-	(0.0)	5	(29.4)	4	(30.8)	-	(0.0)	3	(100.0)	12	(31.6)	
	クラミジア	-	(0.0)	10	(58.8)	9	(69.2)	3	(60.0)	2	(66.7)	24	(63.2)	
	いずれか感染したことがある	-	(0.0)	12	(70.6)	10	(76.9)	3	(60.0)	3	(100.0)	28	(73.7)	
①+② 全体	梅毒	-	(0.0)	7	(17.9)	7	(21.9)	7	(25.9)	4	(33.3)	25	(22.5)	0.782
	B型肝炎	-	(0.0)	1	(2.6)	2	(6.3)	-	(0.0)	1	(8.3)	4	(3.6)	
	淋菌感染症	-	(0.0)	10	(25.6)	6	(18.8)	4	(14.8)	7	(58.3)	27	(24.3)	
	クラミジア	1	(100.0)	21	(53.8)	18	(56.3)	10	(37.0)	8	(66.7)	58	(52.3)	
	いずれか感染したことがある	1	(100.0)	29	(74.4)	24	(75.0)	17	(63.0)	11	(91.7)	82	(73.9)	
※2 これまでにHIV以外の性感染症の検査を受けたことがあるものを分母とする。														

表21. クリニック調査(非CSW) 病気・検査について考えや対応

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆今後、かかると思う病気(複数回答)														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	がん	1	(50.0)	20	(48.8)	14	(56.0)	20	(80.0)	6	(46.2)	61	(57.5)	0.080
	糖尿病	1	(50.0)	7	(17.1)	7	(28.0)	6	(24.0)	2	(15.4)	23	(21.7)	0.301
	脳卒中・心臓病	1	(50.0)	4	(9.8)	3	(12.0)	3	(12.0)	5	(38.5)	16	(15.1)	0.035
	インフルエンザ	2	(100.0)	23	(56.1)	14	(56.0)	14	(56.0)	3	(23.1)	56	(52.8)	0.117
	肺炎	-	(0.0)	8	(19.5)	1	(4.0)	3	(12.0)	2	(15.4)	14	(13.2)	0.205
	HIV感染症(エイズ)	1	(50.0)	6	(14.6)	4	(16.0)	2	(8.0)	1	(7.7)	14	(13.2)	0.222
	HIV感染症(エイズ)以外の性感染症(性病)	1	(50.0)	13	(31.7)	5	(20.0)	4	(16.0)	4	(30.8)	27	(25.5)	0.223
	上記以外の病気	-	(0.0)	2	(4.9)	2	(8.0)	5	(20.0)	2	(15.4)	11	(10.4)	0.156
	(病気に)かからないと思う	-	(0.0)	4	(9.8)	7	(28.0)	-	(0.0)	1	(7.7)	12	(11.3)	0.023
			n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43	
②女性	がん	-	(0.0)	8	(40.0)	10	(66.7)	4	(80.0)	2	(66.7)	24	(55.8)	0.254
	糖尿病	-	(0.0)	4	(20.0)	1	(6.7)	1	(20.0)	-	(0.0)	6	(14.0)	0.591
	脳卒中・心臓病	-	(0.0)	4	(20.0)	2	(13.3)	1	(20.0)	1	(33.3)	8	(18.6)	0.864
	インフルエンザ	-	(0.0)	14	(70.0)	8	(53.3)	3	(60.0)	2	(66.7)	27	(62.8)	0.788
	肺炎	-	(0.0)	3	(15.0)	1	(6.7)	2	(40.0)	-	(0.0)	6	(14.0)	0.262
	HIV感染症(エイズ)	-	(0.0)	2	(10.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	3	(7.0)	0.401
	HIV感染症(エイズ)以外の性感染症(性病)	-	(0.0)	8	(40.0)	1	(6.7)	2	(40.0)	1	(33.3)	12	(27.9)	0.156
	上記以外の病気	-	(0.0)	3	(15.0)	2	(13.3)	3	(60.0)	-	(0.0)	8	(18.6)	0.079
	(病気に)かからないと思う	-	(0.0)	4	(20.0)	2	(13.3)	1	(20.0)	1	(33.3)	8	(18.6)	0.864
			n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149	
①+② 全体	がん	1	(50.0)	28	(45.9)	24	(60.0)	24	(80.0)	8	(50.0)	85	(57.0)	0.019
	糖尿病	1	(50.0)	11	(18.0)	8	(20.0)	7	(23.3)	2	(12.5)	29	(19.5)	0.247
	脳卒中・心臓病	1	(50.0)	8	(13.1)	5	(12.5)	4	(13.3)	6	(37.5)	24	(16.1)	0.030
	インフルエンザ	2	(100.0)	37	(60.7)	22	(55.0)	17	(56.7)	5	(31.3)	83	(55.7)	0.097
	肺炎	-	(0.0)	11	(18.0)	2	(5.0)	5	(16.7)	2	(12.5)	20	(13.4)	0.130
	HIV感染症(エイズ)	1	(50.0)	8	(13.1)	4	(10.0)	3	(10.0)	1	(6.3)	17	(11.4)	0.154
	HIV感染症(エイズ)以外の性感染症(性病)	1	(50.0)	21	(34.4)	6	(15.0)	6	(20.0)	5	(31.3)	39	(26.2)	0.066
	上記以外の病気	-	(0.0)	5	(8.2)	4	(10.0)	8	(26.7)	2	(12.5)	19	(12.8)	0.054
	(病気に)かからないと思う	-	(0.0)	8	(13.1)	9	(22.5)	1	(3.3)	2	(12.5)	20	(13.4)	0.078
	◆HIV(エイズ)または性感染症(性病)検査を受けようと思うとき(複数回答)													
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	体の不調を感じたとき	2	(100.0)	24	(58.5)	8	(32.0)	10	(40.0)	10	(76.9)	54	(50.9)	0.025
	パートナーがHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	1	(50.0)	21	(51.2)	10	(40.0)	9	(36.0)	5	(38.5)	46	(43.4)	0.761
	知人や友人など周囲の人がHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	10	(24.4)	2	(8.0)	2	(8.0)	2	(15.4)	16	(15.1)	0.279
	HIV(エイズ)または性感染症(性病)についてのニュースや記事を読んだとき	-	(0.0)	14	(34.1)	4	(16.0)	5	(20.0)	1	(7.7)	24	(22.6)	0.194
	金銭的な補助が出ると知ったとき	1	(50.0)	3	(7.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(3.8)	0.004
	定期的	-	(0.0)	6	(14.6)	7	(28.0)	4	(16.0)	4	(30.8)	21	(19.8)	0.485
	人生の節目(結婚など)	-	(0.0)	7	(17.1)	7	(28.0)	1	(4.0)	2	(15.4)	17	(16.0)	0.217
	職場から勧められたとき	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	感染した人の話を聞いたとき	1	(50.0)	7	(17.1)	4	(16.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	13	(12.3)	0.123
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.0)	4	(16.0)	-	(0.0)	5	(4.7)	0.042
		n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
②女性	体の不調を感じたとき	-	(0.0)	7	(35.0)	5	(33.3)	4	(80.0)	1	(33.3)	17	(39.5)	0.274
	パートナーがHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	5	(25.0)	5	(33.3)	2	(40.0)	-	(0.0)	12	(27.9)	0.609
	知人や友人など周囲の人がHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	3	(15.0)	3	(20.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	7	(16.3)	0.847
	HIV(エイズ)または性感染症(性病)についてのニュースや記事を読んだとき	-	(0.0)	4	(20.0)	3	(20.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	8	(18.6)	0.864
	金銭的な補助が出ると知ったとき	-	(0.0)	1	(5.0)	1	(6.7)	1	(20.0)	-	(0.0)	3	(7.0)	0.647
	定期的	-	(0.0)	11	(55.0)	6	(40.0)	5	(100.0)	2	(66.7)	24	(55.8)	0.131
	人生の節目(結婚など)	-	(0.0)	7	(35.0)	4	(26.7)	2	(40.0)	-	(0.0)	13	(30.2)	0.608
	職場から勧められたとき	-	(0.0)	2	(10.0)	1	(6.7)	-	(0.0)	1	(33.3)	4	(9.3)	0.440
	感染した人の話を聞いたとき	-	(0.0)	4	(20.0)	1	(6.7)	3	(60.0)	-	(0.0)	8	(18.6)	0.051
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(26.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(9.3)	0.041
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149		
①+② 全体	体の不調を感じたとき	2	(100.0)	31	(50.8)	13	(32.5)	14	(46.7)	11	(68.8)	71	(47.7)	0.061
	パートナーがHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	1	(50.0)	26	(42.6)	15	(37.5)	11	(36.7)	5	(31.3)	58	(38.9)	0.917
	知人や友人など周囲の人がHIV(エイズ)または性感染症(性病)になったとき	-	(0.0)	13	(21.3)	5	(12.5)	3	(10.0)	2	(12.5)	23	(15.4)	0.553
	HIV(エイズ)または性感染症(性病)についてのニュースや記事を読んだとき	-	(0.0)	18	(29.5)	7	(17.5)	6	(20.0)	1	(6.3)	32	(21.5)	0.240
	金銭的な補助が出ると知ったとき	1	(50.0)	4	(6.6)	1	(2.5)	1	(3.3)	-	(0.0)	7	(4.7)	0.027
	定期的	-	(0.0)	17	(27.9)	13	(32.5)	9	(30.0)	6	(37.5)	45	(30.2)	0.822
	人生の節目(結婚など)	-	(0.0)	14	(23.0)	11	(27.5)	3	(10.0)	2	(12.5)	30	(20.1)	0.325
	職場から勧められたとき	-	(0.0)	2	(3.3)	1	(2.5)	-	(0.0)	1	(6.3)	4	(2.7)	0.782
	感染した人の話を聞いたとき	1	(50.0)	11	(18.0)	5	(12.5)	4	(13.3)	-	(0.0)	21	(14.1)	0.228
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(12.5)	4	(13.3)	-	(0.0)	9	(6.0)	0.029

表21. クリニック調査(非CSW) 病気・検査について考えや対応

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆今後、HIV(エイズ)または性感染症(性病)について体に心配な事がある時の対応(複数回答)														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	病気についてインターネットで調べる	1	(50.0)	27	(65.9)	14	(56.0)	20	(80.0)	9	(69.2)	71	(67.0)	0.464
	パートナーに相談する	-	(0.0)	8	(19.5)	3	(12.0)	1	(4.0)	1	(7.7)	13	(12.3)	0.390
	友人・知人に相談する	-	(0.0)	5	(12.2)	2	(8.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	8	(7.5)	0.566
	受診する病院を探す	-	(0.0)	24	(58.5)	8	(32.0)	5	(20.0)	6	(46.2)	43	(40.6)	0.016
	病院を受診する	2	(100.0)	32	(78.0)	20	(80.0)	19	(76.0)	11	(84.6)	84	(79.2)	0.916
	様子をみる(何もしない)	-	(0.0)	1	(2.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.9)	0.809
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	1	(0.9)	0.514
		n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
②女性	病気についてインターネットで調べる	-	(0.0)	17	(85.0)	9	(60.0)	4	(80.0)	2	(66.7)	32	(74.4)	0.393
	パートナーに相談する	-	(0.0)	8	(40.0)	1	(6.7)	2	(40.0)	-	(0.0)	11	(25.6)	0.087
	友人・知人に相談する	-	(0.0)	3	(15.0)	1	(6.7)	1	(20.0)	-	(0.0)	5	(11.6)	0.725
	受診する病院を探す	-	(0.0)	10	(50.0)	7	(46.7)	3	(60.0)	1	(33.3)	21	(48.8)	0.902
	病院を受診する	-	(0.0)	16	(80.0)	15	(100.0)	5	(100.0)	2	(66.7)	38	(88.4)	0.147
	様子をみる(何もしない)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149		
①+② 全体	病気についてインターネットで調べる	1	(50.0)	44	(72.1)	23	(57.5)	24	(80.0)	11	(68.8)	103	(69.1)	0.309
	パートナーに相談する	-	(0.0)	16	(26.2)	4	(10.0)	3	(10.0)	1	(6.3)	24	(16.1)	0.088
	友人・知人に相談する	-	(0.0)	8	(13.1)	3	(7.5)	2	(6.7)	-	(0.0)	13	(8.7)	0.488
	受診する病院を探す	-	(0.0)	34	(55.7)	15	(37.5)	8	(26.7)	7	(43.8)	64	(43.0)	0.054
	病院を受診する	2	(100.0)	48	(78.7)	35	(87.5)	24	(80.0)	13	(81.3)	122	(81.9)	0.775
	様子をみる(何もしない)	-	(0.0)	1	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	0.835
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.3)	-	(0.0)	1	(0.7)	0.407
◆HIV(エイズ)または性感染症(性病)検査を受けるのを妨げる理由(複数回答)														
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106		
①男性	健康に自信があり、必要性を感じない	-	(0.0)	3	(7.3)	-	(0.0)	2	(8.0)	-	(0.0)	5	(4.7)	0.488
	時間がない	2	(100.0)	16	(39.0)	2	(8.0)	7	(28.0)	3	(23.1)	30	(28.3)	0.029
	経済的な負担がある	1	(50.0)	9	(22.0)	4	(16.0)	2	(8.0)	-	(0.0)	16	(15.1)	0.274
	診断されるのが怖い	-	(0.0)	20	(48.8)	12	(48.0)	10	(40.0)	6	(46.2)	48	(45.3)	0.596
	検査にともなう苦痛が不安	-	(0.0)	8	(19.5)	-	(0.0)	1	(4.0)	1	(7.7)	10	(9.4)	0.130
	受検するのを忘れてしまう	-	(0.0)	4	(9.8)	3	(12.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	8	(7.5)	0.606
	受検する場所が不便	1	(50.0)	6	(14.6)	4	(16.0)	4	(16.0)	1	(7.7)	16	(15.1)	0.597
	検査そのものを知らない	-	(0.0)	1	(2.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.9)	0.685
	検査の結果が信用できない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.388
	その他	-	(0.0)	2	(4.9)	4	(16.0)	2	(8.0)	2	(15.4)	10	(9.4)	0.499
		n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
②女性	健康に自信があり、必要性を感じない	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.3)	0.916
	時間がない	-	(0.0)	6	(30.0)	1	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(16.3)	0.454
	経済的な負担がある	-	(0.0)	4	(20.0)	3	(20.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	9	(20.9)	0.300
	診断されるのが怖い	-	(0.0)	5	(25.0)	4	(26.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(20.9)	0.722
	検査にともなう苦痛が不安	-	(0.0)	2	(10.0)	1	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(7.0)	0.941
	受検するのを忘れてしまう	-	(0.0)	2	(10.0)	2	(13.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(9.3)	0.903
	受検する場所が不便	-	(0.0)	1	(5.0)	2	(13.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(7.0)	0.825
検査そのものを知らない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.800	
検査の結果が信用できない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.800	
その他	-	(0.0)	2	(10.0)	3	(20.0)	4	(80.0)	-	(0.0)	9	(20.9)	0.021	
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149		
①+② 全体	健康に自信があり、必要性を感じない	-	(0.0)	4	(6.6)	-	(0.0)	2	(6.7)	-	(0.0)	6	(4.0)	0.616
	時間がない	2	(100.0)	22	(36.1)	3	(7.5)	7	(23.3)	3	(18.8)	37	(24.8)	0.018
	経済的な負担がある	1	(50.0)	13	(21.3)	7	(17.5)	2	(6.7)	2	(12.5)	25	(16.8)	0.594
	診断されるのが怖い	-	(0.0)	25	(41.0)	16	(40.0)	10	(33.3)	6	(37.5)	57	(38.3)	0.818
	検査にともなう苦痛が不安	-	(0.0)	10	(16.4)	1	(2.5)	1	(3.3)	1	(6.3)	13	(8.7)	0.285
	受検するのを忘れてしまう	-	(0.0)	6	(9.8)	5	(12.5)	1	(3.3)	-	(0.0)	12	(8.1)	0.661
	受検する場所が不便	1	(50.0)	7	(11.5)	6	(15.0)	4	(13.3)	1	(6.3)	19	(12.8)	0.692
検査そのものを知らない	-	(0.0)	1	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	0.877	
検査の結果が信用できない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	0.660	
その他	-	(0.0)	4	(6.6)	7	(17.5)	6	(20.0)	2	(12.5)	19	(12.8)	0.440	

表21. クリニック調査(非CSW) 病気・検査について考えや対応

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)についての考え(複数回答)															
		n=2		n=41		n=25		n=25		n=13		n=106			
①男性	早期発見が大切である	2	(100.0)	37	(90.2)	23	(92.0)	22	(88.0)	12	(92.3)	96	(90.6)	0.972	
	怖い病気である	2	(100.0)	35	(85.4)	15	(60.0)	19	(76.0)	12	(92.3)	83	(78.3)	0.082	
	検査は、感染の早期発見と治療につながる	1	(50.0)	21	(51.2)	14	(56.0)	21	(84.0)	8	(61.5)	65	(61.3)	0.108	
	早期に発見できれば、治療が可能である	1	(50.0)	18	(43.9)	9	(36.0)	15	(60.0)	6	(46.2)	49	(46.2)	0.548	
	自分もHIV(エイズ)を含む性感染症(性病)にかかる可能性がある	1	(50.0)	23	(56.1)	14	(56.0)	18	(72.0)	10	(76.9)	66	(62.3)	0.492	
	HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)の危険性について常に意識しておく必要がある	-	(0.0)	20	(48.8)	12	(48.0)	18	(72.0)	8	(61.5)	58	(54.7)	0.152	
	①男性 周囲で話題になることが多い病気である	-	(0.0)	5	(12.2)	3	(12.0)	4	(16.0)	1	(7.7)	13	(12.3)	0.930	
	遺伝する病気である	-	(0.0)	4	(9.8)	2	(8.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	7	(6.6)	0.722	
	自分は感染するリスクが高い	-	(0.0)	5	(12.2)	4	(16.0)	2	(8.0)	3	(23.1)	14	(13.2)	0.698	
	自分は感染予防について、きちんとした知識をもっている	-	(0.0)	3	(7.3)	1	(4.0)	1	(4.0)	-	(0.0)	5	(4.7)	0.841	
	めったにかかることのない病気である	-	(0.0)	8	(19.5)	1	(4.0)	2	(8.0)	1	(7.7)	12	(11.3)	0.311	
	自分にはあまり関係ない病気である	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	病気について、よく分からない	-	(0.0)	1	(2.4)	1	(4.0)	-	(0.0)	1	(7.7)	3	(2.8)	0.726	
			n=0		n=20		n=15		n=5		n=3		n=43		
	②女性	早期発見が大切である	-	(0.0)	17	(85.0)	12	(80.0)	5	(100.0)	2	(66.7)	36	(83.7)	0.617
怖い病気である		-	(0.0)	18	(90.0)	10	(66.7)	4	(80.0)	1	(33.3)	33	(76.7)	0.111	
検査は、感染の早期発見と治療につながる		-	(0.0)	15	(75.0)	11	(73.3)	4	(80.0)	1	(33.3)	31	(72.1)	0.477	
早期に発見できれば、治療が可能である		-	(0.0)	9	(45.0)	8	(53.3)	4	(80.0)	1	(33.3)	22	(51.2)	0.498	
自分もHIV(エイズ)を含む性感染症(性病)にかかる可能性がある		-	(0.0)	14	(70.0)	10	(66.7)	4	(80.0)	1	(33.3)	29	(67.4)	0.570	
HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)の危険性について常に意識しておく必要がある		-	(0.0)	11	(55.0)	9	(60.0)	4	(80.0)	1	(33.3)	25	(58.1)	0.606	
②女性 周囲で話題になることが多い病気である		-	(0.0)	2	(10.0)	2	(13.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(9.3)	0.772	
遺伝する病気である		-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.3)	0.758	
自分は感染するリスクが高い		-	(0.0)	7	(35.0)	3	(20.0)	2	(40.0)	1	(33.3)	13	(30.2)	0.753	
自分は感染予防について、きちんとした知識をもっている		-	(0.0)	4	(20.0)	2	(13.3)	1	(20.0)	-	(0.0)	7	(16.3)	0.818	
めったにかかることのない病気である		-	(0.0)	2	(10.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(4.7)	0.491	
自分にはあまり関係ない病気である		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
病気について、よく分からない		-	(0.0)	-	(0.0)	1	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.3)	0.591	
		n=2		n=61		n=40		n=30		n=16		n=149			
①+②全体		早期発見が大切である	2	(100.0)	54	(88.5)	35	(87.5)	27	(90.0)	14	(87.5)	132	(88.6)	0.984
	怖い病気である	2	(100.0)	53	(86.9)	25	(62.5)	23	(76.7)	13	(81.3)	116	(77.9)	0.060	
	検査は、感染の早期発見と治療につながる	1	(50.0)	36	(59.0)	25	(62.5)	25	(83.3)	9	(56.3)	96	(64.4)	0.187	
	早期に発見できれば、治療が可能である	1	(50.0)	27	(44.3)	17	(42.5)	19	(63.3)	7	(43.8)	71	(47.7)	0.439	
	自分もHIV(エイズ)を含む性感染症(性病)にかかる可能性がある	1	(50.0)	37	(60.7)	24	(60.0)	22	(73.3)	11	(68.8)	95	(63.8)	0.731	
	HIV(エイズ)を含む性感染症(性病)の危険性について常に意識しておく必要がある	-	(0.0)	31	(50.8)	21	(52.5)	22	(73.3)	9	(56.3)	83	(55.7)	0.133	
	①+②全体 周囲で話題になることが多い病気である	-	(0.0)	7	(11.5)	5	(12.5)	4	(13.3)	1	(6.3)	17	(11.4)	0.934	
	遺伝する病気である	-	(0.0)	5	(8.2)	2	(5.0)	1	(3.3)	-	(0.0)	8	(5.4)	0.692	
	自分は感染するリスクが高い	-	(0.0)	12	(19.7)	7	(17.5)	4	(13.3)	4	(25.0)	27	(18.1)	0.822	
	自分は感染予防について、きちんとした知識をもっている	-	(0.0)	7	(11.5)	3	(7.5)	2	(6.7)	-	(0.0)	12	(8.1)	0.621	
	めったにかかることのない病気である	-	(0.0)	10	(16.4)	1	(2.5)	2	(6.7)	1	(6.3)	14	(9.4)	0.171	
	自分にはあまり関係ない病気である	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	病気について、よく分からない	-	(0.0)	1	(1.6)	2	(5.0)	-	(0.0)	1	(6.3)	4	(2.7)	0.603	



表22. クリニック調査(非CSW) 性経験

		10代	20代	30代	40代	50歳以上	全体	p値
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
◆過去6か月間にセックスした相手の人数								
		n=2	n=41	n=25	n=25	n=13	n=106	
これまでの人生でセックスの経験はない		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (7.7)	1 (0.9)	0.640
(過去6か月間では)0人		- (0.0)	2 (4.9)	1 (4.0)	1 (4.0)	- (0.0)	4 (3.8)	
①男性	1人	- (0.0)	5 (12.2)	5 (20.0)	4 (16.0)	1 (7.7)	15 (14.2)	
	2人~3人	2 (100.0)	20 (48.8)	6 (24.0)	10 (40.0)	7 (53.8)	45 (42.5)	
	4人~9人	- (0.0)	9 (22.0)	6 (24.0)	6 (24.0)	2 (15.4)	23 (21.7)	
	10人以上	- (0.0)	5 (12.2)	7 (28.0)	4 (16.0)	2 (15.4)	18 (17.0)	
	答えたくない	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
-----								
		n=0	n=20	n=15	n=5	n=3	n=43	
これまでの人生でセックスの経験はない		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	0.014
(過去6か月間では)0人		- (0.0)	- (0.0)	1 (6.7)	- (0.0)	- (0.0)	1 (2.3)	
②女性	1人	- (0.0)	3 (15.0)	3 (20.0)	2 (40.0)	- (0.0)	8 (18.6)	
	2人~3人	- (0.0)	3 (15.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	3 (7.0)	
	4人~9人	- (0.0)	4 (20.0)	1 (6.7)	2 (40.0)	- (0.0)	7 (16.3)	
	10人以上	- (0.0)	9 (45.0)	10 (66.7)	1 (20.0)	1 (33.3)	21 (48.8)	
	答えたくない	- (0.0)	1 (5.0)	- (0.0)	- (0.0)	2 (66.7)	3 (7.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
-----								
		n=2	n=61	n=40	n=30	n=16	n=149	
これまでの人生でセックスの経験はない		- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (6.3)	1 (0.7)	0.039
(過去6か月間では)0人		- (0.0)	2 (3.3)	2 (5.0)	1 (3.3)	- (0.0)	5 (3.4)	
①+② 全体	1人	- (0.0)	8 (13.1)	8 (20.0)	6 (20.0)	1 (6.3)	23 (15.4)	
	2人~3人	2 (100.0)	23 (37.7)	6 (15.0)	10 (33.3)	7 (43.8)	48 (32.2)	
	4人~9人	- (0.0)	13 (21.3)	7 (17.5)	8 (26.7)	2 (12.5)	30 (20.1)	
	10人以上	- (0.0)	14 (23.0)	17 (42.5)	5 (16.7)	3 (18.8)	39 (26.2)	
	答えたくない	- (0.0)	1 (1.6)	- (0.0)	- (0.0)	2 (12.5)	3 (2.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
◆過去6か月間にセックスした相手の性別								
		n=2 <sup>※3</sup>	n=39	n=24	n=24	n=12	n=101	
①男性	男性	1 (50.0)	9 (23.1)	4 (16.7)	3 (12.5)	2 (16.7)	19 (18.8)	0.636
	女性	1 (50.0)	29 (74.4)	18 (75.0)	21 (87.5)	10 (83.3)	79 (78.2)	
	男女両方	- (0.0)	1 (2.6)	2 (8.3)	- (0.0)	- (0.0)	3 (3.0)	
	その他	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
-----								
		n=0	n=19	n=14	n=5	n=1	n=39	
②女性	男性	- (0.0)	18 (94.7)	14 (100.0)	5 (100.0)	1 (100.0)	38 (97.4)	0.782
	女性	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	男女両方	- (0.0)	1 (5.3)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (2.6)	
	その他	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
-----								
		n=2	n=58	n=38	n=29	n=13	n=140	
①+② 全体	男性	1 (50.0)	27 (46.6)	18 (47.4)	8 (27.6)	3 (23.1)	57 (40.7)	0.383
	女性	1 (50.0)	29 (50.0)	18 (47.4)	21 (72.4)	10 (76.9)	79 (56.4)	
	男女両方	- (0.0)	2 (3.4)	2 (5.3)	- (0.0)	- (0.0)	4 (2.9)	
	その他	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	

※3 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上と回答したものを分母とする。

表22. クリニック調査(非CSW) 性経験

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体	p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間にセックスした相手														
		n=2 <sup>※3</sup>		n=39		n=24		n=24		n=12		n=101		
①男性	恋人や配偶者など特手の相手と	-	(0.0)	26	(66.7)	13	(54.2)	12	(50.0)	2	(16.7)	53	(52.5)	0.020
	友達やセフレと	2	(100.0)	21	(53.8)	10	(41.7)	5	(20.8)	6	(50.0)	44	(43.6)	0.049
	(自分が)お金を払った相手と	-	(0.0)	8	(20.5)	11	(45.8)	9	(37.5)	5	(41.7)	33	(32.7)	0.186
	(自分に)お金をくれた相手と	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	-	(0.0)	7	(17.9)	4	(16.7)	3	(12.5)	1	(8.3)	15	(14.9)	0.876
	街やクラブでナンパした(された)相手と	1	(50.0)	3	(7.7)	4	(16.7)	1	(4.2)	-	(0.0)	9	(8.9)	0.097
	(性風俗店の)客と	-	(0.0)	4	(10.3)	1	(4.2)	1	(4.2)	2	(16.7)	8	(7.9)	0.618
	その他	-	(0.0)	3	(7.7)	1	(4.2)	3	(12.5)	1	(8.3)	8	(7.9)	0.856
			n=0		n=19		n=14		n=5		n=1		n=39	
	②女性	恋人や配偶者など特手の相手と	-	(0.0)	16	(84.2)	7	(50.0)	4	(80.0)	1	(100.0)	28	(71.8)
友達やセフレと		-	(0.0)	6	(31.6)	4	(28.6)	2	(40.0)	-	(0.0)	12	(30.8)	0.877
(自分が)お金を払った相手と		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
(自分に)お金をくれた相手と		-	(0.0)	4	(21.1)	2	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(15.4)	0.666
SNSや出会い系アプリで知り合った相手と		-	(0.0)	2	(10.5)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(7.7)	0.868
街やクラブでナンパした(された)相手と		-	(0.0)	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.6)	0.608
(性風俗店の)客と		-	(0.0)	7	(36.8)	7	(50.0)	-	(0.0)	1	(100.0)	15	(38.5)	0.137
その他		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=2		n=58		n=38		n=29		n=13		n=140		
①+② 全体		恋人や配偶者など特手の相手と	-	(0.0)	42	(72.4)	20	(52.6)	16	(55.2)	3	(23.1)	81	(57.9)
	友達やセフレと	2	(100.0)	27	(46.6)	14	(36.8)	7	(24.1)	6	(46.2)	56	(40.0)	0.114
	(自分が)お金を払った相手と	-	(0.0)	8	(13.8)	11	(28.9)	9	(31.0)	5	(38.5)	33	(23.6)	0.147
	(自分に)お金をくれた相手と	-	(0.0)	4	(6.9)	2	(5.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(4.3)	0.554
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	-	(0.0)	9	(15.5)	5	(13.2)	3	(10.3)	1	(7.7)	18	(12.9)	0.888
	街やクラブでナンパした(された)相手と	1	(50.0)	3	(5.2)	5	(13.2)	1	(3.4)	-	(0.0)	10	(7.1)	0.049
	(性風俗店の)客と	-	(0.0)	11	(19.0)	8	(21.1)	1	(3.4)	3	(23.1)	23	(16.4)	0.264
	その他	-	(0.0)	3	(5.2)	1	(2.6)	3	(10.3)	1	(7.7)	8	(5.7)	0.723

※3 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上と回答したものを分母とする。

◆過去6か月間のセックスでのコンドーム使用

		n=2 <sup>※3</sup>		n=39		n=24		n=24		n=12		n=101			
①男性	必ず使った	1	(50.0)	9	(23.1)	5	(20.8)	8	(33.3)	-	(0.0)	23	(22.8)	0.691	
	使うことが多かった	1	(50.0)	12	(30.8)	4	(16.7)	4	(16.7)	3	(25.0)	24	(23.8)		
	五分五分	-	(0.0)	10	(25.6)	7	(29.2)	4	(16.7)	3	(25.0)	24	(23.8)		
	使わないことが多かった	-	(0.0)	5	(12.8)	4	(16.7)	4	(16.7)	4	(33.3)	17	(16.8)		
	全く使わなかった	-	(0.0)	3	(7.7)	4	(16.7)	4	(16.7)	2	(16.7)	13	(12.9)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)		
			n=0		n=19		n=14		n=5		n=1		n=39		
	②女性	必ず使った	-	(0.0)	5	(26.3)	4	(28.6)	2	(40.0)	-	(0.0)	11	(28.2)	0.840
		使うことが多かった	-	(0.0)	6	(31.6)	5	(35.7)	2	(40.0)	-	(0.0)	13	(33.3)	
		五分五分	-	(0.0)	3	(15.8)	3	(21.4)	-	(0.0)	1	(100.0)	7	(17.9)	
使わないことが多かった		-	(0.0)	2	(10.5)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(7.7)		
全く使わなかった		-	(0.0)	3	(15.8)	1	(7.1)	1	(20.0)	-	(0.0)	5	(12.8)		
無回答/無効回答		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)		
		n=2		n=58		n=38		n=29		n=13		n=140			
①+② 全体		必ず使った	1	(50.0)	14	(24.1)	9	(23.7)	10	(34.5)	-	(0.0)	34	(24.3)	0.709
		使うことが多かった	1	(50.0)	18	(31.0)	9	(23.7)	6	(20.7)	3	(23.1)	37	(26.4)	
		五分五分	-	(0.0)	13	(22.4)	10	(26.3)	4	(13.8)	4	(30.8)	31	(22.1)	
	使わないことが多かった	-	(0.0)	7	(12.1)	5	(13.2)	4	(13.8)	4	(30.8)	20	(14.3)		
	全く使わなかった	-	(0.0)	6	(10.3)	5	(13.2)	5	(17.2)	2	(15.4)	18	(12.9)		
	無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)		

※3 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上と回答したものを分母とする。

表22. クリニック調査(非CSW) 性経験

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間の膣性交でのコンドーム使用													
	n=1 <sup>※4</sup>		n=35		n=20		n=21		n=10		n=87		
必ず使った	-	(0.0)	9	(25.7)	6	(30.0)	6	(28.6)	-	(0.0)	21	(24.1)	0.796
使うことが多かった	1	(100.0)	11	(31.4)	2	(10.0)	3	(14.3)	3	(30.0)	20	(23.0)	
五分五分	-	(0.0)	7	(20.0)	5	(25.0)	4	(19.0)	3	(30.0)	19	(21.8)	
①男性 使わないことが多かった	-	(0.0)	4	(11.4)	2	(10.0)	4	(19.0)	3	(30.0)	13	(14.9)	
全く使わなかった	-	(0.0)	3	(8.6)	4	(20.0)	3	(14.3)	1	(10.0)	11	(12.6)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(2.9)	1	(5.0)	1	(4.8)	-	(0.0)	3	(3.4)	
-----													
	n=0		n=18		n=14		n=5		n=1		n=38		
必ず使った	-	(0.0)	6	(33.3)	4	(28.6)	2	(40.0)	-	(0.0)	12	(31.6)	0.461
使うことが多かった	-	(0.0)	4	(22.2)	5	(35.7)	2	(40.0)	-	(0.0)	11	(28.9)	
五分五分	-	(0.0)	3	(16.7)	3	(21.4)	-	(0.0)	1	(100.0)	7	(18.4)	
②女性 使わないことが多かった	-	(0.0)	2	(11.1)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(7.9)	
全く使わなかった	-	(0.0)	3	(16.7)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(10.5)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	1	(2.6)	
-----													
	n=1		n=53		n=34		n=26		n=11		n=125		
必ず使った	-	(0.0)	15	(28.3)	10	(29.4)	8	(30.8)	-	(0.0)	33	(26.4)	0.827
使うことが多かった	1	(100.0)	15	(28.3)	7	(20.6)	5	(19.2)	3	(27.3)	31	(24.8)	
五分五分	-	(0.0)	10	(18.9)	8	(23.5)	4	(15.4)	4	(36.4)	26	(20.8)	
①+② 全体 使わないことが多かった	-	(0.0)	6	(11.3)	3	(8.8)	4	(15.4)	3	(27.3)	16	(12.8)	
全く使わなかった	-	(0.0)	6	(11.3)	5	(14.7)	3	(11.5)	1	(9.1)	15	(12.0)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	1	(1.9)	1	(2.9)	2	(7.7)	-	(0.0)	4	(3.2)	

※4 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上(膣性交していないものは除く)と回答したものを分母とする。

◆過去6か月間のアナルセックスでのコンドーム使用													
	n=0 <sup>※5</sup>		n=12		n=6		n=5		n=1		n=24		
必ず使った	-	(0.0)	6	(50.0)	1	(16.7)	3	(60.0)	-	(0.0)	10	(41.7)	0.408
使うことが多かった	-	(0.0)	3	(25.0)	3	(50.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	7	(29.2)	
五分五分	-	(0.0)	1	(8.3)	-	(0.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	2	(8.3)	
①男性 使わないことが多かった	-	(0.0)	2	(16.7)	2	(33.3)	-	(0.0)	1	(100.0)	5	(20.8)	
全く使わなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
-----													
	n=0		n=2		n=1		n=0		n=0		n=3		
必ず使った	-	(0.0)	1	(50.0)	1	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(66.7)	0.386
使うことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
五分五分	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性 使わないことが多かった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
全く使わなかった	-	(0.0)	1	(50.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(33.3)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
-----													
	n=0		n=14		n=7		n=5		n=1		n=27		
必ず使った	-	(0.0)	7	(50.0)	2	(28.6)	3	(60.0)	-	(0.0)	12	(44.4)	0.612
使うことが多かった	-	(0.0)	3	(21.4)	3	(42.9)	1	(20.0)	-	(0.0)	7	(25.9)	
五分五分	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	1	(20.0)	-	(0.0)	2	(7.4)	
①+② 全体 使わないことが多かった	-	(0.0)	2	(14.3)	2	(28.6)	-	(0.0)	1	(100.0)	5	(18.5)	
全く使わなかった	-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.7)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

※5 過去6か月間にセックスした相手の人数が1人以上(アナルセックスしていないものは除く)と回答したものを分母とする。

表22. クリニック調査(非CSW) 性経験

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆コンドームを使わない理由(複数回答)															
		n=1※6		n=30		n=19		n=16		n=12		n=78			
①男性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	-	(0.0)	18	(60.0)	15	(78.9)	7	(43.8)	5	(41.7)	45	(57.7)	0.112	
	一体感が欲しかったから	-	(0.0)	8	(26.7)	7	(36.8)	4	(25.0)	3	(25.0)	22	(28.2)	0.866	
	「つけよう」って言えなかったから	-	(0.0)	2	(6.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(8.3)	3	(3.8)	0.602	
	コンドームが手元になかったから	-	(0.0)	13	(43.3)	5	(26.3)	1	(6.3)	3	(25.0)	22	(28.2)	0.104	
	今よりもっと好きになってほしいから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	外だしすれば大丈夫と思ったから	-	(0.0)	4	(13.3)	1	(5.3)	3	(18.8)	3	(25.0)	11	(14.1)	0.580	
	今までつけなくても大丈夫だったから	-	(0.0)	3	(10.0)	2	(10.5)	2	(12.5)	3	(25.0)	10	(12.8)	0.728	
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	-	(0.0)	4	(13.3)	3	(15.8)	2	(12.5)	3	(25.0)	12	(15.4)	0.872	
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	1	(100.0)	6	(20.0)	1	(5.3)	4	(25.0)	5	(41.7)	17	(21.8)	0.048	
	子どもが欲しいから	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(10.5)	1	(6.3)	-	(0.0)	3	(3.8)	0.372	
	仕事だから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	2	(6.7)	-	(0.0)	2	(12.5)	1	(8.3)	5	(6.4)	0.656	
			n=0		n=14		n=10		n=3		n=1		n=28		
	②女性	コンドームをつけない方が気持ちいいから	-	(0.0)	4	(28.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(14.3)	0.198
一体感が欲しかったから		-	(0.0)	2	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	0.541	
「つけよう」って言えなかったから		-	(0.0)	2	(14.3)	3	(30.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(17.9)	0.573	
コンドームが手元になかったから		-	(0.0)	1	(7.1)	4	(40.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(17.9)	0.151	
今よりもっと好きになってほしいから		-	(0.0)	1	(7.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	0.792	
外だしすれば大丈夫と思ったから		-	(0.0)	1	(7.1)	1	(10.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	0.934	
今までつけなくても大丈夫だったから		-	(0.0)	3	(21.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(10.7)	0.339	
自分(または相手)がピルを飲んでいるから		-	(0.0)	2	(14.3)	2	(20.0)	2	(66.7)	-	(0.0)	6	(21.4)	0.226	
相手が「つけなくても大丈夫」と言うから		-	(0.0)	1	(7.1)	1	(10.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.1)	0.934	
子どもが欲しいから		-	(0.0)	-	(0.0)	1	(10.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(3.6)	0.601	
仕事だから		-	(0.0)	3	(21.4)	2	(20.0)	-	(0.0)	1	(100.0)	6	(21.4)	0.213	
上記いずれも当てはまらない		-	(0.0)	2	(14.3)	1	(10.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	4	(14.3)	0.752	
		n=1		n=44		n=29		n=19		n=13		n=106			
①+② 全体		コンドームをつけない方が気持ちいいから	-	(0.0)	22	(50.0)	15	(51.7)	7	(36.8)	5	(38.5)	49	(46.2)	0.653
	一体感が欲しかったから	-	(0.0)	10	(22.7)	7	(24.1)	4	(21.1)	3	(23.1)	24	(22.6)	0.986	
	「つけよう」って言えなかったから	-	(0.0)	4	(9.1)	3	(10.3)	-	(0.0)	1	(7.7)	8	(7.5)	0.716	
	コンドームが手元になかったから	-	(0.0)	14	(31.8)	9	(31.0)	1	(5.3)	3	(23.1)	27	(25.5)	0.209	
	今よりもっと好きになってほしいから	-	(0.0)	1	(2.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.9)	0.840	
	外だしすれば大丈夫と思ったから	-	(0.0)	5	(11.4)	2	(6.9)	3	(15.8)	3	(23.1)	13	(12.3)	0.630	
	今までつけなくても大丈夫だったから	-	(0.0)	6	(13.6)	2	(6.9)	2	(10.5)	3	(23.1)	13	(12.3)	0.652	
	自分(または相手)がピルを飲んでいるから	-	(0.0)	6	(13.6)	5	(17.2)	4	(21.1)	3	(23.1)	18	(17.0)	0.891	
	相手が「つけなくても大丈夫」と言うから	1	(100.0)	7	(15.9)	2	(6.9)	4	(21.1)	5	(38.5)	19	(17.9)	0.027	
	子どもが欲しいから	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(10.3)	1	(5.3)	-	(0.0)	4	(3.8)	0.211	
	仕事だから	-	(0.0)	3	(6.8)	2	(6.9)	-	(0.0)	1	(7.7)	6	(5.7)	0.828	
	上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	4	(9.1)	1	(3.4)	3	(15.8)	1	(7.7)	9	(8.5)	0.667	

※6 過去6か月間のセックスでコンドームを使わなかったことがあるものを分母とする。

表22. クリニック調査(非CSW) 性経験

	10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間のセックスでコンドームを使った目的													
	n=2 <sup>※7</sup>		n=36		n=20		n=20		n=10		n=88		
①男性													
避妊のため	-	(0.0)	12	(33.3)	7	(35.0)	2	(10.0)	3	(30.0)	24	(27.3)	0.303
性感染症予防のため	2	(100.0)	13	(36.1)	9	(45.0)	6	(30.0)	2	(20.0)	32	(36.4)	
両方(避妊と性感染症予防)のため	-	(0.0)	10	(27.8)	3	(15.0)	10	(50.0)	4	(40.0)	27	(30.7)	
上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	1	(2.8)	1	(5.0)	2	(10.0)	1	(10.0)	5	(5.7)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	n=0		n=16		n=13		n=4		n=1		n=34		
②女性													
避妊のため	-	(0.0)	1	(6.3)	1	(7.7)	1	(25.0)	-	(0.0)	3	(8.8)	0.817
性感染症予防のため	-	(0.0)	6	(37.5)	5	(38.5)	2	(50.0)	1	(100.0)	14	(41.2)	
両方(避妊と性感染症予防)のため	-	(0.0)	9	(56.3)	6	(46.2)	1	(25.0)	-	(0.0)	16	(47.1)	
上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(7.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.9)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	n=2		n=52		n=33		n=24		n=11		n=122		
①+②全体													
避妊のため	-	(0.0)	13	(25.0)	8	(24.2)	3	(12.5)	3	(27.3)	27	(22.1)	0.725
性感染症予防のため	2	(100.0)	19	(36.5)	14	(42.4)	8	(33.3)	3	(27.3)	46	(37.7)	
両方(避妊と性感染症予防)のため	-	(0.0)	19	(36.5)	9	(27.3)	11	(45.8)	4	(36.4)	43	(35.2)	
上記いずれも当てはまらない	-	(0.0)	1	(1.9)	2	(6.1)	2	(8.3)	1	(9.1)	6	(4.9)	
無回答/無効回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	

※7 過去6か月間のセックスでコンドームを使ったことがあるものを分母とする。

表23. クリニック調査(非CSW) お金を払った相手

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆過去6か月間に、お金を払って利用した性風俗サービス(複数回答)															
		n=0 <sup>※8</sup>		n=8		n=11		n=9		n=5		n=33			
①男性	店舗型ファッションヘルス	-	(0.0)	5	(62.5)	6	(54.5)	4	(44.4)	3	(60.0)	18	(54.5)	0.888	
	派遣型ファッションヘルス	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(63.6)	6	(66.7)	3	(60.0)	16	(48.5)	0.019	
	派遣型デートクラブ、ホテル、エスコートサービス	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(18.2)	4	(44.4)	2	(40.0)	8	(24.2)	0.141	
	接客型料理店	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	ストリップ劇場	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	風俗系エステ	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(27.3)	-	(0.0)	2	(40.0)	5	(15.2)	0.082	
	ピンクサロン、ヌキキャバ	-	(0.0)	3	(37.5)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(12.1)	0.076	
	ソープランド	-	(0.0)	4	(50.0)	2	(18.2)	3	(33.3)	1	(20.0)	10	(30.3)	0.471	
	出会い系サイト、テレクラなどを通じた援助交際	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	1	(11.1)	1	(20.0)	3	(9.1)	0.667	
	バー、スナック	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	街場(立ちんぼ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	SMクラブ、SMパブ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
			n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		
	②女性	店舗型ファッションヘルス	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
派遣型ファッションヘルス		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
派遣型デートクラブ、ホテル、エスコートサービス		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
接客型料理店		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
ストリップ劇場		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
風俗系エステ		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
ピンクサロン、ヌキキャバ		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
ソープランド		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
出会い系サイト、テレクラなどを通じた援助交際		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
バー、スナック		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
街場(立ちんぼ)		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
SMクラブ、SMパブ		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
その他		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
		n=0		n=8		n=11		n=9		n=5		n=33			
①+② 全体		店舗型ファッションヘルス	-	(0.0)	5	(62.5)	6	(54.5)	4	(44.4)	3	(60.0)	18	(54.5)	0.888
	派遣型ファッションヘルス	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(63.6)	6	(66.7)	3	(60.0)	16	(48.5)	0.019	
	派遣型デートクラブ、ホテル、エスコートサービス	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(18.2)	4	(44.4)	2	(40.0)	8	(24.2)	0.141	
	接客型料理店	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	ストリップ劇場	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	風俗系エステ	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(27.3)	-	(0.0)	2	(40.0)	5	(15.2)	0.082	
	ピンクサロン、ヌキキャバ	-	(0.0)	3	(37.5)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(12.1)	0.076	
	ソープランド	-	(0.0)	4	(50.0)	2	(18.2)	3	(33.3)	1	(20.0)	10	(30.3)	0.471	
	出会い系サイト、テレクラなどを通じた援助交際	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(9.1)	1	(11.1)	1	(20.0)	3	(9.1)	0.667	
	バー、スナック	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	街場(立ちんぼ)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	SMクラブ、SMパブ	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	

※8 過去6か月間に自分がお金を払った相手とセックスしたものを分母とする。

◆過去6か月間に、お金を払って利用した性風俗サービスの相手(複数回答)

		n=0 <sup>※8</sup>		n=8		n=11		n=9		n=5		n=33			
①男性	母国語が日本語の相手	-	(0.0)	8	(100.0)	11	(100.0)	9	(100.0)	5	(100.0)	33	(100.0)	-	
	母国語が中国語の相手	-	(0.0)	1	(12.5)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.1)	0.645	
	母国語が韓国語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	1	(3.0)	0.123	
	母国語が英語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	母国語が欧州語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	分からない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
			n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		
	②女性	母国語が日本語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		母国語が中国語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		母国語が韓国語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		母国語が英語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		母国語が欧州語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		分からない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=0		n=8		n=11		n=9		n=5		n=33			
①+② 全体		母国語が日本語の相手	-	(0.0)	8	(100.0)	11	(100.0)	9	(100.0)	5	(100.0)	33	(100.0)	-
		母国語が中国語の相手	-	(0.0)	1	(12.5)	1	(9.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(6.1)	0.645
		母国語が韓国語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(20.0)	1	(3.0)	0.123
		母国語が英語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		母国語が欧州語の相手	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		分からない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-

※8 過去6か月間に自分がお金を払った相手とセックスしたものを分母とする。

表23. クリニック調査(非CSW) お金を払った相手

		10代		20代		30代		40代		50歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間に、お金を払って利用した性風俗サービスでのコンドーム使用(複数回答)														
		n=0 <sup>※8</sup>		n=8		n=11		n=9		n=5		n=33		
①男性	セックス相手が準備したコンドームを使用した	-	(0.0)	4	(50.0)	4	(36.4)	3	(33.3)	2	(40.0)	13	(39.4)	0.861
	自分が準備したコンドームを使用した	-	(0.0)	1	(12.5)	1	(9.1)	2	(22.2)	-	(0.0)	4	(12.1)	0.723
	お店のコンドームを使用した	-	(0.0)	2	(25.0)	4	(36.4)	2	(22.2)	1	(20.0)	9	(27.3)	0.798
	ホテルに備え付けのコンドームを使用した	-	(0.0)	1	(12.5)	4	(36.4)	4	(44.4)	3	(60.0)	12	(36.4)	0.470
	コンドームを使用しなかった	-	(0.0)	3	(37.5)	2	(18.2)	2	(22.2)	4	(80.0)	11	(33.3)	0.215
		n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		
②女性	セックス相手が準備したコンドームを使用した	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	自分が準備したコンドームを使用した	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	お店のコンドームを使用した	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	ホテルに備え付けのコンドームを使用した	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
	コンドームを使用しなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
		n=0		n=8		n=11		n=9		n=5		n=33		
①+②全体	セックス相手が準備したコンドームを使用した	-	(0.0)	4	(50.0)	4	(36.4)	3	(33.3)	2	(40.0)	13	(39.4)	0.861
	自分が準備したコンドームを使用した	-	(0.0)	1	(12.5)	1	(9.1)	2	(22.2)	-	(0.0)	4	(12.1)	0.723
	お店のコンドームを使用した	-	(0.0)	2	(25.0)	4	(36.4)	2	(22.2)	1	(20.0)	9	(27.3)	0.798
	ホテルに備え付けのコンドームを使用した	-	(0.0)	1	(12.5)	4	(36.4)	4	(44.4)	3	(60.0)	12	(36.4)	0.470
	コンドームを使用しなかった	-	(0.0)	3	(37.5)	2	(18.2)	2	(22.2)	4	(80.0)	11	(33.3)	0.215

※8 過去6か月間に自分がお金を払った相手とセックスしたものを分母とする。

◆過去6か月間に、お金を払って利用した性風俗サービスでコンドームを使用しなかった理由(複数回答)

		n=0 <sup>※9</sup>		n=3		n=2		n=2		n=4		n=11			
①男性	コンドームを使用する必要のないサービスだから	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	1	(50.0)	3	(75.0)	5	(45.5)	0.352	
	相手が希望したから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	相手が好みのタイプだから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(50.0)	2	(18.2)	0.233	
	これまでも関係のある相手だから	-	(0.0)	1	(33.3)	1	(50.0)	-	(0.0)	4	(100.0)	6	(54.5)	0.098	
	サービスとして当然(暗黙の了解)だから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(25.0)	1	(9.1)	0.588	
	一体感がないから	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	1	(50.0)	-	(0.0)	2	(18.2)	0.233	
	コンドームが手元になかったから	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(25.0)	2	(18.2)	0.688	
	コンドームをつけようって言えなかったから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(25.0)	1	(9.1)	0.588	
			n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		n=0		
	②女性	コンドームを使用する必要のないサービスだから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
相手が希望したから		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
相手が好みのタイプだから		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
これまでも関係のある相手だから		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
サービスとして当然(暗黙の了解)だから		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
一体感がないから		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
コンドームが手元になかったから		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
コンドームをつけようって言えなかったから		-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
		n=0		n=3		n=2		n=2		n=4		n=11			
①+②全体		コンドームを使用する必要のないサービスだから	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	1	(50.0)	3	(75.0)	5	(45.5)	0.352
	相手が希望したから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
	相手が好みのタイプだから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(50.0)	2	(18.2)	0.233	
	これまでも関係のある相手だから	-	(0.0)	1	(33.3)	1	(50.0)	-	(0.0)	4	(100.0)	6	(54.5)	0.098	
	サービスとして当然(暗黙の了解)だから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(25.0)	1	(9.1)	0.588	
	一体感がないから	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(50.0)	1	(50.0)	-	(0.0)	2	(18.2)	0.233	
	コンドームが手元になかったから	-	(0.0)	1	(33.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(25.0)	2	(18.2)	0.688	
	コンドームをつけようって言えなかったから	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(25.0)	1	(9.1)	0.588	

※9 過去6か月間にお金を払って利用した性風俗サービスでコンドームを使用しなかったものを分母とする。