

社会分野における予防指針の課題に関する研究

研究分担者：塩野徳史（大阪青山大学 健康科学部看護学科 講師）

研究要旨

初年度は、予防活動に関わる多くの研究協力者と協働し、HIV 陽性者、MSM、性産業従事者に関する状況について検討した。特に性産業従事者に関しては先行的な量的資料が少なく、本研究で質問紙調査を実施した。A 社が保有するアンケートモニター登録者を対象として国政調査を基に 47 都道府県と年齢階級によって層化し、20 歳から 59 歳の女性について比例配分し、「生涯の性交相手が異性のみで生涯にお金をもらった性交経験がある女性」を対象に、労働環境や予防行動について伺った。本年度は、その結果を地域ブロック別に分析した。

A. 研究目的

世界におけるエイズ/HIV 感染症を取り巻く状況は、抗ウイルス薬の多剤併用療法（ART）の飛躍的進歩によって、近年大きく変貌した。ART の早期導入によって、HIV 感染症の生命予後が著しく改善されるばかりでなく、パートナーへの感染予防効果も示され（Treatment as Prevention: TasP）、世界に大きなインパクトを与えた（Cohen MS et al., N Engl J Med. 2011）。このことは当事者コミュニティ側への影響も大きく、Undetectable = Untransmittable; U=U などのメッセージ性の強い普及啓発が展開されるようになった。

一方、ART 普及の効果について“ケアカスケード分析”がおこなわれ、米国においては、治療継続の問題が明らかとなった（Gardner EM et al., Clin Infect Dis. 2011）。この“ケアカスケード分析”は、各国における AIDS 対策の新たなよりどころとなり（UNAIDS. Fast-Track - Ending the AIDS epidemic by 2030, 2014）、我が国においても検査機会の拡大が叫ばれている。

また、抗ウイルス薬を用いた暴露前予防（Pre Exposure Prophylaxis: PrEP）の有効性が証明され、HIV 感染ハイリスク群への PrEP 導入が、WHO によって推奨（WHO Guideline, 2015）されるようになり、改定されたエイズ予防指針にも明記された。

我が国におけるエイズ対策は、後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針（エイズ予防指針）に沿って展開されてきたが、その効果評価が曖昧となっていることが課題となっ

ている。そこで本研究の目的は改定されたエイズ予防指針に基づき、陽性者や予防啓発の対象となるコミュニティ当事者を取り巻く課題を明確にし、各種施策の効果を経年的に評価するとともに、一元的に進捗状況を把握し、課題抽出を行うことで、一貫したエイズ対策を推進するところにある。

初年度は、改訂されたエイズ予防指針に基づく課題を研究協力者と社会系分野の視点で整理し、課題解決のための体制について個別に意見交換することを始めた。また、特にセックスワーカーにおける状況について先行研究が少ないことを鑑み、セックスワーカーのデータ蓄積を主に行った。本報告では主に、本調査結果について報告する。

B. 研究方法

初年度は、改訂されたエイズ予防指針に基づく課題を研究協力者と社会系分野の視点で整理し、課題解決のための体制について個別に意見交換することを始めた。

また、特にセックスワーカーにおける状況について先行研究が少ないことを鑑み、日本のインターネットサイトを運営する A 社が保有するアンケートモニター登録者を対象にスクリーニングする調査を行い、次いで性行動や検査行動などに関して 2 次調査（以下、本調査）を 2019 年 2 月に実施した。

平成 27 年度国勢調査を基に、47 都道府県と年齢階級によって層化し 20 歳から 59 歳の女性を比例配分し、その割合に基づき A 社保有のモニター登録者のうち成人女性を対象にしてスク

リーニング調査を実施する。スクリーニング調査では性別、年齢、居住地、居住期間、居住形態、最終学歴と「相手にお金を払って性交渉（セックス）をした経験（これまでと過去6ヶ月間）」「相手からお金をもらって性交渉（セックス）をした（これまでと過去6ヶ月間）」などの12問を尋ね、生涯の性交相手が異性のみで生涯にお金をもらった性交経験がある女性1,000人を対象に本調査を実施した。

本調査の質問項目は婚姻状況、HIVや性感染症に関する知識、過去6ヶ月間のHIVやエイズに関する対話経験、検査行動、性感染症既往歴、性行動、セックスワーク時の環境などを尋ね、分析では居住地別のクロス集計を行った。カイ2乗検定を用いて検討した。有意水準を5%未満とした。データの集計および統計処理にはIBM SPSS Statistics 23 (Windows) を用いた。

(倫理面への配慮)

本研究実施については大阪青山大学研究倫理審査委員会より実施の承認を得た。

C. 研究結果

1) 社会分野の視点での整理

初年度意見交換を進める中で、エイズ対策における課題そのものは予防指針に明記されているものの、エイズ予防指針がより実行力を高めるためには以下のようなモニタリングが必要であると指摘された。

HIV感染症に対しては、一般住民の理解度や知識について、HIV陽性者においては就労の課題（企業の人事担当者・経営者の意識調査、差別事例の収集）等、医療においては、地域の医療機関との連携状況、患者受け入れ状況の継続的把握、かかりつけ医の有無調査、診療拒否事例の収集、医療従事者の意識調査等。

また予防啓発活動については、複数の個別施策層にまたがるハイリスク層が存在し、性感染症の拡大（梅毒・A型肝炎）が拡大している現状を背景に、専門家が当事者と協働し、コミュニティにおける新たな予防（PEP・PrEP）への関心や知識、予防行動を継続的にモニタリングしていく必要性が指摘された。

またセックスワーカーについては、予防指針そのものが、セックスワーカーのエイズ対策について実行力のない現状であることが指摘された。その背景には、先行研究が少なく予防対策のベースラインや方向性が曖昧なままであることが考えられ、本研究で補完的に当事者と協働した量的調査を実施することとなった。

2) セックスワーカーを対象とした性行動および予防行動に関する調査結果

本調査はこれまでに相手からお金をもらって性交渉した20歳～59歳までの女性を対象に実施し、1,000人の有効回答を得た。

居住地を北海道・東北ブロック、東京都、東京都を除く関東・甲信越ブロック、北陸・東海ブロック、近畿ブロック、中国・四国ブロック、九州ブロックに分けて分析した。集計した結果を表1～表8に示す。

回答者の平均年齢は38.1±9.2歳であり、はじめて性風俗系の仕事をした年齢の平均は24.3±7.4歳であった。このうち、現在も仕事を継続しているのは6.8%であった。

主な結果として、居住形態では独居18.0%、同居81.7%であり、地域によって有意差がみられた ($p<0.01$)。婚姻状況では既婚55.8%、未婚24.5%であった ($p=0.05$)。これまでに周囲の人と性風俗系のお仕事をしていること（していたこと）について話したことがある割合は、家族11.7%、恋人31.0%、友達43.2%、過去6ヶ月間にお金に関係なく、プライベートでセックスした相手13.4%であった。

HIV抗体検査受検行動について、これまでに受検経験を有する人の割合は41.1%であり、地域別に有意差がみられた ($p=0.04$)。受検場所として最も多かったのは病院17.9%であり、次いでクリニック・医院・診療所15.0%、保健所の即日検査8.6%であった。未受検の理由として最も多かったのは「HIVに感染している可能性がない」49.1%であり、次いで「どこで検査を受けたら良いか分からない」27.3%、「感染しているのではないかと疑われる」24.4%、「お金がかかる」23.3%、「機会（時間や場所など）があわなかった」22.4%であった。

「HIV感染予防のためのセックス前の服薬（PrEP）」や「HIVに感染したかもしれないときの予防服薬（PEP）」に関する上記のような情報について、よく知っていた割合は2.9%である一方で、PrEPをしたことがあると回答した割合は2.4%であった。

D. 考察

本調査ではセックスワーカーに関する資料を得られ、検査行動等の地域別の分析を行った。調査対象は、インターネットのモニター登録者であり、バイアスを考慮する必要があるが、二段層化抽出法によるものであり地域別・年齢層別の状況をある程度反映しているものと考えられる。検査行動についてはMSMの先行研究に比べやや低い割合にとどまり、検査場所として

は病院等が多く、保健所における無料匿名検査の利用は少ない状況が示唆される。また未受検理由や知識の正当においても MSM の状況と異なっている。特に郵送検査キットに関する正当率は低く、啓発普及が課題となっていると考えられる。また PrEP や PEP の情報についてもほとんど知られていない状況であった。

E. 結論

初年度は、社会系分野の視点で整理し、課題解決のための体制について個別に意見交換した。またセックスワーカーの状況について、今後詳細な分析を進める必要があるが、先行研究と比較可能な量的資料を得た。

F. 研究発表

1. 論文発表

- 1) ○塩野徳史, 市川誠一, 金子典代, 佐々木由理: 都市部保健所における HIV 抗体検査受検者の特性, 厚生指標, 2018, 65(5): 35-42
- 2) ○金子典代, 塩野徳史, 本間隆之, 岩橋恒太, 健山正男, 市川誠一: 地方都市在住の MSM (Men who have sex with men) における調査時点までと過去1年の HIV 検査経験と関連要因. 日本エイズ学会誌, 2019, 21(1) (受理済) .

2. 学会発表

- 1) ○塩野徳史 ゲイコミュニティにおける HIV 抗体検査—『これまで』と『これから』 シンポジウム 3 HIV 将来予測と流行阻止 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 2) ○塩野徳史 HIV 検査の受検阻害要因としてのスティグマ シンポジウム 4 スティグマの払拭は誰が担うのか 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 3) ○塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 宮田りりい, 大畑泰次郎, 伴仲昭彦, 鬼塚哲郎, 市川誠一 商業施設を利用しはじめる若年層 MSM を対象とした予防啓発介入の開発と効果評価 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 4) ○荒木順子, 金子典代, 木南拓也, 岩橋恒太, 佐久間久弘, 阿部甚兵, 大島 岳, 太田 貴, 石田敏彦, 塩野徳史, 新山 賢, 金城 健, 本間隆之, 市川誠一 akta で展開したセーフーセックスキャンペーンとコミュニティベース調査による効果評価 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 5) ○宮田りりい, 塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 大畑泰次郎, 市川誠一 MSM における性

交相手との出会いの場所と方法一年齢層による差異について— 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 6) ○塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 宮田りりい MSM における検査行動に関する尺度開発とコミュニティセンター dista 利用者の変化 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 7) ○後藤大輔, 中村理恵, 宮田りりい, 塩野徳史 若年層向けの行政と連携した予防啓発方法の試み 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 8) ○川畑拓也, 小島洋子, 森 治代, 駒野 淳, 岩佐 厚, 亀岡 博, 菅野展史, 近藤雅彦, 杉本賢治, 高田昌彦, 田端運久, 中村幸生, 古林敬一, 清田敦彦, 伏谷加奈子, 塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 柴田敏之, 木下 優 大阪府における MSM 向け HIV/STI 検査相談事業・平成 28 年度実績報告 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 9) ○Takaku Michiko, Dorjgotov Myagmardorj, Gombo Erdenetuya, Galsanjamts Nyampurev, Jagdagsuren Davaalkham, Ichikawa Seiichi, Shiono Satoshi, Kaneko Noriyo, Oka Shinichi Studies on NGOs' HIV prevention interventions targeting MSM community in Mongolia The 31st Annual Meeting of the Japanese Society for AIDS Research, Tokyo, Nov. 24-26, 2017
- 10) ○櫻井理恵, 真木景子, 浦林純江, 青木理恵, 浅井千絵, 松本健二, 小向 潤, 植田英也, 半羽宏之, 松村直樹, 久保徹朗, 安井典子, 塩野徳史, 市川誠一 保健福祉センターにおける HIV 抗原抗体検査受検者アンケートから見た MSM 対策の評価 ワークショップ 3 検査・相談体制 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 11) ○塩野徳史: U=U をめぐるメッセージと予防啓発 第 32 回日本エイズ学会学術集会・総会 シンポジウム 9 U=U 誰が何をどう伝えるか: 陽性者の人権とスティグマゼロへの取り組みを視野に入れて 大阪, H30. 12. 2-4
- 12) ○塩野徳史: 社会分野における予防指針の課題 第 32 回日本エイズ学会学術集会・総会 日本エイズ学会シンポジウム エイズ予防指針改定の背景と課題 大阪, H30. 12. 2-4

G. 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む)

1. 特許取得 なし。
2. 実用新案登録 なし。
3. その他 なし。

表1 居住地別 基本属性及び検査行動

	居住地							合計	Pearson カイ乗
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州		
	n=110	n=120	n=268	n=140	n=166	n=83	n=113	n=1000	
年齢階級									
29歳以下	20	35	54	34	41	19	26	229	0.23
30-39歳	31	40	77	39	51	26	33	297	
40-49歳	34	37	98	46	60	27	36	338	
50歳以上	25	8	39	21	14	11	18	136	
あなたは、現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。									
生まれてからずっと	30	18	57	44	32	18	24	223	0.01
1年未満	4	10	13	5	7	3	12	54	
1-5年未満	14	34	63	28	36	18	17	210	
5-10年未満	13	19	41	13	30	7	13	136	
10-20年未満	15	24	47	25	28	20	23	182	
20年以上	34	15	47	25	33	17	24	195	
あなたは、現在、一人暮らしですか。									
はい(1人暮らし)	19	37	40	18	32	14	20	180	<0.01
いいえ	91	83	228	119	134	69	93	817	
定住している家はない	0	0	0	3	0	0	0	3	
あなたの最終学歴をお答えください。									
小学校	0	0	0	0	0	1	0	1	0.15
中学校	11	8	25	12	10	9	6	81	
高等学校	53	38	104	55	70	29	50	399	
専門学校	21	17	59	24	29	14	21	185	
短大・高専	8	19	33	16	19	11	11	117	
大学	16	34	44	33	35	18	21	201	
大学院	1	4	3	0	3	1	4	16	
あなたの現在の職業として、もっとも近いのは次のどれですか。									
常勤(正規雇用)	32	40	66	45	48	20	36	287	0.76
常勤(非正規雇用)	7	6	16	7	12	6	7	61	
パート/タイマー	30	24	60	31	33	19	20	217	
アルバイト	6	11	22	6	18	5	8	76	
経営者	6	2	9	4	5	2	6	34	
その他	4	10	15	3	6	4	3	45	
働いていない	25	27	80	44	44	27	33	280	
あなたは、現在結婚していますか。									
結婚している	58	66	161	83	84	44	62	558	0.05
離別/死別	29	16	55	29	28	15	25	197	
未婚	23	38	52	28	54	24	26	245	
これまでに、H IV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。									
ある	40	59	115	42	67	36	52	411	0.04
ない	70	61	153	98	99	47	61	589	
これまでに受けた、H IV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。									
保健所の即日検査	9	15	21	8	11	6	16	86	0.08
保健所の夜間検査	2	5	3	1	3	2	2	18	0.14
保健所の即日・夜間検査以外	3	4	10	2	10	3	0	32	0.03
病院	17	23	45	19	24	24	27	179	0.01
クリニック/医院/診療所	15	18	39	19	32	10	17	150	0.05
郵送検査キット	2	5	7	3	6	1	4	28	0.23
その他	0	3	6	1	2	1	2	15	0.19
過去1年間に、H IV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。									
ある	14	19	19	14	19	12	15	112	0.02
ない	26	40	96	28	48	24	37	299	
これまでにない	70	61	153	98	99	47	61	589	
過去1年間に受けた、H IV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。									
保健所の即日検査	2	3	2	4	4	2	3	20	0.12
保健所の夜間検査	0	4	0	0	3	2	1	10	0.01
保健所の即日・夜間検査以外	0	1	1	0	3	1	0	6	0.03
病院	8	8	8	6	5	8	7	50	0.04
クリニック/医院/診療所	3	6	7	4	8	6	6	40	0.08
郵送検査キット	2	1	1	0	2	0	0	6	0.04
その他	0	1	1	0	0	0	0	2	0.07
H IV抗体検査(エイズ検査)を受けなかった理由はどれにあてはまりますか。 ^{*1}									
結果を知るのが怖い	19	16	23	18	22	19	10	127	0.01
H IVに感染している可能性がない	33	34	79	45	41	20	37	289	0.21
曖昧なままにしておきたい	3	5	4	3	5	6	2	28	0.10
どこで検査を受けたら良いかわからない	17	17	41	27	30	15	14	161	0.93
機会(時間や場所など)があわなかった	12	17	33	21	22	10	17	132	0.76
お金がかかる	13	19	34	23	27	9	12	137	0.56
感染しているのではないかと疑われる	2	7	10	5	11	5	8	48	0.18
面倒だから	15	17	38	24	28	9	13	144	0.86
検査場所での知り合いに会う可能性がある	3	6	6	8	9	2	7	41	0.31
その他	3	0	7	4	4	0	0	18	0.27

*1 H IV抗体検査をこれまでに受けたことがないと回答した589人を対象に分析した。

表2 居住地別 検査に関する態度及び予防接種経験、PrEP/PEPに関する認知

	居住地								合計	Pearson カイ乗							
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州										
	n=110	n=120	n=268	n=140	n=166	n=83	n=113	n=1000									
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_無料で検査を受けられる																	
とてもそう思う	84	76.4%	85	70.8%	200	74.6%	110	78.6%	119	71.7%	70	84.3%	97	85.8%	765	76.5%	0.13
ややそう思う	19	17.3%	30	25.0%	52	19.4%	21	15.0%	30	18.1%	12	14.5%	13	11.5%	177	17.7%	
あまりそう思わない	5	4.5%	4	3.3%	13	4.9%	6	4.3%	11	6.6%	1	1.2%	3	2.7%	43	4.3%	
全くそう思わない	2	1.8%	1	0.8%	3	1.1%	3	2.1%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.5%	
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_匿名で検査を受けられる																	
とてもそう思う	91	82.7%	95	79.2%	201	75.0%	106	75.7%	133	80.1%	76	91.6%	95	84.1%	797	79.7%	0.15
ややそう思う	12	10.9%	20	16.7%	46	17.2%	26	18.6%	23	13.9%	4	4.8%	9	8.0%	140	14.0%	
あまりそう思わない	5	4.5%	5	4.2%	17	6.3%	5	3.6%	6	3.6%	2	2.4%	8	7.1%	48	4.8%	
全くそう思わない	2	1.8%	0	0.0%	4	1.5%	3	2.1%	4	2.4%	1	1.2%	1	0.9%	15	1.5%	
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_利便性の高い場所で検査を受けられる																	
とてもそう思う	82	74.5%	82	68.3%	190	70.9%	94	67.1%	113	68.1%	67	80.7%	81	71.7%	709	70.9%	0.07
ややそう思う	19	17.3%	28	23.3%	57	21.3%	30	21.4%	39	23.5%	9	10.8%	23	20.4%	205	20.5%	
あまりそう思わない	9	8.2%	10	8.3%	17	6.3%	12	8.6%	6	3.6%	5	6.0%	9	8.0%	68	6.8%	
全くそう思わない	0	0.0%	0	0.0%	4	1.5%	4	2.9%	8	4.8%	2	2.4%	0	0.0%	18	1.8%	
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_他の性感染症と同時に検査を受けられる																	
とてもそう思う	69	62.7%	81	67.5%	187	69.8%	87	62.1%	107	64.5%	62	74.7%	77	68.1%	670	67.0%	0.47
ややそう思う	25	22.7%	33	27.5%	55	20.5%	41	29.3%	41	24.7%	13	15.7%	22	19.5%	230	23.0%	
あまりそう思わない	12	10.9%	4	3.3%	18	6.7%	9	6.4%	10	6.0%	6	7.2%	10	8.8%	69	6.9%	
全くそう思わない	4	3.6%	2	1.7%	8	3.0%	3	2.1%	8	4.8%	2	2.4%	4	3.5%	31	3.1%	
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_他の誰にも知られず検査を受けられる																	
とてもそう思う	91	82.7%	91	75.8%	207	77.2%	116	82.9%	121	72.9%	70	84.3%	96	85.0%	792	79.2%	0.16
ややそう思う	13	11.8%	27	22.5%	49	18.3%	16	11.4%	33	19.9%	12	14.5%	14	12.4%	164	16.4%	
あまりそう思わない	3	2.7%	1	0.8%	9	3.4%	4	2.9%	8	4.8%	1	1.2%	3	2.7%	29	2.9%	
全くそう思わない	3	2.7%	1	0.8%	3	1.1%	4	2.9%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.5%	
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_検査結果についてプライバシーが保護される																	
とてもそう思う	99	90.0%	95	79.2%	221	82.5%	114	81.4%	129	77.7%	75	90.4%	102	90.3%	835	83.5%	0.01
ややそう思う	8	7.3%	24	20.0%	39	14.6%	23	16.4%	27	16.3%	6	7.2%	10	8.8%	137	13.7%	
あまりそう思わない	0	0.0%	1	0.8%	7	2.6%	1	0.7%	7	4.2%	2	2.4%	1	0.9%	19	1.9%	
全くそう思わない	3	2.7%	0	0.0%	1	0.4%	2	1.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.9%	
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_平日に受けられる検査の日や時間を拡大する																	
とてもそう思う	69	62.7%	60	50.0%	160	59.7%	82	58.6%	95	57.2%	60	72.3%	66	58.4%	592	59.2%	0.15
ややそう思う	32	29.1%	50	41.7%	79	29.5%	41	29.3%	51	30.7%	15	18.1%	32	28.3%	300	30.0%	
あまりそう思わない	8	7.3%	10	8.3%	23	8.6%	14	10.0%	15	9.0%	6	7.2%	15	13.3%	91	9.1%	
全くそう思わない	1	0.9%	0	0.0%	6	2.2%	3	2.1%	5	3.0%	2	2.4%	0	0.0%	17	1.7%	
HIV抗体検査(エイズ検査)をより受けやすくするためにどのようなことが重要だと思いますか。_夜間や休日に検査を受けられる日を増やす																	
とてもそう思う	74	67.3%	77	64.2%	170	63.4%	91	65.0%	108	65.1%	62	74.7%	57	50.4%	639	63.9%	0.31
ややそう思う	30	27.3%	34	28.3%	76	28.4%	40	28.6%	39	23.5%	15	18.1%	46	40.7%	280	28.0%	
あまりそう思わない	5	4.5%	8	6.7%	18	6.7%	7	5.0%	16	9.6%	5	6.0%	9	8.0%	68	6.8%	
全くそう思わない	1	0.9%	1	0.8%	4	1.5%	2	1.4%	3	1.8%	1	1.2%	1	0.9%	13	1.3%	
次のうちいずれかのワクチン(予防接種)を受けたことがありますか。																	
A型肝炎	1	0.9%	2	1.7%	1	0.4%	1	0.7%	2	1.2%	5	6.0%	2	1.8%	14	1.4%	0.01
B型肝炎	13	11.8%	13	10.8%	23	8.6%	20	14.3%	18	10.8%	12	14.5%	22	19.5%	121	12.1%	0.11
HPV(ヒトパピローマウイルス)	3	2.7%	4	3.3%	4	1.5%	5	3.6%	10	6.0%	4	4.8%	5	4.4%	35	3.5%	0.30
インフルエンザ	70	63.6%	77	64.2%	164	61.2%	93	66.4%	109	65.7%	55	66.3%	82	72.6%	650	65.0%	0.56
麻疹・風疹	59	53.6%	58	48.3%	144	53.7%	73	52.1%	89	53.6%	47	56.6%	70	61.9%	540	54.0%	0.56
水ぼうそう	43	39.1%	44	36.7%	104	38.8%	58	41.4%	62	37.3%	36	43.4%	49	43.4%	396	39.6%	0.90
流行性耳下腺炎(ムンプス,おたふくかぜ)	17	15.5%	28	23.3%	71	26.5%	38	27.1%	38	22.9%	23	27.7%	35	31.0%	250	25.0%	0.17
わからない/覚えていない	21	19.1%	21	17.5%	48	17.9%	23	16.4%	27	16.3%	11	13.3%	13	11.5%	164	16.4%	0.72
いずれもない	6	5.5%	6	5.0%	17	6.3%	8	5.7%	10	6.0%	4	4.8%	3	2.7%	54	5.4%	0.88
HIV感染予防のためのセックス前の服薬(PrEP)やHIVに感染したかもしれないときの予防服薬(PEP)に関する上記のような情報について、知っていましたか。																	
とてもよく知っている	2	1.8%	5	4.2%	2	0.7%	4	2.9%	9	5.4%	4	4.8%	3	2.7%	29	2.9%	0.30
具体的には知らないが、聞いたことはある	16	14.5%	19	15.8%	44	16.4%	26	18.6%	32	19.3%	14	16.9%	14	12.4%	165	16.5%	
まったく知らなかった	92	83.6%	96	80.0%	222	82.8%	110	78.6%	125	75.3%	65	78.3%	96	85.0%	806	80.6%	
友達や知り合い、セックスの相手で、HIV陰性者(HIVに感染していない人)の中にHIV感染予防のためのセックス前の服薬(PrEP)をしている人はいると思いますか。																	
いる	1	0.9%	1	0.8%	1	0.4%	1	0.7%	7	4.2%	2	2.4%	1	0.9%	14	1.4%	0.03
いると思う	4	3.6%	8	6.7%	8	3.0%	8	5.7%	10	6.0%	6	7.2%	5	4.4%	49	4.9%	
いないと思う	61	55.5%	52	43.3%	107	39.9%	70	50.0%	72	43.4%	42	50.6%	60	53.1%	464	46.4%	
いない	21	19.1%	20	16.7%	58	21.6%	21	15.0%	31	18.7%	14	16.9%	12	10.6%	177	17.7%	
わからない	23	20.9%	39	32.5%	94	35.1%	40	28.6%	46	27.7%	19	22.9%	35	31.0%	296	29.6%	
あなたはHIV感染予防のためのセックス前の服薬(PrEP)をしたいと思いますか。																	
服薬したい	7	6.4%	11	9.2%	26	9.7%	18	12.9%	28	16.9%	18	21.7%	15	13.3%	123	12.3%	0.06
どちらかといえば、服薬したい	44	40.0%	51	42.5%	86	32.1%	47	33.6%	47	28.3%	23	27.7%	31	27.4%	329	32.9%	
どちらかといえば、服薬したくない	37	33.6%	34	28.3%	95	35.4%	48	34.3%	54	32.5%	27	32.5%	39	34.5%	334	33.4%	
服薬したくない	22	20.0%	24	20.0%	61	22.8%	24	17.1%	36	21.7%	14	16.9%	27	23.9%	208	20.8%	
現在、抗HIV薬の服薬治療を続けている	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.1%	1	0.6%	1	1.2%	1	0.9%	6	0.6%	
あなたはHIV感染予防のためのセックス前の服薬(PrEP)をしたことがありますか。																	
過去に飲んだことがある	0	0.0%	3	2.5%	3	1.1%	2	1.4%	4	2.4%	1	1.2%	2	1.8%	15	1.5%	0.45
現在飲んでいる	0	0.0%	2	1.7%	1	0.4%	1	0.7%	4	2.4%	1	1.2%	0	0.0%	9	0.9%	
一度も飲んだことがない	110	100.0%	115	95.8%	264	98.5%	137	97.9%	158	95.2%	81	97.6%	111	98.2%	976	97.6%	

表3 居住地別 性感染既往及び病院受診経験及び対話経験

	居住地											合計	Pearson カイ乗				
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州										
	n=110	n=120	n=268	n=140	n=166	n=83	n=113	n=1000									
これまでに性感染症にかかったことがありますか。																	
ある	55	50.0%	66	55.0%	120	44.8%	63	45.0%	82	49.4%	45	54.2%	63	55.8%	494	49.4%	0.28
ない	55	50.0%	54	45.0%	148	55.2%	77	55.0%	84	50.6%	38	45.8%	50	44.2%	506	50.6%	
生涯の性感染症既往(再掲)																	
梅毒	0	0.0%	4	3.3%	5	1.9%	2	1.4%	6	3.6%	4	4.8%	7	6.2%	28	2.8%	0.14
A型肝炎	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	3	0.3%	0.12
B型肝炎	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.2%	1	0.9%	4	0.4%	0.47
C型肝炎	0	0.0%	2	1.7%	3	1.1%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	1	0.9%	9	0.9%	0.37
尖圭コンジローマ	9	8.2%	8	6.7%	9	3.4%	7	5.0%	10	6.0%	9	10.8%	6	5.3%	58	5.8%	0.29
クラミジア	37	33.6%	41	34.2%	81	30.2%	46	32.9%	58	34.9%	33	39.8%	44	38.9%	340	34.0%	0.59
淋病	8	7.3%	9	7.5%	15	5.6%	4	2.9%	12	7.2%	9	10.8%	7	6.2%	64	6.4%	0.41
性器ヘルペス	12	10.9%	20	16.7%	21	7.8%	10	7.1%	12	7.2%	10	12.0%	12	10.6%	97	9.7%	0.22
赤痢アメーバ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	2	2.4%	1	0.9%	4	0.4%	0.10
HIV感染症	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.2%	1	0.9%	4	0.4%	0.53
毛じらみ	10	9.1%	4	3.3%	11	4.1%	9	6.4%	11	6.6%	6	7.2%	10	8.8%	61	6.1%	0.30
その他の性感染症	8	7.3%	8	6.7%	24	9.0%	14	10.0%	16	9.6%	6	7.2%	11	9.7%	87	8.7%	0.49
あなたは、これまでに性感染症について病院やクリニックを受診したことがありますか。																	
ある	56	50.9%	76	63.3%	140	52.2%	75	53.6%	93	56.0%	52	62.7%	66	58.4%	558	55.8%	0.29
ない	54	49.1%	44	36.7%	128	47.8%	65	46.4%	73	44.0%	31	37.3%	47	41.6%	442	44.2%	
病院やクリニックでの対応はいかがでしたか。最も近いものをお答えください。※複数回受診されたことがある方は直近の経験についてお答えください。*1																	
とても良かった	15	26.8%	23	30.3%	38	27.1%	21	28.0%	26	28.0%	20	38.5%	23	34.8%	166	29.7%	0.96
どちらかと言うと良かった	35	62.5%	43	56.6%	76	54.3%	45	60.0%	56	60.2%	26	50.0%	32	48.5%	313	56.1%	
どちらかと言うと悪かった	5	8.9%	9	11.8%	23	16.4%	8	10.7%	9	9.7%	5	9.6%	10	15.2%	69	12.4%	
とても悪かった	1	1.8%	1	1.3%	3	2.1%	1	1.3%	2	2.2%	1	1.9%	1	1.5%	10	1.8%	
これまでに、以下の人と性風俗系のお仕事をしていること(していたこと)について話したことがありますか。_両親や兄弟姉妹と																	
ある	13	11.8%	16	13.3%	26	9.7%	13	9.3%	22	13.3%	16	19.3%	11	9.7%	117	11.7%	0.24
ない	74	67.3%	65	54.2%	170	63.4%	89	63.6%	96	57.8%	40	48.2%	71	62.8%	605	60.5%	
いない	23	20.9%	39	32.5%	72	26.9%	38	27.1%	48	28.9%	27	32.5%	31	27.4%	278	27.8%	
これまでに、以下の人と性風俗系のお仕事をしていること(していたこと)について話したことがありますか。_恋人や大切な人と																	
ある	29	26.4%	37	30.8%	86	32.1%	42	30.0%	53	31.9%	27	32.5%	36	31.9%	310	31.0%	0.62
ない	58	52.7%	53	44.2%	113	42.2%	64	45.7%	73	44.0%	27	32.5%	47	41.6%	435	43.5%	
いない	23	20.9%	30	25.0%	69	25.7%	34	24.3%	40	24.1%	29	34.9%	30	26.5%	255	25.5%	
これまでに、以下の人と性風俗系のお仕事をしていること(していたこと)について話したことがありますか。_友達や知り合いと																	
ある	51	46.4%	51	42.5%	111	41.4%	63	45.0%	73	44.0%	29	34.9%	54	47.8%	432	43.2%	0.72
ない	42	38.2%	40	33.3%	96	35.8%	48	34.3%	61	36.7%	30	36.1%	39	34.5%	356	35.6%	
いない	17	15.5%	29	24.2%	61	22.8%	29	20.7%	32	19.3%	24	28.9%	20	17.7%	212	21.2%	
これまでに、以下の人と性風俗系のお仕事をしていること(していたこと)について話したことがありますか。_過去6ヶ月間にお金に関係なく、プライベートでセックスした相手と																	
ある	16	14.5%	14	11.7%	31	11.6%	23	16.4%	22	13.3%	13	15.7%	15	13.3%	134	13.4%	0.81
ない	53	48.2%	50	41.7%	114	42.5%	63	45.0%	76	45.8%	31	37.3%	54	47.8%	441	44.1%	
いない	41	37.3%	56	46.7%	123	45.9%	54	38.6%	68	41.0%	39	47.0%	44	38.9%	425	42.5%	
これまでに、以下の人と性風俗系のお仕事をしていること(していたこと)について話したことがありますか。_医療関係者と																	
ある	12	10.9%	23	19.2%	33	12.3%	12	8.6%	28	16.9%	7	8.4%	17	15.0%	132	13.2%	0.02
ない	65	59.1%	49	40.8%	131	48.9%	80	57.1%	89	53.6%	36	43.4%	58	51.3%	508	50.8%	
いない	33	30.0%	48	40.0%	104	38.8%	48	34.3%	49	29.5%	40	48.2%	38	33.6%	360	36.0%	
あなたは、友達や知り合いにHIVに感染している人はいると思いますか。																	
いる	2	1.8%	2	1.7%	5	1.9%	2	1.4%	8	4.8%	3	3.6%	3	2.7%	25	2.5%	0.11
いると思う	13	11.8%	13	10.8%	19	7.1%	13	9.3%	15	9.0%	11	13.3%	16	14.2%	100	10.0%	
いないと思う	55	50.0%	51	42.5%	116	43.3%	78	55.7%	76	45.8%	39	47.0%	53	46.9%	468	46.8%	
いない	14	12.7%	20	16.7%	51	19.0%	15	10.7%	32	19.3%	8	9.6%	8	7.1%	148	14.8%	
わからない	26	23.6%	34	28.3%	77	28.7%	32	22.9%	35	21.1%	22	26.5%	33	29.2%	259	25.9%	

*1 :これまでに病院やクリニックを受診したことがあると回答した558人を対象に分析した。

表4 居住地別 性風俗系の仕事についての経験①

	居住地							合計	Pearson カイ乗
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州		
	n=110	n=120	n=268	n=140	n=166	n=83	n=113		
あなたはこれまでに以下のどの場所・方法で、性風俗系のお仕事をしましたか。									
ちよんの間 (旧遊郭)	1 0.9%	2 1.7%	3 1.1%	1 0.7%	6 3.6%	4 4.8%	3 2.7%	20 2.0%	0.19
ソープランド	8 7.3%	12 10.0%	29 10.8%	12 8.6%	14 8.4%	6 7.2%	9 8.0%	90 9.0%	0.90
デリバリー 派遣型ヘルス	36 32.7%	44 36.7%	74 27.6%	41 29.3%	41 24.7%	26 31.3%	36 31.9%	298 29.8%	0.40
店舗型ヘルス	19 17.3%	20 16.7%	55 20.5%	19 13.6%	39 23.5%	17 20.5%	18 15.9%	187 18.7%	0.35
ピンクサロン	7 6.4%	18 15.0%	29 10.8%	16 11.4%	13 7.8%	9 10.8%	5 4.4%	97 9.7%	0.11
路上等で出会って個人的に	18 16.4%	15 12.5%	32 11.9%	25 17.9%	34 20.5%	4 4.8%	6 5.3%	134 13.4%	<0.01
インターネットを活用して個人的に	39 35.5%	53 44.2%	111 41.4%	59 42.1%	74 44.6%	25 30.1%	47 41.6%	408 40.8%	0.33
その他	19 17.3%	20 16.7%	43 16.0%	22 15.7%	26 15.7%	24 28.9%	24 21.2%	178 17.8%	0.15
あなたが、性風俗系のお仕事として、相手にしたことがあるのはどれですか。									
身体を洗う	52 47.3%	66 55.0%	139 51.9%	73 52.1%	82 49.4%	36 43.4%	50 44.2%	498 49.8%	0.53
手コキ	71 64.5%	70 58.3%	173 64.6%	85 60.7%	117 70.5%	49 59.0%	67 59.3%	632 63.2%	0.32
素股	38 34.5%	55 45.8%	119 44.4%	56 40.0%	71 42.8%	28 33.7%	36 31.9%	403 40.3%	0.12
キス	81 73.6%	82 68.3%	200 74.6%	104 74.3%	116 69.9%	54 65.1%	77 68.1%	714 71.4%	0.52
口への指入れ	25 22.7%	35 29.2%	59 22.0%	33 23.6%	38 22.9%	11 13.3%	23 20.4%	224 22.4%	0.27
フェラチオ	84 76.4%	89 74.2%	194 72.4%	98 70.0%	126 75.9%	57 68.7%	80 70.8%	728 72.8%	0.79
膣なめ (ソニンリングス)	49 44.5%	53 44.2%	110 41.0%	59 42.1%	65 39.2%	27 32.5%	34 30.1%	397 39.7%	0.19
膣への指入れ	51 46.4%	54 45.0%	116 43.3%	62 44.3%	74 44.6%	32 38.6%	43 38.1%	432 43.2%	0.84
膣へのベニス挿入 (ヴァギナセックス)	53 48.2%	60 50.0%	141 52.6%	66 47.1%	82 49.4%	30 36.1%	62 54.9%	494 49.4%	0.19
肛門なめ (リミング)	21 19.1%	24 20.0%	55 20.5%	32 22.9%	37 22.3%	15 18.1%	25 22.1%	209 20.9%	0.97
肛門への指入れ	18 16.4%	20 16.7%	38 14.2%	24 17.1%	27 16.3%	9 10.8%	13 11.5%	149 14.9%	0.74
肛門へのベニス挿入 (アナルセックス)	9 8.2%	13 10.8%	28 10.4%	15 10.7%	14 8.4%	5 6.0%	6 5.3%	90 9.0%	0.59
その他	4 3.6%	8 6.7%	14 5.2%	10 7.1%	8 4.8%	10 12.0%	7 6.2%	61 6.1%	0.28
あなたが、性風俗系のお仕事として、相手からされたことがあるのはどれですか。									
身体を洗う	40 36.4%	60 50.0%	107 39.9%	60 42.9%	61 36.7%	29 34.9%	41 36.3%	398 39.8%	0.21
手コキ	13 11.8%	18 15.0%	36 13.4%	30 21.4%	33 19.9%	9 10.8%	13 11.5%	152 15.2%	0.09
素股	18 16.4%	28 23.3%	56 20.9%	39 27.9%	37 22.3%	12 14.5%	16 14.2%	206 20.6%	0.08
キス	81 73.6%	82 68.3%	186 69.4%	96 68.6%	109 65.7%	50 60.2%	76 67.3%	680 68.0%	0.59
口への指入れ	28 25.5%	39 32.5%	68 25.4%	45 32.1%	42 25.3%	13 15.7%	33 29.2%	268 26.8%	0.12
フェラチオ	18 16.4%	20 16.7%	41 15.3%	29 20.7%	33 19.9%	13 15.7%	15 13.3%	169 16.9%	0.65
膣なめ (ソニンリングス)	78 70.9%	85 70.8%	191 71.3%	87 62.1%	109 65.7%	46 55.4%	67 59.3%	663 66.3%	0.04
膣への指入れ	74 67.3%	80 66.7%	182 67.9%	93 66.4%	115 69.3%	51 61.4%	70 61.9%	665 66.5%	0.83
膣へのベニス挿入 (ヴァギナセックス)	69 62.7%	75 62.5%	169 63.1%	88 62.9%	98 59.0%	49 59.0%	70 61.9%	618 61.8%	0.98
肛門なめ (リミング)	18 16.4%	28 23.3%	53 19.8%	30 21.4%	38 22.9%	17 20.5%	27 23.9%	211 21.1%	0.81
肛門への指入れ	13 11.8%	17 14.2%	38 14.2%	20 14.3%	24 14.5%	8 9.6%	15 13.3%	135 13.5%	0.95
肛門へのベニス挿入 (アナルセックス)	12 10.9%	11 9.2%	33 12.3%	17 12.1%	14 8.4%	6 7.2%	8 7.1%	101 10.1%	0.59
その他	4 3.6%	7 5.8%	15 5.6%	11 7.9%	9 5.4%	9 10.8%	8 7.1%	63 6.3%	0.49
あなたが、性風俗系のお仕事として「ソニンパン」だと思えるのはどれですか。									
身体を洗う	0 0.0%	6 5.0%	1 0.4%	7 5.0%	4 2.4%	3 3.6%	3 2.7%	24 2.4%	0.02
手コキ	1 0.9%	4 3.3%	2 0.7%	2 1.4%	5 3.0%	2 2.4%	3 2.7%	19 1.9%	0.48
素股	0 0.0%	4 3.3%	3 1.1%	8 5.7%	7 4.2%	4 4.8%	2 1.8%	28 2.8%	0.04
キス	3 2.7%	3 2.5%	13 4.9%	7 5.0%	9 5.4%	8 9.6%	6 5.3%	49 4.9%	0.35
口への指入れ	0 0.0%	3 2.5%	4 1.5%	6 4.3%	4 2.4%	3 3.6%	3 2.7%	23 2.3%	0.36
フェラチオ	7 6.4%	9 7.5%	18 6.7%	9 6.4%	13 7.8%	12 14.5%	11 9.7%	79 7.9%	0.35
膣なめ (ソニンリングス)	7 6.4%	9 7.5%	17 6.3%	13 9.3%	12 7.2%	9 10.8%	12 10.6%	79 7.9%	0.69
膣への指入れ	5 4.5%	9 7.5%	22 8.2%	15 10.7%	14 8.4%	12 14.5%	9 8.0%	86 8.6%	0.32
膣へのベニス挿入 (ヴァギナセックス)	102 92.7%	102 85.0%	256 95.5%	130 92.9%	150 90.4%	71 85.5%	103 91.2%	914 91.4%	0.01
肛門なめ (リミング)	1 0.9%	11 9.2%	16 6.0%	13 9.3%	10 6.0%	7 8.4%	10 8.8%	68 6.8%	0.12
肛門への指入れ	4 3.6%	9 7.5%	20 7.5%	12 8.6%	11 6.6%	8 9.6%	11 9.7%	75 7.5%	0.66
肛門へのベニス挿入 (アナルセックス)	35 31.8%	42 35.0%	106 39.6%	43 30.7%	56 33.7%	26 31.3%	36 31.9%	344 34.4%	0.54
その他	2 1.8%	5 4.2%	5 1.9%	4 2.9%	3 1.8%	6 7.2%	2 1.8%	27 2.7%	0.15
あなたは、現在も性風俗系のお仕事をしていますか。									
はい	3 2.7%	10 8.3%	16 6.0%	10 7.1%	17 10.2%	5 6.0%	7 6.2%	68 6.8%	0.33
いいえ	107 97.3%	110 91.7%	252 94.0%	130 92.9%	149 89.8%	78 94.0%	106 93.8%	932 93.2%	

表5 居住地別 性風俗系の仕事についての経験②

	居住地							合計 n=68	Pearson カイ乗								
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州										
	n=3	n=10	n=16	n=10	n=17	n=5	n=7										
ここからは、あなたが現在している性風俗のお仕事について伺います。あなたが性風俗のお仕事をする場所は、通常どのくらいの明るさですか。																	
いつも暗い	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	10.0%	3	17.6%	2	40.0%	1	14.3%	8	11.8%	0.68
ほとんどが暗い	0	0.0%	3	30.0%	3	18.8%	4	40.0%	5	29.4%	1	20.0%	0	0.0%	16	23.5%	
どちらかと言うと暗い方が多い	2	66.7%	3	30.0%	5	31.3%	3	30.0%	4	23.5%	1	20.0%	2	28.6%	20	29.4%	
どちらかと言うと明るい方が多い	1	33.3%	2	20.0%	5	31.3%	2	20.0%	1	5.9%	1	20.0%	3	42.9%	15	22.1%	
ほとんどが明るい	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	1	14.3%	5	7.4%	
いつも明るい	0	0.0%	2	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.9%	
あなたが相手に会って、性風俗のお仕事をするまでの間に、通常どのくらいの時間がかかりますか。																	
30分未満	0	0.0%	3	30.0%	2	12.5%	2	20.0%	6	35.3%	2	40.0%	3	42.9%	18	26.5%	0.06
30分～60分未満	2	66.7%	4	40.0%	1	6.3%	0	0.0%	3	17.6%	2	40.0%	2	28.6%	14	20.6%	
60分以上	1	33.3%	3	30.0%	13	81.3%	8	80.0%	8	47.1%	1	20.0%	2	28.6%	36	52.9%	
過去6ヶ月間に、あなたは性風俗のお仕事をしましたか。																	
した	3	100.0%	9	90.0%	15	93.8%	10	100.0%	15	88.2%	5	100.0%	7	100.0%	64	94.1%	0.82
していない	0	0.0%	1	10.0%	1	6.3%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.9%	
過去6ヶ月間に、性風俗のお仕事で、あなたはコンドームをどのくらい使いましたか。 ^{*1}																	
必ず使った	0	0.0%	3	33.3%	7	46.7%	6	60.0%	4	26.7%	2	40.0%	1	14.3%	23	35.9%	0.53
使うことが多かった	0	0.0%	4	44.4%	2	13.3%	3	30.0%	4	26.7%	1	20.0%	3	42.9%	17	26.6%	
五分五分の割合で使った	1	33.3%	0	0.0%	2	13.3%	1	10.0%	4	26.7%	1	20.0%	1	14.3%	10	15.6%	
使わないことが多かった	1	33.3%	2	22.2%	3	20.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	20.0%	1	14.3%	11	17.2%	
全く使わなかった	1	33.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	3	4.7%	
過去6ヶ月間に、性風俗のお仕事でセックスの時に同時に使用したものはありますか。 ^{*1}																	
水溶性ローション(潤滑剤)	2	66.7%	5	55.6%	10	66.7%	7	70.0%	13	86.7%	3	60.0%	4	57.1%	44	68.8%	0.73
ハンドクリーム	0	0.0%	3	33.3%	1	6.7%	2	20.0%	1	6.7%	2	40.0%	0	0.0%	9	14.1%	0.18
ほっき薬(バイアグラなど)	1	33.3%	4	44.4%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	3	60.0%	2	28.6%	12	18.8%	0.02
ラッシュ	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	3	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	6	9.4%	0.51
5M E0-D IPT (ゲメオ・フォクシー)	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	20.0%	0	0.0%	4	6.3%	0.25
スピード・エクスタシー M D M A など)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	20.0%	0	0.0%	2	3.1%	0.35
その他のセックスドラッグ	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	3.1%	0.35
静脈注射のドラッグ	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	20.0%	1	14.3%	7	10.9%	0.38
違法ドラッグ(マリファナ・コカイン・大麻等)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	20.0%	1	14.3%	3	4.7%	0.42
PrEP	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	20.0%	1	14.3%	4	6.3%	0.59
PEP	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	3.1%	0.22
いずれも使用していない	1	33.3%	1	11.1%	5	33.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	11	17.2%	0.21
過去6ヶ月間に、あなたは性風俗のお仕事で「コンバン」をしましたか。 ^{*1}																	
ある	3	100.0%	8	88.9%	11	73.3%	9	90.0%	15	100.0%	3	60.0%	6	85.7%	55	85.9%	0.25
ない	0	0.0%	1	11.1%	4	26.7%	1	10.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	14.3%	9	14.1%	
過去6ヶ月間に、性風俗のお仕事で「コンバン」をしたとき、あなたはコンドームをどのくらい使いましたか。 ^{*2}																	
必ず使った	0	0.0%	4	50.0%	6	54.5%	6	66.7%	9	60.0%	1	33.3%	1	16.7%	27	49.1%	0.03
使うことが多かった	0	0.0%	3	37.5%	2	18.2%	3	33.3%	2	13.3%	1	33.3%	2	33.3%	13	23.6%	
五分五分の割合で使った	1	33.3%	1	12.5%	1	9.1%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	3	50.0%	9	16.4%	
使わないことが多かった	1	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	6.7%	1	33.3%	0	0.0%	5	9.1%	
全く使わなかった	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	

*1 過去6ヶ月間に性風俗の仕事をしたことがあると回答した64人を対象に分析した。

*2 過去6ヶ月間に性風俗の仕事で「コンバン」をしたことがあると回答した55人を対象に分析した。

表6 居住地別 性風俗系の仕事についての意識①

	居住地								合計	Pearson カイ乗
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州			
	n=110	n=120	n=268	n=140	n=166	n=83	n=113	n=1000		
体調が悪ければ、性風俗系のお仕事は休んだ方がよい										
とてもそう思う	93 84.5%	92 76.7%	214 79.9%	114 81.4%	121 72.9%	71 85.5%	91 80.5%	796 79.6%	0.72	
ややそう思う	14 12.7%	23 19.2%	42 15.7%	20 14.3%	33 19.9%	8 9.6%	17 15.0%	157 15.7%		
あまりそう思わない	3 2.7%	3 2.5%	9 3.4%	4 2.9%	7 4.2%	3 3.6%	2 1.8%	31 3.1%		
全くそう思わない	0 0.0%	2 1.7%	3 1.1%	2 1.4%	5 3.0%	1 1.2%	3 2.7%	16 1.6%		
性風俗系のお仕事でセックスする時のほうが、プライベートよりも気持ちが良い										
とてもそう思う	18 16.4%	19 15.8%	43 16.0%	21 15.0%	29 17.5%	19 22.9%	12 10.6%	161 16.1%	0.13	
ややそう思う	6 5.5%	17 14.2%	27 10.1%	19 13.6%	24 14.5%	4 4.8%	15 13.3%	112 11.2%		
あまりそう思わない	32 29.1%	24 20.0%	75 28.0%	42 30.0%	38 22.9%	15 18.1%	25 22.1%	251 25.1%		
全くそう思わない	54 49.1%	60 50.0%	123 45.9%	58 41.4%	75 45.2%	45 54.2%	61 54.0%	476 47.6%		
性風俗系のお仕事をしている間は、目の前の客のことだけを考えたほうがよい										
とてもそう思う	24 21.8%	29 24.2%	73 27.2%	35 25.0%	40 24.1%	25 30.1%	26 23.0%	252 25.2%	0.37	
ややそう思う	39 35.5%	36 30.0%	90 33.6%	43 30.7%	62 37.3%	21 25.3%	36 31.9%	327 32.7%		
あまりそう思わない	31 28.2%	33 27.5%	57 21.3%	47 33.6%	33 19.9%	26 31.3%	31 27.4%	258 25.8%		
全くそう思わない	16 14.5%	22 18.3%	48 17.9%	15 10.7%	31 18.7%	11 13.3%	20 17.7%	163 16.3%		
性風俗系のお仕事でセックスする時に相手が好みのタイプであれば、相手の望み通りにしてほしいと思う										
とてもそう思う	16 14.5%	14 11.7%	45 16.8%	21 15.0%	22 13.3%	19 22.9%	18 15.9%	155 15.5%	0.73	
ややそう思う	49 44.5%	47 39.2%	110 41.0%	60 42.9%	68 41.0%	31 37.3%	42 37.2%	407 40.7%		
あまりそう思わない	28 25.5%	31 25.8%	63 23.5%	42 30.0%	45 27.1%	19 22.9%	34 30.1%	262 26.2%		
全くそう思わない	17 15.5%	28 23.3%	50 18.7%	17 12.1%	31 18.7%	14 16.9%	19 16.8%	176 17.6%		
相手が怒っていたり、不機嫌であれば、性風俗系のお仕事をしている間は、相手の望み通りにする方がよい										
とてもそう思う	7 6.4%	10 8.3%	28 10.4%	17 12.1%	17 10.2%	17 20.5%	8 7.1%	104 10.4%	0.04	
ややそう思う	45 40.9%	52 43.3%	91 34.0%	50 35.7%	61 36.7%	20 24.1%	39 34.5%	358 35.8%		
あまりそう思わない	41 37.3%	31 25.8%	89 33.2%	41 29.3%	59 35.5%	23 27.7%	46 40.7%	330 33.0%		
全くそう思わない	17 15.5%	27 22.5%	60 22.4%	32 22.9%	29 17.5%	23 27.7%	20 17.7%	208 20.8%		
相手から求められた行為でも、嫌なら断ってもよい										
とてもそう思う	70 63.6%	70 58.3%	157 58.6%	89 63.6%	100 60.2%	49 59.0%	63 55.8%	598 59.8%	0.93	
ややそう思う	32 29.1%	40 33.3%	85 31.7%	34 24.3%	51 30.7%	28 33.7%	38 33.6%	308 30.8%		
あまりそう思わない	7 6.4%	8 6.7%	18 6.7%	14 10.0%	10 6.0%	3 3.6%	8 7.1%	68 6.8%		
全くそう思わない	1 0.9%	2 1.7%	8 3.0%	3 2.1%	5 3.0%	3 3.6%	4 3.5%	26 2.6%		
コンドームを使わない方が、相手から喜ばれると思う										
とてもそう思う	13 11.8%	17 14.2%	46 17.2%	23 16.4%	30 18.1%	21 25.3%	16 14.2%	166 16.6%	0.22	
ややそう思う	44 40.0%	50 41.7%	104 38.8%	65 46.4%	61 36.7%	31 37.3%	49 43.4%	404 40.4%		
あまりそう思わない	25 22.7%	22 18.3%	52 19.4%	29 20.7%	37 22.3%	15 18.1%	33 29.2%	213 21.3%		
全くそう思わない	28 25.5%	31 25.8%	66 24.6%	23 16.4%	38 22.9%	16 19.3%	15 13.3%	217 21.7%		
コンドームを使わない方が、次も来てくれると思う										
とてもそう思う	13 11.8%	14 11.7%	41 15.3%	25 17.9%	32 19.3%	20 24.1%	13 11.5%	158 15.8%	0.06	
ややそう思う	33 30.0%	43 35.8%	89 33.2%	61 43.6%	54 32.5%	29 34.9%	44 38.9%	353 35.3%		
あまりそう思わない	37 33.6%	28 23.3%	66 24.6%	30 21.4%	40 24.1%	18 21.7%	36 31.9%	255 25.5%		
全くそう思わない	27 24.5%	35 29.2%	72 26.9%	24 17.1%	40 24.1%	16 19.3%	20 17.7%	234 23.4%		
コンドームを使わない方が、よりお金を得られると思う										
とてもそう思う	15 13.6%	20 16.7%	51 19.0%	33 23.6%	38 22.9%	21 25.3%	26 23.0%	204 20.4%	0.26	
ややそう思う	39 35.5%	51 42.5%	94 35.1%	60 42.9%	62 37.3%	25 30.1%	44 38.9%	375 37.5%		
あまりそう思わない	34 30.9%	22 18.3%	56 20.9%	23 16.4%	33 19.9%	21 25.3%	22 19.5%	211 21.1%		
全くそう思わない	22 20.0%	27 22.5%	67 25.0%	24 17.1%	33 19.9%	16 19.3%	21 18.6%	210 21.0%		
性風俗系のお仕事でセックスする時のほうが、プライベートよりもコンドームは使いやすい										
とてもそう思う	52 47.3%	48 40.0%	121 45.1%	63 45.0%	73 44.0%	44 53.0%	55 48.7%	456 45.6%	0.56	
ややそう思う	35 31.8%	40 33.3%	80 29.9%	43 30.7%	49 29.5%	20 24.1%	39 34.5%	306 30.6%		
あまりそう思わない	12 10.9%	17 14.2%	37 13.8%	27 19.3%	27 16.3%	10 12.0%	13 11.5%	143 14.3%		
全くそう思わない	11 10.0%	15 12.5%	30 11.2%	7 5.0%	17 10.2%	9 10.8%	6 5.3%	95 9.5%		
H IV や性感染症に感染しても、性風俗系の仕事を続けられると思う										
とてもそう思う	3 2.7%	7 5.8%	9 3.4%	9 6.4%	18 10.8%	9 10.8%	4 3.5%	59 5.9%	0.01	
ややそう思う	12 10.9%	14 11.7%	17 6.3%	20 14.3%	26 15.7%	9 10.8%	12 10.6%	110 11.0%		
あまりそう思わない	27 24.5%	26 21.7%	77 28.7%	36 25.7%	39 23.5%	20 24.1%	24 21.2%	249 24.9%		
全くそう思わない	68 61.8%	73 60.8%	165 61.6%	75 53.6%	83 50.0%	45 54.2%	73 64.6%	582 58.2%		
H IV や性感染症に感染したら、そのことを相手に伝える必要があると思う										
とてもそう思う	69 62.7%	74 61.7%	151 56.3%	74 52.9%	86 51.8%	53 63.9%	62 54.9%	569 56.9%	0.44	
ややそう思う	25 22.7%	24 20.0%	60 22.4%	42 30.0%	42 25.3%	17 20.5%	30 26.5%	240 24.0%		
あまりそう思わない	11 10.0%	16 13.3%	28 10.4%	10 7.1%	21 12.7%	9 10.8%	11 9.7%	106 10.6%		
全くそう思わない	5 4.5%	6 5.0%	29 10.8%	14 10.0%	17 10.2%	4 4.8%	10 8.8%	85 8.5%		
相手がH IV や性感染症に感染していたら、そのことを自分に、事前に伝えるべきだと思う										
とてもそう思う	86 78.2%	88 73.3%	201 75.0%	102 72.9%	109 65.7%	68 81.9%	79 69.9%	733 73.3%	0.16	
ややそう思う	16 14.5%	18 15.0%	35 13.1%	25 17.9%	39 23.5%	10 12.0%	23 20.4%	166 16.6%		
あまりそう思わない	6 5.5%	10 8.3%	13 4.9%	6 4.3%	7 4.2%	4 4.8%	5 4.4%	51 5.1%		
全くそう思わない	2 1.8%	4 3.3%	19 7.1%	7 5.0%	11 6.6%	1 1.2%	6 5.3%	50 5.0%		
性風俗系のお仕事をしている (していた) ことは誰にも言えないと思う										
とてもそう思う	68 61.8%	52 43.3%	147 54.9%	87 62.1%	97 58.4%	55 66.3%	64 56.6%	570 57.0%	0.15	
ややそう思う	27 24.5%	41 34.2%	64 23.9%	33 23.6%	34 20.5%	18 21.7%	33 29.2%	250 25.0%		
あまりそう思わない	10 9.1%	17 14.2%	33 12.3%	14 10.0%	23 13.9%	7 8.4%	8 7.1%	112 11.2%		
全くそう思わない	5 4.5%	10 8.3%	24 9.0%	6 4.3%	12 7.2%	3 3.6%	8 7.1%	68 6.8%		

表7 居住地別 性風俗系の仕事についての意識②

	居住地								合計	Pearson カイ乗
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州			
	n=110	n=120	n=268	n=140	n=166	n=83	n=113	n=1000		
エイズ発症をきっかけにH IVに感染していることがわかるより、検査で早めに感染していることがわかったほうがいいと思う										
とてもそう思う	86 78.2%	89 74.2%	194 72.4%	88 62.9%	119 71.7%	55 66.3%	86 76.1%	717 71.7%	0.40	
ややそう思う	19 17.3%	29 24.2%	61 22.8%	42 30.0%	35 21.1%	23 27.7%	19 16.8%	228 22.8%		
あまりそう思わない	5 4.5%	2 1.7%	10 3.7%	7 5.0%	8 4.8%	4 4.8%	6 5.3%	42 4.2%		
全くそう思わない	0 0.0%	0 0.0%	3 1.1%	3 2.1%	4 2.4%	1 1.2%	2 1.8%	13 1.3%		
H IVに感染しているかどうかは、ぎりぎりまであいまいなまましておきたい										
とてもそう思う	2 1.8%	7 5.8%	6 2.2%	7 5.0%	12 7.2%	7 8.4%	3 2.7%	44 4.4%	0.07	
ややそう思う	14 12.7%	16 13.3%	20 7.5%	17 12.1%	21 12.7%	9 10.8%	8 7.1%	105 10.5%		
あまりそう思わない	20 18.2%	27 22.5%	61 22.8%	40 28.6%	39 23.5%	20 24.1%	34 30.1%	241 24.1%		
全くそう思わない	74 67.3%	70 58.3%	181 67.5%	76 54.3%	94 56.6%	47 56.6%	68 60.2%	610 61.0%		
健康を維持するためにH IV抗体検査（エイズ検査）を受けたほうがいいと思う										
とてもそう思う	55 50.0%	58 48.3%	130 48.5%	53 37.9%	71 42.8%	45 54.2%	56 49.6%	468 46.8%	0.11	
ややそう思う	49 44.5%	42 35.0%	102 38.1%	71 50.7%	75 45.2%	27 32.5%	44 38.9%	410 41.0%		
あまりそう思わない	6 5.5%	18 15.0%	27 10.1%	14 10.0%	17 10.2%	10 12.0%	13 11.5%	105 10.5%		
全くそう思わない	0 0.0%	2 1.7%	9 3.4%	2 1.4%	3 1.8%	1 1.2%	0 0.0%	17 1.7%		
H IV抗体検査（エイズ検査）は予防に自信のないセックスをしたときに受けるべきだと思う										
とてもそう思う	32 29.1%	36 30.0%	85 31.7%	37 26.4%	49 29.5%	29 34.9%	30 26.5%	298 29.8%	0.99	
ややそう思う	47 42.7%	51 42.5%	100 37.3%	57 40.7%	68 41.0%	29 34.9%	49 43.4%	401 40.1%		
あまりそう思わない	22 20.0%	22 18.3%	63 23.5%	33 23.6%	33 19.9%	16 19.3%	25 22.1%	214 21.4%		
全くそう思わない	9 8.2%	11 9.2%	20 7.5%	13 9.3%	16 9.6%	9 10.8%	9 8.0%	87 8.7%		
自分の知り合いや友達が多くは、H IV抗体検査（エイズ検査）を定期的に行うのは良いことだと思う										
とてもそう思う	19 17.3%	25 20.8%	62 23.1%	26 18.6%	33 19.9%	27 32.5%	19 16.8%	211 21.1%	0.35	
ややそう思う	38 34.5%	50 41.7%	90 33.6%	52 37.1%	67 40.4%	25 30.1%	48 42.5%	370 37.0%		
あまりそう思わない	45 40.9%	35 29.2%	87 32.5%	53 37.9%	53 31.9%	24 28.9%	39 34.5%	336 33.6%		
全くそう思わない	8 7.3%	10 8.3%	29 10.8%	9 6.4%	13 7.8%	7 8.4%	7 6.2%	83 8.3%		
自分の知り合いや友達が多くは、H IV抗体検査（エイズ検査）を受けていると思う										
とてもそう思う	1 0.9%	11 9.2%	13 4.9%	8 5.7%	13 7.8%	8 9.6%	1 0.9%	55 5.5%	0.03	
ややそう思う	11 10.0%	19 15.8%	27 10.1%	13 9.3%	23 13.9%	9 10.8%	16 14.2%	118 11.8%		
あまりそう思わない	55 50.0%	57 47.5%	115 42.9%	56 40.0%	66 39.8%	38 45.8%	55 48.7%	442 44.2%		
全くそう思わない	43 39.1%	33 27.5%	113 42.2%	63 45.0%	64 38.6%	28 33.7%	41 36.3%	385 38.5%		
自分の知り合いや友達が多くは、H IV抗体検査（エイズ検査）を受けるのが怖いと感じていると思う										
とてもそう思う	19 17.3%	23 19.2%	39 14.6%	34 24.3%	39 23.5%	19 22.9%	23 20.4%	196 19.6%	0.69	
ややそう思う	52 47.3%	54 45.0%	114 42.5%	57 40.7%	68 41.0%	38 45.8%	49 43.4%	432 43.2%		
あまりそう思わない	32 29.1%	37 30.8%	89 33.2%	38 27.1%	44 26.5%	21 25.3%	34 30.1%	295 29.5%		
全くそう思わない	7 6.4%	6 5.0%	26 9.7%	11 7.9%	15 9.0%	5 6.0%	7 6.2%	77 7.7%		
自分の知り合いや友達が多くは、自分がH IV抗体検査（エイズ検査）を利用しているのを他人に知られたくないと思っていると思う										
とてもそう思う	50 45.5%	45 37.5%	108 40.3%	59 42.1%	61 36.7%	37 44.6%	49 43.4%	409 40.9%	0.17	
ややそう思う	41 37.3%	58 48.3%	106 39.6%	56 40.0%	72 43.4%	28 33.7%	39 34.5%	400 40.0%		
あまりそう思わない	19 17.3%	12 10.0%	33 12.3%	18 12.9%	26 15.7%	16 19.3%	18 15.9%	142 14.2%		
全くそう思わない	0 0.0%	5 4.2%	21 7.8%	7 5.0%	7 4.2%	2 2.4%	7 6.2%	49 4.9%		
H IV感染症は、死に至る病であると感じる										
とてもそう思う	43 39.1%	35 29.2%	104 38.8%	56 40.0%	55 33.1%	35 42.2%	55 48.7%	383 38.3%	0.01	
ややそう思う	50 45.5%	67 55.8%	105 39.2%	66 47.1%	67 40.4%	32 38.6%	35 31.0%	422 42.2%		
あまりそう思わない	15 13.6%	15 12.5%	45 16.8%	11 7.9%	35 21.1%	14 16.9%	20 17.7%	155 15.5%		
全くそう思わない	2 1.8%	3 2.5%	14 5.2%	7 5.0%	9 5.4%	2 2.4%	3 2.7%	40 4.0%		
H IVに感染していても、自分は今と同じように働いたり、生活することができると思う										
とてもそう思う	15 13.6%	22 18.3%	36 13.4%	22 15.7%	28 16.9%	18 21.7%	17 15.0%	158 15.8%	0.43	
ややそう思う	37 33.6%	45 37.5%	101 37.7%	53 37.9%	69 41.6%	28 33.7%	32 28.3%	365 36.5%		
あまりそう思わない	48 43.6%	47 39.2%	98 36.6%	51 36.4%	53 31.9%	27 32.5%	47 41.6%	371 37.1%		
全くそう思わない	10 9.1%	6 5.0%	33 12.3%	14 10.0%	16 9.6%	10 12.0%	17 15.0%	106 10.6%		
H IVに感染したら、セックスをする前に、相手にそのことを伝えたいと思う										
とてもそう思う	62 56.4%	68 56.7%	155 57.8%	64 45.7%	85 51.2%	51 61.4%	59 52.2%	544 54.4%	0.60	
ややそう思う	31 28.2%	40 33.3%	74 27.6%	53 37.9%	51 30.7%	21 25.3%	35 31.0%	305 30.5%		
あまりそう思わない	14 12.7%	10 8.3%	26 9.7%	16 11.4%	22 13.3%	9 10.8%	16 14.2%	113 11.3%		
全くそう思わない	3 2.7%	2 1.7%	13 4.9%	7 5.0%	8 4.8%	2 2.4%	3 2.7%	38 3.8%		
H IVに感染したら、恋愛や結婚はあきらめなければならぬと思う										
とてもそう思う	36 32.7%	26 21.7%	64 23.9%	37 26.4%	44 26.5%	27 32.5%	30 26.5%	264 26.4%	0.70	
ややそう思う	49 44.5%	53 44.2%	107 39.9%	56 40.0%	62 37.3%	31 37.3%	47 41.6%	405 40.5%		
あまりそう思わない	20 18.2%	30 25.0%	71 26.5%	35 25.0%	43 25.9%	19 22.9%	31 27.4%	249 24.9%		
全くそう思わない	5 4.5%	11 9.2%	26 9.7%	12 8.6%	17 10.2%	6 7.2%	5 4.4%	82 8.2%		
性感染症に感染すれば、自分自身を振り返って悪いことしたなと感じる										
とてもそう思う	49 44.5%	47 39.2%	105 39.2%	59 42.1%	69 41.6%	46 55.4%	51 45.1%	426 42.6%	0.33	
ややそう思う	42 38.2%	51 42.5%	120 44.8%	64 45.7%	60 36.1%	25 30.1%	44 38.9%	406 40.6%		
あまりそう思わない	17 15.5%	19 15.8%	34 12.7%	14 10.0%	29 17.5%	8 9.6%	12 10.6%	133 13.3%		
全くそう思わない	2 1.8%	3 2.5%	9 3.4%	3 2.1%	8 4.8%	4 4.8%	6 5.3%	35 3.5%		
性感染症に感染すれば、セックスをする相手を見つげにくくなると思う										
とてもそう思う	55 50.0%	61 50.8%	137 51.1%	66 47.1%	80 48.2%	39 47.0%	59 52.2%	497 49.7%	0.89	
ややそう思う	39 35.5%	43 35.8%	93 34.7%	54 38.6%	57 34.3%	27 32.5%	38 33.6%	351 35.1%		
あまりそう思わない	11 10.0%	14 11.7%	30 11.2%	15 10.7%	19 11.4%	14 16.9%	15 13.3%	118 11.8%		
全くそう思わない	5 4.5%	2 1.7%	8 3.0%	5 3.6%	10 6.0%	3 3.6%	1 0.9%	34 3.4%		

表8 居住地別 性風俗系の仕事についての意識③および知識

	居住地							合計	Pearson カイ乗
	北海道/東北	東京都	東京都を除く 関東/甲信越	北陸/東海	近畿	中国/四国	九州		
	n=110	n=120	n=268	n=140	n=166	n=83	n=113		
性感染症に感染すれば、友達と今までのようにはつきあえなくなると思う									
とてもそう思う	17 15.5%	12 10.0%	39 14.6%	23 16.4%	26 15.7%	26 31.3%	16 14.2%	159 15.9%	0.04
ややそう思う	39 35.5%	44 36.7%	86 32.1%	53 37.9%	51 30.7%	14 16.9%	39 34.5%	326 32.6%	
あまりそう思わない	40 36.4%	45 37.5%	97 36.2%	40 28.6%	55 33.1%	26 31.3%	40 35.4%	343 34.3%	
全くそう思わない	14 12.7%	19 15.8%	46 17.2%	24 17.1%	34 20.5%	17 20.5%	18 15.9%	172 17.2%	
性感染症に感染したことが周りの友達に知られたら、嫌な印象を持たれると思う									
とてもそう思う	63 57.3%	47 39.2%	128 47.8%	66 47.1%	80 48.2%	46 55.4%	63 55.8%	493 49.3%	0.18
ややそう思う	36 32.7%	56 46.7%	100 37.3%	54 38.6%	56 33.7%	24 28.9%	42 37.2%	368 36.8%	
あまりそう思わない	9 8.2%	13 10.8%	34 12.7%	16 11.4%	20 12.0%	10 12.0%	6 5.3%	108 10.8%	
全くそう思わない	2 1.8%	4 3.3%	6 2.2%	4 2.9%	10 6.0%	3 3.6%	2 1.8%	31 3.1%	
H IVを持っている人はセックスをする前に、そのことを相手に話すべきだと思う									
とてもそう思う	88 80.0%	91 75.8%	195 72.8%	91 65.0%	116 69.9%	66 79.5%	89 78.8%	736 73.6%	0.45
ややそう思う	18 16.4%	24 20.0%	53 19.8%	38 27.1%	39 23.5%	13 15.7%	20 17.7%	205 20.5%	
あまりそう思わない	2 1.8%	4 3.3%	16 6.0%	8 5.7%	7 4.2%	2 2.4%	4 3.5%	43 4.3%	
全くそう思わない	2 1.8%	1 0.8%	4 1.5%	3 2.1%	4 2.4%	2 2.4%	0 0.0%	16 1.6%	
最近、わが国のH IVの感染経路は性行為によるものが最も多い									
正しい	81 73.6%	91 75.8%	186 69.4%	93 66.4%	123 74.1%	61 73.5%	81 71.7%	716 71.6%	0.76
正しくない	4 3.6%	5 4.2%	16 6.0%	12 8.6%	13 7.8%	6 7.2%	7 6.2%	63 6.3%	
わからない	25 22.7%	24 20.0%	66 24.6%	35 25.0%	30 18.1%	16 19.3%	25 22.1%	221 22.1%	
H IV感染症は医療の進歩で、服薬を継続することでエイズ発症をコントロールできる病気となった									
正しい	58 52.7%	73 60.8%	149 55.6%	74 52.9%	98 59.0%	51 61.4%	69 61.1%	572 57.2%	0.69
正しくない	8 7.3%	11 9.2%	15 5.6%	12 8.6%	10 6.0%	8 9.6%	7 6.2%	71 7.1%	
わからない	44 40.0%	36 30.0%	104 38.8%	54 38.6%	58 34.9%	24 28.9%	37 32.7%	357 35.7%	
適切な治療を行えば、H IVに感染しても、感染していない人とほぼ同じ寿命を生きることができる									
正しい	50 45.5%	66 55.0%	129 48.1%	66 47.1%	86 51.8%	46 55.4%	51 45.1%	494 49.4%	0.39
正しくない	14 12.7%	11 9.2%	23 8.6%	9 6.4%	9 5.4%	9 10.8%	14 12.4%	89 8.9%	
わからない	46 41.8%	43 35.8%	116 43.3%	65 46.4%	71 42.8%	28 33.7%	48 42.5%	417 41.7%	
適切に治療することにより、他の人へH IVを感染させる危険性をほぼ減らすことができる									
正しい	51 46.4%	59 49.2%	131 48.9%	74 52.9%	83 50.0%	38 45.8%	50 44.2%	486 48.6%	0.74
正しくない	19 17.3%	18 15.0%	34 12.7%	21 15.0%	25 15.1%	13 15.7%	26 23.0%	156 15.6%	
わからない	40 36.4%	43 35.8%	103 38.4%	45 32.1%	58 34.9%	32 38.6%	37 32.7%	358 35.8%	
H IV感染により免疫が低下すると、さまざまな性感染症（性病）や悪性腫瘍（がん）にかかりやすくなる									
正しい	71 64.5%	83 69.2%	155 57.8%	76 54.3%	97 58.4%	52 62.7%	78 69.0%	612 61.2%	0.07
正しくない	2 1.8%	4 3.3%	13 4.9%	5 3.6%	6 3.6%	4 4.8%	9 8.0%	43 4.3%	
わからない	37 33.6%	33 27.5%	100 37.3%	59 42.1%	63 38.0%	27 32.5%	26 23.0%	345 34.5%	
通常のH IV抗体検査（エイズ検査）では、H IVに感染してから2～3ヶ月経過しないと感染しているかどうかわからない									
正しい	48 43.6%	53 44.2%	92 34.3%	49 35.0%	69 41.6%	32 38.6%	46 40.7%	389 38.9%	0.08
正しくない	4 3.6%	12 10.0%	22 8.2%	13 9.3%	11 6.6%	14 16.9%	7 6.2%	83 8.3%	
わからない	58 52.7%	55 45.8%	154 57.5%	78 55.7%	86 51.8%	37 44.6%	60 53.1%	528 52.8%	
H IV即日検査や郵送検査キットでは感染していても陽性（感染している）と結果が出ることもある									
正しい	23 20.9%	28 23.3%	54 20.1%	29 20.7%	37 22.3%	19 22.9%	23 20.4%	213 21.3%	0.81
正しくない	5 4.5%	12 10.0%	23 8.6%	13 9.3%	20 12.0%	11 13.3%	10 8.8%	94 9.4%	
わからない	82 74.5%	80 66.7%	191 71.3%	98 70.0%	109 65.7%	53 63.9%	80 70.8%	693 69.3%	
H IV即日検査や郵送検査キットでは、検査結果を確認するため病院などで再度検査が必要になる場合がある									
正しい	53 48.2%	54 45.0%	124 46.3%	57 40.7%	77 46.4%	36 43.4%	54 47.8%	455 45.5%	0.55
正しくない	1 0.9%	6 5.0%	19 7.1%	7 5.0%	7 4.2%	2 2.4%	7 6.2%	49 4.9%	
わからない	56 50.9%	60 50.0%	125 46.6%	76 54.3%	82 49.4%	45 54.2%	52 46.0%	496 49.6%	
保健所では名前を言わずに無料でH IV抗体検査（エイズ検査）ができる									
正しい	78 70.9%	84 70.0%	168 62.7%	82 58.6%	102 61.4%	55 66.3%	81 71.7%	650 65.0%	0.45
正しくない	3 2.7%	4 3.3%	11 4.1%	8 5.7%	6 3.6%	3 3.6%	1 0.9%	36 3.6%	
わからない	29 26.4%	32 26.7%	89 33.2%	50 35.7%	58 34.9%	25 30.1%	31 27.4%	314 31.4%	
性感染症（性病）に感染していると、H IVに感染しやすくなる									
正しい	29 26.4%	50 41.7%	80 29.9%	39 27.9%	65 39.2%	33 39.8%	39 34.5%	335 33.5%	0.02
正しくない	15 13.6%	9 7.5%	30 11.2%	19 13.6%	23 13.9%	17 20.5%	16 14.2%	129 12.9%	
わからない	66 60.0%	61 50.8%	158 59.0%	82 58.6%	78 47.0%	33 39.8%	58 51.3%	536 53.6%	