

Table 10 . Logistic 回帰分析による DIMS 対するダイオキシン類総 TEQ 四分位範囲と RLS/WED 関連症状のオッズ比

	Unadjusted		Adjusted*	
	p value	Odds ratio (95% CI)	p value	Odds ratio (95% CI)
<b>Total TEQ</b>				
Q1: < 20 pg-TEQ/g lipid		1		1
Q2: 20-35 pg-TEQ/g lipid	< 0.001	1.94 (1.34-2.83)	0.004	1.89 (1.23-2.89)
Q3: 35-62 pg-TEQ/g lipid	0.02	1.79 (1.23-2.60)	0.04	1.62 (1.02-2.57)
Q4: ≥ 62 pg-TEQ/g lipid	< 0.001	2.74 (1.87-4.02)	0.006	2.09 (1.24-3.53)
<b>RLS/WED related symptoms</b>				
Non-LMR		1		1
LMR	< 0.001	2.46 (1.81-3.34)	< 0.001	2.35 (1.71-3.24)
RLS/WED	0.04	1.67 (1.02-2.75)	0.04	1.74 (1.04-2.91)

\*年齢 , 性別 , BMI , 習慣性飲酒 , 及び喫煙状況で調整した . ダイオキシン類血中濃度の総 TEQ は Q1 , Q2 , Q3 及び Q4 の四分位に分割した . DIMS, difficulty initiating and/or maintaining sleep; LMR, leg motor restlessness; RLS/WED, restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease; TEQ, toxic equivalent quantity .