

「潰瘍性大腸炎、Crohn 病に合併した小腸、大腸癌の特徴と予後
- Crohn 病の直腸肛門管癌（痔瘻癌を含む）に対する surveillance program の検証」

研究分担者 杉田昭 横浜市立市民病院 臨床研究部 部長

研究要旨

本邦の Crohn 病に合併する大腸癌は欧米の報告と異なり、直腸肛門管（痔瘻癌を含む）が多くを占める。本研究班では本症に合併した直腸、肛門管癌に対して早期診断を目的とした surveillance program（案）を作成し、有症状例の診断手順とともに平成 26 年度本研究班業績集に掲載した。10 年以上経過した直腸、肛門病変（痔瘻を含む）をもつ Crohn 病症例を対象とし、症例集積を本研究班協力施設で更に継続しており、本 program での surveillance を施行した症例は 2017 年 1 月で登録 497 例で、25 例（5.0%）に悪性腫瘍が診断され、2019 年 1 月には登録例が 576 例と増加、30 例（5.2%）と高頻度に直腸肛門管の悪性腫瘍が診断されている。内訳は直腸肛門管癌 26 例、痔瘻癌 2 例、直腸 group4 1 例、dysplasia1 例であった。本 surveillance program は直腸肛門管の発見率が高く、癌合併例は初回だけでなく、33%は検査の継続によって診断されていることから、surveillance program として有用と考えられた。今後は更に対象とする症例数を増やすとともに、現在までの登録例のうち癌合併例を除き、現時点で本 program による癌 surveillance が施行されている症例に定期的に施行するとともに、本サーベイランスで診断された癌症例の予後を分析して本 surveillance program が予後に寄与するか否かを検証していく予定である。また、本 surveillance program の施行には経験が重要な要素であることから、施行法の啓蒙や施行施設のセンター化も検討課題とする予定である。

共同研究者

二見喜太郎	福岡大学筑紫病院	外科
根津理一郎	西宮市立中央病院	外科
池内浩基	兵庫医科大学	炎症性腸疾患学講座外科部門
舟山裕士	仙台赤十字病院	外科
渡辺和宏	東北大学	胃腸外科
小金井一隆	横浜市立市民病院	炎症性腸疾患科
古川聡美	東京山手メディカルセンター	大腸肛門病センター
水島恒和	大阪大学	消化器外科
高橋賢一	東北労災病院	大腸肛門病センター
渡辺憲治	大阪市立大学	消化器内科
畑啓介	東京大学	腫瘍外科

A. 研究目的

本プロジェクト研究は本邦での潰瘍性大腸炎に合併した大腸癌、および Crohn 病に合併した小腸、大腸癌の特徴と治療後の予後を分析し、生存率の向上のための指針を考案することを目的としている。

Crohn 病では進行癌で発見されるために予後が不良である大腸癌の早期診断に対する対策が必要である。本邦で本症に合併する大腸癌は、欧米で多く合併する結腸癌もみられるものの、痔瘻癌を含む直腸、肛門管癌が多いことが本研究班の結果を含めて明らかになった。本研究班の癌 surveillance についての pilot study の結果に基づいて、癌の合併を疑わせる有症状例の診断手順の作成に加え、本邦独自の直腸肛門管癌（痔瘻癌を含む）に対する癌 surveillance program（案）

を作成、平成 26 年度業績集に掲載した (1)。

本プロジェクトでは本 surveillance program に参加している各施設での症例を更に集積するとともに、現時点で登録された症例のうち、本 surveillance program を定期的に施行する予定の症例を選定して surveillance を継続し、program の有用性を検討している。

B. 研究方法

本研究班で作成した癌 surveillance program 施行例をさらに増加させ、その有用性を検討するとともに、現時点での各施設で本 surveillance program を定期的に施行する予定の症例を現時点で選定し、癌合併例発見の有無を見ることによりその有用性を検討した。

対象患者を 10 年以上経過した直腸、肛門病変(痔瘻を含む)をもつ Crohn 病症例(直腸空置例を含む)とし、共同研究参加施設で直腸、肛門管病変部および痔瘻から生検、または細胞診を行って直腸肛門管癌の診断を行った。また、選定した定期的癌サーベイランス症例での癌発生率を検証することとした。

(倫理面への配慮)

参加施設の症例を匿名化して結果を集積、分析した。

C. 研究結果

1. 癌診断率 (表 - 1)

本 surveillance program に基づいて検査結果を経時的にみると、増加する施行症例数に対して癌発見率は約 5%と高頻度であった。2020 年 1 月には Crohn 病症例は 576 例と増加し、直腸肛門管の悪性腫瘍(痔瘻癌を含む)は 30 例(5.2%)と高頻度に診断された(直腸癌 26 例、痔瘻癌 2 例、直腸 group 4 1 例、dysplasia 1 例)(表 - 2)。診断方法は大腸内視鏡検査生検が 11 例、麻酔下生検が 14 例(5 例は確認中)であった。癌診断例中 33%(10/30 例)は癌 surveillance program に記載されているように定期的に検査を繰り返した症例であった。

D. 考察

Crohn 病の直腸肛門管癌(痔瘻癌を含む)に対する本 surveillance program 施行症例数が年々経時的に増加した結果は、癌発見率が従来からの結果と同様に約 5%と高値を示しており、本 program は癌 surveillance 法として有効と考えられた。また、癌発見例の 33%が繰り返しの検査で診断されており、本 program の有用性が示されたと考えられる。今後は更に対象とする症例数を増やすとともに、現在までの登録例のうち癌合併例を除き、現時点で本 program による癌 surveillance を定期的に施行するとともに、本サーベイランスで診断された癌症例の予後を分析して本 surveillance program が予後に寄与するか否かを検証していく予定である。

本 surveillance program の施行には経験が重要な要素であることから、施行法の啓蒙や施行施設のセンター化も検討課題とする予定である。s

E. 結論

Crohn 病の直腸肛門管癌(痔瘻癌を含む)に対する本 surveillance program は癌 surveillance として有効と考えられた。今後は本 surveillance program に参加する症例の集積とともに、現時点で登録された症例のうち、本 surveillance program を定期的に施行する予定と選定した症例について surveillance を継続して癌発見に対する本 surveillance program の有用性と患者の予後に寄与するか否かを検証することが必要である。

F. 健康危険情報

なし

G: 研究報告

1. 学会発表

- Sugita A, Futami K, Nezu R, et al: The Analysis of colorectal cancer with Crohn's Disease and pilot study of cancer surveillance by multicenter analysis in Japan. ASCRS Annual Scientific Meeting. May 17-21 2014 Hollywood Florida,

- Sugita A: Cancer surveillance in IBD. 15th Asia Pacific Federation of Coloproctology Congress. October 5-7, 2015 Melbourne,

H. 知的財産権の出願、登録状況
なし

I. 文献

1) 杉田昭：潰瘍性大腸炎、Crohn 病に合併した小腸、大腸癌の特徴と予後 - 第 10 報 - . 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業 難治性炎症性腸管障害に関する調査研究. 平成 26 年度総括、分担研究報告書. P117-119

表-1. Crohn病に対する直腸肛門管癌surveillance program施行
-全施設(2020/1/23現在)-

◆症例576例(572← 554← 447←422←372←340←302)

◆直腸肛門部悪性腫瘍合併 5.2%(30例)
(4.7%:27例← 4.8%:27例← 5.1%:23例←5.0%:21例←4.8%:18例
←5.3%:18例←4.6%:14例)

直腸癌	26例
痔瘻癌	2
Group 4	1
Dysplasia	1