

表6. クリニック調査 基本属性

◆平均年齢		有効回答数		141		平均値		38.40		中央値		37.00		標準偏差		10.875		最小値		20		最大値		66	
		20代		30代		40歳以上		全体		p値															
		n (%)		n (%)		n (%)		n (%)																	
◆性別		n=34		n=43		n=64		n=141																	
男性		9 (26.5)		12 (27.9)		18 (28.1)		39 (27.7)		0.234															
女性		18 (52.9)		20 (46.5)		40 (62.5)		78 (55.3)																	
ゲイ・バイセクシュアル男性(以下、G・B男性とする)		7 (20.6)		11 (25.6)		6 (9.4)		24 (17.0)																	
◆職業を教えてください。(複数回答)		n=9		n=12		n=18		n=39																	
①男性		n=9		n=12		n=18		n=39																	
学生		2 (22.2)		-		-		2 (5.1)		0.030															
会社員		6 (66.7)		11 (91.7)		11 (61.1)		28 (71.8)		0.176															
公務員		-		-		-		-		-															
自営業		1 (11.1)		-		7 (38.9)		8 (20.5)		0.026															
性風俗店勤務		-		-		-		-		-															
主婦		-		-		-		-		-															
アルバイト・フリーター		-		-		-		-		-															
無職		-		-		-		-		-															
その他		-		1 (8.3)		-		1 (2.6)		0.315															
②女性		n=18		n=20		n=40		n=78																	
学生		7 (38.9)		-		-		7 (9.0)		0.000															
会社員		3 (16.7)		1 (5.0)		5 (12.5)		9 (11.5)		0.512															
公務員		-		-		1 (2.5)		1 (1.3)		0.618															
自営業		-		-		2 (5.0)		2 (2.6)		0.377															
性風俗店勤務		10 (55.6)		19 (95.0)		28 (70.0)		57 (73.1)		0.019															
主婦		-		3 (15.0)		7 (17.5)		10 (12.8)		0.172															
アルバイト・フリーター		2 (11.1)		-		5 (12.5)		7 (9.0)		0.262															
無職		-		-		-		-		-															
その他		-		-		1 (2.5)		1 (1.3)		0.618															
①+②全体		n=27		n=32		n=58		n=117																	
学生		9 (33.3)		-		-		9 (7.7)		0.000															
会社員		9 (33.3)		12 (37.5)		16 (27.6)		37 (31.6)		0.611															
公務員		-		-		1 (1.7)		1 (0.9)		0.599															
自営業		1 (3.7)		-		9 (15.5)		10 (8.5)		0.025															
性風俗店勤務		10 (37.0)		19 (59.4)		28 (48.3)		57 (48.7)		0.231															
主婦		-		3 (9.4)		7 (12.1)		10 (8.5)		0.176															
アルバイト・フリーター		2 (7.4)		-		5 (8.6)		7 (6.0)		0.240															
無職		-		-		-		-		-															
その他		-		1 (3.1)		1 (1.7)		2 (1.7)		0.653															
③G・B男性		n=7		n=11		n=6		n=24																	
学生		1 (14.3)		-		-		1 (4.2)		0.282															
会社員		5 (71.4)		6 (54.5)		2 (33.3)		13 (54.2)		0.389															
公務員		-		1 (9.1)		1 (16.7)		2 (8.3)		0.552															
自営業		1 (14.3)		2 (18.2)		2 (33.3)		5 (20.8)		0.671															
性風俗店勤務		-		-		-		-		-															
主婦		-		-		-		-		-															
アルバイト・フリーター		-		1 (9.1)		-		1 (4.2)		0.540															
無職		-		-		1 (16.7)		1 (4.2)		0.209															
その他		-		1 (9.1)		-		1 (4.2)		0.540															
①~③全体		n=34		n=43		n=64		n=141																	
学生		10 (29.4)		-		-		10 (7.1)		0.000															
会社員		14 (41.2)		18 (41.9)		18 (28.1)		50 (35.5)		0.252															
公務員		-		1 (2.3)		2 (3.1)		3 (2.1)		0.591															
自営業		2 (5.9)		2 (4.7)		11 (17.2)		15 (10.6)		0.070															
性風俗店勤務		10 (29.4)		19 (44.2)		28 (43.8)		57 (40.4)		0.323															
主婦		-		3 (7.0)		7 (10.9)		10 (7.1)		0.133															
アルバイト・フリーター		2 (5.9)		1 (2.3)		5 (7.8)		8 (5.7)		0.484															
無職		-		-		1 (1.6)		1 (0.7)		0.546															
その他		-		2 (4.7)		1 (1.6)		3 (2.1)		0.341															

表7. クリニック調査_HIV/STI感染既往の有無

	20代		30代		40歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでに、HIV検査を受けたことがありますか？									
①男性	n=9		n=12		n=18		n=39		0.305
	ある	6 (66.7)	7 (58.3)	15 (83.3)	28 (71.8)				
	ない	3 (33.3)	5 (41.7)	3 (16.7)	11 (28.2)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
②女性	n=18		n=20		n=40		n=78		0.028
	ある	9 (50.0)	18 (90.0)	32 (80.0)	59 (75.6)				
	ない	9 (50.0)	2 (10.0)	7 (17.5)	18 (23.1)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	1 (2.5)	1 (1.3)				
①+② 全体	n=27		n=32		n=58		n=117		0.079
	ある	15 (55.6)	25 (78.1)	47 (81.0)	87 (74.4)				
	ない	12 (44.4)	7 (21.9)	10 (17.2)	29 (24.8)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.7)	1 (0.9)				
③G・B 男性	n=7		n=11		n=6		n=24		0.071
	ある	5 (71.4)	11 (100.0)	6 (100.0)	22 (91.7)				
	ない	2 (28.6)	- (0.0)	- (0.0)	2 (8.3)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
①~③ 全体	n=34		n=43		n=64		n=141		0.030
	ある	20 (58.8)	36 (83.7)	53 (82.8)	109 (77.3)				
	ない	14 (41.2)	7 (16.3)	10 (15.6)	31 (22.0)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.6)	1 (0.7)				
◆これまでに、HIVに感染したことがありますか？※1									
①男性	n=6		n=7		n=15		n=28		0.557
	ある	1 (16.7)	- (0.0)	2 (13.3)	3 (10.7)				
	ない	5 (83.3)	7 (100.0)	13 (86.7)	25 (89.3)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
②女性	n=9		n=18		n=32		n=59		0.651
	ある	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	ない	9 (100.0)	18 (100.0)	31 (96.9)	58 (98.3)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	1 (3.1)	1 (1.7)				
①+② 全体	n=15		n=25		n=47		n=87		0.675
	ある	1 (6.7)	- (0.0)	2 (4.3)	3 (3.4)				
	ない	14 (93.3)	25 (100.0)	44 (93.6)	83 (95.4)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	1 (2.1)	1 (1.1)				
③G・B 男性	n=5		n=11		n=6		n=22		0.180
	ある	1 (20.0)	- (0.0)	- (0.0)	1 (4.5)				
	ない	4 (80.0)	11 (100.0)	5 (83.3)	20 (90.9)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	1 (16.7)	1 (4.5)				
①~③ 全体	n=20		n=36		n=53		n=109		0.214
	ある	2 (10.0)	- (0.0)	2 (3.8)	4 (3.7)				
	ない	18 (90.0)	36 (100.0)	49 (92.5)	103 (94.5)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	2 (3.8)	2 (1.8)				

※1 HIV検査(エイズ検査)を受けたことがあるものを分母とする。

表7. クリニック調査_HIV/STI感染既往の有無

	20代		30代		40歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆これまでに、HIVを除く性感染症検査を受けたことがありますか？									
①男性	n=9		n=12		n=18		n=39		0.150
	ある	5 (55.6)	11 (91.7)	14 (77.8)	30 (76.9)				
	ない	4 (44.4)	1 (8.3)	4 (22.2)	9 (23.1)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
②女性	n=18		n=20		n=40		n=78		0.491
	ある	15 (83.3)	20 (100.0)	36 (90.0)	71 (91.0)				
	ない	2 (11.1)	- (0.0)	3 (7.5)	5 (6.4)				
	無回答/無効回答	1 (5.6)	- (0.0)	1 (2.5)	2 (2.6)				
①+② 全体	n=27		n=32		n=58		n=117		0.163
	ある	20 (74.1)	31 (96.9)	50 (86.2)	101 (86.3)				
	ない	6 (22.2)	1 (3.1)	7 (12.1)	14 (12.0)				
	無回答/無効回答	1 (3.7)	- (0.0)	1 (1.7)	2 (1.7)				
③G・B 男性	n=7		n=11		n=6		n=24		0.071
	ある	5 (71.4)	11 (100.0)	6 (100.0)	22 (91.7)				
	ない	2 (28.6)	- (0.0)	- (0.0)	2 (8.3)				
	無回答/無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
①~③ 全体	n=34		n=43		n=64		n=141		0.041
	ある	25 (73.5)	42 (97.7)	56 (87.5)	123 (87.2)				
	ない	8 (23.5)	1 (2.3)	7 (10.9)	16 (11.3)				
	無回答/無効回答	1 (2.9)	- (0.0)	1 (1.6)	2 (1.4)				
◆これまでに、次の性感染症にかかったことがありますか？※2									
①男性	n=5		n=11		n=14		n=30		0.149
	梅毒	- (0.0)	- (0.0)	3 (21.4)	3 (10.0)				
	B型肝炎	- (0.0)	- (0.0)	1 (7.1)	1 (3.3)				
	淋菌感染症	- (0.0)	2 (18.2)	2 (14.3)	4 (13.3)				
	クラミジア	1 (20.0)	2 (18.2)	7 (50.0)	10 (33.3)				
	いずれかある	1 (20.0)	4 (36.4)	10 (71.4)	15 (50.0)				
②女性	n=15		n=20		n=36		n=71		0.767
	梅毒	2 (13.3)	4 (20.0)	8 (22.2)	14 (19.7)				
	B型肝炎	- (0.0)	1 (5.0)	1 (2.8)	2 (2.8)				
	淋菌感染症	6 (40.0)	9 (45.0)	18 (50.0)	33 (46.5)				
	クラミジア	9 (60.0)	18 (90.0)	31 (86.1)	58 (81.7)				
	いずれかある	11 (73.3)	20 (100.0)	32 (88.9)	63 (88.7)				
①+② 全体	n=20		n=31		n=50		n=101		0.375
	梅毒	2 (10.0)	4 (12.9)	11 (22.0)	17 (16.8)				
	B型肝炎	- (0.0)	1 (3.2)	2 (4.0)	3 (3.0)				
	淋菌感染症	6 (30.0)	11 (35.5)	20 (40.0)	37 (36.6)				
	クラミジア	10 (50.0)	20 (64.5)	38 (76.0)	68 (67.3)				
	いずれかある	12 (60.0)	24 (77.4)	42 (84.0)	78 (77.2)				
③G・B 男性	n=5		n=11		n=6		n=22		0.548
	梅毒	1 (20.0)	5 (45.5)	3 (50.0)	9 (40.9)				
	B型肝炎	- (0.0)	- (0.0)	1 (16.7)	1 (4.5)				
	淋菌感染症	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	クラミジア	2 (40.0)	2 (18.2)	1 (16.7)	5 (22.7)				
	いずれかある	3 (60.0)	6 (54.5)	5 (83.3)	14 (63.6)				
①~③ 全体	n=25		n=42		n=56		n=123		0.416
	梅毒	3 (12.0)	9 (21.4)	14 (25.0)	26 (21.1)				
	B型肝炎	- (0.0)	1 (2.4)	3 (5.4)	4 (3.3)				
	淋菌感染症	6 (24.0)	11 (26.2)	20 (35.7)	37 (30.1)				
	クラミジア	12 (48.0)	22 (52.4)	39 (69.6)	73 (59.3)				
	いずれかある	15 (60.0)	30 (71.4)	47 (83.9)	92 (74.8)				

※2 HIVを除く性感染症検査を受けたことがあるものを分母とする。

表7. クリニック調査 性経験

	20代		30代		40歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間に、セックスした相手の人数を教えてください。									
①男性	n=9		n=12		n=18		n=39		0.569
	(過去6か月間では)0人	- (0.0)	- (0.0)	1 (5.6)	1 (2.6)				
	1人	2 (22.2)	3 (25.0)	5 (27.8)	10 (25.6)				
	2人～3人	3 (33.3)	5 (41.7)	6 (33.3)	14 (35.9)				
	4人～9人	4 (44.4)	4 (33.3)	3 (16.7)	11 (28.2)				
	10人以上	- (0.0)	- (0.0)	3 (16.7)	3 (7.7)				
答えたくない	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
②女性	n=18		n=20		n=40		n=78		0.883
	(過去6か月間では)0人	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	1人	3 (16.7)	1 (5.0)	3 (7.5)	7 (9.0)				
	2人～3人	2 (11.1)	2 (10.0)	8 (20.0)	12 (15.4)				
	4人～9人	2 (11.1)	2 (10.0)	5 (12.5)	9 (11.5)				
	10人以上	10 (55.6)	13 (65.0)	20 (50.0)	43 (55.1)				
答えたくない	1 (5.6)	2 (10.0)	4 (10.0)	7 (9.0)					
①+② 全体	n=27		n=32		n=58		n=117		0.984
	(過去6か月間では)0人	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.7)	1 (0.9)				
	1人	5 (18.5)	4 (12.5)	8 (13.8)	17 (14.5)				
	2人～3人	5 (18.5)	7 (21.9)	14 (24.1)	26 (22.2)				
	4人～9人	6 (22.2)	6 (18.8)	8 (13.8)	20 (17.1)				
	10人以上	10 (37.0)	13 (40.6)	23 (39.7)	46 (39.3)				
答えたくない	1 (3.7)	2 (6.3)	4 (6.9)	7 (6.0)					
③G・B 男性	n=7		n=11		n=6		n=24		0.174
	(過去6か月間では)0人	- (0.0)	- (0.0)	1 (16.7)	1 (4.2)				
	1人	1 (14.3)	2 (18.2)	- (0.0)	3 (12.5)				
	2人～3人	3 (42.9)	- (0.0)	2 (33.3)	5 (20.8)				
	4人～9人	2 (28.6)	7 (63.6)	1 (16.7)	10 (41.7)				
	10人以上	1 (14.3)	2 (18.2)	2 (33.3)	5 (20.8)				
答えたくない	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
①～③ 全体	n=34		n=43		n=64		n=141		0.645
	(過去6か月間では)0人	- (0.0)	- (0.0)	2 (3.1)	2 (1.4)				
	1人	6 (17.6)	6 (14.0)	8 (12.5)	20 (14.2)				
	2人～3人	8 (23.5)	7 (16.3)	16 (25.0)	31 (22.0)				
	4人～9人	8 (23.5)	13 (30.2)	9 (14.1)	30 (21.3)				
	10人以上	11 (32.4)	15 (34.9)	25 (39.1)	51 (36.2)				
答えたくない	1 (2.9)	2 (4.7)	4 (6.3)	7 (5.0)					

表8. クリニック調査 性経験

	20代		30代		40歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間のセックスでは、どのぐらいの割合でコンドームを使用しましたか？※3									
	n=9		n=12		n=17		n=38		
①男性	必ず使った	2 (22.2)	2 (16.7)	4 (23.5)	8 (21.1)	0.631			
	使うことが多かった	3 (33.3)	3 (25.0)	3 (17.6)	9 (23.7)				
	五分五分	- (0.0)	4 (33.3)	5 (29.4)	9 (23.7)				
	使わないことが多かった	3 (33.3)	1 (8.3)	2 (11.8)	6 (15.8)				
	全く使わなかった	1 (11.1)	2 (16.7)	3 (17.6)	6 (15.8)				
	n=17		n=18		n=36		n=71		
②女性	必ず使った	2 (11.8)	6 (33.3)	7 (19.4)	15 (21.1)	0.035			
	使うことが多かった	9 (52.9)	4 (22.2)	14 (38.9)	27 (38.0)				
	五分五分	2 (11.8)	1 (5.6)	10 (27.8)	13 (18.3)				
	使わないことが多かった	3 (17.6)	3 (16.7)	5 (13.9)	11 (15.5)				
	全く使わなかった	1 (5.9)	4 (22.2)	- (0.0)	5 (7.0)				
	n=26		n=30		n=53		n=109		
①+② 全体	必ず使った	4 (15.4)	8 (26.7)	11 (20.8)	23 (21.1)	0.138			
	使うことが多かった	12 (46.2)	7 (23.3)	17 (32.1)	36 (33.0)				
	五分五分	2 (7.7)	5 (16.7)	15 (28.3)	22 (20.2)				
	使わないことが多かった	6 (23.1)	4 (13.3)	7 (13.2)	17 (15.6)				
	全く使わなかった	2 (7.7)	6 (20.0)	3 (5.7)	11 (10.1)				
	n=7		n=11		n=5		n=23		
③G・B 男性	必ず使った	3 (42.9)	1 (9.1)	1 (20.0)	5 (21.7)	0.568			
	使うことが多かった	1 (14.3)	3 (27.3)	1 (20.0)	5 (21.7)				
	五分五分	2 (28.6)	4 (36.4)	- (0.0)	6 (26.1)				
	使わないことが多かった	1 (14.3)	2 (18.2)	2 (40.0)	5 (21.7)				
	全く使わなかった	- (0.0)	1 (9.1)	1 (20.0)	2 (8.7)				
	n=33		n=41		n=58		n=132		
①~③ 全体	必ず使った	7 (21.2)	9 (22.0)	12 (20.7)	28 (21.2)	0.542			
	使うことが多かった	13 (39.4)	10 (24.4)	18 (31.0)	41 (31.1)				
	五分五分	4 (12.1)	9 (22.0)	15 (25.9)	28 (21.2)				
	使わないことが多かった	7 (21.2)	6 (14.6)	9 (15.5)	22 (16.7)				
	全く使わなかった	2 (6.1)	7 (17.1)	4 (6.9)	13 (9.8)				

※3 過去6か月間にセックスしたことがあるものを分母とする。

表8. クリニック調査_性経験

	20代		30代		40歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆過去6か月間のセックスで、コンドームを使った目的を教えてください。※4									
①男性	n=8		n=10		n=14		n=32		0.470
	避妊のため	1 (12.5)	2 (20.0)	2 (14.3)	5 (15.6)				
	性感染症予防のため	4 (50.0)	1 (10.0)	5 (35.7)	10 (31.3)				
	両方(避妊と性感染症予防)のため	3 (37.5)	7 (70.0)	7 (50.0)	17 (53.1)				
	いずれも当てはまらない	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
無回答・無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
②女性	n=16		n=14		n=36		n=66		0.037
	避妊のため	5 (31.3)	1 (7.1)	1 (2.8)	7 (10.6)				
	性感染症予防のため	4 (25.0)	6 (42.9)	12 (33.3)	22 (33.3)				
	両方(避妊と性感染症予防)のため	6 (37.5)	7 (50.0)	19 (52.8)	32 (48.5)				
	いずれも当てはまらない	- (0.0)	- (0.0)	4 (11.1)	4 (6.1)				
無回答・無効回答	1 (6.3)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.5)					
①+② 全体	n=24		n=24		n=50		n=98		0.114
	避妊のため	6 (25.0)	3 (12.5)	3 (6.0)	12 (12.2)				
	性感染症予防のため	8 (33.3)	7 (29.2)	17 (34.0)	32 (32.7)				
	両方(避妊と性感染症予防)のため	9 (37.5)	14 (58.3)	26 (52.0)	49 (50.0)				
	いずれも当てはまらない	- (0.0)	- (0.0)	4 (8.0)	4 (4.1)				
無回答・無効回答	1 (4.2)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.0)					
③G・B 男性	n=7		n=10		n=4		n=21		0.266
	避妊のため	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	性感染症予防のため	5 (71.4)	9 (90.0)	2 (50.0)	16 (76.2)				
	両方(避妊と性感染症予防)のため	2 (28.6)	1 (10.0)	2 (50.0)	5 (23.8)				
	いずれも当てはまらない	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
無回答・無効回答	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
①~③ 全体	n=31		n=34		n=54		n=119		0.099
	避妊のため	6 (19.4)	3 (8.8)	3 (5.6)	12 (10.1)				
	性感染症予防のため	13 (41.9)	16 (47.1)	19 (35.2)	48 (40.3)				
	両方(避妊と性感染症予防)のため	11 (35.5)	15 (44.1)	28 (51.9)	54 (45.4)				
	いずれも当てはまらない	- (0.0)	- (0.0)	4 (7.4)	4 (3.4)				
無回答・無効回答	1 (3.2)	- (0.0)	- (0.0)	1 (0.8)					

※4 過去6か月間にセックスでコンドームを使用したことがあるものを分母とする。

表9. クリニック調査_動画について

	20代		30代		40歳以上		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆動画の表画速度はいかがでしたか。									
①男性	n=9		n=12		n=18		n=39		0.452
	速い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)		
	やや速い	- (0.0)	2 (16.7)	1 (5.6)	3 (7.7)				
	適当	8 (88.9)	9 (75.0)	16 (88.9)	33 (84.6)				
	やや遅い	- (0.0)	1 (8.3)	- (0.0)	1 (2.6)				
遅い	1 (11.1)	- (0.0)	1 (5.6)	2 (5.1)					
②女性	n=18		n=20		n=40		n=78		0.089
	速い	3 (16.7)	1 (5.0)	1 (2.5)	5 (6.4)				
	やや速い	1 (5.6)	2 (10.0)	2 (5.0)	5 (6.4)				
	適当	14 (77.8)	13 (65.0)	36 (90.0)	63 (80.8)				
	やや遅い	- (0.0)	3 (15.0)	1 (2.5)	4 (5.1)				
遅い	- (0.0)	1 (5.0)	- (0.0)	1 (1.3)					
①+② 全体	n=27		n=32		n=58		n=117		0.067
	速い	3 (11.1)	1 (3.1)	1 (1.7)	5 (4.3)				
	やや速い	1 (3.7)	4 (12.5)	3 (5.2)	8 (6.8)				
	適当	22 (81.5)	22 (68.8)	52 (89.7)	96 (82.1)				
	やや遅い	- (0.0)	4 (12.5)	1 (1.7)	5 (4.3)				
遅い	1 (3.7)	1 (3.1)	1 (1.7)	3 (2.6)					
③G・B 男性	n=7		n=11		n=6		n=24		0.845
	速い	1 (14.3)	1 (9.1)	1 (16.7)	3 (12.5)				
	やや速い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
	適当	6 (85.7)	9 (81.8)	5 (83.3)	20 (83.3)				
	やや遅い	- (0.0)	1 (9.1)	- (0.0)	1 (4.2)				
遅い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
①~③ 全体	n=34		n=43		n=64		n=141		0.089
	速い	4 (11.8)	2 (4.7)	2 (3.1)	8 (5.7)				
	やや速い	1 (2.9)	4 (9.3)	3 (4.7)	8 (5.7)				
	適当	28 (82.4)	31 (72.1)	57 (89.1)	116 (82.3)				
	やや遅い	- (0.0)	5 (11.6)	1 (1.6)	6 (4.3)				
遅い	1 (2.9)	1 (2.3)	1 (1.6)	3 (2.1)					
◆動画の長さはいかがでしたか。									
①男性	n=9		n=12		n=18		n=39		0.160
	長い	- (0.0)	- (0.0)	1 (5.6)	1 (2.6)				
	やや長い	2 (22.2)	- (0.0)	1 (5.6)	3 (7.7)				
	適当	7 (77.8)	10 (83.3)	16 (88.9)	33 (84.6)				
	やや短い	- (0.0)	2 (16.7)	- (0.0)	2 (5.1)				
短い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
②女性	n=18		n=20		n=40		n=78		0.487
	長い	1 (5.6)	- (0.0)	- (0.0)	1 (1.3)				
	やや長い	3 (16.7)	4 (20.0)	7 (17.5)	14 (17.9)				
	適当	14 (77.8)	16 (80.0)	33 (82.5)	63 (80.8)				
	やや短い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)				
短い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
①+② 全体	n=27		n=32		n=58		n=117		0.321
	長い	1 (3.7)	- (0.0)	1 (1.7)	2 (1.7)				
	やや長い	5 (18.5)	4 (12.5)	8 (13.8)	17 (14.5)				
	適当	21 (77.8)	26 (81.3)	49 (84.5)	96 (82.1)				
	やや短い	- (0.0)	2 (6.3)	- (0.0)	2 (1.7)				
短い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
③G・B 男性	n=7		n=11		n=6		n=24		0.274
	長い	1 (14.3)	- (0.0)	- (0.0)	1 (4.2)				
	やや長い	- (0.0)	2 (18.2)	- (0.0)	2 (8.3)				
	適当	5 (71.4)	9 (81.8)	6 (100.0)	20 (83.3)				
	やや短い	1 (14.3)	- (0.0)	- (0.0)	1 (4.2)				
短い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					
①~③ 全体	n=34		n=43		n=64		n=141		0.384
	長い	2 (5.9)	- (0.0)	1 (1.6)	3 (2.1)				
	やや長い	5 (14.7)	6 (14.0)	8 (12.5)	19 (13.5)				
	適当	26 (76.5)	35 (81.4)	55 (85.9)	116 (82.3)				
	やや短い	1 (2.9)	2 (4.7)	- (0.0)	3 (2.1)				
短い	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)					

表9. クリニック調査 動画について

		20代		30代		40歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆動画を視聴してどのような印象をもちましたか。(複数回答)										
①男性		n=9		n=12		n=18		n=39		
	親しみやすい	2	(22.2)	7	(58.3)	5	(27.8)	14	(35.9)	0.144
	安心できる	5	(55.6)	4	(33.3)	3	(16.7)	12	(30.8)	0.116
	信頼できる	2	(22.2)	2	(16.7)	6	(33.3)	10	(25.6)	0.571
	興味深い	-	(0.0)	3	(25.0)	3	(16.7)	6	(15.4)	0.285
	新しい	1	(11.1)	2	(16.7)	-	(0.0)	3	(7.7)	0.222
	子ども向け	1	(11.1)	-	(0.0)	4	(22.2)	5	(12.8)	0.201
	若者向け	5	(55.6)	5	(41.7)	7	(38.9)	17	(43.6)	0.703
	大人向け	1	(11.1)	1	(8.3)	3	(16.7)	5	(12.8)	0.787
	自分向け	-	(0.0)	1	(8.3)	3	(16.7)	4	(10.3)	0.391
あてはまるものがない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
②女性		n=18		n=20		n=40		n=78		
	親しみやすい	11	(61.1)	12	(60.0)	19	(47.5)	42	(53.8)	0.513
	安心できる	4	(22.2)	9	(45.0)	11	(27.5)	24	(30.8)	0.257
	信頼できる	4	(22.2)	2	(10.0)	12	(30.0)	18	(23.1)	0.222
	興味深い	6	(33.3)	3	(15.0)	6	(15.0)	15	(19.2)	0.224
	新しい	-	(0.0)	2	(10.0)	4	(10.0)	6	(7.7)	0.377
	子ども向け	1	(5.6)	3	(15.0)	4	(10.0)	8	(10.3)	0.630
	若者向け	6	(33.3)	9	(45.0)	11	(27.5)	26	(33.3)	0.399
	大人向け	2	(11.1)	4	(20.0)	6	(15.0)	12	(15.4)	0.747
	自分向け	4	(22.2)	1	(5.0)	2	(5.0)	7	(9.0)	0.081
あてはまるものがない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
①+② 全体		n=27		n=32		n=58		n=117		
	親しみやすい	13	(48.1)	19	(59.4)	24	(41.4)	56	(47.9)	0.262
	安心できる	9	(33.3)	13	(40.6)	14	(24.1)	36	(30.8)	0.254
	信頼できる	6	(22.2)	4	(12.5)	18	(31.0)	28	(23.9)	0.139
	興味深い	6	(22.2)	6	(18.8)	9	(15.5)	21	(17.9)	0.748
	新しい	1	(3.7)	4	(12.5)	4	(6.9)	9	(7.7)	0.428
	子ども向け	2	(7.4)	3	(9.4)	8	(13.8)	13	(11.1)	0.639
	若者向け	11	(40.7)	14	(43.8)	18	(31.0)	43	(36.8)	0.433
	大人向け	3	(11.1)	5	(15.6)	9	(15.5)	17	(14.5)	0.848
	自分向け	4	(14.8)	2	(6.3)	5	(8.6)	11	(9.4)	0.511
あてはまるものがない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	
③G・B 男性		n=7		n=11		n=6		n=24		
	親しみやすい	4	(57.1)	7	(63.6)	4	(66.7)	15	(62.5)	0.934
	安心できる	3	(42.9)	6	(54.5)	5	(83.3)	14	(58.3)	0.317
	信頼できる	3	(42.9)	6	(54.5)	4	(66.7)	13	(54.2)	0.691
	興味深い	2	(28.6)	2	(18.2)	3	(50.0)	7	(29.2)	0.386
	新しい	-	(0.0)	1	(9.1)	1	(16.7)	2	(8.3)	0.552
	子ども向け	1	(14.3)	2	(18.2)	1	(16.7)	4	(16.7)	0.977
	若者向け	3	(42.9)	6	(54.5)	2	(33.3)	11	(45.8)	0.691
	大人向け	2	(28.6)	3	(27.3)	2	(33.3)	7	(29.2)	0.965
	自分向け	2	(28.6)	1	(9.1)	1	(16.7)	4	(16.7)	0.557
あてはまるものがない	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	1	(4.2)	0.540	
①~③ 全体		n=34		n=43		n=64		n=141		
	親しみやすい	17	(50.0)	26	(60.5)	28	(43.8)	71	(50.4)	0.237
	安心できる	12	(35.3)	19	(44.2)	19	(29.7)	50	(35.5)	0.307
	信頼できる	9	(26.5)	10	(23.3)	22	(34.4)	41	(29.1)	0.430
	興味深い	8	(23.5)	8	(18.6)	12	(18.8)	28	(19.9)	0.827
	新しい	1	(2.9)	5	(11.6)	5	(7.8)	11	(7.8)	0.369
	子ども向け	3	(8.8)	5	(11.6)	9	(14.1)	17	(12.1)	0.746
	若者向け	14	(41.2)	20	(46.5)	20	(31.3)	54	(38.3)	0.260
	大人向け	5	(14.7)	8	(18.6)	11	(17.2)	24	(17.0)	0.902
	自分向け	6	(17.6)	3	(7.0)	6	(9.4)	15	(10.6)	0.291
あてはまるものがない	-	(0.0)	1	(2.3)	-	(0.0)	1	(0.7)	0.317	

表9. クリニック調査 動画について

		20代		30代		40歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆動画の内容はあなたにとってどれくらい役に立ちましたか。										
①男性		n=9		n=12		n=18		n=39		0.613
	役に立った	2	(22.2)	6	(50.0)	8	(44.4)	16	(41.0)	
	まあまあ役に立った	5	(55.6)	5	(41.7)	6	(33.3)	16	(41.0)	
	普通	2	(22.2)	1	(8.3)	4	(22.2)	7	(17.9)	
	あまり役に立たなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	役に立たなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性		n=18		n=20		n=40		n=78		0.060
	役に立った	12	(66.7)	12	(60.0)	20	(50.0)	44	(56.4)	
	まあまあ役に立った	3	(16.7)	5	(25.0)	14	(35.0)	22	(28.2)	
	普通	-	(0.0)	3	(15.0)	6	(15.0)	9	(11.5)	
	あまり役に立たなかった	2	(11.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.6)	
	役に立たなかった	1	(5.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.3)	
①+② 全体		n=27		n=32		n=58		n=117		0.162
	役に立った	14	(51.9)	18	(56.3)	28	(48.3)	60	(51.3)	
	まあまあ役に立った	8	(29.6)	10	(31.3)	20	(34.5)	38	(32.5)	
	普通	2	(7.4)	4	(12.5)	10	(17.2)	16	(13.7)	
	あまり役に立たなかった	2	(7.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(1.7)	
	役に立たなかった	1	(3.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.9)	
③G・B 男性		n=7		n=11		n=6		n=24		0.109
	役に立った	5	(71.4)	3	(27.3)	1	(16.7)	9	(37.5)	
	まあまあ役に立った	2	(28.6)	4	(36.4)	5	(83.3)	11	(45.8)	
	普通	-	(0.0)	3	(27.3)	-	(0.0)	3	(12.5)	
	あまり役に立たなかった	-	(0.0)	1	(9.1)	-	(0.0)	1	(4.2)	
	役に立たなかった	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
①~③ 全体		n=34		n=43		n=64		n=141		0.273
	役に立った	19	(55.9)	21	(48.8)	29	(45.3)	69	(48.9)	
	まあまあ役に立った	10	(29.4)	14	(32.6)	25	(39.1)	49	(34.8)	
	普通	2	(5.9)	7	(16.3)	10	(15.6)	19	(13.5)	
	あまり役に立たなかった	2	(5.9)	1	(2.3)	-	(0.0)	3	(2.1)	
	役に立たなかった	1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	
◆この動画をもう一度視聴したいと思いますか。										
①男性		n=9		n=12		n=18		n=39		0.135
	思う	-	(0.0)	1	(8.3)	1	(5.6)	2	(5.1)	
	多少思う	-	(0.0)	5	(41.7)	3	(16.7)	8	(20.5)	
	どちらともいえない	6	(66.7)	1	(8.3)	9	(50.0)	16	(41.0)	
	あまり思わない	3	(33.3)	3	(25.0)	3	(16.7)	9	(23.1)	
	思わない	-	(0.0)	2	(16.7)	2	(11.1)	4	(10.3)	
②女性		n=18		n=20		n=40		n=78		0.380
	思う	4	(22.2)	1	(5.0)	9	(22.5)	14	(17.9)	
	多少思う	5	(27.8)	8	(40.0)	16	(40.0)	29	(37.2)	
	どちらともいえない	5	(27.8)	6	(30.0)	12	(30.0)	23	(29.5)	
	あまり思わない	4	(22.2)	4	(20.0)	3	(7.5)	11	(14.1)	
	思わない	-	(0.0)	1	(5.0)	-	(0.0)	1	(1.3)	
①+② 全体		n=27		n=32		n=58		n=117		0.134
	思う	4	(14.8)	2	(6.3)	10	(17.2)	16	(13.7)	
	多少思う	5	(18.5)	13	(40.6)	19	(32.8)	37	(31.6)	
	どちらともいえない	11	(40.7)	7	(21.9)	21	(36.2)	39	(33.3)	
	あまり思わない	7	(25.9)	7	(21.9)	6	(10.3)	20	(17.1)	
	思わない	-	(0.0)	3	(9.4)	2	(3.4)	5	(4.3)	
③G・B 男性		n=7		n=11		n=6		n=24		0.065
	思う	2	(28.6)	1	(9.1)	1	(16.7)	4	(16.7)	
	多少思う	2	(28.6)	1	(9.1)	3	(50.0)	6	(25.0)	
	どちらともいえない	2	(28.6)	2	(18.2)	2	(33.3)	6	(25.0)	
	あまり思わない	-	(0.0)	7	(63.6)	-	(0.0)	7	(29.2)	
	思わない	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.2)	
①~③ 全体		n=34		n=43		n=64		n=141		0.071
	思う	6	(17.6)	3	(7.0)	11	(17.2)	20	(14.2)	
	多少思う	7	(20.6)	14	(32.6)	22	(34.4)	43	(30.5)	
	どちらともいえない	13	(38.2)	9	(20.9)	23	(35.9)	45	(31.9)	
	あまり思わない	7	(20.6)	14	(32.6)	6	(9.4)	27	(19.1)	
	思わない	1	(2.9)	3	(7.0)	2	(3.1)	6	(4.3)	

表10. クリニック調査 考え

		20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
◆HIVを含む性感染症の予防について、あなたの考えを教えてください。(複数回答)										
①男性	早期に発見できれば、治療が可能である	n=9		n=12		n=18		n=39		
	動画視聴前	6	(66.7)	8	(66.7)	9	(50.0)	23	(59.0)	0.125
	動画視聴後	6	(66.7)	6	(50.0)	7	(38.9)	19	(48.7)	
	HIVを含む性感染症の危険性について、常に意識しておく必要がある	n=9		n=12		n=18		n=39		
	動画視聴前	7	(77.8)	9	(75.0)	14	(77.8)	30	(76.9)	0.688
	動画視聴後	6	(66.7)	9	(75.0)	13	(72.2)	28	(71.8)	
	HIVや性感染症について、正しい知識をもっている	n=9		n=12		n=18		n=39		
	動画視聴前	1	(11.1)	2	(16.7)	3	(16.7)	6	(15.4)	0.625
	動画視聴後	1	(11.1)	3	(25.0)	4	(22.2)	8	(20.5)	
	HIVや性感染症について、正しい知識が必要である	n=9		n=12		n=18		n=39		
	動画視聴前	5	(55.6)	6	(50.0)	6	(33.3)	17	(43.6)	0.070
	動画視聴後	5	(55.6)	7	(58.3)	11	(61.1)	23	(59.0)	
	予防のために、コンドームの常時所持が必要である	n=9		n=12		n=18		n=39		
	動画視聴前	3	(33.3)	1	(8.3)	6	(33.3)	10	(25.6)	0.004
動画視聴後	4	(44.4)	8	(66.7)	10	(55.6)	22	(56.4)		
予防には、コンドームの使用が有効である	n=9		n=12		n=18		n=39			
動画視聴前	6	(66.7)	9	(75.0)	14	(77.8)	29	(74.4)	1.000	
動画視聴後	7	(77.8)	10	(83.3)	13	(72.2)	30	(76.9)		
②女性	早期に発見できれば、治療が可能である	n=18		n=20		n=40		n=78		
	動画視聴前	11	(61.1)	16	(80.0)	22	(55.0)	49	(62.8)	0.424
	動画視聴後	11	(61.1)	16	(80.0)	26	(65.0)	53	(67.9)	
	HIVを含む性感染症の危険性について、常に意識しておく必要がある	n=18		n=20		n=40		n=78		
	動画視聴前	14	(77.8)	17	(85.0)	28	(70.0)	59	(75.6)	0.607
	動画視聴後	11	(61.1)	16	(80.0)	29	(72.5)	56	(71.8)	
	HIVや性感染症について、正しい知識をもっている	n=18		n=20		n=40		n=78		
	動画視聴前	4	(22.2)	4	(20.0)	11	(27.5)	19	(24.4)	0.344
	動画視聴後	4	(22.2)	6	(30.0)	13	(32.5)	23	(29.5)	
	HIVや性感染症について、正しい知識が必要である	n=18		n=20		n=40		n=78		
	動画視聴前	10	(55.6)	17	(85.0)	23	(57.5)	50	(64.1)	0.118
	動画視聴後	9	(50.0)	18	(90.0)	30	(75.0)	57	(73.1)	
	予防のために、コンドームの常時所持が必要である	n=18		n=20		n=40		n=78		
	動画視聴前	7	(38.9)	8	(40.0)	19	(47.5)	34	(43.6)	0.003
動画視聴後	9	(50.0)	16	(80.0)	26	(65.0)	51	(65.4)		
予防には、コンドームの使用が有効である	n=18		n=20		n=40		n=78			
動画視聴前	13	(72.2)	17	(85.0)	31	(77.5)	61	(78.2)	1.000	
動画視聴後	11	(61.1)	17	(85.0)	33	(82.5)	61	(78.2)		
①+② 全体	早期に発見できれば、治療が可能である	n=27		n=32		n=58		n=117		
	動画視聴前	17	(63.0)	24	(75.0)	31	(53.4)	72	(61.5)	1.000
	動画視聴後	17	(63.0)	22	(68.8)	33	(56.9)	72	(61.5)	
	HIVを含む性感染症の危険性について、常に意識しておく必要がある	n=27		n=32		n=58		n=117		
	動画視聴前	21	(77.8)	26	(81.3)	42	(72.4)	89	(76.1)	0.383
	動画視聴後	17	(63.0)	25	(78.1)	42	(72.4)	84	(71.8)	
	HIVや性感染症について、正しい知識をもっている	n=27		n=32		n=58		n=117		
	動画視聴前	5	(18.5)	6	(18.8)	14	(24.1)	25	(21.4)	0.180
	動画視聴後	5	(18.5)	9	(28.1)	17	(29.3)	31	(26.5)	
	HIVや性感染症について、正しい知識が必要である	n=27		n=32		n=58		n=117		
	動画視聴前	15	(55.6)	23	(71.9)	29	(50.0)	67	(57.3)	0.011
	動画視聴後	14	(51.9)	25	(78.1)	41	(70.7)	80	(68.4)	
	予防のために、コンドームの常時所持が必要である	n=27		n=32		n=58		n=117		
	動画視聴前	10	(37.0)	9	(28.1)	25	(43.1)	44	(37.6)	0.000
動画視聴後	13	(48.1)	24	(75.0)	36	(62.1)	73	(62.4)		
予防には、コンドームの使用が有効である	n=27		n=32		n=58		n=117			
動画視聴前	19	(70.4)	26	(81.3)	45	(77.6)	90	(76.9)	1.000	
動画視聴後	18	(66.7)	27	(84.4)	46	(79.3)	91	(77.8)		

表10. クリニック調査 考え

	20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	n=7		n=11		n=6		n=24		
	早期に発見できれば、治療が可能である								
	2	(28.6)	9	(81.8)	6	(100.0)	17	(70.8)	0.625
	4	(57.1)	9	(81.8)	6	(100.0)	19	(79.2)	
	HIVを含む性感染症の危険性について、常に意識しておく必要がある								
	4	(57.1)	10	(90.9)	4	(66.7)	18	(75.0)	0.250
	5	(71.4)	10	(90.9)	6	(100.0)	21	(87.5)	
	HIVや性感染症について、正しい知識をもっている								
	2	(28.6)	3	(27.3)	2	(33.3)	7	(29.2)	0.063
	4	(57.1)	5	(45.5)	3	(50.0)	12	(50.0)	
③G・B 男性	HIVや性感染症について、正しい知識が必要である								
	4	(57.1)	9	(81.8)	5	(83.3)	18	(75.0)	1.000
	4	(57.1)	10	(90.9)	5	(83.3)	19	(79.2)	
	予防のために、コンドームの常時所持が必要である								
	3	(42.9)	7	(63.6)	5	(83.3)	15	(62.5)	0.250
	4	(57.1)	8	(72.7)	6	(100.0)	18	(75.0)	
	予防には、コンドームの使用が有効である								
	4	(57.1)	10	(90.9)	6	(100.0)	20	(83.3)	1.000
	4	(57.1)	11	(100.0)	6	(100.0)	21	(87.5)	
	n=34		n=43		n=64		n=141		
	早期に発見できれば、治療が可能である								
	19	(55.9)	33	(76.7)	37	(57.8)	89	(63.1)	0.832
	21	(61.8)	31	(72.1)	39	(60.9)	91	(64.5)	
	HIVを含む性感染症の危険性について、常に意識しておく必要がある								
	25	(73.5)	36	(83.7)	46	(71.9)	107	(75.9)	0.839
	22	(64.7)	35	(81.4)	48	(75.0)	105	(74.5)	
	HIVや性感染症について、正しい知識をもっている								
	7	(20.6)	9	(20.9)	16	(25.0)	32	(22.7)	0.019
	9	(26.5)	14	(32.6)	20	(31.3)	43	(30.5)	
①～③ 全体	HIVや性感染症について、正しい知識が必要である								
	19	(55.9)	32	(74.4)	34	(53.1)	85	(60.3)	0.007
	18	(52.9)	35	(81.4)	46	(71.9)	99	(70.2)	
	予防のために、コンドームの常時所持が必要である								
	13	(38.2)	16	(37.2)	30	(46.9)	59	(41.8)	0.000
	17	(50.0)	32	(74.4)	42	(65.6)	91	(64.5)	
	予防には、コンドームの使用が有効である								
	23	(67.6)	36	(83.7)	51	(79.7)	110	(78.0)	0.804
	22	(64.7)	38	(88.4)	52	(81.3)	112	(79.4)	

表10. クリニック調査 知識

		20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆この5年間で、20代の女性の梅毒感染者数が急増した。											
①男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=9		n=12		n=18		n=39		0.000
		そう思わない	4	(44.4)	8	(66.7)	7	(38.9)	19	(48.7)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	5	(55.6)	4	(33.3)	11	(61.1)	20	(51.3)	
		そう思わない	7	(77.8)	11	(91.7)	14	(77.8)	32	(82.1)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=18		n=20		n=40		n=78		0.001
		そう思わない	11	(61.1)	13	(65.0)	31	(77.5)	55	(70.5)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	7	(38.9)	7	(35.0)	9	(22.5)	23	(29.5)	
		そう思わない	15	(83.3)	16	(80.0)	37	(92.5)	68	(87.2)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
①+② 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=27		n=32		n=58		n=117		0.000
		そう思わない	15	(55.6)	21	(65.6)	38	(65.5)	74	(63.2)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	12	(44.4)	11	(34.4)	20	(34.5)	43	(36.8)	
		そう思わない	22	(81.5)	27	(84.4)	51	(87.9)	100	(85.5)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
③G・B 男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=7		n=11		n=6		n=24		0.001
		そう思わない	2	(28.6)	5	(45.5)	3	(50.0)	10	(41.7)	
		わからない	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.2)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	4	(57.1)	6	(54.5)	3	(50.0)	13	(54.2)	
		そう思わない	5	(71.4)	10	(90.9)	6	(100.0)	21	(87.5)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
①~③ 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=34		n=43		n=64		n=141		0.000
		そう思わない	17	(50.0)	26	(60.5)	41	(64.1)	84	(59.6)	
		わからない	1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.7)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	16	(47.1)	17	(39.5)	23	(35.9)	56	(39.7)	
		そう思わない	27	(79.4)	37	(86.0)	57	(89.1)	121	(85.8)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		わからない	7	(20.6)	6	(14.0)	7	(10.9)	20	(14.2)	

表10. クリニック調査 知識

		20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆性感染症に感染しても、症状が出ないことがある。											
①男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=9		n=12		n=18		n=39		0.125
		そう思わない	8	(88.9)	9	(75.0)	12	(66.7)	29	(74.4)	
		わからない	-	(0.0)	1	(8.3)	1	(5.6)	2	(5.1)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	1	(11.1)	2	(16.7)	5	(27.8)	8	(20.5)	
		そう思わない	8	(88.9)	10	(83.3)	16	(88.9)	34	(87.2)	
		わからない	-	(0.0)	1	(8.3)	1	(5.6)	2	(5.1)	
②女性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=18		n=20		n=40		n=78		0.070
		そう思わない	15	(83.3)	18	(90.0)	33	(82.5)	66	(84.6)	
		わからない	-	(0.0)	2	(10.0)	5	(12.5)	7	(9.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	3	(16.7)	-	(0.0)	2	(5.0)	5	(6.4)	
		そう思わない	16	(88.9)	18	(90.0)	38	(95.0)	72	(92.3)	
		わからない	1	(5.6)	1	(5.0)	1	(2.5)	3	(3.8)	
①+② 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=27		n=32		n=58		n=117		0.007
		そう思わない	23	(85.2)	27	(84.4)	45	(77.6)	95	(81.2)	
		わからない	-	(0.0)	3	(9.4)	6	(10.3)	9	(7.7)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	4	(14.8)	2	(6.3)	7	(12.1)	13	(11.1)	
		そう思わない	24	(88.9)	28	(87.5)	54	(93.1)	106	(90.6)	
		わからない	1	(3.7)	2	(6.3)	2	(3.4)	5	(4.3)	
③G・B 男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=7		n=11		n=6		n=24		1.000
		そう思わない	6	(85.7)	11	(100.0)	6	(100.0)	23	(95.8)	
		わからない	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.2)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
		そう思わない	6	(85.7)	11	(100.0)	6	(100.0)	23	(95.8)	
		わからない	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.2)	
①~③ 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=34		n=43		n=64		n=141		0.007
		そう思わない	29	(85.3)	38	(88.4)	51	(79.7)	118	(83.7)	
		わからない	1	(2.9)	3	(7.0)	6	(9.4)	10	(7.1)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	4	(11.8)	2	(4.7)	7	(10.9)	13	(9.2)	
		そう思わない	30	(88.2)	39	(90.7)	60	(93.8)	129	(91.5)	
		わからない	2	(5.9)	2	(4.7)	2	(3.1)	6	(4.3)	

表10. クリニック調査 知識

		20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆性感染症にかかっているとHIVに感染しやすい。											
①男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=9		n=12		n=18		n=39		0.453
		そう思わない	6	(66.7)	11	(91.7)	14	(77.8)	31	(79.5)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	3	(33.3)	1	(8.3)	4	(22.2)	8	(20.5)	
		そう思わない	8	(88.9)	11	(91.7)	15	(83.3)	34	(87.2)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=18		n=20		n=40		n=78		0.000
		そう思わない	8	(44.4)	13	(65.0)	28	(70.0)	49	(62.8)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.5)	1	(1.3)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	10	(55.6)	7	(35.0)	11	(27.5)	28	(35.9)	
		そう思わない	15	(83.3)	19	(95.0)	38	(95.0)	72	(92.3)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.5)	1	(1.3)	
①+② 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=27		n=32		n=58		n=117		0.000
		そう思わない	14	(51.9)	24	(75.0)	42	(72.4)	80	(68.4)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.7)	1	(0.9)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	13	(48.1)	8	(25.0)	15	(25.9)	36	(30.8)	
		そう思わない	23	(85.2)	30	(93.8)	53	(91.4)	106	(90.6)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.7)	1	(0.9)	
③G・B 男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=7		n=11		n=6		n=24		1.000
		そう思わない	4	(57.1)	11	(100.0)	6	(100.0)	21	(87.5)	
		わからない	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.2)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	2	(28.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(8.3)	
		そう思わない	6	(85.7)	11	(100.0)	5	(83.3)	22	(91.7)	
		わからない	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.2)	
①~③ 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=34		n=43		n=64		n=141		0.000
		そう思わない	18	(52.9)	35	(81.4)	48	(75.0)	101	(71.6)	
		わからない	1	(2.9)	-	(0.0)	1	(1.6)	2	(1.4)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	15	(44.1)	8	(18.6)	15	(23.4)	38	(27.0)	
		そう思わない	29	(85.3)	41	(95.3)	58	(90.6)	128	(90.8)	
		わからない	1	(2.9)	-	(0.0)	1	(1.6)	2	(1.4)	
		4	(11.8)	2	(4.7)	5	(7.8)	11	(7.8)		

表10. クリニック調査 知識

		20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆性感染症には、感染すると不妊症になりやすくなるものがある。											
①男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=9		n=12		n=18		n=39		0.453
		そう思わない	7	(77.8)	11	(91.7)	14	(77.8)	32	(82.1)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	2	(22.2)	1	(8.3)	4	(22.2)	7	(17.9)	
		そう思わない	8	(88.9)	11	(91.7)	16	(88.9)	35	(89.7)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
②女性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=18		n=20		n=40		n=78		0.227
		そう思わない	16	(88.9)	18	(90.0)	34	(85.0)	68	(87.2)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	2	(11.1)	2	(10.0)	6	(15.0)	10	(12.8)	
		そう思わない	16	(88.9)	19	(95.0)	38	(95.0)	73	(93.6)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.5)	1	(1.3)	
①+② 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=27		n=32		n=58		n=117		0.096
		そう思わない	23	(85.2)	29	(90.6)	48	(82.8)	100	(85.5)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	4	(14.8)	3	(9.4)	10	(17.2)	17	(14.5)	
		そう思わない	24	(88.9)	30	(93.8)	54	(93.1)	108	(92.3)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.7)	1	(0.9)	
③G・B 男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=7		n=11		n=6		n=24		0.031
		そう思わない	6	(85.7)	7	(63.6)	3	(50.0)	16	(66.7)	
		わからない	1	(14.3)	1	(9.1)	-	(0.0)	2	(8.3)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	-	(0.0)	3	(27.3)	3	(50.0)	6	(25.0)	
		そう思わない	6	(85.7)	10	(90.9)	6	(100.0)	22	(91.7)	
		わからない	1	(14.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(4.2)	
①~③ 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=34		n=43		n=64		n=141		0.007
		そう思わない	29	(85.3)	36	(83.7)	51	(79.7)	116	(82.3)	
		わからない	1	(2.9)	1	(2.3)	-	(0.0)	2	(1.4)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	4	(11.8)	6	(14.0)	13	(20.3)	23	(16.3)	
		そう思わない	30	(88.2)	40	(93.0)	60	(93.8)	130	(92.2)	
		わからない	1	(2.9)	-	(0.0)	1	(1.6)	2	(1.4)	
		3	(8.8)	3	(7.0)	3	(4.7)	9	(6.4)		

表10. クリニック調査 知識

		20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆HIVの検査は、採血のみでできる。											
①男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=9		n=12		n=18		n=39		0.070
		そう思わない	5	(55.6)	7	(58.3)	14	(77.8)	26	(66.7)	
		わからない	1	(11.1)	-	(0.0)	2	(11.1)	3	(7.7)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	3	(33.3)	5	(41.7)	2	(11.1)	10	(25.6)	
		そう思わない	7	(77.8)	11	(91.7)	14	(77.8)	32	(82.1)	
		わからない	1	(11.1)	1	(8.3)	2	(11.1)	4	(10.3)	
②女性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=18		n=20		n=40		n=78		0.022
		そう思わない	12	(66.7)	16	(80.0)	33	(82.5)	61	(78.2)	
		わからない	-	(0.0)	1	(5.0)	4	(10.0)	5	(6.4)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	6	(33.3)	3	(15.0)	3	(7.5)	12	(15.4)	
		そう思わない	15	(83.3)	18	(90.0)	37	(92.5)	70	(89.7)	
		わからない	-	(0.0)	1	(5.0)	2	(5.0)	3	(3.8)	
①+② 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=27		n=32		n=58		n=117		0.001
		そう思わない	17	(63.0)	23	(71.9)	47	(81.0)	87	(74.4)	
		わからない	1	(3.7)	1	(3.1)	6	(10.3)	8	(6.8)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	9	(33.3)	8	(25.0)	5	(8.6)	22	(18.8)	
		そう思わない	22	(81.5)	29	(90.6)	51	(87.9)	102	(87.2)	
		わからない	1	(3.7)	2	(6.3)	4	(6.9)	7	(6.0)	
③G・B 男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=7		n=11		n=6		n=24		0.031
		そう思わない	6	(85.7)	8	(72.7)	4	(66.7)	18	(75.0)	
		わからない	-	(0.0)	1	(9.1)	2	(33.3)	3	(12.5)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	1	(14.3)	2	(18.2)	-	(0.0)	3	(12.5)	
		そう思わない	7	(100.0)	11	(100.0)	6	(100.0)	24	(100.0)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
①~③ 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=34		n=43		n=64		n=141		0.000
		そう思わない	23	(67.6)	31	(72.1)	51	(79.7)	105	(74.5)	
		わからない	1	(2.9)	2	(4.7)	8	(12.5)	11	(7.8)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	10	(29.4)	10	(23.3)	5	(7.8)	25	(17.7)	
		そう思わない	29	(85.3)	40	(93.0)	57	(89.1)	126	(89.4)	
		わからない	1	(2.9)	2	(4.7)	4	(6.3)	7	(5.0)	
		4	(11.8)	1	(2.3)	3	(4.7)	8	(5.7)		

表10. クリニック調査 知識

		20代		30代		40歳以上		全体		p値 対応サンプル McNemar検定	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
◆セックスの時、コンドームを使うように相手に働きかける(断る)セリフがイメージできる											
①男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=9		n=12		n=18		n=39		0.039
		そう思わない	6	(66.7)	8	(66.7)	12	(66.7)	26	(66.7)	
		わからない	-	(0.0)	1	(8.3)	1	(5.6)	2	(5.1)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	3	(33.3)	3	(25.0)	5	(27.8)	11	(28.2)	
		そう思わない	7	(77.8)	12	(100.0)	14	(77.8)	33	(84.6)	
		わからない	1	(11.1)	-	(0.0)	1	(5.6)	2	(5.1)	
②女性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=18		n=20		n=40		n=78		0.021
		そう思わない	12	(66.7)	16	(80.0)	36	(90.0)	64	(82.1)	
		わからない	1	(5.6)	-	(0.0)	2	(5.0)	3	(3.8)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	5	(27.8)	4	(20.0)	2	(5.0)	11	(14.1)	
		そう思わない	16	(88.9)	18	(90.0)	38	(95.0)	72	(92.3)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
①+② 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=27		n=32		n=58		n=117		0.001
		そう思わない	18	(66.7)	24	(75.0)	48	(82.8)	90	(76.9)	
		わからない	1	(3.7)	1	(3.1)	3	(5.2)	5	(4.3)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	8	(29.6)	7	(21.9)	7	(12.1)	22	(18.8)	
		そう思わない	23	(85.2)	30	(93.8)	52	(89.7)	105	(89.7)	
		わからない	1	(3.7)	-	(0.0)	1	(1.7)	2	(1.7)	
③G・B 男性	動画 視聴前	そう思う(正)	n=7		n=11		n=6		n=24		0.002
		そう思わない	5	(71.4)	4	(36.4)	3	(50.0)	12	(50.0)	
		わからない	2	(28.6)	1	(9.1)	-	(0.0)	3	(12.5)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	-	(0.0)	6	(54.5)	3	(50.0)	9	(37.5)	
		そう思わない	7	(100.0)	9	(81.8)	6	(100.0)	22	(91.7)	
		わからない	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	
①~③ 全体	動画 視聴前	そう思う(正)	n=34		n=43		n=64		n=141		0.000
		そう思わない	23	(67.6)	28	(65.1)	51	(79.7)	102	(72.3)	
		わからない	3	(8.8)	2	(4.7)	3	(4.7)	8	(5.7)	
	動画 視聴後	そう思う(正)	8	(23.5)	13	(30.2)	10	(15.6)	31	(22.0)	
		そう思わない	30	(88.2)	39	(90.7)	58	(90.6)	127	(90.1)	
		わからない	1	(2.9)	-	(0.0)	1	(1.6)	2	(1.4)	
		3	(8.8)	4	(9.3)	5	(7.8)	12	(8.5)		