

厚生労働行政推進調査事業費補助金

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス
政策研究事業

一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と
安全使用に関する研究
(H30-医薬-指定-010)

令和2年度 総括・分担研究報告書

研究代表者 袴塚 高志

令和3(2021)年3月

目 次

I.	総括研究報告書		
	一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究		
	国立医薬品食品衛生研究所 袴塚高志	1
II.	分担研究報告書		
1.	漢方製剤の安全使用に資するツールに関する研究		
	「漢方セルフメディケーション」ホームページの利用状況調査		
	国立医薬品食品衛生研究所 袴塚高志・政田さやか	8
2.	漢方製剤の安全使用に資するツールに関する研究		
	一般用漢方製剤の流通実態に関する調査		
	国立医薬品食品衛生研究所 袴塚高志・政田さやか	15
3.	漢方製剤の安全性確保に関する研究		
	名城大学薬学部 能勢充彦	40
4.	一般用漢方製剤の使用上の注意の見直しに関する研究		
	国立医薬品食品衛生研究所 袴塚高志・政田さやか	57
III.	研究成果の刊行に関する一覧表	106

一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究

研究代表者 袴塚高志 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長

研究要旨 本研究は、平成 23 年度に実施された一般用生薬・漢方製剤のリスク区分の見直しに伴う一般用漢方製剤の安全使用に資する環境整備のためのツールの普及・促進と、漢方製剤による副作用の原因成分の体内動態に影響を及ぼす要因の検討と、一般用漢方製剤の添付文書における使用上の注意等の見直しを実施するレギュラトリーサイエンス研究であり、厚生労働行政への貢献を通じた国民の健康と安全の確保を目的とする。

漢方製剤の安全使用に資するツールに関する研究では、平成 29 年 1 月に公開した「漢方セルフメディケーション」ホームページについて、公開 4 年目のアクセス状況を解析した結果、大きな変動はなく、固定利用客が比較的長時間利用しているという昨年度までの傾向を維持していることが分かった。また、サイト内に変化を付ける目的で、「漢方薬を選ぶ」の 8 項目を一定期間ごとに“Pick Up!”として取り上げる試みを開始した。さらに、「市販薬検索」ページに掲載されたセルフチェック対象の 39 処方の市場商品名について、データ元である「日本医薬品集」の出版中止によりデータ提供が受けられなくなったことに伴い、PMDA の一般用医薬品情報に照会し、添付文書情報の確認により製品の流通実態を調査、把握した。

漢方製剤の安全性確保に関する研究では、これまでに作製したカンゾウ配合漢方エキスの中からいくつかをマウスに経口投与し、その後の血中グリチルレチン酸 (GA) 濃度を測定して、処方による血中 GA 濃度推移の違いを検討した。その結果、各処方の血中 GA 濃度の薬物動態パラメーターのうち、0 時間から 48 時間までの血中濃度曲線下面積 (AUC₀₋₄₈ ($\mu\text{g}/\text{mL}\cdot\text{h}$)) は、配合カンゾウ量や GL 含量とよい相関を示した。一方、その最高血中濃度 (C_{max}) やその到達時間 (t_{max}) は、配合カンゾウ量や GL 含量とは相関せず、構成生薬の違いによる影響を受けていることが示唆された。カンゾウ配合の漢方エキス製剤の安全性確保のためには、処方単位での血中 GA 濃度推移を明らかにする必要がある。さらに処方毎の違いに寄与する要因を明らかにしなければならないことが分かった。また、若齢および加齢マウスの盲腸内容物について、アンプリコンシーケンスデータを用いた予測ゲノム解析を行い、腸内細菌叢の糖質加水分解酵素活性の予測とこれまでの実測データとの整合性について検証を行った。

一般用漢方製剤の使用上の注意の見直しに関する研究では、「製品の特徴」と「養生訓（病気の予防、症状の改善等につながる注意事項）」の統一記載案作成に向けた基礎的検討を行った。前年度に、漢方製剤以外の一般用医薬品において使用されている表現を応用できるか検討したが、合成薬における「製品の特徴」は各有効成分に基づく説明が主であり漢方製剤に応用することは難しいことが分かったため、今年度は、既存の一般用漢方製剤の添付文書に記載のある「製品の特徴」と「養生訓」を参考資料として改めて検討を行った。その結果、一般用漢方製剤を何らかの基準に従い分類した上で分類毎に記載案を作成する方向性が妥当と結論された。

研究分担者
政田 さやか 国立医薬品食品衛生研究所
生薬部主任研究官
能勢 充彦 名城大学薬学部教授

A. 目的

一般用医薬品のリスク区分に応じた販売制度は平成21年6月から施行されたが、既に、生薬・漢方製剤に関しては、従前の厚労科学研究（平成24～26年度）を基礎として、量的制限の考え方を導入したリスク区分の見直しが行われている。また、漢方製剤の安全使用に資するツールとして「安全に使うための漢方処方の確認票（確認票）」、「安全に使うための一般用漢方処方の鑑別シート（鑑別シート）」が作成され、さらに、平成27～29年度に実施された研究事業では、これらの普及を目的としたホームページ「漢方セルフメディケーション」の作成と携帯端末・タブレットでも利用できるアプリへの移行が実施されており、これらのさらなる使用促進・普及が国民の漢方製剤安全使用のために必要である。

また、従前の研究事業において、漢方製剤の主要な副作用原因成分として知られるカンゾウ含有のグリチルリチン酸 (GL) 及びマオウ含有のエフェドリン類について、漢方処方中の各々の生薬の配合量と当該成分含量が良く相関することを確認したが、一部で煎じ液のpHの違いにより抽出効率が変化することも見出されたため、成分分量が生薬配合量だけでは予測できない場合もあり得ることから、成分の体内動態も含めてさらに詳細な検討が必要である。

さらに、現行の一般用漢方製剤の添付文書における「使用上の注意」は、処方そのものに関する注意喚起ではなく、配合生薬の注意喚起の集積により成り立つ傾向があるため、処方そのものにおける適用や副作用を勘案したものとなるよう見直す必要性が指摘されている。また、

添付文書における「製品の特徴」及び「養生訓」については、この部分の不統一が一般の使用者の混乱を招いているとの指摘もあることから、業界自主申し合わせの範囲で、漢方処方特有の考え方を取り入れた統一記載の策定が求められている。

これらの状況を踏まえて、公開から4年目を迎えるwebサイト「漢方セルフメディケーション」について、例年に倣ったアクセス解析を実施するとともに、「漢方薬を選ぶ」の8種類のカテゴリーを一定期間ごとにピックアップし、ホームページに変化が生まれるように工夫した。また、「市販薬検索」ページは、株式会社じほうの協力により、毎年「日本医薬品集」から39処方のデータの提供を受けて更新してきたが、「日本医薬品集」の出版が見送られ最新データが入手できなくなったことを受けて、「日本医薬品集一般薬2019」（じほう社）と「JAPIC一般用医薬品集2020」（日本医薬情報センター）に掲載された情報を「PMDA一般用医薬品・要指導医薬品情報検索」サイトに照会し、添付文書の登録の有無から39処方の製品の流通実態を調査した。

また、カンゾウ配合漢方エキスをマウスに単回経口投与した際の血中 GA 濃度推移の実例を増やし、その薬物動態パラメーターとカンゾウ配合量や GL としての投与量との比較を行った。さらに、昨年度に実施した研究より得られた若齢および加齢マウスの盲腸内容物について、アンプリコンシーケンスデータを用いた予測ゲノム解析を行い、腸内細菌叢の糖質加水分解酵素活性の予測とこれまでの実測データとの整合性について検証を行った。

さらに、一般用漢方製剤の添付文書における「製品の特徴」及び「養生訓」については、既存の一般用漢方製剤の添付文書を参考資料として、「製品の特徴」及び「養生訓」の記載案作成に向けた基礎的検討を行った。

B. 研究方法

B-1 漢方製剤の安全使用に資するツールに関する研究

一般用漢方製剤の情報提供サイト「漢方セルフメディケーション」を運営するレンタルサーバーが提供するアクセス解析機能を用い、平成29年1月10日から令和3年1月31までの期間のアクセス数を、月別、OS・ブラウザ別、アクセス元別、滞在時間別に算出した。また、セルフチェック対象の39処方について、「じほう日本医薬品集一般薬2019」及び「JAPIC一般用医薬品集2020」に掲載されている製品を書き出しリスト化し、各製品について、「PMDA一般用医薬品・要指導医薬品情報検索」サイトで添付文書を検索し、令和2年7月時点での、最新の承認状況を確認した。

B-2 漢方製剤の安全性確保に関する研究

実験動物として、雌性 BALB/c マウス（6週令、日本 SLC）を用いた。マウスは、名城大学薬学部実験動物センターにて飼養し、適宜実験に供した。すなわち、温度・湿度ともに制御されている SPF 環境下で、個別喚起飼育ケージ内で飼育し、餌（MM-3、フナバシファーム製）と水（RO 水）は自由摂取とした。実験動物センターに到着後、少なくとも7日間の馴化を行い、各実験に供した。雌性 BALB/c マウスは、18時間絶食し、実験に供した。GL 標準品やカンゾウ配合漢方エキスは、それぞれ精製水に溶解あるいは懸濁して経口投与した。漢方エキスの投与量については、それぞれ収量が異なることから、ヒト常用量を算出し、その10倍量とした。それぞれの投与後、結果に示す時間に1.5%イソフルラン麻酔下にて下大静脈から採血し、室温下30分～60分放置した後、3,000 rpm、15分間の遠心処理をして血清とした。血清は、GA の HPLC 分析まで、 -35°C にて保存した。定量分析においては、血清に、内部標準である 2-methylantraquinone (MAQ) を添加し、HPLC 用アセトニトリルを加えて氷上に放置し、除タン

パクを行った。その後、遠心処理を行い、得られた上清を減圧乾固し、HPLC 用メタノールを加えて溶解し、HPLC 分析に供した。

アンプリコンシーケンスデータの解析による腸内細菌叢機能予測データ解析については、テクノスルガ・ラボラトリーに依頼した。

B-3 一般用漢方製剤の使用上の注意の見直しに関する研究

国立医薬品食品衛生研究所生薬部を事務局とし、日本漢方生薬製剤協会（日漢協）安全性委員会の協力を得ながら打ち合わせを行った。

本年度は、一般用漢方製剤のうち添付文書に「製品の特徴」及び「養生訓」の記載がある製品について、その添付文書情報を23例収集した。

（倫理面への配慮）

本年度の研究では、動物を用いた研究を行っており、名城大学における倫理委員会において倫理面からの審査を受けた上で実施している。

C. 結果・考察

C-1 漢方製剤の安全使用に資するツールに関する研究

「漢方セルフメディケーション」ホームページについて、今年度は、以下の点について改善を行った。鑑別シートを基礎とした「漢方薬を選ぶ」の8項目から1つを選び、45日ごとにトップページ及び「漢方薬を選ぶ」ページに「Pick Up!」項目として強調表示することとした。

「漢方セルフメディケーション」ホームページの利用状況に関する月間アクセス解析において、昨年度に続き減少傾向が続いていたが、平均 PV 数は2程度で安定して推移しており、滞在時間「30秒未満」の割合が減っていることから、当ホームページは固定の来訪者が1日複数回、ある程度の時間をかけて使用している

傾向が強いと推測された。

閲覧に使用された OS・ブラウザの種類は昨年度と同じ傾向を示し、PC よりもスマートフォンやタブレット端末による閲覧が主流であった。

「漢方セルフメディケーション」は、PC とスマホのどちらの端末でも使用できるようにレイアウトを工夫しているため、現時点で大規模なサイト改修は必要ないと考えられた。アクセス元の解析では、お気に入りや URL 入力（QR コード含む）による直接アクセス数が減り、比率としては、検索エンジンを通じたアクセスの割合が増加していた。検索エンジンを通じたアクセス数そのものは増加していないことから、コロナ禍にあって、薬局や大学からの固定アクセスが減ったのではないかと推測された。総じて、アクセス状況は固定利用者を中心に落ち着いており、令和 2 年度内で大きな変動は見られなかった。

また、「じほう日本医薬品集一般薬 2019」に収載された製品数は 1,187、「JAPIC 一般用医薬品集 2020」が 1,172 であったが、「じほう日本医薬品集一般薬 2019」収載の 164 製品、「JAPIC 一般用医薬品集 2020」収載の 96 製品は「PMDA 一般用医薬品・要指導医薬品情報検索」サイトに添付文書の登録がなく、市場には流通していないものと推察された。最終的に、確認票 39 処方では、1,182 の市場流通品が確認できた。今後も引き続き、「PMDA 一般用医薬品・要指導医薬品情報検索」サイトにおける添付文書情報を調査し、定期的に一般用漢方製剤の市場流通品を把握することが重要であると考えられた。

C-2 漢方製剤の安全性確保に関する研究

カンゾウ配合漢方エキスの経口投与における血中 GA 濃度推移に関して、今回新たに、芍薬甘草湯、半夏瀉心湯、苓甘姜味辛夏仁湯、苓桂味甘湯、杏蘇散、六君子湯、補中益気湯、十全大補湯の 8 処方をもちいて、それぞれ絶食マウスにヒト常用量の 10 倍量を経口投与し、48 時

間までの血中 GA 濃度を測定した。

カンゾウの配合量が多く、GL 含量の高い芍薬甘草湯では、投与後 6 時間と 12 時間に二つのピークが確認され、血中 GA 濃度推移としては GL 投与の場合と類似していた。芍薬甘草湯では、構成生薬がシャクヤクとカンゾウの二味であり、そのため構成生薬による影響が少ないと考えられた。一方、配合カンゾウ量や GL としての投与量が同程度の小柴胡湯や苓甘姜味辛夏仁湯では、Cmax で約 4 倍、AUC で約 2 倍苓甘姜味辛夏仁湯の方が大きな値を示した。

その他の処方についても、血中 GA 濃度推移のパターンを比較すると、いくつかのパターンをとることが推定された。すなわち、血中 GA 濃度の明らかなピークは認めないものの、比較的長い時間に渡って血中に GA が存在するものとして、半夏瀉心湯や小柴胡湯、補中益気湯が挙げられ、また投与後 8 時間あたりに一つのピークとして現れ、24 時間以降はほとんど血中に存在しないものとして、苓桂味甘湯や六君子湯、十全大補湯や杏蘇散などが挙げられる。その中でも、十全大補湯や杏蘇散投与群では、投与後 4 時間という早期に GA の一つ目のピークが出現した。

さらに、薬物動態学的パラメーターと配合カンゾウ量と AUC0-48 を比較すると、概ねよい相関を示した。また、GL としての投与量と AUC0-48 を比較すると、その相関性は低下した。その一方で、Cmax とそれぞれ配合量や GL 投与量との間には明確な相関性は認められなかった。以上の結果は、カンゾウ配合処方の投与時に、GL の主代謝物として血中に存在する GA に着目すると、その AUC0-48 を配合カンゾウ量で推定することはできるが、Cmax を推定することは難しいということの意味する。

次に、昨年度に実施した研究より得られた若齢および加齢マウスの盲腸内容物について、アンプリコンシーケンスデータを用いた予測ゲノム解析を行った。昨年度は、加齢マウスへの

GL 単回経口投与における血中 GA 濃度が予想に反して低値を示すことが明らかとなり、また、盲腸内容物から調製した腸内細菌叢酵素液による GL 加水分解活性を実測した結果、加齢により GL 加水分解活性が低下している様子が観察されていた。今年度、若齢マウスと加齢マウスから採取した盲腸内の腸内細菌叢の β グルコシダーゼ活性と β グルクロニダーゼ活性をゲノムデータから予測比較したところ、両酵素活性ともに加齢による影響はないことが示唆され、昨年度に検討した酵素活性の実測結果とは異なる結果であった。今回の機能予測は一般的な β グルコシダーゼ ([EC3.2.1.21]) と β グルクロニダーゼ ([EC 3.2.1.31]) に関するものであり、GL を加水分解可能な β グルクロニダーゼの活性を反映していない可能性が考えられた。今回得られたゲノム機能予測解析との結果を検証するためには、もう一度加齢マウスを作製し、一般的な基質に対する加水分解活性と GL に対する加水分解活性を比較検討する必要があるものと考えられる。

C-3 一般用漢方製剤の使用上の注意の見直しに関する研究

前年度までに、使用上の注意の記載事項の見直し事項として、1) 妊産婦に対する相談項、2) 高齢者に対する相談項、3) 麻黄湯における禁忌項、4) 八味地黄丸及び知柏地黄丸における禁忌項、の4点について最終的な結論を出した。今年度は、「製品の特徴」と「養生訓」について検討した。

医薬品添付文書における「製品の特徴」は、「使用者が製品の概要を知るために必要な内容を簡潔に記載すること」とされ（平成 23 年 10 月 14 日、薬食発 1014 第 6 号）、さらに、「使用者に当該医薬品の特徴をわかりやすく説明することを目的として、当該項目の記載内容が効能又は効果、用法及び用量、成分及び分量等に記載の一部と重複することは差し支えない

が、過度に重複することのないよう注意すること」とされている（平成 23 年 10 月 14 日、薬食発 1014 第 1 号）。一方、「養生訓（病気の予防、症状の改善等につながる注意事項）」については、「記載順序、記載項目を定めないが、必要に応じ関連項目中に記載することは差し支えない。ただし、使用上の注意の項中に記載しないこと」とされている（平成 11 年 8 月 12 日、医薬安第 96 号）。さらに、「製品の特徴」は、省略しても差し支えないものとされており、また、「養生訓」も必ず記載しなければならないものではなく、各社の判断で自主記載して良い、とされている。

これまで、「製品の特徴」と「養生訓」は記載を義務付けられておらず、また、その内容についても各社に任せられているため、同一処方であっても企業毎に記載内容が異なるケースがある。これにより、医薬品の使用者の混乱を招いているとの指摘があり、また、企業側にも記載例としての統一基準を待望する動きがあった。

実際に、一般用漢方製剤のうち添付文書に「製品の特徴」及び「養生訓」の記載がある製品について、その添付文書情報を 23 例収集して検討したところ、同じ処方に基づく製品間であってもほとんど統一性はなく、各社の特徴的な記述となっていることが分かった。「養生訓」については、元来の趣旨が「病気の予防、症状の改善等につながる注意事項」であり、多岐に渡る効能効果のうち、どれに焦点を絞って訴求するかは企業の特徴の一つであるため、統一することの意義は大きくないと考えられた。一方、「製品の特徴」については、それが依拠する漢方処方の特徴を記述するものとするれば、ある程度の標準的記載が可能であろうと考えられた。ただし、一般用漢方製剤製造販売承認基準に収載の 294 処方に関して個々に「製品の特徴」を策定するのは、リソース的に困難であることから、漢方処方にある程度の分類を行い、その分

類毎の特徴を策定することとなったが、294 処方
の分類に関して広くコンセンサスを得ること
ができるものの中に、本研究に適用すること
ができるものは見出せなかった。代替案として、
日本薬局方に収載されている漢方処方エキス
に限定して記載案を策定することが挙げられ
る。

D. 結論

D-1 漢方製剤の安全使用に資するツールに 関する研究

公開から 3 年以上が経過し、「漢方セルフメ
ディケーション」のアクセス状況に大きな変動
はなく、固定利用者による長時間使用が推測さ
れる成熟したホームページとなった。今後は、
今回導入した「Pick Up!」表示など、より多く
の利用者の目に留まる工夫によって、本研究成
果が一般用医薬品の安全で有効な利用を促進
し、セルフメディケーションによる国民の健康・
福祉に貢献することを期待する。また、じ
ほう社より毎年、「市販薬検索」ページに掲載す
る 39 処方の市場流通製品のデータの提供を受
けてきたが、昨年度より「日本医薬品集」の出
版が見送られたことにより、最新データの入手
が困難となったが、PMDA の添付文書情報を調査
することにより代替可能であることが分かっ
た。

D-2 漢方製剤の安全性確保に関する研究

カンゾウは医療用および一般用漢方エキス
製剤の 7 割以上に使用されることから、患者に
とって処方薬あるいはセルフメディケーショ
ンの中で服用する可能性は高い。そのため、そ
の副作用の発症機構を科学的に明らかにし、発
症を未然に防ぐ努力が必要である。副作用の原
因成分としては GL が考えられており、その代
謝物が真の原因化合物であるとして諸説ある
ものの、中心となっている代謝物は依然として
GA である。われわれは、これまでに副作用を予

測する手段として配合カンゾウ量から GL 含量
への転換を提案し、エキス製剤のインタビュー
フォームに記載されるエキスの pH もまた一つ
の目安となることを示している。今回、これま
でに GL 含量やその抽出効率などを検証してき
たエキスを用いて、いくつかのカンゾウ配合漢
方エキス投与時のマウス血中 GA 濃度推移を観
察した。その結果、カンゾウ配合量が血中曲線
下面積 (AUC₀₋₄₈) とよい相関を示した。また、最
高血中濃度 (C_{max}) については、配合カンゾウ
量とは相関性を示さず、他の構成生薬由来の成
分との相互作用が関わることを示唆された。現
時点では、漢方メーカーの提供するインタビ
ューフォームにおいても各カンゾウ配合漢方エ
キシ投与時の血中 GA 濃度やその分布・排泄な
どのデータは記載されておらず、あってもわず
かに標準品やカンゾウエキスでの血中 GA 濃度
推移しかない。漢方エキス製剤の安全使用に資
する基礎研究としては、やはり代表的なカンゾ
ウ配合漢方エキス投与時の血中 GA 濃度推移を
はじめとする体内動態を明らかにしていく必
要があるものと思われる。

D-3 一般用漢方製剤の使用上の注意の見直し に関する研究

一般用漢方製剤のうち添付文書に「製品の特
徴」及び「養生訓」の記載がある製品について、
その添付文書情報を収集し、「製品の特徴」及び
「養生訓」の記載案作成に関して検討した。「養
生訓」については、企業の特徴を表現できる項
目であるため、統一案を作成することの意義は
大きくないと考えられた。「製品の特徴」につ
いては、一般用漢方製剤製造販売承認基準に収
載の 294 処方に関して個々に策定することは困
難であるため、広くコンセンサスを得ることが
できる分類を施して分類毎に記載案を策定す
るか、あるいは、例えば日本薬局方に収載され
ている漢方処方エキスに限定して記載案を策定
するなどの工夫が必要と考えられた。

E. 健康危機情報

特になし

F. 研究発表

論文発表

該当なし

学会発表

該当なし

G. 知的財産権の出願・登録状況

該当なし

分担研究課題 一般用漢方製剤の安全使用に関する研究

研究分担者 袴塚高志 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長

研究分担者 政田さやか 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部主任研究官

「漢方セルフメディケーション」ホームページの利用状況調査

研究要旨 平成 29 年 1 月に公開した「漢方セルフメディケーション」ホームページについて、昨年度に続き、公開 4 年目のアクセス状況を解析した。アクセス解析の結果、令和 2 年度は大きな変動はなく、固定利用客が比較的長時間利用しているという昨年度までの傾向を維持していた。アクセス解析に加えて本年度は、サイト内に変化を付ける目的で、「漢方薬を選ぶ」の 8 項目を一定期間ごとに“Pick Up!”として取り上げる試みを開始した。

研究協力者

内山奈穂子 国立衛研生薬部第二室長

A. 目的

第 2 類医薬品に分類される一般用漢方製剤の安全性確保のためには、薬剤師又は登録販売者が漢方医学的考え方にに基づき購入者に適切な使用を促すことが期待される。漢方医学には体質、体力、病状、病歴などを表現する特有の「証」という考え方があり、平成 23 年度の薬事・食品衛生審議会医薬品等安全性対策調査会では、一般用であっても漢方製剤の安全性を担保するためには「証」に合った使用が重要である旨が指摘されている。この意見を受けて従前の厚労科学研究「一般用医薬品における、化学合成品等のリスク区分の見直しと漢方製剤の安全性確保に関する研究 (平成 24～26 年)」では、薬剤師や登録販売者による服薬指導を念頭に、一般用漢方製剤の適切な使用を促し、副作用回避を支援する目的で、薬局店頭において販売者の情報提供や購入者のセルフチェックに利用できる情報提供ツールを作成してきた。これまでに、「安全に使うための漢方処方確認票」(以

下、「確認票」)39 処方と、39 処方の使い分けの目安となる「安全に使うための一般用漢方処方の鑑別シート」(以下、「鑑別シート」)が完成している。

他方、平成 25 年 1 月の最高裁判決や同年 6 月の日本再興政略の策定を経て、薬事法が改正され、平成 26 年 6 月 12 日以降、要指導医薬品を除くすべての一般用医薬品は一定の条件下で、インターネットや電話で販売・入手できるようになった。すなわち、消費者が自ら「証」に合った漢方処方を選択し、安全かつ効果的に漢方薬を服用するためには、店頭販売のみならず、インターネット販売に対応した消費者向けの情報提供が必要となった。そこで本研究では、インターネット販売を見据えた購入者の安全性を確保する方策として、上述の「確認票」及び「鑑別シート」を基礎として、インターネットを通じて、消費者が自分の体質や症状に合った処方を選択し、適正に漢方製剤を服用する手引きとなる web サイトを作成、公開した。本年度は、公開から 4 年目を迎える web サイト「漢方セルフメディケーション」<<https://www.kampo-self.jp>> について、例年に倣ったアクセス解析

を実施するとともに、「漢方薬を選ぶ」の8種類のカテゴリーを一定期間ごとにピックアップし、ホームページに変化が生まれるように工夫した。

B. 方法

アクセス解析

一般用漢方製剤の情報提供サイト「漢方セルフメディケーション」を運営するレンタルサーバーが提供するアクセス解析機能を用い、平成29年1月10日から令和3年1月31までの期間のアクセス数を、月別、OS・ブラウザ別、アクセス元別、滞在時間別に算出した。

訪問者数：サイトにアクセスした訪問者の数。同一IPはカウントしないユニークなアクセス数。

訪問回数：サイトがアクセスされた回数。同一IPの60分以内のアクセスはカウントしない。

ページビュー(PV)：サイトでHTML文書が表示された回数。同一IPでもカウントする。

(倫理面への配慮)

ヒト由来サンプル及び実験動物を使用しておらず、該当する事由はない。

C. 結果・考察

アクセス解析

月間アクセス数の解析では、昨年度に続き減少傾向が続いていたが、平均PV数は2程度で安定して推移しており、滞在時間「30秒未満」の割合が減っていることから、当ホームページは固定の来訪者が1日複数回、ある程度の時間をかけて使用している傾向が強いと推測された(表1, 2)。

閲覧に使用されたOS・ブラウザの種類は昨年度と同じ傾向を示し、PCよりもスマートフォンやタブレット端末による閲覧が主流であった(表2)。「漢方セルフメディケーション」は、PCとスマホのどちらの端末でも使用できるようにレイアウトを工夫しているため、現時点で大規模なサイト改修は必要ないと考えられた。

アクセス元の解析では、お気に入りやURL入力(QRコード含む)による直接アクセス数が減り、比率としては、検索エンジンを通じたアクセスの割合が増加していた。検索エンジンを通じたアクセス数そのものは増加していないことから、コロナ禍にあつて、薬局や大学からの固定アクセスが減ったのではないかと推測された。

総じて、アクセス状況は固定利用者を中心に落ち着いており、令和2年度内で大きな変動は見られなかった。

サイトの更新

検索エンジン等では常時、ウェブサイトの表示順位を最適化(検索エンジン最適化; Search Engine Optimization, SEO)しており、より多くの人の目に留まるためには、SEO対策も重要である。「漢方セルフメディケーション」ホームページは公開から4年目を迎え成熟しており、SEO評価に関係する更新頻度が滞っていることから、ホームページ制作会社からの助言を得て、サイトの内容は変えずに定期的に「Pick Up!」項目を表示することとした(図2, 3)。

具体的には、鑑別シートを基礎とした「漢方薬を選ぶ」の8項目から1つを選び、45日ごとにトップページ及び「漢方薬を選ぶ」ページに「Pick Up!」項目として強調表示することとし、本年度末から開始した(表3)。

D. 結論

公開から3年以上が経過し、「漢方セルフメディケーション」のアクセス状況に大きな変動はなく、固定利用者による長時間使用が推測される成熟したホームページとなった。今後は、「Pick Up!」表示の導入など、より多くの利用者の目に留まる工夫によって、本研究成果が一般用医薬品の安全で有効な利用を促進し、セルフメディケーションによる国民の健康・福祉に貢献することを期待する。

E. 研究発表

なし

F. 知的財産権の出願・登録状況

なし

表1 「漢方セルフメディケーション」ホームページの月別アクセス状況

	訪問者数	訪問回数	PV数	平均PV数
平成29年1月	140	256	2,178	8.51
平成30年1月	2,486	3,880	5,089	1.31
3月	3,178	4,905	6,831	1.39
12月	1,777	5,571	16,325	2.93
平成31年1月	1,940	5,937	10,211	1.72
令和元年5月	2,130	7,297	12,566	1.72
令和2年1月	1,147	2,924	5,223	1.79
2月	767	2,142	3,288	1.54
3月	769	2,567	3,716	1.45
4月	595	2,002	3,083	1.54
5月	683	1,947	3,130	1.61
6月	607	1,786	3,223	1.80
7月	824	1,903	4,318	2.27
8月	569	1,400	2,650	1.89
9月	684	1,495	3,310	2.21
10月	827	1,654	6,453	3.90
11月	878	1,600	3,934	2.46
12月	879	1,610	3,157	1.96
令和3年1月	910	1,566	3,849	2.46
2月	781	1,313	2,650	2.02
3月	791	1,303	2,729	2.09

		平成29年3月	平成30年1月	平成31年1月	令和3年1月
一日あたりの最大訪問回数		62	144	222	87
一日あたりの平均訪問回数		35.6	125.2	191.5	50.5
一日あたりのPV最大値		133	270	459	327
一日あたりのPV平均値		61.1	164.2	329.4	124.2
OS (ヒット数)	Windows	6,546 (64.1%)	5,774 (56.5%)	11,082 (27.1%)	10,329 (35.8%)
	Macintosh	284 (2.8%)	329 (3.2%)	997 (2.4%)	1,492 (5.2%)
	Linux Android	1,752 (17.2%)	964 (9.4%)	8,378 (20.5%)	6,547 (22.6%)
	iOS	1,574 (15.4%)	3,046 (29.8%)	20,361 (49.7%)	9,074 (31.4%)
	その他	52 (0.5%)	109 (1.1%)	118 (0.3%)	1,024 (3.5%)
ブラウザ (ヒット数)	MS Internet Explorer	3,345 (32.8%)	1,719 (16.8%)	5,224 (12.8%)	3,484 (12.0%)
	Google Chrome	3,089 (30.3%)	1,656 (16.2%)	11,516 (28.1%)	13,000 (44.9%)
	Firefox	1,631 (16%)	3,107 (30.4%)	1,296 (3.2%)	929 (3.2%)
	Safari	1,493 (14.6%)	3,036 (29.7%)	19,283 (47.1%)	9,954 (34.4%)
	その他	650 (6.3%)	696 (6.7%)	3,617 (8.8%)	1,377 (4.8%)
アクセス元 (PV数)	お気に入りやURL入力	1,041 (86.7%)	4,438 (95%)	7,495 (90.9%)	1,560 (73.8%)
	検索エンジン	94 (7.8%)	137 (2.9%)	684 (8.3%)	463 (21.9%)
	外部リンク	66 (5.5%)	99 (2.1%)	64 (0.8%)	90 (4.3%)
滞在時間 (訪問回数)	0秒-30秒	994 (90%)	3,534 (91.1%)	4,646 (78.3%)	1,189 (75.9%)
	30秒-2分	43 (3.9%)	32 (0.8%)	205 (3.5%)	148 (9.5%)
	2分-5分	24 (2.2%)	26 (0.7%)	144 (2.4%)	90 (5.7%)
	5分-15分	18 (1.6%)	58 (1.5%)	185 (3.1%)	58 (3.7%)
	15分-30分	11 (1%)	61 (1.6%)	206 (3.5%)	38 (2.4%)
	30分-1時間	8 (0.7%)	95 (2.4%)	350 (5.9%)	28 (1.8%)
	1時間以上	6 (0.5%)	74 (1.9%)	201 (3.4%)	15 (1.0%)

女性の体調トラブル	3/1 ~ 4/15
神経症	4/16 ~ 5/31
頭痛	6/1 ~ 7/15
尿のトラブル	7/16 ~ 8/31
胃のトラブル	9/1 ~ 10/15
腸のトラブル	10/16 ~ 11/30
カゼ（症状別）	12/1 ~ 1/15
カゼ（経過別）	1/16 ~ 2/28




図1 「漢方セルフメディケーション」ホームページの月別アクセス状況の推移



図2 「漢方セルフメディケーション」トップページの更新 (Pick Up の追加)

次の中からお悩みの症状をお選びください



図3 「漢方薬を選ぶ」ページの更新 (Pick Up の追加)

分担研究課題 一般用漢方製剤の安全使用に関する研究

研究分担者 袴塚高志 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長

研究分担者 政田さやか 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部主任研究官

一般用漢方製剤の流通実態に関する調査

研究要旨 平成 29 年 1 月に公開したウェブサイト「漢方セルフメディケーション」では「市販薬検索」ページを設け、セルフチェック対象の 39 処方に該当する商品名を掲載してきたが、データ元である「日本医薬品集」の出版中止に伴い、データ提供が受けられなくなった。そこで本年度は、書籍の掲載情報を PMDA の一般用医薬品情報に照会し、添付文書により製品の流通実態を調査、把握した。

研究協力者

内山奈穂子 国立衛研生薬部第二室長
里 香世子 国立衛研生薬部
長島義昌 日本漢方生薬製剤協会

<<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/>>

(以下、PMDA) に照会し、添付文書の登録の有無から 39 処方の製品の流通実態を調査した。

A. 目的

本研究では、一般用漢方製剤の安全性確保のための情報提供ツールとして、「安全に使うための漢方処方の確認票」(以下、「確認票」) 39 処方と、39 処方の使い分けの目安となる「安全に使うための一般用漢方処方の鑑別シート」(以下、「鑑別シート」)、これらを基にしたウェブサイト「漢方セルフメディケーション」<<https://www.kampo-self.jp>> を作成、公開してきた。このうち、「市販薬検索」ページは、株式会社じほうの協力により、毎年「日本医薬品集」から 39 処方のデータの提供を受けて更新してきたが、昨年度より「日本医薬品集」の出版が見送られ最新データが入手できなくなった。そのため、本年度は「日本医薬品集一般薬 2019」(じほう社、以下“じほう”) と「JAPIC 一般用医薬品集 2020」(日本医薬情報センター、以下“JAPIC”) に掲載された情報を「PMDA 一般用医薬品・要指導医薬品情報検索」サイト

B. 方法

アクセス解析

“じほう” 及び “JAPIC” に掲載されている 39 処方 (黄連解毒湯、乙字湯、葛根湯、葛根湯加川きゅう辛夷、加味帰脾湯、加味逍遥散、響声破笛丸、駆風解毒散、桂枝茯苓丸、五虎湯、牛車腎気丸、五淋散、五苓散、柴胡加竜骨牡蠣湯、柴胡桂枝湯、芍薬甘草湯、十全大補湯、小柴胡湯、小青竜湯、辛夷清肺湯、清心蓮子飲、疎経活血湯、大黃甘草湯、大柴胡湯、釣藤散、猪苓湯、桃核承気湯、当帰芍薬散、独活葛根湯、麦門冬湯、八味地黄丸、半夏厚朴湯、半夏瀉心湯、防己黄耆湯、防風通聖散、補中益気湯、麻黄湯、苓桂朮甘湯、六君子湯) の製品を書き出しリスト化した。各製品について、“PMDA” で各製品の添付文書を検索し、令和 2 年 7 月時点での、最新の承認状況を確認した。

(倫理面への配慮)

ヒト由来サンプル及び実験動物を使用して

おらず、該当する事由はない。

C. 結果・考察

結果を別紙に記す。書籍に掲載された製品数は、“じほう”が1,187、“JAPIC”が1,172であり、“じほう”の掲載数の方が多かった。しかし、“じほう”掲載の164製品、“JAPIC”掲載の96製品は“PMDA”に添付文書の登録がなく、市場には流通していないものと推察された。また、“じほう”にも“JAPIC”にも掲載されていないが、“PMDA”には添付文書が登録されている製品が78製品見つかった。“じほう”や“JAPIC”等の書籍の情報は、製造販売元にアンケート調査して得られた結果を基にしており、必ずしも市場の製品を完全に把握できているものではない。一方で、添付文書は製品を販売する上で不可欠な要素であり、“PMDA”の情報が最も市場を反映していると考えられた。最終的に、確認票39処方では、1,182の市場流通品が確認できた。今後も引き続き、“PMDA”における添付文書情報を調査し、定期的に一般用漢方製剤の市場流通品を把握することが重要であると考えられた。

D. 結論

書籍及びPMDAの登録情報から、一般用漢方製剤の39処方1,182製品の流通を確認した。PMDAの添付文書情報を基にしたことにより、昨年度までよりも正確な製品数を把握することができた。

E. 研究発表

なし

F. 知的財産権の出願・登録状況

なし

J	A	P	M	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効成分	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○			JPS黄連解毒湯エキス錠N	JPSオウレンゲドクトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯乾燥エキス1.6G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	錠剤	錠	
○	○	○			JPS漢方顆粒-3号	JPSカンボウカリウ3号	ジェービーエス製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス (45錠) 1.28G (オウレン1.2G・オウバク1.2G・オウゴン2.4G・サンシシ1.6G)	錠剤	顆粒	
○	○	○			ウチダの黄連解毒湯	ウチダノオウレンゲドクガン	(株)ウチダ和漢薬	黄連解毒湯	粉末5.882G (オウバク末1.5G・オウレン末1.5G・オウゴン末3G・サンシシ末2G)	錠剤	丸	
○	○	○			ウチダの黄連解毒湯	ウチダノオウレンゲドクトウ	(株)ウチダ和漢薬	黄連解毒湯	オウレン1.5G, オウバク1.5G, オウゴン3G, サンシシ2G	その他	煎剤	
○	○	○			ウチダの黄連解毒湯エキス散	ウチダノオウレンゲドクトウエキスサン	(株)ウチダ和漢薬	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス2G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	散剤	煎剤	
○	○	○			ウチダの清熱瀉火	ウチダノイネツシヤカ	(株)ウチダ和漢薬	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス2G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	散剤	錠剤	
○	○	○			黄解A錠	オウカイAジョウ	一元製薬 (株)	黄連解毒湯	オウレン末4.2G, オウゴン末8.5G, オウバク末4.2G, サンシシ末5.6G, 水性エキス2.5G (オウレン4.95G・オウゴン9.9G・オウバク末4.2G)	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○			オウゲE P錠	オウゲE Pジョウ	羽盛堂薬品 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス (925錠) 0.44G (オウゴン1.08G・オウバク0.54G・オウレン0.54G・サンシシ0.72G), オウゴン末0.405G	錠剤	錠	
○	○	○			オウゲイン「コタロー」	オウゲインコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス散 (34錠) 1.62G (オウレン1.125G・オウバク1.125G・サンシシ1.5G・オウゴン2.25G)	錠剤	錠	
○	○	×		製販HPには掲載あり。	黄解散粒状	オウゲサンリュウジョウ	長倉製薬 (株)	黄連解毒湯	オウレン0.75G, オウバク0.5G, オウゴン0.5G, サンシシ0.35G	錠剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			黄連解毒湯Aエキス細粒三和生薬	オウレンゲドクトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス1.7G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	散剤	細粒	
○	○	○			黄連解毒湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	オウレンゲドクトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス1.7G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	散剤	細粒	
○	○	○			黄連解毒湯エキス顆粒KM-2	オウレンゲドクトウエキスカリユKM-2	北日本製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス1.2G (オウゴン3G・サンシシ2G・オウバク1.5G・オウレン1.5G)	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○			黄連解毒湯エキス顆粒S A	オウレンゲドクトウエキスカリユS A	帝國漢方製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス (45錠) 1.36G (オウレン1.6G・オウバク1.6G・オウゴン2.4G・サンシシ1.6G)	錠剤	顆粒	湧永製薬 (株)
○	○	○			黄連解毒湯エキス (細粒) 4	オウレンゲドクトウエキスサイリュウ4	松浦薬業株式会社	黄連解毒湯	黄連解毒湯水製エキス5.8G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	錠剤	細粒	
○	○	○			黄連解毒湯エキス細粒「コタロー」	オウレンゲドクトウエキスサイリュウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス (45錠) 1.44G (オウレン1.2G・オウバク1.2G・オウゴン2.4G・サンシシ1.6G)	錠剤	細粒	
○	○	○			黄連解毒湯エキス散 (勝昌)	オウレンゲドクトウエキスサンショウショウ	(株)東洋薬行	黄連解毒湯	黄連解毒湯水製エキス1.8G (オウレン2G・オウバク2G・オウゴン3G・サンシシ2G)	散剤	散	
○	○	○			黄連解毒湯「タキザワ」	オウレンゲドクトウタキザワ	(株)タキザワ漢方廠	黄連解毒湯	オウレン2G, オウゴン3G, オウバク2G, サンシシ2G	その他	煎剤	
○	○	○			オースギコーミン	オースギコーミン	大杉製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス1.7G (オウレン1.5G (黄連) 1.5G・オウバク (黄柏) 3G・オウゴン (黄ゴ) 3G・サンシシ (山梔子) 3G)	散剤	顆粒	
○	○	○			大峰エキス錠黄連解毒湯A	オオミネエキスジョウオウレンゲドクトウA	大峰堂薬品工業 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス900MG (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒	クラシエカンボウオウレンゲドクトウエキスカリユウ	クラシエ製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス (12錠) 700MG (オウゴン1.5G・サンシシ1G・オウレン0.75G・オウバク0.75G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒S	クラシエカンボウオウレンゲドクトウエキスカリユS	クラシエ製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス (34錠) 1050MG (オウゴン2.25G・サンシシ1.5G・オウレン1.125G・オウバク1.125G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			神農黄連解毒湯エキス錠	シンノウオウレンゲドクトウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス1.6G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・オウゴン3G・サンシシ2G)	錠剤	錠	
○	○	○			ツムラ漢方黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラカンボウオウレンゲドクトウエキスカリユウ	(株)ツムラ	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス(23錠)1g (オウゴン1.98g, サンシシ1.32g, オウバク・オウレン各0.99g)	散剤		
○	○	○			ツムラ漢方黄連解毒湯エキス顆粒A	ツムラカンボウオウレンゲドクトウエキスカリユA	(株)ツムラ	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス (12錠) 0.75G (オウゴン1.5G・サンシシ1G・オウレン1G・オウバク0.75G)	散剤	顆粒	
○	○	×			デルマンバランス-アミン	デルマンバランス-アミン	(有)本町薬品	黄連解毒湯	水製乾燥エキス粉末1.9G (オウレン1.5G・オウバク1.5G・サンシシ2G・オウゴン3G)			
○	○	○			東洋の黄連解毒湯	トウヨウノオウレンゲドクトウ	東洋漢方製薬 (株)	黄連解毒湯	オウレン1.5G, オウバク1.5G, オウゴン3G, サンシシ2G	その他	煎剤	
○	○	○			東洋の黄連解毒湯エキス顆粒	トウヨウノオウレンゲドクトウエキスカリユウ	東洋漢方製薬 (株)	黄連解毒湯	水製乾燥エキス0.83G (オウレン0.6G・オウバク0.6G・オウゴン1.2G・サンシシ0.8G), オウレン末0.48G, オウバク末0.48G	散剤	煎剤	
○	○	×		確認薬商品例	トチモトの黄連解毒湯	トチモトノオウレンゲドクトウ	(株)栃本天海堂	黄連解毒湯	オウゴン3G, オウバク1.5G, オウレン1.5G, サンシシ2G	錠剤	顆粒	
○	○	×		確認薬商品例	花扇黄解丸	ハナオウギオウゲガン	小西製薬 (株)	黄連解毒湯	オウゴン1G, オウゴン1.5G, オウバク1G, サンシシ1G	錠剤	丸	
○	○	×			ホリエの黄連解毒湯	ホリエノオウレンゲドクトウ	福江生薬 (株)	黄連解毒湯	オウレン1.5G, オウバク1.5G, オウゴン3G, サンシシ2G	錠剤	煎剤	
○	○	○			本草黄連解毒湯エキス錠-H	ホンゾウオウレンゲドクトウエキスジョウ-H	本草製薬 (株)	黄連解毒湯	黄連解毒湯エキス	錠剤	錠	
○	○	○			JPS乙字湯エキス錠N	JPSオツジトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	乙字湯	乙字湯乾燥エキス1.92G (トウキ3.6G・サイコ3G・オウゴン1.8G・カンゾウ1.2G・ショウマ0.9G・ダイオウ0.6G)	錠剤	錠	
○	○	○			JPS漢方顆粒-4号	JPSカンボウカリウ4号	ジェービーエス製薬 (株)	乙字湯	乙字湯エキス(45錠)	錠剤	顆粒	
○	○	○			一元乃錠乙字湯	イチゲンノジョウイザイオツジトウ	一元製薬 (株)	乙字湯	水製エキス1333mg (サイコ・トウキ各4000mg, オウゴン2667mg, ショウマ1333mg, ダイオウ667mg, カンゾウ2000mg)	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○			ウチダの乙字湯	ウチダノオツジトウ	(株)ウチダ和漢薬	乙字湯	ダイオウ, サイコ, ショウマ, カンゾウ, オウゴン etc.	その他	煎剤	
○	○	○			ウチダの乙字湯エキス散	ウチダノオツジトウエキスサン	(株)ウチダ和漢薬	乙字湯	乙字湯エキス2.44G (トウキ3.6G・サイコ3G・オウゴン1.8G・カンゾウ1.2G・ショウマ0.9G・ダイオウ0.6G)	散剤	細粒	
○	○	○			ウチダの天地通橋	ウチダノテンチウツョウ	(株)ウチダ和漢薬	乙字湯	乙字湯エキス2.44G (トウキ3.6G・サイコ3G・オウゴン1.8G・カンゾウ1.2G・ショウマ0.9G・ダイオウ0.6G)	散剤	細粒	旭美商事 (株)
○	○	○			乙字湯	オツジトウ	東洋漢方製薬 (株)	乙字湯	トウキ6G, サイコ5G, オウゴン3G, カンゾウ3G, ショウマ1G, ダイオウ1G	その他	煎剤	
○	○	○			乙字湯Aエキス細粒三和生薬	オツジトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	乙字湯	乙字湯エキス4.1G (ダイオウ1G・サイコ5G・ショウマ1.5G・カンゾウ2G・オウゴン3G・トウキ6G)	散剤	細粒	
○	○	○			乙字湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	オツジトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	乙字湯	乙字湯エキス4.1G (ダイオウ1G・サイコ5G・ショウマ1.5G・カンゾウ2G・オウゴン3G・トウキ6G)	散剤	細粒	
○	○	○			乙字湯エキス (細粒) 3	オツジトウエキスサイリュウ3	松浦薬業株式会社	乙字湯	乙字湯水製エキス3.4G (ダイオウ0.5G・サイコ2.5G・ショウマ0.75G・カンゾウ1G・オウゴン1.5G・トウキ3G)	錠剤	細粒	
○	○	○			乙字湯エキス錠 (大峰)	オツジトウエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	乙字湯	乙字湯エキス (12錠) 2070MG (トウキ3G・サイコ2.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1G・ショウマ0.75G・ダイオウ0.5G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			乙字湯エキス錠クラシエ	オツジトウエキスジョウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	乙字湯	乙字湯エキス (12錠) 2070MG (トウキ3G・サイコ2.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1G・ショウマ0.75G・ダイオウ0.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	×		製販HPには掲載あり。	オツジトウ錠	オツジトウジョウ	長倉製薬 (株)	乙字湯	水製乾燥エキス1.2G (トウキ2G・サイコ1.65G・オウゴン1G・ダイオウ0.2G・ショウマ0.35G・カンゾウ1.2G), トウキ1.2G, オウゴン0.8G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			乙字湯「タキザワ」	オツジトウタキザワ	(株)タキザワ漢方廠	乙字湯	トウキ6G, オウゴン3G, ショウマ1.5G, サイコ5G, カンゾウ2G, ダイオウ0.5G	その他	煎剤	
○	○	×		製販HPには掲載あり。	乙字湯粒状	オツジトウカリユウ	長倉製薬 (株)	乙字湯	サイコ1.2G, オウゴン1.2G, ショウマ0.4G, トウキ1.2G, ダイオウ0.4G, 水性エキス (カンゾウ3G)	錠剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			オツジンS「コタロー」(乙字湯エキス錠)	オツジンSコタローオツジトウエキスジョウ	小太郎漢方製薬 (株)	乙字湯	水製エキス2.6G (トウキ3G・サイコ2.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・ショウマ0.5G・ダイオウ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○			「クラシエ」漢方乙字湯エキス顆粒	クラシエカンボウオツジトウエキスカリユウ	クラシエ製薬 (株)	乙字湯	乙字湯エキス (12錠) 2100MG (トウキ3G・サイコ2.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1G・ショウマ0.75G・ダイオウ0.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			小太郎漢方内服薬	コトウカンボウチナイフクヤク	小太郎漢方製薬 (株)	乙字湯	水製エキス2.6G (トウキ3G・サイコ2.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・ショウマ0.5G・ダイオウ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○			ツムラ漢方乙字湯エキス顆粒	ツムラカンボウオツジトウエキスカリユウ	(株)ツムラ	乙字湯	乙字湯エキス (12錠) 2G (トウキ3G・サイコ2.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1G・ショウマ0.5G・ダイオウ0.25G)	散剤	顆粒	
○	○	×			デルマンシレック	デルマンシレック	(有)本町薬品	乙字湯	水製エキス粉末5G (トウキ6G・サイコ5G・オウゴン3G・カンゾウ3G・ショウマ1G・ダイオウ1G)	錠剤	顆粒	
○	○	×		確認薬商品例	トチモトの乙字湯	トチモトノオツジトウ	(株)栃本天海堂	乙字湯	オウゴン3G, カンゾウ2G, サイコ5G, ショウマ1.5G, ダイオウ1G, トウキ6G	煎剤	煎剤	
○	○	×		製販HPには掲載あり。	南陽 (エキス顆粒)	ナンヨウエキスカリユウ	(株)建林松鶴堂	乙字湯	水製エキス (乾燥エキス) 1.5G (トウキ2G・サイコ2G・オウゴン1.5G・カンゾウ1G・ショウマ0.5G・ダイオウ0.25G)	錠剤	錠	
○	○	○			ニタンダ乙字湯エキス顆粒	ニタンダオツジトウエキスカリユウ	ニ反田薬品工業 (株)	乙字湯	乙字湯エキス4.27G (トウキ6G・サイコ5G・オウゴン3G・カンゾウ3G・ショウマ1G・ダイオウ1G)	散剤	煎剤	
○	○	○			ブリザ漢方内服薬	ブリザカンボウナイフクヤク	松浦薬業株式会社	乙字湯	乙字湯水製エキス3.4G (ダイオウ0.5G・サイコ2.5G・ショウマ0.75G・カンゾウ1G・オウゴン1.5G・トウキ3G)	散剤	細粒	大正製薬株式会社
○	○	○			ホリエの乙字湯	ホリエノオツジトウ	福江生薬 (株)	乙字湯	トウキ6G, サイコ5G, オウゴン3G, カンゾウ3G, ショウマ1G, ダイオウ1G	錠剤	煎剤	
○	○	○			本草乙字湯エキス顆粒-H	ホンゾウオツジトウエキスカリユウ-H	本草製薬 (株)	乙字湯	乙字湯エキス (23錠) 2.2G (トウキ4G・サイコ3.33G・オウゴン2G・カンゾウ1.33G・ショウマ1G・ダイオウ0.67G)	錠剤	顆粒	
○	○	○			モリタイデー	モリタイデー	大杉製薬 (株)	乙字湯	乙字湯乾燥エキス3.6G (ダイオウ (大黄) 1G・サイコ (寒胡) 5G・ショウマ (升麻) 1.5G・カンゾウ (甘草) 2G・オウゴン)	錠剤	顆粒	
○	○	×			モリヂーネン	モリヂーネン	福井製薬 (株)	乙字湯	乙字湯乾燥エキス1200MG (トウキ5G・サイコ4G・オウゴン3G・カンゾウ3G・ショウマ1.5G・ダイオウ1G)	錠剤	錠	
○	○	○			KBC顆粒V	KBCカリユV	新生薬品工業 (株)・京	葛根湯	日高葛根湯エキス(乾燥)(下記の生薬の水製抽出エキス)4.4g (カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g,	散剤		第一三共ヘルスケア (株)

J	A	P	I	C	P	M	D	A	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
										NY葛根湯内服液 α	NYカクコントウナイフクエキ α	株式会社HBC	葛根湯	葛根湯エキス8300mg (カクコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、シヤクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ1.0g)より製	液剤		日本薬劑株式会社
										カゼゼブ内服液 S	カゼゼブナイフクエキ S	(株) 廣實堂	葛根湯	葛根湯エキス8300mg (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										カゼファースト内服液 S	カゼファーストナイフクエキ S	(株) 廣實堂	葛根湯	葛根湯エキス8300mg (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										葛根湯クイック	カクコントウクイック	テイカ製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス (23種) 2,138mg (カクコン2.67g、マオウ・タイソウ各2.0g、ケイヒ・シヤクヤク・カンゾウ各1.33g、ショウキョウ)	散剤		クラシエ薬品株式会社
										葛根湯内服液・NY2	カクコントウナイフクエキ・NY2	日本薬劑株式会社	葛根湯	葛根湯エキス8300mg (カクコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、シヤクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ1.0g)	液剤		
										葛根湯内服液AX	カクコントウナイフクエキAX	株式会社HBC	葛根湯	葛根湯エキス4310mg (カクコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、シヤクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ)	液剤		
										葛根湯内服液K	カクコントウナイフクエキK	株式会社HBC	葛根湯	葛根湯エキス4310mg (カクコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、シヤクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ)	液剤		
										葛根湯内服液M	カクコントウナイフクエキM	萬金薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.31g (カクコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シヤクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		販売元大昭製薬 (株)
										葛根湯内服液S	カクコントウナイフクエキS	萬金薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3g (カクコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シヤクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		(株) 大木
										「クラシエ」漢方葛根湯エキスF C錠	クラシエカンボウカクコントウエキS F C ジョウ	葛根湯	葛根湯	葛根湯エキス (12種) 2,600mg (カクコン4.0g、マオウ・タイソウ各2.0g、ケイヒ・シヤクヤク各1.5g、カンゾウ1.0g、ショウキョウ)	錠剤		クラシエ薬品 (株)
										大生堂 葛根湯シロップ A	ダイセイドウカクコントウシロップ A	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯軟エキス8.3g (カクコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シヤクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		株式会社富士薬品
										ツムラ漢方葛根湯エキス錠A	ツムラカンボウカクコントウエキSジョウA	(株) ツムラ	葛根湯	葛根湯エキス(23種)2.8g (カクコン2.64g、タイソウ・マオウ各1.98g、カンゾウ・ケイヒ・シヤクヤク各1.32g、ショウキョウ0.6)	錠剤		
										ネオ真治内服液「葛根湯」 S	ネオシンジナイフクエキカクコントウS	(株) 廣實堂	葛根湯	葛根湯エキス8300mg (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										ハイカゼ内服液S	ハイカゼナイフクエキS	(株) 廣實堂	葛根湯	葛根湯エキス8300mg (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										ヒストミン葛根湯液	ヒストミンカクコントウエキ	小林薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.34g (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										ヒストミン葛根湯液2	ヒストミンカクコントウエキ2	小林薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.34g (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										ピタクル葛根湯液	ピタクルカクコントウエキ	小林薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.34g (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										ピタクル葛根湯液2	ピタクルカクコントウエキ2	小林薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.34g (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										ブルミン葛根湯液	ブルミンカクコントウエキ	小林薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.34g (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		
										DHC漢方 葛根湯エキス錠	DHCカンボウカクコントウエキSジョウ	(株) ディー・エイチシー	葛根湯	葛根湯エキス(34種)	錠剤		フィルムコーティング錠
										J A アスマリン葛根湯シロップ	J A アスマリンカクコントウシロップ	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯軟エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		シロップ
										JPS葛根湯エキス錠N	JPSカクコントウエキSジョウN	ジェー・ピー・エス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12種) 2.5G (カクコン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ)	錠剤		厚生農業協同組合連合会
										JPS漢方顆粒-5号	JPSカクコントウエキウ-5ゴウ	ジェー・ピー・エス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (45種) 4G (カクコン6.4G・マオウ3.2G・タイソウ3.2G・ケイヒ2.4G・シヤクヤク2.4G・カンゾウ1.6G・ショウキョウ)	錠剤		錠
										アズマリン葛根湯シロップ	アズマリカクコントウシロップ	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		シロップ
										アトラスミン葛根湯液	アトラスミンカクコントウエキ	小林薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.34G (カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	液剤		本革製薬(株)
										アルシン葛根湯液WS	アルシンカクコントウエキWS	遊賀製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4340MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										いけだや葛根湯	イケダヤカクコントウ	(株) 延寿堂	葛根湯	カクコン4G、マオウ3G、ショウキョウ1G、タイソウ3G、ケイヒ2G、シヤクヤク2G、カンゾウ2G	その他		錠剤
										イトーの葛根湯エキス顆粒	イトーノカクコントウエキスカリュウ	井藤漢方製薬 (株)	葛根湯	エキス2.55G (カクコン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	錠剤		(株) 池田屋安兵衛商店
										ウチダのカクコン湯	ウチダノカクコントウ	(株) ウチダ和漢薬	葛根湯	カクコン4G、マオウ3G、ショウキョウ1G、タイソウ3G、ケイヒ2G、シヤクヤク2G、カンゾウ2G	その他		錠剤
										ウチダの葛根湯エキス散	ウチダノカクコントウエキSサン	(株) ウチダ和漢薬	葛根湯	葛根湯エキス2.45G (カクコン2.4G・マオウ1.8G・タイソウ1.8G・ケイヒ1.2G・シヤクヤク1.2G・カンゾウ1.2G・ショウキョウ)	散剤		顆粒
										ウチダの解熱散 (分包)	ウチダノゲヒョウジョクインブソウ	(株) ウチダ和漢薬	葛根湯	葛根湯エキス2.45G (カクコン2.4G・マオウ1.8G・タイソウ1.8G・ケイヒ1.2G・シヤクヤク1.2G・カンゾウ1.2G・ショウキョウ)	散剤		顆粒
										エスタックかぜ内服液	エスタックカゼナイフクエキ	エスエス製薬(株)	葛根湯	葛根湯軟エキス	液剤		液
										エスタック葛根湯内服液	エスタックカクコントウナイフクエキ	エスエス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8300MG (カクコン8G・マオウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・タイソウ4G・ショウキョウ1G・カンゾウ2G)	液剤		液
										オオクサ葛根湯エキス顆粒EX	オオクサカクコントウエキスカリュウEX	大華薬品株式会社	葛根湯	葛根湯エキス(34種)	錠剤		顆粒
										オオクサ葛根湯エキス顆粒 (分包)	オオクサカクコントウエキスカリュウブンボウ	大華薬品 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (23種) 3.33G (カクコン5.33G・マオウ2.67G・タイソウ2.67G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ1.33G)	散剤		顆粒
										オオクサ葛根湯エキス錠	オオクサカクコントウエキSジョウ	大華薬品 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12種) 2.5G (カクコン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ)	錠剤		錠
										カイゲンかぜ内服液	カイゲンカゼナイフクエキ	萬金薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										敬源葛根湯エキス顆粒	カイゲンカクコントウエキスカリュウ	第一薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12種) 1604MM (カクコン2G・マオウ1.5G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G・ショウキョウ0.5G)	液剤		液
										カコナル	カコナル	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯抽出液90ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										カコナル2	カコナル2	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯濃縮液81ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										カコナル2DX顆粒	カコナル2DXカリュウ	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯エキス (乾燥) 4.4G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ)	散剤		顆粒
										カコナル2葛根湯顆粒 (少量処方)	カコナル2カクコントウカリュウ (マンリョウショホウ)	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯エキス (乾燥) 5.56G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ)	散剤		顆粒
										カコナルII	カコナルII	新生薬品工業 (株) (奈良)	葛根湯	葛根湯濃縮液81ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液		液
										カコナル葛根湯顆粒 (少量処方)	カコナルカクコントウカリュウ (マンリョウショホウ)	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯エキス (乾燥) 5.56G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ)	散剤		顆粒
										カコナル葛根湯顆粒F	カコナルカクコントウカリュウF	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯エキス (乾燥) 5.56G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ)	散剤		顆粒
										カコナミン葛根湯液2	カコナミンカクコントウエキ2	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯抽出液54ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										カコナミン内服液S	カコナミンナイフクエキS	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯濃縮液81ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										かぜ漢方内服液DX	カゼカンボウナイフクエキDX	金剛製薬 (株)	葛根湯	葛根湯濃縮液60ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										かぜコールド内服液	カゼコールドナイフクエキ	大豊薬品 (株)	葛根湯	葛根湯濃縮液45ML (カクコン8G・タイソウ4G・シヤクヤク3G・ショウキョウ1G・マオウ4G・ケイヒ3G・カンゾウ2G)	液剤		液
										かぜゼブ内服液	カゼゼブナイフクエキ	(株) 廣實堂	葛根湯	葛根湯エキス8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										カゼファースト内服液K	カゼファーストナイフクエキK	(株) 廣實堂	葛根湯	葛根湯エキス-A8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ)	液剤		液
										カクコンV「コタロー」	カクコンVコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12種) 2.2G (カクコン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ)	錠剤		錠
										カコリン	カコリン	萬金薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯軟エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										カコリン葛根湯液	カコリンカクコントウエキ	萬金薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.31G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										葛根湯Aエキス細粒 三和生薬	カクコントウAエキスサイリュウサンショウヤク	三和生薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.1G (カクコン4G・マオウ3G・ケイヒ2G・カンゾウ2G・シヤクヤク2G・タイソウ3G・ショウキョウ1G)	散剤		細粒
										葛根湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	カクコントウAエキスサイリュウブンボウサンショウヤク	三和生薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス4.1G (カクコン4G・マオウ3G・ケイヒ2G・カンゾウ2G・シヤクヤク2G・タイソウ3G・ショウキョウ1G)	散剤		細粒
										葛根湯 K I D S	カクコントウ K I D S	クラシエ製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (13種) 1733MG (カクコン2.67G・マオウ1.33G・タイソウ1.33G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ0.67G)	散剤		液
										葛根湯液	カクコントウエキ	ジェー・ピー・エス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス2.4G (カクコン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ショウキョウ2G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G)	液剤		液
										かっ根湯液	カクコントウエキ	日局製薬株式会社	葛根湯	日局葛根湯エキス2.4g (カクコン4g、マオウ・タイソウ各3g、ショウキョウ・ケイヒ・シヤクヤク・カンゾウ各2g)	液剤		液
										葛根湯液 E X 2	カクコントウエキ E X 2	遊賀製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス4340MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液
										葛根湯液SX	カクコントウエキSX	遊賀製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス4340MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		シロップ
										葛根湯液WS	カクコントウエキWS	遊賀製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス4340MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤		液

じほ	JAPIC	PMDA	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○		葛根湯エキスG	カコントウエキスG	東亜薬品(株)	葛根湯	葛根湯エキス(45量) 4G(カココン6.4G・マオウ3.2G・タイソウ3.2G・ケイヒ2.4G・シヤクヤク2.4G・カンゾウ1.6G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	リブ・ラボラトリーズ(株)
○	○	○		葛根湯(エキス顆粒)	カコントウエキスカリュウ	(株)建林松鶴堂	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 1.6G(カココン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス顆粒	カコントウエキスカリュウ	田村薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス粉末2125MG(カココン2000MG・マオウ1500MG・ショウキョウ500MG・タイソウ1500MG・ケイヒ1000MG)	散剤	顆粒	吉田製薬(株)・奈
○	○	○		葛根湯エキス顆粒	カコントウエキスカリュウ	晋業化学工業(株)	葛根湯	カココン湯乾燥エキス1700MG(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ショウキョウ1G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス【顆粒】2	カコントウエキスカリュウ2	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス4310MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス【顆粒】A	カコントウエキスカリュウA	(株)廣貫堂	葛根湯	カココン湯乾燥エキス1.7G(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	×		葛根湯エキス【顆粒】A	カコントウエキスカリュウA	御所薬舗(株)	葛根湯	葛根湯エキス粉末1700MG(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	(株)プロダクト・イノベーション
○	○	○		葛根湯エキス顆粒Aクラシエ	カコントウエキスカリュウAクラシエ	クラシエ製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス5200MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		葛根湯エキス顆粒D	カコントウエキスカリュウD	第一薬品工業株式会社	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 1604MG(カココン2G・マオウ1.5G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	×		カココン湯エキス顆粒D	カコントウエキスカリュウD	北日本製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス4.25G(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス顆粒D S	カコントウエキスカリュウD S	第一薬品工業株式会社	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 1604MG(カココン2G・マオウ1.5G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	白石薬品株式会社
○	○	×		葛根湯エキス【顆粒】G	カコントウエキスカリュウG	御所薬舗(株)	葛根湯	葛根湯エキス粉末1700MG(カココン4G・カンゾウ2G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・ショウキョウ1G・マオウ3G・タイソウ3G)	散剤	顆粒	
○	○	○		カココン湯エキス顆粒H	カコントウエキスカリュウH	北日本製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス4.25G(カココン4G・マオウ3G・ショウキョウ1G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス顆粒KM	カコントウエキスカリュウKM	北日本製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス5G(カココン8G・マオウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	一元製薬(株)
○	○	○		葛根湯エキス顆粒MX	カコントウエキスカリュウMX	滋賀県製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス4300MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス【顆粒】S	カコントウエキスカリュウS	御所薬舗(株)	葛根湯	葛根湯エキス粉末1700MG(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	散	
○	○	○		葛根湯エキス【顆粒】S	カコントウエキスカリュウS	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 2G(カココン2G・マオウ1.5G・ショウキョウ0.5G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		カココン湯エキス顆粒S	カコントウエキスカリュウS	北日本製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(710量) 3G(カココン2.82G・マオウ2.12G・ショウキョウ0.71G・タイソウ2.12G・ケイヒ1.41G・シヤクヤク1.41G)	散剤	顆粒	第一三共ヘルスケア(株)
○	○	○		葛根湯エキス顆粒SKT	カコントウエキスカリュウSKT	北日本製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(34量) 3.75G(カココン6G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2.25G・シヤクヤク2.25G・カンゾウ1.5G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス顆粒Sクラシエ	カコントウエキスカリュウSクラシエ	クラシエ製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(34量) 3900MG(カココン6G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2.25G・シヤクヤク2.25G・カンゾウ1.5G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		葛根湯エキス顆粒WS-R	カコントウエキスカリュウWS-R	滋賀県製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス(45量) 3483MG(カココン6.4G・マオウ3.23G・タイソウ3.23G・ケイヒ2.42G・シヤクヤク2.42G・カンゾウ1.61G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス顆粒(大峰)	カコントウエキスカリュウオオサミネ	大峰堂薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス(34量) 3600MG(カココン6G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2.25G・シヤクヤク2.25G・カンゾウ1.5G)	散剤	顆粒	田辺三堂製薬(株)
○	○	○		葛根湯エキス顆粒クラシエ	カコントウエキスカリュウクラシエ	クラシエ製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 2600MG(カココン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		葛根湯エキス顆粒【至聖】	カコントウエキスカリュウシセイ	北日本製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス5G(カココン8G・マオウ4G・シヤクヤク1.6G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス顆粒【創至聖】	カコントウエキスカリュウソウシセイ	北日本製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス4.25G(カココン(葛根)4G・マオウ(麻黄)3G・ショウキョウ(生姜)1G・タイソウ(大棗)3G・ケイヒ(炙甘草)1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス顆粒【東洋】分包	カコントウエキスカリュウトウヨウブンボウ	(株)東洋薬行	葛根湯	葛根湯水製エキス2.4G(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯エキス(細粒)7	カコントウエキスサイリュウ7	松浦薬業(株)	葛根湯	葛根湯エキス(65%量) 3.2G(乾燥物換算約1.6G)(カココン2.6G・マオウ1.95G・タイソウ1.95G・ケイヒ1.3G・シヤクヤク1.3G・カンゾウ1.6G)	散剤	細粒	
○	○	○		葛根湯エキス細粒G【コタロー】	カコントウエキスサイリュウGコタロー	松浦薬業株式会社	葛根湯	葛根湯エキス(65%量)3.2g(乾燥物換算約1.6g(相当))(カココン2.6g・マオウ1.95g・タイソウ各1.95g・ケイヒ1.3g・シヤクヤク1.3g)	散剤	細粒	
○	○	○		葛根湯エキス細粒V【コタロー】	カコントウエキスサイリュウVコタロー	小太郎漢方製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(45量) 3.84G(カココン3.2G・マオウ3.2G・タイソウ2.4G・ケイヒ1.6G・シヤクヤク1.6G・カンゾウ1.6G)	散剤	細粒	
○	○	○		葛根湯エキス細粒分包【コタロー】	カコントウエキスサイリュウブンボウコタロー	小太郎漢方製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(1325量)	散剤	顆粒	テイカ製薬株式会社
○	○	○		葛根湯エキス散【勝品】	カコントウエキスサンショウショウ	(株)東洋薬行	葛根湯	葛根湯エキス2.4G(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	散	
○	○	○		葛根湯エキス錠S【コタロー】	カコントウエキスジョウSコタロー	小太郎漢方製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 2.2G(カココン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ1G)	錠剤	錠	
○	○	○		葛根湯エキス錠【大峰】	カコントウエキスジョウオオサミネ	大峰堂薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 2400MG(カココン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ1G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○		葛根湯エキス錠クラシエ	カコントウエキスジョウクラシエ	クラシエ製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス(12量) 2600MG(カココン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ1G)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○		葛根湯カプレット【コタロー】	カコントウカプレットコタロー	小太郎漢方製薬(株)	葛根湯	葛根湯エキス散(1120量) 3.3G(カココン4.4G・マオウ2.2G・タイソウ2.2G・ケイヒ1.65G・シヤクヤク1.65G・カンゾウ1.65G)	錠剤	カプレット錠	
○	○	×		葛根湯散	カコントウ散	(有)杉原達二商店	葛根湯	カココン23.2G、カンゾウ11.6G、ケイヒ11.6G、シヤクヤク11.6G、ショウキョウ11.6G、タイソウ11.6G、マオウ17.6G	散	散	
○	○	○		葛根湯錠OM	カコントウジョウOM	大峰堂薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス2400MG(カココン3G・マオウ2.25G・タイソウ2.25G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1.5G・ショウキョウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○		葛根湯【タキザワ】	カコントウタキザワ	(株)タキザワ漢方廠	葛根湯	カココン8G、シヤクヤク3G、マオウ4G、カンゾウ2G、タイソウ4G、ショウキョウ1G、ケイヒ3G	その他	煎剤	
○	○	○		葛根湯内服液A	カコントウナイフクエキA	株式会社HBC	葛根湯	葛根湯エキス	液剤	液	日本薬劑(株)
○	○	○		葛根湯内服液A2	カコントウナイフクエキA2	株式会社HBC	葛根湯	葛根湯エキス	液剤	液	日本薬劑(株)
○	○	○		葛根湯内服液G	カコントウナイフクエキG	(株)廣昌堂	葛根湯	葛根湯エキス	液剤	液	
○	○	○		葛根湯内服液H	カコントウナイフクエキH	日野薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス-A8300MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	(株)大木
○	○	○		葛根湯内服液N	カコントウナイフクエキN	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス8300MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○		葛根湯内服液NS	カコントウナイフクエキNS	日新薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス	液剤	液	
○	○	○		葛根湯内服液NY	カコントウナイフクエキNY	日本薬劑株式会社	葛根湯	葛根湯エキス8300MG(カココン8.0G・マオウ4.0G・タイソウ4.0G・ケイヒ3.0G・シヤクヤク3.0G・カンゾウ2.0G・ショウキョウ1.0G)	液剤	液	
○	○	○		葛根湯内服液NY2	カコントウナイフクエキNY2	日本薬劑株式会社	葛根湯	葛根湯エキス8300MG(カココン8.0G・マオウ4.0G・タイソウ4.0G・ケイヒ3.0G・シヤクヤク3.0G・カンゾウ2.0G・ショウキョウ1.0G)	液剤	液	グレートアンドグランド株式会社
○	○	○		葛根湯内服液W	カコントウナイフクエキW	日野薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス-A8300MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	(株)大木
○	○	○		葛根湯内服液【廣貫堂】2	カコントウナイフクエキコウカンドウ	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス8300MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○		葛根湯内服液【廣貫堂】2	カコントウナイフクエキコウカンドウ2	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス8300MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○		葛根湯内服液【廣貫堂】S	カコントウナイフクエキコウカンドウS	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス	液剤	液	
○	○	×		葛根湯長崎	カコントウナガサキ	長崎県製薬(協)	葛根湯	カココン4G、カンゾウ2G、ケイヒ2G、シヤクヤク2G、ショウキョウ1G、タイソウ3G、マオウ3G	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯微細粒【湯重】	カコントウウビカユママンリョウ	大峰堂薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス3200MG(カココン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		葛根湯湯量顆粒2	カコントウマンリョウカリユウ2	カイクンファーマ株式会社	葛根湯	葛根湯エキス4.4G(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	×	製販HPには掲載あり。	葛根湯粒状	カコントウリョウジョウ	長倉製薬(株)	葛根湯	カココン1.2G、マオウ0.9G、ケイヒ0.5G、シヤクヤク0.8G、ショウキョウ0.5G、カンゾウ0.5G、水溶性乾燥エキス0.1G(タイソウ3G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○		漢方かせカココン液	カンボウかせカココンエキ	大協薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯抽出液A60ML(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○		漢方濃煎煎液葛根湯1	カンボウウシヤクセンザイカコントウ1	松浦薬業株式会社	葛根湯	葛根湯抽出液12.5G(カココン8.0G・マオウ4.0G・タイソウ4.0G・ショウキョウ1.0G・ケイヒ3.0G・シヤクヤク3.0G・カンゾウ1.0G)	その他	エキス	星製薬株式会社
○	○	○		カンボウ内服液【廣貫堂】2	カンボウナイフクエキコウカンドウ2	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス8300MG(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	×		カンボンコール感冒内服液葛根湯	カンボンコールカンボウナイフクエキカコントウ	大同薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	×	2017年閉店	紀伊国屋カココン湯	キノクニヤカコントウ	(株)紀伊国屋漢薬局	葛根湯	カココン4G、カンゾウ2G、ケイヒ2G、シヤクヤク2G、ショウキョウ1G、タイソウ3G、マオウ3G	散剤	顆粒	
○	○	×	2017年閉店	「紀伊国屋」カココン湯エキス顆粒S	キノクニヤカコントウエキスカリュウS	(株)紀伊国屋漢薬局	葛根湯	水製乾燥エキス3G(カココン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ0.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○		秋風葛根湯内服液	キョウフウカコントウナイフクエキ	新生薬品工業(株)(奈良)	葛根湯	葛根湯抽出液エキス54ML(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	常盤薬品工業(株)
○	○	○		秋風葛根湯内服液S	キョウフウカコントウナイフクエキS	滋賀県製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス	液剤	液	常盤薬品工業株式会社
○	○	○		キョウキ内服液N	キョウキナイフクエキN	(株)廣貫堂	葛根湯	葛根湯エキス	液剤	液	
○	○	○		クミアイ葛根湯【顆粒】	クミアイカコントウカリユウ	協同薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯エキス5G(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	販売元全国農業協同組合連合会
○	○	○		クラシエ葛根湯II	クラシエカコントウエキII	大協薬品工業(株)	葛根湯	葛根湯抽出液A60ML(カココン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	液剤	液	クラシエ薬品(株)

J	A	P	M	D	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
	○	○				「クラシエ」漢方葛根湯エキスE X錠	クラシエカンボウカクコントウエキSE Xジョウ	クラシエ製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス(23重)	錠剤	フィルムコーティング錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				「クラシエ」漢方葛根湯エキス顆粒SII	クラシエカンボウカクコントウエキスカリュウSII	クラシエ製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (34重) 3900MG (カクコン6G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2.25G・シヤクヤク2.25G・カンゾウ1.5G・)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				「廣貴堂」漢方葛根湯エキス顆粒	コウカンドウカンボウカクコントウエキスカリュウ	(株) 廣貴堂	葛根湯	葛根湯乾燥エキス4310MG (カクコン8.0G・マオウ4.0G・タイソウ4.0G・ケイヒ3.0G・シヤクヤク3.0G・カンゾウ2.0G・シ)	散剤	顆粒	
○	○	○				阪本漢法の葛根湯エキス顆粒	サカモトカンボウカクコントウエキスカリュウ	(株) 阪本漢法製薬	葛根湯	葛根湯エキス4.34G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				阪本漢法の葛根湯顆粒2	サカモトカンボウカクコントウカリユウ2	(株) 阪本漢法製薬	葛根湯	葛根湯乾燥エキス4.34G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				阪本漢法の葛根湯内服液2	サカモトカンボウカクコントウナイフクエキ2	(株) 阪本漢法製薬	葛根湯	葛根湯軟エキス	液剤	液	
○	○	○				サカンボ-葛根湯顆粒	サカンボ-カクコントウカリユウ	(株) 阪本漢法製薬	葛根湯	葛根湯エキス4.34G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				サトウ葛根湯エキス顆粒	サトウカクコントウエキスカリュウ	佐藤製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス (12重) 3.0g(葛根湯) [カクコン2.0g, タイソウ1.5g, マオウ1.5g, ケイヒ1.0g, シヤクヤク1.0g, カンゾウ1.0g,	散剤	液	
○	○	○				サトウ葛根湯顆粒<清量処方>	サトウカクコントウカリユウ<マンリョウショホウ>	佐藤製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス4.4G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	×				三宝葛根湯液	サンボウカクコントウエキ	葛根湯	葛根湯エキス8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)				
○	○	○				三宝葛根湯エキス顆粒	サンボウカクコントウエキスカリュウ	三宝製薬 (株)	葛根湯	葛根湯乾燥エキス5G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				シオノギ葛根湯エキス顆粒	シオノギカクコントウエキスカリュウ	大峰堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス3600MG (カクコン6G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2.25G・シヤクヤク2.25G・カンゾウ1.5G・シヨウキ)	散剤	顆粒	シオノギヘルスケア (株)
○	○	○				ジキナ葛根湯内服液	ジキナカクコントウナイフクエキ	(株) 富士薬品	葛根湯	葛根湯エキス7.1G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				ジスコール葛根湯液	ジスコールカクコントウエキ	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	カシマ薬品商事(株)
○	○	○				錠剤葛根湯	ジョウザイカクコントウ	一元製薬	葛根湯	ケイヒ末3G, シヤクヤク末3G, カンゾウ末2G, シヨウキョウ末1G, カクコン末8G, マオウ末4G, タイソウ末4G	錠剤	錠	イスタラ産薬 (株)
○	○	○				新生カクコンBC顆粒	シンセイカクコンBCカリユウ	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯エキス (乾燥) 4.4G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョ)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				神農葛根湯エキス顆粒	シンノウカクコントウエキスカリュウ	ジェービーエス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (45重) 4G (カクコン6.4G・タイソウ3.2G・マオウ3.2G・シヤクヤク2.4G・ケイヒ2.4G・シヨウキョウ0.8G)	散剤	顆粒	
○	○	○				神農葛根湯エキス錠	シンノウカクコントウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12重) 2.5G (カクコン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・シヨウキ)	錠剤	錠	
○	○	○				ストナ葛根湯2	ストナカクコントウ2	金澤製薬 (株)	葛根湯	葛根湯濃縮液60ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	佐藤製薬 (株)
○	○	○				スパーク葛根湯内服液	スパークカクコントウナイフクエキ	滋賀県製薬株式会社	葛根湯	葛根湯エキス8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				角野葛根湯	スミノカクコントウ	(有) 角野製薬所	葛根湯	葛根4G, 麻黄3G, 乾生薑1G, 甘草2G, 大棗3G, 桂皮2G, 芍薬2G	その他	煎剤	
○	○	○				ゼリス葛根湯シロップ	ゼリスカクコントウシロップ	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	シロップ	本草製薬 (株)
○	○	○				ゼリス葛根湯内服液	ゼリスカクコントウナイフクエキ	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				ゼリス葛根湯内服液II	ゼリスカクコントウナイフクエキII	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				第一葛根湯エキス顆粒M	ダイイチカクコントウエキスカリュウM	第一薬品工業株式会社	葛根湯	葛根湯エキス4800MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				大協葛根湯内服液	ダイキョウカクコントウナイフクエキ	大協薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯抽出液A60ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				太陽	タイヨウ	株式会社 栃木天海堂	葛根湯	カクコン25MG, カンゾウ10MG, ケイヒ10MG, シヤクヤク10MG, シヨウキョウ10MG, シヨウキョウ15MG, マオウ15MG	錠剤	丸	日の丸漢方 (株) ツムラ
○	○	○				ツムラ漢方葛根湯2	ツムラカンボウカクコントウエキ2	大同薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒	ツムラカンボウカクコントウエキスカリュウ	(株) ツムラ	葛根湯	葛根湯エキス(23重)2.8g (カクコン2.64g, タイソウ・マオウ各1.98g, カンゾウ・ケイヒ・シヤクヤク各1.32g, シヨウキョウ0.70g,	散剤	顆粒	
○	○	○				ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒A	ツムラカンボウカクコントウエキスカリュウA	(株) ツムラ	葛根湯	葛根湯エキス (23重) 2.5G (カクコン2.68G, タイソウ2.01G, マオウ2.01G, カンゾウ1.34G, ケイヒ1.34G, シヤクヤク1.3)	散剤	顆粒	
○	○	○				ツムラ漢方内服液葛根湯	ツムラカンボウナフクエキカクコントウ	大同薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	(株) ツムラ
○	○	×				デルマンエフェドリカ	デルマンエフェドリカ	(有) 末岡薬品	葛根湯	水製エキス粉末5.9G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)			
○	○	○				東亜葛根湯かぜ内服液	トウアカクコントウカゼナイフクエキ	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯濃縮液81ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	東亜薬品 (株)
○	○	○				東洋漢方の葛根湯	トウヨウカクコントウ	東洋漢方製薬 (株)	葛根湯	カクコン4G, マオウ3G, シヨウキョウ1G, タイソウ3G, ケイヒ2G, シヤクヤク2G, カンゾウ2G	その他	煎剤	
○	○	○				東洋の葛根湯エキス顆粒S	トウヨウカクコントウエキスカリュウS	東洋漢方製薬 (株)	葛根湯	水製乾燥エキス1.8G (カクコン2G・マオウ1.5G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G・シヨウキョウ0.70G,	散剤	顆粒	
○	○	○				トチモトのカクコントウ	トチモトカクコントウ	(株) 栃木天海堂	葛根湯	カクコン4G, カンゾウ2G, ケイヒ2G, シヤクヤク2G, シヨウキョウ1G, タイソウ3G, マオウ3G	煎剤	煎剤	
○	○	○				トビック葛根湯内服液	トビックカクコントウナイフクエキ	日新薬品工業株式会社	葛根湯	葛根湯エキス7.1G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				トビック葛根湯内服液D2	トビックカクコントウナイフクエキD2	日新薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス7.1G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				内服液葛根湯S	ナイフクエキカクコントウS	萬金薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯軟エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	(株) プロダクト・イノベーション
○	○	○				ニタンダ葛根湯エキス顆粒	ニタンダカクコントウエキスカリュウ	二反田薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯乾燥エキス4.34G (カクコン (葛根) 8G・マオウ (麻黄) 4G・タイソウ (大棗) 4G・ケイヒ (桂皮) 3G・シヤクヤク	散剤	顆粒	
○	○	○				ネオ真治内服液「葛根湯」	ネオシンジナイフクエキカクコントウ	(株) 廣貴堂	葛根湯	葛根湯エキス8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				ハイ・カッコー	ハイ・カッコー	大杉製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス3.3G (カクコン (葛根) 4G・マオウ (麻黄) 3G・タイソウ (大棗) 3G・ケイヒ (桂皮) 2G・シヤクヤク (芍薬)	散剤	液	
○	○	○				ハイカゼ内服液K	ハイカゼナイフクエキK	(株) 廣貴堂	葛根湯	葛根湯エキス- A8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				パオニン葛根湯内服液	パオニンカクコントウナイフクエキ	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				パオニン葛根湯内服液II	パオニンカクコントウナイフクエキII	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8.3G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	×				ピタドレル 葛根湯エキス [顆粒] A	ピタドレルカクコントウエキスカリュウA	御所薬舗 (株)	葛根湯	葛根湯エキス粉末1700MG (カクコン4G・マオウ3G・タイソウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)			
○	○	○				ピュアドリップ葛根湯	ピュアドリップカクコントウ	松浦薬業株式会社	葛根湯	葛根湯抽出物12.5G (カクコン8G・マオウ4G・シヨウキョウ1G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G)	その他	エキス	湧泉製薬株式会社
○	○	○				ピュンカゼ漢方内服液 2	ピュンカゼカンボウナイフクエキ2	新生薬品工業 (株)・奈	葛根湯	葛根湯抽出エキス54ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	(株) 中京医薬品
○	○	○				風治散 (顆粒)	フウジサンカクコントウ	(株) 和漢薬研究所	葛根湯	葛根湯水製エキス2.8G (カクコン (葛根) 4G・マオウ (麻黄) 3G・シヨウキョウ (生姜) 1G・タイソウ (大棗) 3G・ケイヒ (桂皮)	散剤	顆粒	カゴニー産業 (株)
○	○	○				ブリDMIN葛根湯内服液	ブリDMINカクコントウナイフクエキ	田村薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				ホノミキョ錠	ホノミキョジョウ	劑盛堂薬品 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12重) 1.8G (カクコン4G・カンゾウ1G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・シヨウキョウ0.5G・タイソウ2G・)	錠剤	錠	
○	○	○				ホノミキョ粒	ホノミキョツブ	劑盛堂薬品 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12重) 1.8G (カクコン4G・カンゾウ1G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・シヨウキョウ0.5G・タイソウ2G・)	散剤	顆粒	
○	○	×				ホリエカクコントウ	ホリエカクコントウ	福江生薬 (株)	葛根湯	カクコン4G, マオウ3G, タイソウ3G, ケイヒ2G, シヤクヤク2G, カンゾウ2G, シヨウキョウ1G	煎剤	煎剤	
○	○	○				本草葛根湯エキス顆粒-H	ホンソウカクコントウエキスカリュウ-H	本草製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (23重) 2.87G (カクコン5.33G・マオウ2.67G・タイソウ2.67G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ1.33G)	散剤	顆粒	
○	○	○				本草葛根湯エキス錠-H	ホンソウカクコントウエキスジョウ-H	本草製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス(12重)	錠剤	錠	
○	○	○				本草葛根湯シロップ	ホンソウカクコントウシロップ	大生堂薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯軟エキス2.83G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	シロップ	本草製薬 (株)
○	○	○				マイティ葛根湯液	マイティカクコントウエキ	ジェービーエス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス15G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				増田葛根湯エキス顆粒	マサダカクコントウエキスカリュウ	増田製薬 (株)	葛根湯	葛根湯乾燥エキス990MG (カクコン (葛根) 2329MG・マオウ (麻黄) 1747MG・タイソウ (大棗) 1747MG・シヨウキョウ	散剤	顆粒	
○	○	○				山本漢方葛根湯エキス顆粒	ヤマモトカンボウカクコントウエキスカリュウ	山本漢方製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス (12重) 3G (カクコン4G・マオウ2G・タイソウ2G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1G・シヨウキョウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				ラベリン葛根湯内服液	ラベリンカクコントウナイフクエキ	ジェービーエス製薬 (株)	葛根湯	葛根湯エキス15G (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				ルルカゼ内服液	ルルカゼナイフクエキ	田村薬品工業 (株)	葛根湯	葛根湯エキス8300MG (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	第一三共ヘルスケア (株)
○	○	○				レオミン漢方内服液	レオミンカンボウナイフクエキ	金澤製薬 (株)	葛根湯	葛根湯濃縮液60ML (カクコン8G・マオウ4G・タイソウ4G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・カンゾウ2G・シヨウキョウ1G)	液剤	液	
○	○	○				葛根湯エキス顆粒「MT」	カクコントウエキスカリュウMT	松本製薬工業 (株)	漢方製剤 (葛根湯)	葛根湯乾燥エキス1.7g (カクコン4g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シヤクヤク・カンゾウ各2g, シヨウキョウ1g)	散剤	顆粒	
○	○	○				生陰「分包」	キョウインボウ	太虎精堂製薬 (株)	漢方製剤 (葛根湯)		散剤	顆粒	
○	○	○				葛根湯エキス顆粒「MT」	カクコントウエキスカリュウMT	松本製薬工業 (株)	漢方製剤 (葛根湯)	葛根湯乾燥エキス1.7g (カクコン4g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シヤクヤク・カンゾウ各2g, シヨウキョウ1g)	散剤	顆粒	

J	A	P	M	D	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○				JPS葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠N	JPSカコントウカセンキュウシンイエキスジョウN	ジェービーエス製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷乾燥エキス2.3G(カコントウ2G・マオウ2G・タイソウ1.5G・センキュウ1.5G・シンイ1.5G・ケイヒ1G)	錠剤	錠	
○	○	○				JPS漢方顆粒-62号	JPSカンボウカリユウ-62ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川きゅう辛夷エキス(45量)	散剤	顆粒	
○	○	○				ウチダの葛根湯加川きゅう	ウチダノカコントウカシンイセンキュウ	(株)ウチダ和漢薬	葛根湯加川きゅう	カココン、マオウ、ショウキョウ、タイソウ、ケイヒ etc.	その他	煎剤	
○	○	○				ウチダの葛根湯加川きゅう辛夷エキス散	ウチダノカコントウカセンキュウシンイエキサン	(株)ウチダ和漢薬	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス2.71G(カコントウ2G・マオウ1.5G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G)	散剤	細粒	
○	○	○				ウチダの太陽爽鼻湯(分包)	ウチダノタイヨウソウブトウブンボウ	(株)ウチダ和漢薬	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス2.71G(カコントウ2G・マオウ1.5G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G)	散剤	細粒	
○	○	○				オオクサ鼻優S	オオクサビユウS	大草薬品(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷水製エキス2550MG(カココン(葛根)2G・マオウ(麻黄)2G・ケイヒ(桂皮)1G・シヤクヤク(芍薬)2G)	錠剤	糖衣錠	大草薬品販売(株)
○	○	○			表記違い	葛根湯加川きゅう辛夷エキス(細粒)77	カコントウカセンキュウシンイエキサイリユウ77	松浦薬業(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(12量)4G(乾燥物換算約2G)(カココン2G・マオウ2G・タイソウ1.5G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G)	散剤	細粒	
○	○	○				かっ根湯加川きゅう辛夷エキス(細粒)77	カコントウカセンキュウシンイエキサイリユウ77	松浦薬業株式会社	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川きゅう辛夷エキス(12量)4.0g(乾燥物換算約2.0gに相当)(カココン・マオウ各2.0g、タイソウ・センキュウ・シンイ各1.5g)	散剤		
○	○	○				葛根湯加川きゅう辛夷エキス散(勝品)	カコントウカセンキュウシンイエキサンショウショウ	(株)東洋薬行	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷水製エキス3G(カココン4G・マオウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G・タイソウ3G・ショウキョウ1G)	散剤	散	
○	○	○				葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠(大峰)	カコントウカセンキュウシンイエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス粉末2400MG(カココン2.4G・マオウ2.4G・タイソウ1.8G・ケイヒ1.2G・シヤクヤク1.2G・カンゾウ1.2G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○				葛根湯加川きゅう辛夷「タキザワ」	カコントウカセンキュウシンイタキザワ	(株)タキザワ漢方	葛根湯加川きゅう	カココン4G、ショウキョウ1G、マオウ4G、カンゾウ2G、ケイヒ2G、センキュウ3G、シヤクヤク2G、シンイ3G、タイソウ1G	その他	煎剤	
○	○	○				「クラシエ」漢方葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	クラシエカンボウカコントウカセンキュウシンイエキスカリユウ	クラシエ製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(12量)2350MG(カココン2G・マオウ2G・タイソウ1.5G・センキュウ1.5G・シンイ1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○				「クラシエ」漢方葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠	クラシエカンボウカコントウカセンキュウシンイエキスジョウ	クラシエ製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(12量)2350MG(カココン2G・マオウ2G・タイソウ1.5G・センキュウ1.5G・シンイ1.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○				「クラシエ」ベルエムビク葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠	クラシエベルエムビクカコントウカセンキュウシンイエキスジョウ	クラシエ製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(12量)2350MG(カココン2G・マオウ2G・タイソウ1.5G・センキュウ1.5G・シンイ1.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○				小太郎漢方鼻炎薬A「コタロー」	コタロウカンボウビエンヤクAコタロー	小太郎漢方製薬(株)	葛根湯加川きゅう	水製エキス2.25G(カココン2G・シヤクヤク1G・カンゾウ1G・マオウ2G・タイソウ1.5G・センキュウ1.5G・ケイヒ1G)	錠剤	錠	
○	○	○				サンワ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒	サンワカコントウカセンキュウシンイエキサイリユウ	三和生薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(35量)2.4G(カココン2.4G・マオウ2.4G・ケイヒ1.2G・シヤクヤク1.2G・タイソウ1.8G)	散剤	細粒	
○	○	○				サンワ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠「分包」	サンワカコントウカセンキュウシンイエキサイリユウブンボウ	三和生薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(35量)2.4G(カココン2.4G・マオウ2.4G・ケイヒ1.2G・シヤクヤク1.2G・タイソウ1.8G)	散剤	細粒	
○	○	○				神農葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠	シンノウカコントウカセンキュウシンイエキスジョウ	ジェービーエス製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷乾燥エキス2.3G(カココン2G・マオウ2G・タイソウ1.5G・センキュウ1.5G・シンイ1.5G・ケイヒ1G)	錠剤	錠	
○	○	○				ツムラ漢方葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	ツムラカンボウカコントウカセンキュウシンイエキスカリユウ	(株)ツムラ	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(12量)2G(カココン2G・タイソウ1.5G・マオウ1.5G・カンゾウ1G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				東洋の葛根湯加川きゅう辛夷「ノーザA」	トウヨウカコントウカセンキュウシンイノーザAコタロー	東洋漢方製薬(株)	葛根湯加川きゅう	カココン4G、マオウ4G、ケイヒ2G、シヤクヤク2G、タイソウ3G、ショウキョウ1G、カンゾウ2G、センキュウ3G、シンイ1G	その他	煎剤	
○	○	○				小太郎漢方製薬A「コタロー」	コタロー漢方製薬(株)	葛根湯加川きゅう	水製エキス2.25G(カココン2G・マオウ2G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・タイソウ1.5G・ショウキョウ0.5G・カンゾウ1G)	錠剤	錠		
○	○	○				ノバースA(錠剤)葛根湯加川辛夷エキス	ノバースAジョウザイカコントウカシンイセンキュウ	一元製薬(株)	葛根湯加川きゅう	ショウキョウ末2.8G、ケイヒ末2.1G、シヤクヤク末2.1G、カンゾウ末1.5G、センキュウ末2.1G、カココン末5.6G、マオウ末2.1G	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○				ビスカイナ顆粒	ビスカイナカリユウ	東洋漢方製薬(株)	葛根湯加川きゅう	水性乾燥エキス2.76G(カココン2G・マオウ2G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・タイソウ1.5G・ショウキョウ0.5G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○				ビスカイナ顆粒(分包)	ビスカイナカリユウブンボウ	東洋漢方製薬(株)	葛根湯加川きゅう	水性乾燥エキス2.76G(カココン2G・マオウ2G・ケイヒ1G・シヤクヤク1G・タイソウ1.5G・ショウキョウ0.5G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○				フジビートル錠	フジビートルBジョウ	国産薬品工業(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷乾燥エキス4200MG(カココン4G・マオウ4G・タイソウ3G・センキュウ3G・ケイヒ2G・シヤクヤク2G)	錠剤	錠	湧永製薬(株)
○	○	○				本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠-H	ホンゾウカコントウカセンキュウシンイエキスカリユウ-H	本草製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス(23量)2.8G(カココン2.67G・マオウ2.67G・ケイヒ1.33G・シヤクヤク1.33G・タイソウ2G)	散剤	顆粒	
○	○	○				モリ チクノーン	モリチクノーン	大村製薬(株)	葛根湯加川きゅう	葛根湯加川キョウ辛夷エキス4.2G(カココン(葛根)4G・マオウ(麻黄)4G・ケイヒ(桂皮)2G・シヤクヤク(芍薬)2G)	散剤	顆粒	
○	○	○				JPS加味帰脾湯エキス錠N	JPSカミキヒトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬(株)	加味帰脾湯	加味帰脾湯乾燥エキス3.15G(ニンジン1.5G・ソウジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サンソウニン1.5G・リュウガンニン1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○				JPS漢方顆粒-74号	JPSカンボウカリユウ-74ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	加味帰脾湯	加味帰脾湯乾燥エキス5.04G(ニンジン2.4G・ソウジュツ2.4G・ブクリョウ2.4G・サンソウニン2.4G・リュウガンニン2.4G)	散剤	顆粒	
○	○	○				加味帰脾湯エキス顆粒KM	カミキヒトウエキスカリユウKM	北日本製薬(株)	加味帰脾湯	加味帰脾湯水製乾燥エキス5G(サイコ3G・サンソウニン3G・ニンジン3G・ソウジュツ3G・ブクリョウ3G・リュウガンニン3G)	散剤	顆粒	一元製薬(株)
○	○	○				加味帰脾湯エキス顆粒クラシエ	カミキヒトウエキスカリユウクラシエ	クラシエ製薬(株)	加味帰脾湯	加味帰脾湯エキス粉末2800MG(ニンジン1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・サンソウニン1.5G・リュウガンニン1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○				加味帰脾湯エキス(細粒)9	カミキヒトウエキサイリユウ9	松浦薬業株式会社	加味帰脾湯	加味帰脾湯エキス6.8G(乾燥物換算約3.4G)(ニンジン1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サンソウニン1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○				加味帰脾湯「タキザワ」	カミキヒトウタキザワ	(株)タキザワ漢方	加味帰脾湯	ニンジン3G、オウギ2G、カンゾウ1G、ビヤクジュツ3G、トウキ2G、モッコウ1G、ブクリョウ3G、オンジ1.5G、タイソウ1G	その他	煎剤	
○	○	○				松鶴湯A	ショウカクトウA	(株)建林松鶴堂	加味帰脾湯	ニンジン2.4G、ブクリョウ2.4G、リュウガンニン2.4G、トウキ1.6G、サイコ2.4G、カンゾウ0.8G、タイソウ1.6G、ボタンビ2G	その他	煎剤	
○	○	○				東洋の加味帰脾湯エキス錠	トウヨウカミキヒトウエキスカリユウ	東洋漢方製薬(株)	加味帰脾湯	水製乾燥エキス2.2G(ニンジン1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・サンソウニン1.5G・リュウガンニン1.5G)	錠剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○				ヒロレス 加味帰脾湯錠	ヒロレスカミキヒトウジョウ	ジェービーエス製薬株式会社	加味帰脾湯	加味帰脾湯エキス(12量)	錠剤	錠	小林製薬株式会社
○	○	○				妙光(エキス顆粒)	ミョウコウエキスカリユウ	(株)建林松鶴堂	加味帰脾湯	水製エキス(乾燥エキス)1.8G(サイコ1.5G・ニンジン1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・オウギ1.5G・トウキ1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○				ユクリズム	ユクリズム	大峰堂薬品工業(株)	加味帰脾湯	加味帰脾湯エキス(12量)2800MG(ニンジン1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・タイソウ0.75G・サイコ1.5G)	錠剤	錠	ロート製薬(株)
○	○	○				ロート加味帰脾湯錠	ロートカミキヒトウジョウ	大峰堂薬品工業(株)	加味帰脾湯	加味帰脾湯エキス粉末	錠剤	錠	ロート製薬(株)
○	○	×				千宝丸	カミシヨウヨウサン	北宝薬品(株)	加味帰脾湯	加味帰脾湯水製エキス1.45G(ニンジン1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サンソウニン1.5G・リュウガンニン1.5G・サイコ1.5G・オウギ1G・トウキ1G・サンシシ1G・オンジ0.5G)	散剤	錠	
○	○	○				DHC漢方 加味逍遙散エキス錠	DHCカンボウカミシヨウヨウサンエキスジョウ	(株)ディーエイチシー	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(12量)	錠剤	フィルムコーティング錠	
○	○	○				JPS加味逍遙散料エキス錠N	JPSカミシヨウヨウサンリョウエキスジョウN	ジェービーエス製薬(株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(35量)2.28G(トウキ1.8G・シヤクヤク1.8G・ソウジュツ1.8G・ブクリョウ1.8G・サイコ1.8G・ボタンビ2G)	錠剤	錠	
○	○	○				JPS漢方顆粒-7号	JPSカンボウカリユウ-7ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(45量)3.04G(トウキ2.4G・シヤクヤク2.4G・ソウジュツ2.4G・ブクリョウ2.4G・サイコ2.4G・ボタンビ2G)	散剤	顆粒	
○	○	○				ウチダの加味逍遙散	ウチダノカミシヨウヨウサン	(株)ウチダ和漢薬	加味逍遙散	トウキ3G、シヤクヤク3G、ビヤクジュツ3G、ブクリョウ3G、サイコ3G、カンゾウ1.5G、ボタンビ2G、サンシシ2G、ショウキョウ3G、シヤクヤク3G、ビヤクジュツ3G、ブクリョウ3G、サイコ3G、カンゾウ2G、ボタンビ2G、サンシシ2G、シヤクヤク3G	その他	煎剤	
○	○	○				ウチダの加味逍遙散料	ウチダノカミシヨウヨウサンリョウ	(株)ウチダ和漢薬	加味逍遙散	トウキ3G、シヤクヤク3G、ビヤクジュツ3G、ブクリョウ3G、サイコ3G、カンゾウ2G、ボタンビ2G、サンシシ2G、ショウキョウ3G	その他	煎剤	
○	○	○				ウチダの加味逍遙散料エキス散	ウチダノカミシヨウヨウサンリョウエキサン	(株)ウチダ和漢薬	加味逍遙散	加味逍遙散料エキス2.6G(トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ1G)	散剤	細粒	
○	○	○				ウチダの明草順心	ウチダノメイカジュンシン	(株)ウチダ和漢薬	加味逍遙散	加味逍遙散料エキス2.6G(トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ1G)	散剤	細粒	
○	○	○				加味逍遙散	カミシヨウヨウサン	(有)杉原達二商店	加味逍遙散	カンゾウ4G、サイコ12G、サンシシ8G、シヤクヤク12G、ショウキョウ4G、トウキ12G、トウヒ8G、ハツクジュ12G、ブクリョウ4G	散剤		
○	○	○				加味逍遙散エキス顆粒【東洋】分包	カミシヨウヨウサンエキスカリユウトウヨウブンボウ	(株)東洋薬行	加味逍遙散	加味逍遙散エキス4.35G(トウキ3G・シヤクヤク3G・ビヤクジュツ3G・ブクリョウ3G・サイコ3G・ボタンビ2G・サンシシ2G)	散剤	顆粒	イスクラ産業(株)
○	○	○				加味逍遙散エキス(細粒)8	カミシヨウヨウサンエキサイリユウ8	松浦薬業株式会社	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(12量)4.6G(トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ2G)	散剤	細粒	一心堂漢方株式会社

J	JA	P	MA	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効成分	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○			加味逍遙散エキス錠G「コタロー」	カミショウヨウサンエキサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (45錠) 4G (トウキ2.4G・シヤクヤク2.4G・ビヤクジュツ2.4G・ブクリョウ2.4G・サイコ2.4G・ボタンビ)	散剤	細粒	
○	○	○			加味逍遙散エキス錠「分包」三和生薬	カミショウヨウサンエキサイリウブンボウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (35錠) 2.1G (トウキ1.8G・シヤクヤク1.8G・ビヤクジュツ1.8G・ブクリョウ1.8G・サイコ1.8G・カンゾウ)	散剤	細粒	湧永製薬 (株)
○	○	○			加味逍遙散エキス散 (勝昌)	カミショウヨウサンエキサンショウショウ	(株) 東洋薬行	加味逍遙散	加味逍遙散エキス3G (トウキ3G・シヤクヤク3G・サイコ3G・ビヤクジュツ3G・ブクリョウ3G・ハッカ1G・カンゾウ2G)	散剤	散	
○	○	○			加味逍遙散エキス錠N「コタロー」	カミショウヨウサンエキシヨウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス錠 (12錠) 3G (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ)	錠剤	錠	
○	○	○			加味逍遙散エキス錠 (大峰)	カミショウヨウサンエキシヨウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(12錠)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			加味逍遙散エキス錠「創至聖」	カミショウヨウサンエキシヨウソウシセイ	北日本製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2.5G (トウキ1.5G, シヤクヤク1.5G, ビヤクジュツ1.5G, ブクリョウ1.5G, サイコ1.5G, ボタンビ)	錠剤	錠	
○	○	○			加味逍遙散錠 T 24	カミショウヨウサンシヨウ T 24	中村薬品工業株式会社	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2380MG (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ)	錠剤	錠	株式会社 日本ヘルスクアアドバイザース
○	○	○			加味逍遙散錠 (大峰)	カミショウヨウサンシヨウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2380MG (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			加味逍遙散料エキス顆粒KM	カミショウヨウサンリョウエキスカリウムKM	北日本製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス5.5G (サイコ3G・シヤクヤク3G・ソウジュツ3G・トウキ3G・ブクリョウ3G・カンゾウ2G・サンシシ2G)	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○			加味逍遙散料エキス錠クラシエ	カミショウヨウサンリョウエキシヨウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2380MG (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			加味逍遙散料「タキザワ」	カミショウヨウサンリョウタキザワ	(株) タキザワ薬廠	加味逍遙散	トウキ3G, サイコ3G, カンゾウ2G, シヤクヤク3G, ボタンビ2G, ショウキョウ1G, ソウジュツ3G, サンシシ2G, ハッカ1G, ブクリョウ1G	散剤	錠	
○	○	○			カミセーN「コタロー」	カミセーNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス錠 (12錠) 3G (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ)	錠剤	錠	
○	○	○			漢方濃縮煎剤加味逍遙散24	カンボノウシユクセンザイカミショウヨウサン24	松浦薬業株式会社	加味逍遙散	加味逍遙散抽出物10.6G (トウキ2G・シヤクヤク2G・ソウジュツ2G・ブクリョウ2G・サイコ2G・ボタンビ1.33G・サンシシ)	錠剤	その他	エキス
○	○	○			「クラシエ」漢方加味逍遙散料エキス顆粒	クラシエカンボウカミショウヨウサンリョウエキスカリウム	クラシエ製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2050MG (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			サン・コーミン	サン・コーミン	大杉製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス3.8G (トウキ (当帰) 3G・シヤクヤク (芍薬) 3G・ビヤクジュツ (白朮) 3G・ブクリョウ (茯苓) 3G・ソウジュツ (三和生薬) 3G)	散剤	顆粒	
○	○	○			サンワ加味逍遙散エキス錠	サンワカミショウヨウサンエキシヨウ	三和生薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (35錠) 2.1G (トウキ1.8G・シヤクヤク1.8G・ビヤクジュツ1.8G・ブクリョウ1.8G・サイコ1.8G・カンゾウ)	錠剤	錠	
○	○	○			錠剤加味逍遙散	シヨウザイカミショウヨウサン	一元製薬 (株)	加味逍遙散	トウキ末3.4G, ソウジュツ末3.4G, シヤクヤク末3.4G, ブクリョウ末3.4G, カンゾウ末2.2G, ボタンビ末2.2G, サンシシ末2.2G	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○			神農加味逍遙散料エキス錠	シノノケカミショウヨウサンリョウエキシヨウ	ジェービーエス製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (35錠) 2.28G (トウキ1.8G・シヤクヤク1.8G・ソウジュツ1.8G・ブクリョウ1.8G・サイコ1.5G・ボタンビ)	錠剤	錠	
○	○	○			清心 (エキス顆粒)	セイシンエキスカリウム	(株) 建林松鶴堂	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2G (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ)	散剤	顆粒	
○	○	○			ツムラ漢方加味逍遙散エキス顆粒	ツムラカンボウカミショウヨウサンエキスカリウム	(株) ツムラ	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2G (サイコ1.5G・シヤクヤク1.5G・ソウジュツ1.5G・トウキ1.5G・ブクリョウ1.5G・サンシシ1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○			東洋漢方の加味逍遙散料	トウヨウカンボウカミショウヨウサンリョウ	東洋漢方製薬 (株)	加味逍遙散	トウキ3G, シヤクヤク3G, ビヤクジュツ3G, ブクリョウ3G, サイコ3G, ボタンビ2G, サンシシ2G, カンゾウ1.5G, ショウキョウ1.5G	散剤	その他	日邦薬品工業株式会社
○	○	○			東洋の加味逍遙散料エキス顆粒	トウヨウカミショウヨウサンリョウエキスカリウム	東洋漢方製薬 (株)	加味逍遙散	水製乾燥エキス1.54G (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ1G・サンシシ1G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	×			東洋の加味逍遙散料エキス錠S	トウヨウカミショウヨウサンリョウエキスカリウムS	東洋漢方製薬 (株)	加味逍遙散	水製乾燥エキス2.3G (トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・サイコ1.5G・ボタンビ1G・サンシシ1G・カンゾウ2G, サイコ3G, プルシシ2G, シヤクヤク3G, ショウキョウ1G, トウキ3G, ハッカ1G, ビヤクジュツ3G, ブクリョウ1G)	錠剤	錠	
○	○	○			トチモトの加味逍遙散	トチモトカミショウヨウサン	(株) 栃本天海堂	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2.5G (トウキ1.5G, シヤクヤク1.5G, ビヤクジュツ1.5G, ブクリョウ1.5G, サイコ1.5G, ボタンビ1G, サンシシ1G, カンゾウ1G, ショウキョウ0.5G, ハッカ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	×			ピタレール 加味逍遙散エキス錠	ピタレールカミショウヨウサンエキシヨウ	北日本製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 2.5G (トウキ1.5G, シヤクヤク1.5G, ビヤクジュツ1.5G, ブクリョウ1.5G, サイコ1.5G, ボタンビ1G, サンシシ1G, カンゾウ1G, ショウキョウ0.5G, ハッカ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○			ホニミチョウケイ錠	ホニミチョウケイシヨウ	羽庭堂薬品 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 1.5G (カンゾウ1G・サイコ1.5G・サンシシ1G・シヤクヤク1.5G・ショウキョウ0.5G・トウキ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○			ホニミチョウケイ錠	ホニミチョウケイシヨウ	羽庭堂薬品 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (12錠) 1.5G (カンゾウ1G・サンシシ1G・ボタンビ1G・サイコ1.5G・シヤクヤク1.5G・トウキ1.5G・ボタンビ)	錠剤	錠	
○	○	×			ホリエの加味逍遙散料	ホリエノカミショウヨウサンリョウ	堀江生薬 (株)	加味逍遙散	トウキ3G, シヤクヤク3G, ソウジュツ3G, ブクリョウ3G, サイコ3G, ボタンビ2G, サンシシ2G, カンゾウ1.5G, ショウキョウ1G, ハッカ1G	散剤	錠	
○	○	○			本草加味逍遙散エキス錠-H	ホンソウカミショウヨウサンエキシヨウ-H	本草製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(12錠)	錠剤	錠	
○	○	○			療方調律顆粒	リョウホウチョウリツカリウム	クラシエ製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (34錠) 3075MG (トウキ2.25G・シヤクヤク2.25G・ビヤクジュツ2.25G・ブクリョウ2.25G・サイコ2.25G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			レディシトルG	レディシトルG	ジェービーエス製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (45錠) 3.04G (トウキ2.4G・ソウジュツ2.4G・サイコ2.4G・サンシシ1.6G・ショウキョウ0.8G・シヤクヤク)	錠剤	顆粒	
○	○	○			レディシトルT	レディシトルT	ジェービーエス製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス (35錠) 2.28G (トウキ1.8G・ソウジュツ1.8G・サイコ1.8G・サンシシ1.2G・ショウキョウ0.6G・シヤクヤク)	錠剤	錠	
○	○	○			「クラシエ」漢方加味逍遙散料エキス顆粒S	クラシエカンボウカミショウヨウサンリョウエキスカリウムS	クラシエ製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(34錠)3075mg (トウキ・シヤクヤク・ビヤクジュツ・ブクリョウ・サイコ各2.25g, ボタンビ・サンシシ各1.5g)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			ツムラ漢方加味逍遙散エキス錠A	ツムラカンボウカミショウヨウサンエキシヨウA	(株) ツムラ	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(12錠)2g (サイコ・シヤクヤク・ソウジュツ・トウキ・ブクリョウ各1.5g, サンシシ・ボタンビ各1g, カンゾウ)	錠剤	錠	
○	○	○			ホワイトルナ 加味逍遙散錠	ホワイトルナカミショウヨウサンシヨウ	ジェービーエス製薬 (株)	加味逍遙散	加味逍遙散エキス(12錠)1.9g (トウキ・シヤクヤク・ソウジュツ・ブクリョウ・サイコ各1.5g, ボタンビ・サンシシ・カンゾウ)	錠剤	錠	小林製薬 (株)
○	○	○			響声破音丸エキス顆粒G	キョウセイハチキガンリョウエキスカリウムG	ジェービーエス製薬 (株)	響声破音丸	響声破音丸乾燥エキス5.54G (レンギョウ2.5G・キョウ2.5G・カンゾウ2.5G・ダイオウ1.0G・シヤクヤク1.0G・センキュウ)	散剤	顆粒	
○	○	○			響声破音丸エキス顆粒K	キョウセイハチキガンリョウエキスカリウムK	コーア製薬 (株)	響声破音丸	響声破音丸乾燥エキス	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			響声破音丸料エキス顆粒KM	キョウセイハチキガンリョウエキスカリウムKM	北日本製薬 (株)	響声破音丸	響声破音丸料水製乾燥エキス3.5G (ハッカ4G・レンギョウ2.5G・キョウ2.5G・カンゾウ2.5G・アセンヤク2G・ダイオウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○			響声破音丸料エキス (細粒) 45	キョウセイハチキガンリョウエキサイリウム45	松浦薬業株式会社	響声破音丸	響声破音丸料水製エキス4G (乾燥物換算約2G) (レンギョウ1.25G・キョウ1.25G・カンゾウ1.25G・シヤクヤク0.5G・センキュウ)	散剤	細粒	
○	○	○			コエキア	コエキア	小林製薬 (株)	響声破音丸	響声破音丸料エキス3.5g (レンギョウ2.5g, ダイオウ1.0g, カシ1.0g, キョウ2.5g, シュクシャ1.0g, アセンヤク2.0g, カンゾウ)	散剤	錠	
○	○	○			ササクールA	ササクールA	(株) 和漢薬研究所	響声破音丸	響声破音丸料水製エキス0.75G (レンギョウ0.75G・キョウ0.75G・カンゾウ0.75G・シュクシャ0.3G・センキュウ0.3G・カ)	錠剤	丸	カゴニー産業 (株)
○	○	×			香薷丸	シユンケイガン	北薬業 (株)	響声破音丸	響声破音丸水製エキス1G (レンギョウ1.25G・キョウ1.25G・カンゾウ1.25G・シュクシャ0.5G・センキュウ0.5G・カ0.5G・アセンヤク1G・ハッカ薬2G)	散剤	錠	
○	○	○			JPS漢方顆粒-60号	JPSカンボウカリウム-60ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒散エキス2.64G (ポウフウ2.4G・ゴボウシ2.4G・キョウ2.4G・レンギョウ4G・セッコウ4G・ケイガイ1.2G)	散剤	液	
○	○	○			JPS駆風解毒湯液	JPSクワフグドクトウエキ	ジェービーエス製薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯エキス10G (ポウフウ3G・ゴボウシ3G・キョウ3G・レンギョウ5G・セッコウ5G・ケイガイ1.5G・キョウカツ)	散剤	液	
○	○	○			JPS駆風解毒散エキス (細粒) 79	クワフグドクトウエキサイリウム79	松浦薬業株式会社	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒散水製エキス4.5G (ポウフウ2G・ゴボウシ2G・レンギョウ3.33G・ケイガイ1G・キョウカツ1G・カンゾウ1G)	散剤	細粒	
○	○	○			駆風解毒湯Aエキス錠「分包」三和生薬	クワフグドクトウAエキサイリウブンボウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯A水製エキス5.2G (ポウフウ3G・ゴボウシ3G・レンギョウ5G・ケイガイ1.5G・キョウカツ1.5G・カンゾウ1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○			駆風解毒湯エキス「顆粒」	クワフグドクトウエキスカリウム	(株) 廣昌堂	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯エキス2000MG (ポウフウ2.553G・ゴボウシ2.553G・レンギョウ4.255G・ケイガイ1.277G・キョウカツ1.277G)	散剤	顆粒	ノーエチ薬品 (株)
○	○	○			駆風解毒湯エキス顆粒Aクラシエ	クワフグドクトウエキスカリウムAクラシエ	クラシエ製薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯エキス粉末4700MG (ポウフウ3G・ゴボウシ3G・キョウ3G・レンギョウ5G・セッコウ5G・ケイガイ1.5G・キョウカツ)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			駆風解毒湯エキス顆粒KM	クワフグドクトウエキスカリウムKM	北日本製薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯水製乾燥エキス4.1G (セッコウ10G・レンギョウ5G・ポウフウ3G・キョウ3G・ケイガイ1.5G・カンゾウ1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○			駆風解毒湯「タキザワ」	クワフグドクトウタキザワ	(株) タキザワ薬廠	駆風解毒散 (湯)	ポウフウ5G, ゴボウシ3G, レンギョウ5G, ケイガイ1.5G, キョウカツ1.5G, カンゾウ1.5G, キョウ3G, セッコウ6G	散剤	その他	
○	○	○			サトウ駆風解毒湯エキス顆粒	サトウクワフグドクトウエキスカリウム	佐藤製薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯エキス4g (ポウフウ・ゴボウシ・キョウ各1.5g, レンギョウ・セッコウ各2.5g, ケイガイ・キョウカツ・カンゾウ)	散剤	錠	
○	○	○			サトウ駆風解毒湯エキス錠ローチ	サトウクワフグドクトウエキストローチ	佐藤製薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯乾燥エキス1175MG (防風 (ポウフウ) 1.5G・牛蒡子 (ゴボウシ) 1.5G・連翹 (レンギョウ) 2.5G・荆芥 (ケイガイ)	錠剤	錠	
○	○	○			東洋漢方の駆風解毒湯エキス顆粒	トウヨウカンボウクワフグドクトウエキスカリウム	東洋漢方製薬 (株)	駆風解毒散 (湯)	水製乾燥エキス3.48G (ハバポウフウ3G・ゴボウシ3G・キョウ3G・レンギョウ5G・セッコウ5G・ケイガイ1.5G・キョウカツ)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			トチモトの駆風解毒湯	トチモトクワフグドクトウ	(株) 栃本天海堂	駆風解毒散 (湯)	ポウフウ3G, カンゾウ1.5G, キョウ3G, ケイガイ1.5G, ゴボウシ3G, セッコウ5G, レンギョウ5G, ワキョウカツ1.5G	散剤	その他	
○	○	○			ニットー駆風解毒湯エキス顆粒	ニットークワフグドクトウエキスカリウム	日東薬品工業 (株)	駆風解毒散 (湯)	駆風解毒湯エキス1.7G (ポウフウ1G・キョウ1G・ゴボウシ1G・レンギョウ1.7G・キョウカツ0.5G・ケイガイ0.5G・カンゾウ)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)

J	A	P	M	P	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○				ノドゲン漢方トローチ	ノドゲンカンボウトローチ	ジェービーエス製薬 (株)	風風解毒散 (湯)	風風解毒湯乾燥エキス1.65G (ボウフウ1.5G・レンギョウ2.5G・キョウカウ0.75G・キョウ1.5G・ゴボウシ1.5G・ケイヒ4)	錠剤	トローチ	
○	○	○				のどぬる ガラゴック	ノドヌールガラゴック	小林製薬 (株)	風風解毒散 (湯)	風風解毒湯エキス10G (ボウフウ3G・ゴボウシ3G・レンギョウ5G・ケイヒ1.5G・キョウカウ1.5G・カンゾウ1.5G・キキ)	液剤	液	
○	○	○				JPS漢方顆粒-11号	JPSカンボウカリユウ-11ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (45量) 2.08G (ケイヒ3.2G・ブクリョウ3.2G・ボタンビ3.2G・トウニン3.2G・ジャクヤク3.2G)	散剤	顆粒	
○	○	○				JPS桂枝茯苓丸エキス錠N	JPSケイシブクリョウガンリョウウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (34量) 1.95G (ケイヒ3G・ブクリョウ3G・ボタンビ3G・トウニン3G・ジャクヤク3G)	錠剤	錠	
○	○	○				ウチダの桂枝茯苓丸	ウチダノケイシブクリョウガン	(株) ウチダ和漢薬	桂枝茯苓丸	生薬末8.083G (ケイヒ4G・ブクリョウ4G・ボタンビ4G・トウニン4G・ジャクヤク4G)	錠剤	錠	
○	○	○				ウチダの桂枝茯苓丸	ウチダノケイシブクリョウガンリョウ	(株) ウチダ和漢薬	桂枝茯苓丸	ケイヒ4G, ブクリョウ4G, ボタンビ4G, トウニン4G, ジャクヤク4G	散剤	煎剤	
○	○	○				ウチダの桂枝茯苓丸エキス散	ウチダノケイシブクリョウガンリョウウエキスサン	(株) ウチダ和漢薬	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス2.09G (ケイヒ2.5G・ブクリョウ2.5G・トウニン2.5G・ブクリョウ2.5G・ボタンビ2.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○				ウチダの恵眼錠	ウチダノケイレインジエン	(株) ウチダ和漢薬	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス2.09G (ケイヒ2.5G・ブクリョウ2.5G・トウニン2.5G・ブクリョウ2.5G・ボタンビ2.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○				オオクサ桂枝茯苓丸	オオクサケイシブクリョウガン	大塚薬品 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ末 (桂皮末) 1200MG, ブクリョウ末 (茯苓末) 1200MG, ボタンビ末 (牡丹皮末) 1200MG, トウニン末 (桃仁末) 1200MG	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○				オオクサ桂枝茯苓丸エキス錠	オオクサケイシブクリョウガンリョウウエキスジョウ	大塚薬品 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (23量) 1870MG (ケイヒ (桂皮) 2.67G・ブクリョウ (茯苓) 2.67G・ボタンビ (牡丹皮) 2.67G・トウニ	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	×			2017年閉店	紀伊国屋桂枝茯苓丸	キノクニケイシブクリョウガン	(株) 紀伊国屋漢薬局	桂枝茯苓丸	ケイヒ末1.44G, ジャクヤク末1.44G, トウニン1.44G, ブクリョウ末1.44G, ボタンビ末1.44G			
○	○	○				「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸エキス顆粒	クラシエカンボウケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウ	クラシエ製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 1150MG (ケイヒ2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G・トウニン2G・ジャクヤク2G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸エキス錠	クラシエカンボウケイシブクリョウガンリョウウエキスジョウ	クラシエ製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 1150MG (ケイヒ2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G・トウニン2G・ジャクヤク2G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				桂枝茯苓丸	ケイシブクリョウガン	(株) 延寿堂	桂枝茯苓丸	ケイヒ900MG, ブクリョウ900MG, ボタンビ900MG, トウニン900MG, ジャクヤク900MG	その他		(株) 池田屋安兵衛商店
○	○	○			表記違い	桂枝茯苓丸	ケイシブクリョウガン	二反田薬品工業 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ末1.2G, ブクリョウ末1.2G, ボタンビ末1.2G, ジャクヤク末1.2G, トウニン末1.2G	錠剤	丸	松浦薬業株式会社
○	○	○				桂枝茯苓丸(フジウ桂枝茯苓丸)	ケイシブクリョウガンフジウケイシブクリョウガン		桂枝茯苓丸	ケイヒ末, ブクリョウ末, ボタンビ末, ジャクヤク末, トウニン末	錠剤	丸	松浦薬業 (株)
○	○	○				桂枝茯苓丸	ケイシブクリョウガン	日本製薬 (株)・滋	桂枝茯苓丸		錠剤		
○	○	○				桂枝茯苓丸エキス錠OM	ケイシブクリョウガンエキスジョウOM	大峰堂薬品工業 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 1150MG (ケイヒ2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G・トウニン2G・ジャクヤク2G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○				桂枝茯苓丸錠SH	ケイシブクリョウガンジョウSH	新日本製薬株式会社	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 1150MG (ケイヒ2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G・トウニン2G・ジャクヤク2G)	錠剤	錠	
○	○	○				桂枝茯苓丸錠「創至聖」	ケイシブクリョウガンジョウソウセンセイ	北日本製薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ末600MG, ブクリョウ末600MG, ボタンビ末600MG, トウニン末600MG, ジャクヤク末600MG	錠剤	錠	
○	○	○				桂枝茯苓丸 ダイコー	ケイシブクリョウガンダイコー	大発生薬 (有)	桂枝茯苓丸	ケイヒ1161MG, ブクリョウ1161MG, ボタンビ1161MG, トウニン1161MG, ジャクヤク1161MG	錠剤	丸	
○	○	×			製販HPには掲載あり。	桂枝茯苓丸粒状	ケイシブクリョウガンリョウウジョウ	長倉製薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ1.126G, ブクリョウ1.126G, ジャクヤク1.126G, トウニン1.126G, ボタンビ1.126G	顆粒		日邦薬品工業 (株)
○	○	○				桂枝茯苓丸料Aエキス細粒三和生薬	ケイシブクリョウガンリョウウAエキスサイリウサンフシヨウヤク	三和生薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス2.6G (ケイヒ4G・ブクリョウ4G・ボタンビ4G・トウニン4G・ジャクヤク4G)	散剤	細粒	
○	○	○				桂枝茯苓丸料Aエキス細粒「分包」三和生薬	ケイシブクリョウガンリョウウAエキスサイリウサンフシヨウヤク	三和生薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス2.6G (ケイヒ4G・ブクリョウ4G・ボタンビ4G・トウニン4G・ジャクヤク4G)	散剤	細粒	湧永製薬 (株)
○	○	○				桂枝茯苓丸料エキス顆粒KM-2	ケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウKM-2	北日本製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス2.35G (ケイヒ4G・ジャクヤク4G・トウニン4G・ブクリョウ4G・ボタンビ4G)	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○				桂枝茯苓丸料エキス顆粒【東洋】分包	ケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウトヨウブンボウ	(株) 東洋薬行	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸料水製エキス2.4G (ケイヒ4G・ブクリョウ4G・ボタンビ4G・トウニン4G・ジャクヤク4G)	散剤	顆粒	
○	○	○				桂枝茯苓丸料エキス【細粒】69	ケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウ69	松浦薬業株式会社	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 2.75G (ケイヒ2G・ジャクヤク2G・トウニン2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G)	散剤	細粒	
○	○	○				桂枝茯苓丸料エキス細粒「コタロー」	ケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (45量) 2.24G (ケイヒ3.2G・ボタンビ3.2G・ジャクヤク3.2G・ブクリョウ3.2G・トウニン3.2G)	散剤	散	
○	○	○				桂枝茯苓丸料エキス散【勝島】	ケイシブクリョウガンリョウウエキスサンジョウショウ	(株) 東洋薬行	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス3G (ケイヒ4G・ブクリョウ4G・ボタンビ4G・トウニン4G・ジャクヤク4G)	散剤	散	
○	○	○				桂枝茯苓丸料錠 T 2 5	ケイシブクリョウガンリョウウジョウ T 2 5	中村薬品工業株式会社	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 1150MG (ケイヒ2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G・トウニン2G・ジャクヤク2G)	錠剤	錠	株式会社 日本ヘルスクアアドバイザーズ
○	○	○				桂枝茯苓丸料「タキザワ」	ケイシブクリョウガンリョウウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	桂枝茯苓丸	ケイヒ4G, ブクリョウ4G, ボタンビ4G, トウニン4G, ジャクヤク4G	その他	煎剤	
○	○	○				桂枝茯苓湯	ケイシブクリョウトウ	東洋漢方製薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ4G, ブクリョウ4G, ボタンビ4G, トウニン4G, ジャクヤク4G	その他		日邦薬品工業株式会社
○	○	○				桂枝茯苓湯 (顆粒)	ケイシブクリョウトウカリユウ	東洋漢方製薬 (株)	桂枝茯苓丸	水製乾燥エキス0.5G (ケイヒ1.4G・ブクリョウ1.4G・ボタンビ1.4G・ジャクヤク1.4G・トウニン1.4G), ケイヒ末0.8G, フ	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	×			製販HPには掲載あり。	桂枝茯苓粒状	ケイシブクリョウリョウウジョウ	長倉製薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ0.9G, ジャクヤク0.9G, トウニン0.9G, ブクリョウ0.9G, ボタンビ0.9G	散剤		日邦薬品工業 (株)
○	○	○				健腸丸	ケイフガン	大峰堂薬品工業 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ900MG, ブクリョウ900MG, ボタンビ900MG, トウニン900MG, ジャクヤク900MG	錠剤	丸	
○	○	○				ケイブクN「コタロー」	ケイブクNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス散 (12量) 1.68G (ケイヒ2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G・トウニン2G・ジャクヤク2G)	錠剤	錠	
○	○	○				ケイホープB	ケイホープB	国産薬品工業 (株)	桂枝茯苓丸	水製乾燥エキス1201mg (ケイヒ・ボタンビ・ジャクヤク・ブクリョウ・トウニン各3g) アスコルビン酸60mgリポフラビン3mg	錠剤		湧永製薬 (株)
○	○	○				健腸丸	ケンフガン	(株) 新本天海堂	桂枝茯苓丸	ケイヒ末1000MG, ブクリョウ末1000MG, ジャクヤク末1000MG, ボタンビ末1000MG, トウニン末1000MG, コメデンブ	錠剤	丸	
○	○	○				錠剤桂枝茯苓丸	ジョウザイケイシブクリョウガン	一元製薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ末4.5G, ブクリョウ末4.5G, ボタンビ末4.5G, ジャクヤク末4.5G, トウニン末4.5G, 水性エキス2.5G (ケイヒ5G・シ	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○				神農桂枝茯苓丸料エキス錠	シンノウケイシブクリョウガンリョウウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (34量) 1.95G (ケイヒ3G・ブクリョウ3G・ボタンビ3G・トウニン3G・ジャクヤク3G)	錠剤	錠	
○	○	×				杉原の桂枝茯苓丸	スギハラノケイシブクリョウガン	(有) 杉原達二商店	桂枝茯苓丸	ケイヒ0.92G, ジャクヤク0.92G, トウニン0.92G, ブクリョウ0.92G, ボタンビ0.92G		丸	
○	○	○				田尻漢宝丸	タジリカンボウガン	(株) 田尻300年製薬	桂枝茯苓丸	ケイヒ0.9G, ブクリョウ0.9G, ボタンビ0.9G, トウニン0.9G, ジャクヤク0.9G, ハチミツ13G, バイシヨデンブ0.2G	錠剤	丸	
○	○	○				ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒	ツムラカンボウケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウ	(株) ツムラ	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス(処方分量集, 58量)1.5g (ケイヒ・ジャクヤク・トウニン・ブクリョウ・ボタンビ各2.5g)	散剤		
○	○	○				ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒A	ツムラカンボウケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウA	(株) ツムラ	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 0.875G (ケイヒ1.5G・ブクリョウ1.5G・ジャクヤク1.5G・ボタンビ1.5G・トウニン1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○				ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス錠A	ツムラカンボウケイシブクリョウガンリョウウエキスジョウA	(株) ツムラ	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス(処方分量集, 23量)1.6g (ケイヒ・ジャクヤク・トウニン・ブクリョウ・ボタンビ各2.67g)	錠剤		
○	○	○				てんぐ桂枝茯苓丸	テングケイシブクリョウガン	二反田薬品工業 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ末1.2G, ジャクヤク末1.2G, トウニン末1.2G, ブクリョウ末1.2G, ボタンビ末1.2G	錠剤	丸	
○	○	○				東洋の桂枝茯苓丸料エキス顆粒	トウノウケイシブクリョウガンリョウウエキスカリユウ	東洋漢方製薬 (株)	桂枝茯苓丸	水製乾燥エキス0.5G (ケイヒ1.1G・ブクリョウ1.1G・ボタンビ1.1G・ジャクヤク1.1G・トウニン1.1G), ケイヒ末0.8G, フ	散剤	顆粒	日邦薬品工業株式会社
○	○	○				トチモトの桂枝茯苓丸料	トチモトノケイシブクリョウガンリョウ	(株) 新本天海堂	桂枝茯苓丸	ケイヒ4G, ジャクヤク4G, トウニン4G, ブクリョウ4G, ボタンビ4G	その他		
○	○	×			確認票商品例	花腸桂枝茯苓丸	ハナオウケイシブクリョウガン	小西製薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ末1G, ブクリョウ末1G, ボタンビ末1G, トウニン末1G, ジャクヤク末1G	丸		
○	○	×				ビタトール 桂枝茯苓丸錠	ビタトールケイシブクリョウガンジヨウ	北日本製薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ末600MG, ブクリョウ末600MG, ボタンビ末600MG, トウニン末600MG, ジャクヤク末600MG			
○	○	○				フックツ散	フックツ散	劑盛堂薬品 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (310量) 0.7G (ケイヒ1.2G・ジャクヤク1.2G・トウニン1.2G・ブクリョウ1.2G・ボタンビ1.2G), ケイ	散剤	細粒	
○	○	×				フルチン	フルチン	日の丸漢方 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ16MG, ジャクヤク16MG, トウニン16MG, ハチミツ20MG, ブクリョウ16MG, ボタンビ16MG			
○	○	○				ヘア漢方エキス錠	ヘアカンボウエキスジョウ	大峰堂薬品工業 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (23量) 1533MG (ケイヒ2.67G・ブクリョウ2.67G・ボタンビ2.67G・トウニン2.67G・ジャクヤク2.67G)	錠剤	錠	ライオン (株)
○	○	○				ホノフックツE X錠	ホノフックツE Xジョウ	劑盛堂薬品 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 0.95G (ケイヒ2G・ジャクヤク2G・トウニン2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G)	錠剤	錠	
○	○	×				ホリエの桂枝茯苓丸料	ホリエノケイシブクリョウガンリョウ	堀江生薬 (株)	桂枝茯苓丸	ケイヒ4G, ブクリョウ4G, ボタンビ4G, トウニン4G, ジャクヤク4G	煎剤		
○	○	○				モリ ビーシャン	モリビーシャン	大杉製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス2G (ケイヒ (桂皮) 4G・ブクリョウ (茯苓) 4G・ボタンビ (牡丹皮) 4G・トウニン (桃仁) 4G・ジャク	散剤	顆粒	
○	○	○				療方調血顆粒	リョウホウチュウケツカリユウ	クラシエ製薬 (株)	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丸エキス (12量) 1150MG (ケイヒ2G・ブクリョウ2G・ボタンビ2G・トウニン2G・ジャクヤク2G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒A	クラシエカンボウゴトウエキスカリユウA	クラシエ製薬 (株)	五虎湯	五虎湯エキス粉末M2100MG (マオウ74G・キョウニン4G・カンソウ2G・セッコウ10G・ソウハクヒ3G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)

J	A	P	I	C	PMDA	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○					「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒S	クラシエカンボウゴトウエキスカリウス	クラシエ製薬 (株)	五虎湯	五虎湯エキス粉末M1575M (マオウ3G・キョウニン3G・カンゾウ1.5G・セッコウ7.5G・ソウハクヒ2.25G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒SII	クラシエカンボウゴトウエキスカリウスII	クラシエ製薬 (株)	五虎湯	五虎湯エキス粉末M1575M (マオウ3G・キョウニン3G・カンゾウ1.5G・セッコウ7.5G・ソウハクヒ2.25G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
		○					こども咳止め漢方ゼリー	コドモセキドメカンボウゼリー	新薬品工業(株)・奈	五虎湯	五虎湯エキス粉末525mg (マオウ・キョウニン各1.0g、カンゾウ0.5g、セッコウ2.5g、ソウハクヒ0.75gより抽出。)	ゼリー	顆粒	クラシエ薬品株式会社
○	○	×				製販HPには掲載あり。	宝樹 (エキス顆粒)	ホウジュエキスカリウ	(株) 建林松鶴堂	五虎湯	水製エキス (乾燥エキス) 1.3G (マオウ2G・キョウニン2G・カンゾウ1G・ソウハクヒ1G・セッコウ5G)	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○					一元/錠剤半車腎丸	イチゲン/ジョウザイゴシャジンキガン	一元製薬 (株)	半車腎丸	エキス末2300MG (ジョウ5000MG・サンジュ3000MG・サンヤク3000MG・タクシャ3000MG・ブクリョウ3000MG・ボ)	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○					ウロバランS	ウロバランS	松浦薬業株式会社	半車腎丸	半車腎丸水製エキス7G (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボ)	錠剤	錠	佐藤製薬株式会社
○	○	○					温補利水丸	オンボリスイガン	株式会社ウチダ和漢薬	半車腎丸	ジオウ、サンジュ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ etc.	錠剤	丸	
○	○	○					漢方濃縮煎剤半車腎丸107	カンボウノウシュクセンザイゴシャジンキガン107	松浦薬業株式会社	半車腎丸	半車腎丸抽出物7.7G (ジョウ2.5G・タクシャ1.5G・シャゼン1.5G・サンジュ1.5G・ブクリョウ1.5G・サンヤク1.5G)	その他	エキス	
○	○	○					漢方ラクトル顆粒	カンボウラクトルカリウ	新薬品工業株式会社	半車腎丸	半車腎丸エキス	散剤	顆粒	日本機器製薬株式会社
○	○	○					【救心漢方】金匱腎気丸料エキス顆粒	キョウシンカンボウキンギンキガンリョウエキスカリウス	救心製薬 (株)	半車腎丸	半車腎丸料乾燥エキス4000MG (ジョウ4G・サンジュ2.4G・サンヤク2.4G・タクシャ2.4G・ブクリョウ2.4G・ボ)	散剤	顆粒	
○	○	○					「クラシエ」漢方牛車腎気丸料エキス錠	クラシエカンボウゴシャジンキガンリョウエキスジョウ	クラシエ製薬 (株)	半車腎丸	牛車腎気丸エキス (「症候別治療」, 12錠) 2400MG (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブ)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					原末・牛車腎気丸	ゲンマツ・ゴシャジンキガン	株式会社ウチダ和漢薬	半車腎丸	ジオウ1.11G、サンジュ0.555G、サンヤク0.555G、タクシャ0.416G、ブクリョウ0.416G、ボタンピ0.416G、ケイヒ0.139G	錠剤	丸	
○	○	○					牛車腎気丸エキス錠G「コタロー」	ゴシャジンキガンエキスサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	半車腎丸	牛車腎気丸エキス散 (12錠) 3.4G (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボ)	錠剤	錠	
○	○	○					牛車腎気丸エキス錠N「コタロー」	ゴシャジンキガンエキスジョウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	半車腎丸	牛車腎気丸エキス散 (12錠) 3.4G (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボ)	錠剤	錠	
○	○	○					牛車腎気丸料エキス顆粒「クラシエ」	ゴシャジンキガンリョウエキスカリウスクラシエ	大峰堂薬品工業 (株)	半車腎丸	牛車腎気丸エキス (「症候別治療」, 12錠) 2400MG (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブ)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					牛車腎気丸料エキス (細粒) 98	ゴシャジンキガンリョウエキスサイリウ98	松浦薬業株式会社	半車腎丸	牛車腎気丸水製エキス7G (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボ)	錠剤	錠	
○	○	○					牛車腎気丸料「タキザワ」	ゴシャジンキガンリョウタキザワ	(株) タキザワ漢方殿	半車腎丸	ジオウ6G、ボタンピ3G、サンジュ3G、ケイヒ3G、サンヤク3G、フシ0.5G、タクシャ3G、ゴシツ3G、ブクリョウ3G、	その他	煎剤	
○	○	○					10味寿丸	ジュウミジュセソウガン	中新薬業 (株)	半車腎丸	半車腎気丸エキス末1200MG (ジョウ2.58G・サンジュ1.55G・サンヤク1.55G・タクシャ1.55G・ブクリョウ1.55G・ボ)	錠剤	丸	
○	○	○					精華牛車腎気丸	セイカゴシャジンキガン	ハツ目製薬 (株)	半車腎丸	牛車腎気丸料エキス末2.4G (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボ)	錠剤	丸	イスクラ産業 (株)
○	○	○					ロート牛車腎気丸錠II	ロートゴシャジンキガンジョウII	大峰堂薬品工業 (株)	半車腎丸	牛車腎気丸エキス (12錠) 2400MG (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボ)	錠剤	錠	ロート製薬 (株)
○	○	○					ロート トリリズム	ロートトリリズム	大峰堂薬品工業 (株)	半車腎丸	牛車腎気丸エキス(12錠)2400MG (ジョウ2.5G・サンジュ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボ)	錠剤	錠	ロート製薬 (株)
○	○	○					ゴリンサンN「コタロー」	ゴリンサンNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	五淋散	エキス散3.36G (ブクリョウ3G・トウキ1.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・シャクヤク1G・サンシシ1G・ジオウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					五淋散エキス錠G「コタロー」	ゴリンサンエキスサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	五淋散	エキス散3.36G (ブクリョウ3G・カンゾウ1.5G・ジオウ1.5G・カッセキ1.5G・トウキ1.5G・シャクヤク1G・タクシャ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					五淋散エキス錠N「コタロー」	ゴリンサンエキスジョウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	五淋散	エキス散3.36G (ブクリョウ3G・トウキ1.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・シャクヤク1G・サンシシ1G・ジオウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					五淋散カプレット「コタロー」	ゴリンサンカプレットコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	五淋散	エキス散3.36G (ブクリョウ3G・トウキ1.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・シャクヤク1G・サンシシ1G・ジオウ1.5G)	錠剤	カプレット錠	
○	○	○					五淋散料エキス (細粒) 80	ゴリンサンリョウエキスサイリウ80	松浦薬業株式会社	五淋散	五淋散料エキス5.2G (ブクリョウ3G・トウキ1.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・シャクヤク1G・サンシシ1G・ジオウ1.5G)	錠剤	錠	南天商事株式会社
○	○	○					腫経 (エキス顆粒)	シュケイエキスカリウス	(株) 建林松鶴堂	五淋散	水製エキス (乾燥エキス) 1.6G (ブクリョウ2.5G・トウキ1.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・シャクヤク1G・サンシシ1)	錠剤	錠	
○	○	×					デルマンテマ-A	デルマンテマ-A	(有) 本則薬品	五淋散	水製乾燥エキス粉末3.5G (ブクリョウ5G・トウキ3G・オウゴン3G・カンゾウ3G・シャクヤク2G・サンシシ2G)	錠剤	錠	
○	○	○					ノルクスK錠	ノルクスKジョウ	明治薬品 (株)	五淋散	五淋散料エキス2.6G (シャクヤク1G・サンシシ1G・ブクリョウ3G・トウキ1.5G・カンゾウ1.5G・オウゴン1.5G・ジオウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					ポーコレン	ポーコレン	小林製薬 (株)	五淋散	五淋散料エキス2.95G (ブクリョウ3G・トウキ1.5G・オウゴン1.5G・カンゾウ1.5G・シャクヤク1G・サンシシ1G・ジオウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					ポーラック	ポーラック	小太郎漢方製薬 (株)	五淋散	エキス散	錠剤	カプレット錠	
○	○	○					JPS漢方顆粒-14号	JPSカンボウカリウG-14ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	五苓散	五苓散料乾燥エキス1.92G (タクシャ4.8G・チャレイ3.6G・ブクリョウ3.6G・ソウジュツ3.6G・ケイヒ2.4G)	錠剤	顆粒	宇津救命丸株式会社
○	○	○					JPS五苓散料エキス錠N	JPSゴレサンリョウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	五苓散	五苓散料乾燥エキス1.8G (タクシャ4.5G・チャレイ3.375G・ブクリョウ3.375G・ソウジュツ3.375G・ケイヒ2.25G)	錠剤	錠	
○	○	○					アルピタン	アルピタン	小林製薬 (株)	五苓散	五苓散料エキス2.3G (タクシャ5.0G・チャレイ3.0G・ブクリョウ3.0G・ビャクジュツ3.0G・ケイヒ2.0G)	錠剤	錠	
○	○	○					ウチダの五味利水	ウチダノゴミリスイ	(株) ウチダ和漢薬	五苓散	五苓散料エキス1.8G (タクシャ4G・チャレイ3G・ブクリョウ3G・ソウジュツ3G・ケイヒ2G)	散剤	細粒	
○	○	○					ウチダの五苓散	ウチダノゴレイサン	(株) ウチダ和漢薬	五苓散	タクシャ末310G、チャレイ190G、ブクリョウ末190G、ソウジュツ末190G、ケイヒ末120G	散剤	散	
○	○	○					ウチダの五苓散料	ウチダノゴレイサンリョウ	(株) ウチダ和漢薬	五苓散	タクシャ6G、チャレイ4.5G、ブクリョウ4.5G、ソウジュツ4.5G、ケイヒ3G	その他	散	
○	○	○					ウチダの五苓散料エキス散	ウチダノゴレイサンリョウエキスサン	(株) ウチダ和漢薬	五苓散	五苓散料エキス1.8G (タクシャ4G・チャレイ3G・ブクリョウ3G・ソウジュツ3G・ケイヒ2G)	散剤	散	
○	○	○					かんばう循々五苓散	カンバウジュンジュンゴレイサン	松浦薬業株式会社	五苓散	タクシャ (沢瀉) 1.406G、チャレイ (猪苓) 0.844G、ブクリョウ (茯苓) 0.844G、ビャクジュツ (白朮) 0.844G、ケイヒ (桂)	散剤	散	
○	○	○					キアガード	キアガード	ロート製薬 (株)	五苓散	五苓散エキス2.175g (タクシャ4g、チャレイ・ブクリョウ・ソウジュツ各3g、ケイヒ1.5g)	錠剤	錠	
○	○	○					【救心漢方】五苓散	キョウシンカンボウゴレイサン	救心製薬 (株)	五苓散	五苓散料乾燥エキス1050MG (タクシャ3G・チャレイ2.25G・ブクリョウ2.25G・ソウジュツ2.25G・ケイヒ1.5G)、五苓散	散剤	散	
○	○	○					「クラシエ」漢方五苓散料エキス顆粒	クラシエカンボウゴレイサンリョウエキスカリウス	クラシエ製薬 (株)	五苓散	五苓散料エキス粉末M1000MG (タクシャ2.5G・チャレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・ビャクジュツ1.5G・ケイヒ1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					「クラシエ」漢方五苓散料エキス顆粒S	クラシエカンボウゴレイサンリョウエキスカリウス	クラシエ製薬 (株)	五苓散	五苓散料エキス粉末M1500mg (タクシャ3.75g、チャレイ・ブクリョウ・ビャクジュツ各2.25g、ケイヒ1.5gより抽出)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					クラシエ五苓散錠	クラシエゴレイサンジョウ	クラシエ製薬 (株)	五苓散	タクシャ末703M G、チャレイ末422M G、ブクリョウ末422M G、ソウジュツ末422M G、ケイヒ末281M G	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	×				製販HPには掲載あり。	光風 (エキス顆粒)	コウフウエキスカリウス	(株) 建林松鶴堂	五苓散	水製エキス (乾燥エキス) 0.9G (タクシャ2.5G・チャレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・ビャクジュツ1.5G・ケイヒ1G)	錠剤	錠	
○	○	×				製販HPには掲載あり。	五苓散	ゴレイサン	(有) 杉原達二商店	五苓散	ケイヒ12.5G、タクシャ31.2G、チャレイ18.7G、ビャクジュツ18.7G、ブクリョウ18.7G	散剤	散	
○	○	○					五苓散エキス顆粒S A	ゴレイサンエキスカリウスA	帝國漢方製薬 (株)	五苓散	五苓散水製乾燥エキス1.35G (タクシャ4G・チャレイ2.4G・ブクリョウ2.4G・ビャクジュツ2.4G・ケイヒ1.6G)	散剤	錠	湧泉製薬 (株)
○	○	×				製販HPには掲載あり。	五苓散錠	ゴレイサンジョウ	長倉製薬 (株)	五苓散	ケイヒ0.55G、タクシャ1.4G、チャレイ0.85G、ビャクジュツ0.85G、ブクリョウ0.85G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	×				製販HPには掲載あり。	五苓散粒状	ゴレイサンリョウジョウ	長倉製薬 (株)	五苓散	ケイヒ0.56G、チャレイ0.84G、ビャクジュツ0.84G、ブクリョウ0.84G、タクシャ1.4G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	×				製販HPには掲載あり。	五苓散粒状 (分包)	ゴレイサンリョウジョウブンボウ	長倉製薬 (株)	五苓散	ケイヒ0.56G、タクシャ1.4G、チャレイ0.84G、ビャクジュツ0.84G、ブクリョウ0.84G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○					五苓散料A	ゴレイサンリョウA	大杉製薬 (株)	五苓散	五苓散エキス2.1G (タクシャ (沢瀉) 6G・チャレイ (猪苓) 4.5G・ブクリョウ (茯苓) 4.5G・ソウジュツ (蒼朮) 4.5G・ケ)	散剤	顆粒	
○	○	○					五苓散料Aエキス細粒三和生薬	ゴレイサンリョウAエキスサイリウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	五苓散	五苓散料A水製エキス3.8G (タクシャ6G・チャレイ4.5G・ブクリョウ4.5G・ビャクジュツ4.5G・ケイヒ3G)	散剤	細粒	
○	○	○					五苓散料Aエキス細粒「分包」三和生薬	ゴレイサンリョウAエキスサイリウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	五苓散	五苓散料A水製エキス3.8G (タクシャ6G・チャレイ4.5G・ブクリョウ4.5G・ビャクジュツ4.5G・ケイヒ3G)	散剤	細粒	
○	○	○					五苓散料エキス (細粒) 16	ゴレイサンリョウエキスサイリウ16	松浦薬業株式会社	五苓散	五苓散料水製エキス3.7G (乾燥物換算約1.85G) (タクシャ4G・チャレイ3G・ブクリョウ3G・ビャクジュツ3G・ケイヒ1.6)	散剤	錠	
○	○	○					五苓散料エキス散 (勝昌)	ゴレイサンリョウエキスサンショウ	(株) 東洋薬行	五苓散	五苓散料水製エキス2.4G (タクシャ5G・ビャクジュツ3G・ブクリョウ3G・チャレイ3G・ケイヒ2G)	散剤	散	
○	○	○					五苓散料エキス錠 (大峰)	ゴレイサンリョウエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	五苓散	五苓散料エキス1050MG (タクシャ2.5G・チャレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・ビャクジュツ1.5G・ケイヒ1G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○					五苓散料「タキザワ」	ゴレイサンリョウタキザワ	(株) タキザワ漢方殿	五苓散	タクシャ6G、ソウジュツ4.5G、チャレイ4.5G、ケイヒ3G、ブクリョウ4.5G	その他	煎剤	
○	○	○					ゴレーンN「コタロー」	ゴレーンNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	五苓散	水製エキス1.6G (タクシャ3G・チャレイ2.25G・ブクリョウ2.25G・ビャクジュツ2.25G・ケイヒ1.25G)	錠剤	錠	

J	APIC	PMDA	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (APIC)	販売元
		○		ゴレーンS「コタロー」(五苓散料エキス錠)	ゴレーンSコタローゴレイサンリョウエキスジョウ	小太郎漢方製薬(株)	五苓散	水製エキス1.4g(タクシャ3g・チャレイ・ブクリョウ・ビャクジュツ各2.25g、ケイヒ1.5g)	錠剤		
○	○	○		錠剤五苓散	ジョウザイゴレイサン	一元製薬(株)	五苓散	ケイヒ末3.2G、ソウジュツ末4.7G、タクシャ末5.2G、ブクリョウ末4.7G、チャレイ末4.7G、水性エキス2.5G(ケイヒ3.7G)	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○		神農五苓散料エキス錠	シンノウゴレイサンリョウエキスジョウ	ジェービーエス製薬(株)	五苓散	五苓散料乾燥エキス1.8G(タクシャ4.5G・チャレイ3.375G・ブクリョウ3.375G・ソウジュツ3.375G・ケイヒ2.25G)	錠剤	錠	
○	○	○		スイギョクE P錠	スイギョクE P錠	刑盛堂薬品(株)	五苓散	五苓散料エキス0.95G(ケイヒ1.08G・タクシャ2.16G・チャレイ1.62G・ビャクジュツ1.62G・ブクリョウ1.62G)	錠剤	錠	
○	○	○		聖恵	セイケイ	昭和化学工業(株)	五苓散	ケイヒ末562.5MG、タクシャ末1406.25MG、チャレイ843.75MG、ハチミツ1.8G、ビャクジュツ末843.75MG、ブクリョウ末	錠剤	丸	
○	○	○		ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒	ツムラカンボウゴレイサンリョウエキスカリユウ	(株)ツムラ	五苓散	乾燥エキス1.4G(タクシャ3.3G・ソウジュツ1.98G・チャレイ1.98G・ブクリョウ1.98G・ケイヒ1.32G)	錠剤	顆粒	
○	○	○		テイヤク五苓散エキス顆粒	テイヤクゴレイサンエキスカリユウ	帝國漢方製薬(株)	五苓散	五苓散水製乾燥エキス1.35G(タクシャ4.0G・チャレイ2.4G・ブクリョウ2.4G・ビャクジュツ2.4G・ケイヒ1.6G)	散剤	顆粒	テイコクファルマケア(株)
○	○	○		テイラック	テイラック	小林製薬(株)	五苓散	五苓散エキス2.3gタクシャ5.0g、チャレイ3.0g、ブクリョウ3.0g、ビャクジュツ3.0g、ケイヒ2.0g	錠剤		
○	○	×		デルマンテーマ	デルマンテーマ	(有)本町薬品	五苓散	水製乾燥エキス粉末2.7G(タクシャ6G・チャレイ4.5G・ブクリョウ4.5G・ビャクジュツ4.5G・ケイヒ3G)	散剤		
○	○	○		てんぐ五苓散(顆粒)	テングゴレイサンカリユウ	二反田薬品工業(株)	五苓散	タクシャ末1.40625G、ブクリョウ末0.84375G、ビャクジュツ末0.84375G、ケイヒ末0.5625G、チャレイ末0.84375G	散剤	顆粒	
○	○	○		東洋の五苓散料エキス顆粒	トウヨウゴレイサンリョウエキスカリユウ	東洋漢方製薬(株)	五苓散	水製乾燥エキス1.05G(タクシャ2G・チャレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・ビャクジュツ1.5G・ケイヒ1G)	散剤	顆粒	タクシャ末0.6G、
○	○	○		東洋の五苓散料エキス顆粒(分包)	トウヨウゴレイサンリョウエキスカリユウブンボウ	東洋漢方製薬(株)	五苓散	水製乾燥エキス、タクシャ末、チャレイ末、ブクリョウ末、ビャクジュツ末 etc.	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○		トチモトの五苓湯	トチモトノイレイトウ	(株)栃本天海堂	五苓散	ケイヒ3G、タクシャ6G、チャレイ4.5G、ビャクジュツ4.5G、ブクリョウ4.5G	その他		
○	○	×		ホリエの五苓散料	ホリエノゴレイサンリョウ	堀江生薬(株)	五苓散	タクシャ6G、チャレイ4.5G、ブクリョウ4.5G、ソウジュツ4.5G、ケイヒ3G	錠剤	煎剤	
○	○	○		ミオンライフ五苓散料エキス錠	ミオンライフゴレイサンエキスカリユウ	帝國漢方製薬株式会社	五苓散	五苓散水製乾燥エキス1.69G(タクシャ5.0G・チャレイ3.0G・ブクリョウ3.0G・ビャクジュツ3.0G・ケイヒ2.0G)	散剤	顆粒	テイコクファルマケア(株)
○	○	○		療方調流顆粒	リョウホウチョウリョウカリユウ	クラシエ製薬(株)	五苓散	五苓散料エキス粉末1500MG(タクシャ3.75G・チャレイ2.25G・ブクリョウ2.25G・ビャクジュツ2.25G・ケイヒ1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		JPS漢方調流-15号	JPSカンボウカリユウ-15ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	五苓散	五苓散料エキス粉末1500MG(タクシャ3.75G・チャレイ2.25G・ブクリョウ2.25G・ビャクジュツ2.25G・ケイヒ1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○		JPS柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠N	JPSサイコカリュウコツポレイトウエキスジョウN	柴胡加竜骨牡蠣湯	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯乾燥エキス2.05G(サイコ2.5G・ハンガ2G・ブクリョウ1.5G・ケイヒ1.5G・オウゴン1.25G・タイソウ1.25G)	錠剤	錠	
○	○	○		ウチダの柴胡加竜骨牡蠣湯	ウチダノサイコカリュウコツポレイトウ	(株)ウチダ和漢薬	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	その他	
○	○	○		ウチダの柴胡加竜骨牡蠣湯エキス散	ウチダノサイコカリュウコツポレイトウエキサン	(株)ウチダ和漢薬	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス2.34G(サイコ2.5G・ハンガ2G・ケイヒ1.5G・ブクリョウ1.5G・オウゴン1.25G・タイソウ1.25G)	散剤	細粒	
○	○	○		ウチダの電化調流	ウチダノリュウカジュンセイ	(株)ウチダ和漢薬	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	細粒	
○	○	○		休意(エキス顆粒)	キュウエキスカリユウ	(株)建林松鶴堂	五苓散	水製エキス(乾燥エキス)1.8G(サイコ2G・ハンガ2G・オウゴン1.25G・ブクリョウ1G・ケイヒ1G・タイソウ1G・ニンジン)	散剤	散	
○	○	○		「クラシエ」漢方柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	クラシエカンボウサイコカリュウコツポレイトウエキスカリユウ	クラシエ製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		柴胡加竜骨牡蠣湯	サイコカリュウコツポレイトウ	東洋漢方製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	煎剤	日邦薬品工業(株)
○	○	○		柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠KM	サイコカリュウコツポレイトウエキスカリユウKM	北日本製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	顆粒	一元製薬(株)
○	○	○		柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠(細粒)22	サイコカリュウコツポレイトウエキスカリユウ22	松浦薬業株式会社	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯水製エキス3.2G(サイコ2.5G・ハンガ2G・ブクリョウ1.5G・ケイヒ1.5G・オウゴン1.25G・タイソウ1.25G)	散剤	細粒	一心堂漢方株式会社
○	○	○		柴胡加竜骨牡蠣湯エキス散(勝昌)	サイコカリュウコツポレイトウエキサンショウショウ	(株)東洋薬行	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯水製エキス3.5G(サイコ5G・ハンガ4G・ブクリョウ3G・ケイヒ3G・タイソウ2.5G・ニンジン2.5G・リュウ)	散剤	散	
○	○	○		柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠(大峰)	サイコカリュウコツポレイトウエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○		柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠クラシエ	サイコカリュウコツポレイトウエキスジョウクラシエ	クラシエ製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○		柴胡加竜骨牡蠣湯「タキザワ」	サイコカリュウコツポレイトウタキザワ	(株)タキザワ漢方廠	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	その他	煎剤	
○	○	×	製販HPには掲載あり。	柴胡龍骨粒状	サイコカリュウボリョウジョウ	辰倉製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○		サイリオン「コタロー」	サイリオンNコタロー	小太郎漢方製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	錠剤	錠	
○	○	○		サンワ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒	サンワサイコカリュウコツポレイトウエキスカリユウ	三和生薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	細粒	
○	○	○		サンワ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒「分包」	サンワサイコカリュウコツポレイトウエキスカリユウブンボウ	三和生薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	細粒	湧永製薬(株)
○	○	○		錠剤柴胡加竜骨牡蠣湯	ジョウザイサイコカリュウコツポレイトウ	一元製薬(株)	五苓散	ブクリョウ末3G、ケイヒ末3G、オウゴン末2.5G、ショウキョウ末1.5G、ボレイ末2.5G、ダイオウ末1G、サイコ末5G、ハン	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	×		神農柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	シンノウサイコカリュウコツポレイトウエキスジョウ	神農製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯乾燥エキス2.05G(サイコ2.5G・ハンガ2G・ケイヒ1.5G・ブクリョウ1.5G・オウゴン1.25G・タイソウ1.25G)	錠剤	錠	
○	○	○		ツムラ漢方柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	ツムラカンボウサイコカリュウコツポレイトウエキスカリユウ	(株)ツムラ	五苓散	乾燥エキス2.25G(サイコ2.5G・ハンガ2G・ケイヒ1.5G・ブクリョウ1.5G・オウゴン1.25G・タイソウ1.25G・ニンジン1.25G)	散剤	顆粒	
○	○	○		トチモトの柴胡加竜骨牡蠣湯	トチモトノサイコカリュウコツポレイトウ	(株)栃本天海堂	五苓散	オウゴン2.5G、ケイヒ3G、サイコ5G、ショウキョウ1G、ダイオウ1G、タイソウ2.5G、ニンジン2.5G、ハンガ4G、ブクリ	その他		
○	○	○		ホノミサイキ錠	ホノミサイキジョウ	刑盛堂薬品(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	錠剤	錠	
○	○	×		ホリエ五洗湯	ホリエゴチントウ	堀江生薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯水製エキス1.8G(オウゴン1.25G・ケイヒ1.5G・サイコ2.5G・ショウキョウ0.5G・ダイオウ0.5G・タイソウ)	錠剤	錠	ショウ
○	○	○		モリ コーミニ	モリ コーミニ	大杉製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	散剤	顆粒	
○	○	○		ロート柴胡加竜骨牡蠣湯錠	ロートサイコカリュウコツポレイトウジョウ	大峰堂薬品工業(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	錠剤	錠	ロート製薬(株)
○	○	○		JPS漢方顆粒-16号	JPSカンボウカリユウ-16ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	五苓散	柴胡加竜骨牡蠣湯	錠剤	顆粒	
○	○	○		JPS柴胡桂枝湯液	JPSサイコケイシトウエキ	柴胡桂枝湯	五苓散	柴胡桂枝湯	液剤	液	
○	○	○		JPS柴胡桂枝湯エキス錠N	JPSサイコケイシトウエキスジョウN	柴胡桂枝湯	五苓散	柴胡桂枝湯	錠剤	錠	
○	○	○		SKコーラル内服液	SKコーラル内服液	大華薬品(株)	五苓散	柴胡桂枝湯	液剤	液	日邦薬品工業(株)
○	○	○		ウチダの柴胡桂枝湯	ウチダノサイコケイシトウ	(株)ウチダ和漢薬	五苓散	柴胡桂枝湯	その他	煎剤	
○	○	○		ウチダの柴胡桂枝湯エキス散	ウチダノサイコケイシトウエキサン	(株)ウチダ和漢薬	五苓散	柴胡桂枝湯	散剤	細粒	
○	○	○		ウチダの半夏回腸	ウチダノハンリカイヨウ	(株)ウチダ和漢薬	五苓散	柴胡桂枝湯	散剤	細粒	
○	○	○		オオクサ柴胡桂枝湯エキス錠(分包)	オオクササイコケイシトウエキスカリユウブンボウ	大華薬品(株)	五苓散	柴胡桂枝湯	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○		「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス錠	クラシエカンボウサイコケイシトウエキスカリユウ	クラシエ製薬(株)	五苓散	柴胡桂枝湯	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス錠A	クラシエカンボウサイコケイシトウエキスカリユウA	クラシエ製薬(株)	五苓散	柴胡桂枝湯	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス錠SII	クラシエカンボウサイコケイシトウエキスカリユウSII	クラシエ製薬(株)	五苓散	柴胡桂枝湯	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○		「クラシエ」柴胡桂枝湯液	クラシエサイコケイシトウエキ	大協薬品工業(株)	五苓散	柴胡桂枝湯	液剤	液	クラシエ薬品(株)
○	○	○		サイケットN「コタロー」	サイケットNコタロー	小太郎漢方製薬(株)	五苓散	柴胡桂枝湯	錠剤	錠	

J	JA	P	M	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○			紫胡桂枝湯	サイコケイシトウ	東洋漢方製薬 (株)	紫胡桂枝湯	サイコ5G、ハンガ4G、ケイヒ2.5G、シャクヤク2.5G、オウゴン2G、チクセツニンジン2G、タイソウ2G、カンゾウ1.5G、	○	煎剤	日邦薬品工業株式会社
○	○	○			紫胡桂枝湯Aエキス細粒三和生薬	サイコケイシトウAエキスサイリウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	紫胡桂枝湯	サイコ5G、ハンガ4G、ケイヒ2.5G、シャクヤク2.5G、オウゴン2G、チクセツニンジン2G、タイソウ2G、カンゾウ1.5G、	○	錠剤	
○	○	○			紫胡桂枝湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	サイコケイシトウAエキスサイリウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	紫胡桂枝湯	サイコ5G、ハンガ4G、ケイヒ2.5G、シャクヤク2.5G、オウゴン2G、チクセツニンジン2G、タイソウ2G、カンゾウ1.5G、	○	錠剤	
○	○	○			紫胡桂枝湯エキス顆粒KM	サイコケイシトウエキスカリユウKM	北日本製薬 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯乾燥エキス4G (サイコ5G・ハンガ4G・ケイヒ2.5G・オウゴン2G・シャクヤク2G・タイソウ2G・ニンジン2G・	○	錠剤	一元製薬 (株)
○	○	○			紫胡桂枝湯エキス顆粒S A	サイコケイシトウエキスカリユウS A	帝國漢方製薬 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (23顆) 2.95G (サイコ3.33G・ハンガ2.67G・ケイヒ1.67G・シャクヤク1.67G・オウゴン1.33G・ニンジン1.33G・	○	錠剤	湧永製薬 (株)
○	○	○			紫胡桂枝湯エキス (細粒) 23	サイコケイシトウエキスカリユウ23	松浦薬業株式会社	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (「漢方診療医典」、12顆) 3.6G (乾燥物換算約1.8G) (サイコ2.5G・ハンガ2G・ケイヒ1.25G・シャクヤク2.5G・	○	錠剤	一心堂漢方株式会社
○	○	○			紫胡桂枝湯エキス細粒G「コタロー」	サイコケイシトウエキスサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	紫胡桂枝湯	水製エキス3.2G (サイコ4G・ハンガ3.2G・ケイヒ2G・シャクヤク1.6G・オウゴン1.6G・ニンジン1.6G・タイソウ1.6G・カ	○	錠剤	
○	○	○			紫胡桂枝湯エキス細粒 (東洋)	サイコケイシトウエキスサイリウトウヨウ	(株) 東洋薬行	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯水製エキス (「漢方診療の実際」) 3G (サイコ5G・ハンガ4G・ケイヒ2.5G・シャクヤク2G・オウゴン2G・ニ	○	錠剤	
○	○	○			紫胡桂枝湯エキス散 (勝昌)	サイコケイシトウエキスサンショウショウ	(株) 東洋薬行	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯水製エキス (「漢方処方応用の実際」) 3G (サイコ5G・ハンガ4G・ケイヒ2G・シャクヤク2G・オウゴン2G・ニ	○	散	
○	○	○			紫胡桂枝湯エキス錠 (大峰)	サイコケイシトウエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (12顆) 1900MG (サイコ2.5G・ハンガ2G・ケイヒ1.25G・シャクヤク1.25G・オウゴン1G・ニンジン1G	○	錠剤	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			紫胡桂枝湯錠OM	サイコケイシトウジョウOM	大峰堂薬品工業 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス(12顆)	○	錠剤	
○	○	○			紫胡桂枝湯「タキザワ」	サイコケイシトウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	紫胡桂枝湯	サイコ5G、シャクヤク2.5G、タイソウ2G、ハンガ4G、オウゴン2G、カンゾウ1.5G、ケイヒ2.5G、ニンジン2G、ショウキ	○	煎剤	その他
○	○	○			紫胡桂枝湯分包エキス細粒 (大峰)	サイコケイシトウ分包エキスカリユウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (35顆) 2280MG (サイコ3G・ハンガ2.4G・ケイヒ1.5G・シャクヤク1.2G・オウゴン1.2G・ニンジン1.2G	○	錠剤	
○	○	×		製版HPには掲載あり。	紫胡桂枝湯粒状	サイコケイシトウリュウジョウ	長倉製薬 (株)	紫胡桂枝湯	サイコ1.3G、オウゴン0.6G、ハンガ0.6G、ケイヒ0.6G、シャクヤク0.6G、チクセツニンジン0.6G、ショウキョウ0.3G、水溶性乾燥エキス	○	錠剤	日邦薬品工業 (株)
○	○	×			三宝紫胡桂枝湯液	サンボサイコケイシトウエキ	三寶製薬 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス4200MG (サイコ (紫胡) 5G・ハンガ (半夏) 4G・ケイヒ (桂皮) 3G・シャクヤク (芍薬) 3G・オウゴン (黄	○	錠剤	(人參) 2G・タイソウ (大棗) 2G・カ
○	○	○			錠剤紫胡桂枝湯	ジョウザイサイコケイシトウ	一元製薬 (株)	紫胡桂枝湯	ケイヒ末2.5G、オウゴン末1.9G、シャクヤク末1.9G、ショウキョウ末1.9G、カンゾウ末1.5G、サイコ末5G、ハンガ末4G、	○	錠剤	(株) イチゲン
○	○	○			神農紫胡桂枝湯エキス錠	シンノウサイコケイシトウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (35顆) 2.28g (サイコ3g、ハンガ2.4g、ケイヒ1.5g、シャクヤク・オウゴン・ニンジン・タイソウ各1.2g、カ	○	錠剤	
○	○	○			ツムラ漢方紫胡桂枝湯エキス顆粒A	ツムラカンボウサイコケイシトウエキスカリユウA	(株) ツムラ	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (12顆) 2G (サイコ2.5G・ハンガ2G・オウゴン1G・カンゾウ1G・ケイヒ1G・シャクヤク1G・タイソウ1G	○	錠剤	
○	○	×		製版HPには掲載あり。	ツムラ漢方内服液紫胡桂枝湯S	ツムラカンボウナイフクエキサイコケイシトウS	新生薬品工業株式会社	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス81ML (サイコ5G・ハンガ4G・ケイヒ2.5G・オウゴン2G・シャクヤク2G・タイソウ2G・ニンジン2G・カ	○	液	株式会社ツムラ
○	○	×			天香 (エキス顆粒)	テンコウエキスカリユウ	(株) 建林社鶴堂	紫胡桂枝湯	水製エキス (乾燥エキス) 1.3G (サイコ2.5G・ハンガ2G・ケイヒ1G・シャクヤク1G・オウゴン1G・ニンジン1G・タイソウ1G・カン	○	錠剤	
○	○	○			トチモトの紫胡桂枝湯	トチモトサイコケイシトウ	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯	サイコ5G、ハンガ4G、ケイヒ2.5G、シャクヤク2.5G、オウゴン2G、ニンジン2G、タイソウ2G、カンゾウ1.5G、ショウキ	○	錠剤	その他
○	○	○			ニナダ紫胡桂枝湯エキス細粒	ニナダサイコケイシトウエキスカリユウ	二反田薬品工業 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯乾燥エキス3.67G (サイコ5G・ハンガ4G・ケイヒ2.5G・シャクヤク2.5G・オウゴン2G・ニンジン2G・タイソウ2G	○	錠剤	
○	○	○			ハイ・カンボール	ハイ・カンボール	大杉製薬 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス3.3G (サイコ (紫胡) 5G・ハンガ (半夏) 4G・ケイヒ (桂皮) 2.5G・オウゴン (黄ゴ) 2G・ニンジン	○	錠剤	
○	○	○			ホノミキウカン錠	ホノミキウカンジョウ	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (12顆) 1.6G (オウゴン1G・カンゾウ0.75G・ケイヒ1.25G・サイコ2.5G・シャクヤク1.25G・ショウキ	○	錠剤	
○	○	×			ホリエの紫胡桂枝湯	ホリエノサイコケイシトウ	福江生薬 (株)	紫胡桂枝湯	サイコ5G、ハンガ4G、ケイヒ2.5G、シャクヤク2.5G、オウゴン2G、ニンジン2G、タイソウ2G、カンゾウ1.5G、ショウキ	○	煎剤	
○	○	○			本草紫胡桂枝湯エキス顆粒-H	ホンゾウサイコケイシトウエキスカリユウH	本草製薬 (株)	紫胡桂枝湯	紫胡桂枝湯エキス (23顆) 2.31G (サイコ3.33G・ハンガ2.67G・ケイヒ1.67G・シャクヤク1.67G・オウゴン1.33G・ニンジ	○	錠剤	
○	○	○			JPS漢方顆粒-20号	JPSカンボウカリユウ-20ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	紫胡桂枝湯	芍薬甘草湯エキス (45顆) 2.16G (シャクヤク4.8G・カンゾウ4.8G)	○	錠剤	
○	○	○			アルクラック内服液	アルクラックナイフクエキ	全業工業(株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス2400MG (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	液	
○	○	○			ウチダの解熱止痛湯 (分包)	ウチダノゲキンシツトウブンボウ	(株) ウチダ和漢薬	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス1.1G (シャクヤク2G・カンゾウ2G)	○	錠剤	
○	○	○			ウチダの芍薬甘草湯	ウチダノシャクヤクカンゾウトウ	(株) ウチダ和漢薬	芍薬甘草湯	シャクヤク、カンゾウ	○	煎剤	その他
○	○	○			ウチダの芍薬甘草湯エキス散	ウチダノシャクヤクカンゾウトウエキスサン	(株) ウチダ和漢薬	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス1.1G (シャクヤク2G・カンゾウ2G)	○	錠剤	
○	○	○			「クラシエ」漢方芍薬甘草湯エキス顆粒	クラシエカンボウシャクヤクカンゾウトウエキスカリユウ	クラシエ製薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス1450MG (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	錠剤	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			コムレケアa	コムレケアa	小林製薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス2.4G (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	錠剤	
○	○	○			コムレケアゼリー	コムレケアゼリー	小林製薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス27G (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	ゼリー	ゼリー
○	○	○			コムロン	コムロン	小太郎漢方製薬 (株)	芍薬甘草湯	エキス散1.5G (シャクヤク2.5G・カンゾウ2.5G)	○	錠剤	カブレット錠
○	○	○			阪本漢法の芍薬甘草湯顆粒	サカモトカンボウノシャクヤクカンゾウトウカリユウ	(株) 阪本漢法製薬	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯乾燥エキス2.4G (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	錠剤	
○	○	○			サンフ芍薬甘草湯エキス細粒	サンフシャクヤクカンゾウトウエキスサイリウ	三和生薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (35顆) 1G (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	錠剤	
○	○	○			サンフ芍薬甘草湯エキス錠	サンフシャクヤクカンゾウトウエキスジョウ	三和生薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (35顆) 1G (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	錠剤	
○	○	○			芍薬甘草湯エキス (細粒) 34	シャクヤクカンゾウトウエキスサイリウ34	松浦薬業株式会社	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (「漢方診療医典」、12顆) 1.8G (乾燥物換算約0.9G) (シャクヤク2G・カンゾウ2G)	○	錠剤	
○	○	○			芍薬甘草湯エキス細粒G「コタロー」	シャクヤクカンゾウトウエキスサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	芍薬甘草湯	水製エキス2G (シャクヤク4G・カンゾウ4G)	○	錠剤	
○	○	○			芍薬甘草湯エキス (細粒) SH	シャクヤクカンゾウトウエキスサイリウSH	新日本製薬株式会社	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (「漢方診療医典」、12顆) 1800MG (乾燥物換算約900MG) (シャクヤク2G・カンゾウ2G)	○	錠剤	
○	○	○			芍薬甘草湯エキス細粒「分包」三和生薬	シャクヤクカンゾウトウエキスサイリウブンボウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (35顆) 1G (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	錠剤	湧永製薬 (株)
○	○	○			芍薬甘草湯エキス散 (勝昌)	シャクヤクカンゾウトウエキスサンショウショウ	(株) 東洋薬行	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯水製エキス (「漢方処方応用の実際」) 0.8G (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	散	
○	○	○			芍薬甘草湯「タキザワ」	シャクヤクカンゾウトウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	芍薬甘草湯	シャクヤク3G、カンゾウ3G	○	錠剤	その他
○	○	×		製版HPには掲載あり。	芍薬甘草粒状	シャクヤクカンゾウリュウジョウ	長倉製薬 (株)	芍薬甘草湯	シャクヤク1G、カンゾウ1.1G	○	錠剤	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			錠剤芍薬甘草湯	ジョウザイシャクヤクカンゾウトウ	一元製薬 (株)	芍薬甘草湯	シャクヤク末12.5G、カンゾウ末12.5G	○	錠剤	(株) イチゲン
○	○	○			スピット顆粒	スピットカリユウ	(株) 阪本漢法製薬	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス2.4G (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	錠剤	
○	○	○			太虎堂の仙散「分包」	タイコドウノセンカンブンゴウ	太虎精堂製薬株式会社	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス1000MG (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	散	
○	○	○			ツムラ漢方芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラカンボウノシャクヤクカンゾウトウエキスカリユウ	(株) ツムラ	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (12顆) 1.25G (カンゾウ3G・シャクヤク3G)	○	錠剤	
○	○	○			ツラレス	ツラレス	ロート製薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス2400MG (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	錠剤	
○	○	○			ツラレスSPゼリー	ツラレスSPゼリー	松浦薬業株式会社	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス(12顆)	○	ゼリー	ロート製薬株式会社
○	○	×			デルマンドラマ-B	デルマンドラマ-B	(有) 本町薬品	芍薬甘草湯	水製乾燥エキス粉末2.6G (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	錠剤	
○	○	○			東洋の芍薬甘草湯エキス顆粒	トウヨウノシャクヤクカンゾウトウエキスカリユウ	東洋漢方製薬 (株)	芍薬甘草湯	水製乾燥エキス1.34G (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	錠剤	日邦薬品工業株式会社
○	○	×		確認薬商品例	トチモトの芍薬甘草湯	トチモトノシャクヤクカンゾウトウ	(株) 栃本天海堂	芍薬甘草湯	カンゾウ6G、シャクヤク6G	○	煎剤	
○	○	○			ドルチェ顆粒	ドルチェカリユウ	(株) 阪本漢法製薬	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス2.4G (シャクヤク6G・カンゾウ6G)	○	錠剤	
○	○	×			ピタレール 芍薬甘草湯エキス顆粒A	ピタレールノシャクヤクカンゾウトウエキスカリユウA	東洋漢方製薬 (株)	芍薬甘草湯	水製乾燥エキス1.34G (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	錠剤	
○	○	×			ホリエの芍薬甘草湯	ホリエノシャクヤクカンゾウトウ	福江生薬 (株)	芍薬甘草湯	シャクヤク6G、カンゾウ6G	○	煎剤	
○	○	○			本草芍薬甘草湯エキス顆粒-H	ホンゾウノシャクヤクカンゾウトウエキスカリユウH	本草製薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (23顆) 1.60G (シャクヤク4G・カンゾウ4G)	○	錠剤	
○	○	○			松浦の芍薬甘草湯ゼリー	マツウラノシャクヤクカンゾウトウゼリー	松浦薬業株式会社	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス (12顆) 1.75G (シャクヤク3G・カンゾウ3G)	○	ゼリー	ゼリー
○	○	○			ミオンライフ芍薬甘草湯エキス顆粒	ミオンライフノシャクヤクカンゾウトウエキスカリユウ	帝國漢方製薬 (株)	芍薬甘草湯	芍薬甘草湯エキス2.65G (シャクヤク6.0G・カンゾウ6.0G)	○	錠剤	テイコクファルマケア (株)

J	A	P	M	D	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
						薬王顆粒甘草湯	ヤクオウシヤクヤクカンゾウトウ	薬王製薬(株)	苧草湯	苧草湯エキス(12顆)1.2g(シヤクヤク・カンゾウ各3g)	散剤		
						JPS漢方顆粒-70号	JPSカンボウカリユウ-70ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス(45顆)4.96G(ニンジン2.4G・オウギ2.4G・ビヤクジュツ2.4G・ブクリョウ2.4G・トウキ2.4G・シヤクヤク1.5G)	散剤	顆粒	
						JPS十全大補湯エキス錠N	JPSジュウゼンタイホトウエキシジョウN	ジェービーエス製薬(株)	十全大補湯	十全大補湯乾燥エキス3.1G(ニンジン1.5G・オウギ1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G)	錠剤	錠	
						ウチダの十全大補湯	ウチダノジュウゼンタイホトウ	(株)ウチダ和漢薬	十全大補湯	ニジン3G、オウギ3G、ビヤクジュツ3G、ブクリョウ3G、トウキ3G、シヤクヤク3G、ジオウ3G、センキョウ3G、ケイヒ	散剤	散	その他
						ジュゼンS「コタロー」(十全大補湯エキス錠)	ジュゼンSコタロージュウゼンタイホトウエキシジョウ	小太郎漢方製薬(株)	十全大補湯	水製エキス3.45G(ニンジン1.5G・オウギ1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ケイヒ)	錠剤	錠	
						十全大補湯	ジュウゼンタイホトウ	東洋漢方製薬(株)	十全大補湯	ニンジン3G、オウギ3G、ビヤクジュツ3G、ブクリョウ3G、トウキ3G、シヤクヤク3G、ジオウ3G、センキョウ3G、ケイヒ	散剤	散	その他
						十全大補湯Aエキス細粒三和生薬	ジュウゼンタイホトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス(710顆)4.2G(ニンジン2.1G・オウギ2.1G・ビヤクジュツ2.1G・トウキ2.1G・ブクリョウ2.1G・ジオウ2.1G)	散剤	細粒	湧永製薬(株)
						十全大補湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ジュウゼンタイホトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス(710顆)4.2G(ニンジン2.1G・オウギ2.1G・ビヤクジュツ2.1G・トウキ2.1G・ブクリョウ2.1G・ジオウ2.1G)	散剤	細粒	湧永製薬(株)
						十全大補湯エキス顆粒KM	ジュウゼンタイホトウエキスカリユウKM	北日本製薬(株)	十全大補湯	十全大補湯水製乾燥エキス5G(ジオウ3.5G・ソウジュツ3.5G・トウキ3.5G・ブクリョウ3.5G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G)	散剤	顆粒	一元製薬(株)
						十全大補湯エキス顆粒「東洋」分包	ジュウゼンタイホトウエキスカリユウウブンボウ	(株)東洋薬行	十全大補湯	十全大補湯水製エキス(「漢方処方応用の実際」)4G(ニンジン3G・オウギ3G・ビヤクジュツ3G・ブクリョウ3G・トウキ3G)	散剤	顆粒	
						十全大補湯エキス(細粒)36	ジュウゼンタイホトウエキスサイリュウウ36	松浦薬業株式会社	十全大補湯	十全大補湯水製エキス6.5G(ニンジン1.25G・オウギ1.25G・ビヤクジュツ1.75G・ブクリョウ1.75G・トウキ1.75G・シヤクヤク1.5G)	散剤	顆粒	
						十全大補湯エキス細粒G「コタロー」	ジュウゼンタイホトウエキスサイリュウGコタロー	小太郎漢方製薬(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス(45顆)6.8G(ニンジン2G・オウギ2G・ビヤクジュツ2.8G・ブクリョウ2.8G・トウキ2.8G・ジオウ2.8G)	散剤	細粒	
						十全大補湯エキス散(勝島)	ジュウゼンタイホトウエキスサンソウショウ	(株)東洋薬行	十全大補湯	十全大補湯水製エキス4G(ニンジン3G・オウギ3G・ビヤクジュツ3G・ブクリョウ3G・トウキ3G・シヤクヤク3G・ジオウ3G)	散剤	散	
						十全大補湯エキス錠(大峰)	ジュウゼンタイホトウエキシジョウオオミネ	大峰堂薬品工業(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス2300MG(ニンジン1.5G・オウギ1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
						十全大補湯エキス錠クラシエ	ジュウゼンタイホトウエキシジョウクラシエ	クラシエ製薬(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス(12顆)3100MG(ニンジン1.5G・オウギ1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
						十全大補湯「タキザワ」	ジュウゼンタイホトウタキザワ	(株)タキザワ漢方廠	十全大補湯	ニジン3G、ブクリョウ4G、ジオウ4G、ケイヒ3G、オウギ3G、トウキ4G、センキョウ3G、カンゾウ2G、ソウジュツ4G、オウゴン2G	散剤	散	その他
						ジュホトウ	ジュホトウ	大杉製薬(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス6.1G(ニンジン)3G・オウギ(黄耆)3G・ビヤクジュツ(白朮)3G・トウキ(当帰)3G・ブクリョウ(人參)3G	散剤	散	その他
						錠剤十全大補湯	ジュウザイジュウゼンタイホトウ	一元製薬(株)	十全大補湯	ニジン末1.89G、オウギ末1.89G、ビヤクジュツ末2.69G、トウキ末2.69G、ブクリョウ末2.69G、ジオウ末2.69G、センキョ	錠剤	錠	(株)イチゲン
						太補	タイホ	日の丸漢方(株)	十全大補湯	オウギ9MG、カンゾウ7MG、ケイヒ8MG、ジオウ10MG、シヤクヤク8MG、センキョウ8MG、トウキ10MG、ニンジン10MG	散剤	散	日邦薬品工業(株)
						東洋の十全大補湯エキス顆粒	トウヨウノジュウゼンタイホトウエキスカリユウ	東洋漢方製薬(株)	十全大補湯	水製乾燥エキス3.12G(ニンジン1.5G・オウギ1.5G・ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G)	散剤	顆粒	
						ヒロレス 十全大補湯錠	ヒロレスジュウゼンタイホトウジョウ	ジェービーエス製薬株式会社	十全大補湯	十全大補湯エキス(12顆)	錠剤	錠	小林製薬株式会社
						補全-S	ホゼン-S	明治薬品(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス1000MG(ニンジン1.5G・オウギ1.5G・ソウジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G)	液剤	シロップ	
						ホノミジュンケツ錠	ホノミジュンケツジョウ	荆盛堂薬品(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス2.1G(オウギ1.5G・カンゾウ0.75G・ケイヒ1.5G・ジオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・センキョウ1.5G)	錠剤	錠	
						ホノミジュンケツ粒	ホノミジュンケツツブ	荆盛堂薬品(株)	十全大補湯	十全大補湯エキス(12顆)2.1G(オウギ1.5G・カンゾウ0.75G・ケイヒ1.5G・ジオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・センキョウ1.5G)	散剤	顆粒	
						養力丸	ヨウリクワン	北薬品工業(株)	十全大補湯	十全大補湯水製エキス1.65G(ニンジン1.5G・オウギ1.5G・ビヤクジュツ1.5G・トウキ1.5G・ブクリョウ1.5G・ジオウ1.5G・センキョウ1.5G)	散剤	錠	その他
						麗雲(エキス顆粒)	リウエンエキスカリユウ	(株)建林松鶴堂	十全大補湯	十全大補湯エキス(12顆)1.5G(ビヤクジュツ1.5G・ブクリョウ1.5G・トウキ1.5G・シヤクヤク1.5G・ジオウ1.5G・センキョウ1.5G)	散剤	顆粒	
						JPS漢方顆粒-24号	JPSカンボウカリユウ-24ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(45顆)3.44G(サイコ5.6G・ハンガ4G・ショウキョウ0.8G・オウゴン2.4G・タイソウ2.4G・ニンジン2.4G)	散剤	錠	
						JPS小柴胡湯エキス錠N	JPSショウサイコトウエキシジョウN	ジェービーエス製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯乾燥エキス2.15G(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・ニンジン1.5G・タイソウ1.5G)	錠剤	錠	
						ウチダの小柴胡湯	ウチダノショウサイコトウ	(株)ウチダ和漢薬	小柴胡湯	サイコ7G、ハンガ5G、ショウキョウ16G、オウゴン3G、タイソウ3G、ニンジン3G、カンゾウ2G	散剤	散	その他
						ウチダの小柴胡湯エキス散U	ウチダノショウサイコトウエキシサンU	小柴胡湯	小柴胡湯エキス2.75G(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1.5G)	散剤	細粒		
						ウチダの小柴胡湯	ウチダノショウサイコトウ	(株)ウチダ和漢薬	小柴胡湯	小柴胡湯エキス2.75G(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1.5G)	散剤	細粒	
						オースギ カンボール	オースギカンボール	大杉製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス4G(サイコ(柴胡)7G・ハンガ(半夏)5G・ショウキョウ(生姜)1G・オウゴン(黄芩)3G・タイソウ(芍薬)3G)	散剤	顆粒	
						小柴胡湯	ショウサイコトウ	東洋漢方製薬(株)	小柴胡湯	東洋漢方製薬(株)小柴胡湯エキス(12顆)2.000MG(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・タイソウ1.5G)	散剤	散	その他
						小柴胡湯Aエキス細粒三和生薬	ショウサイコトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(45顆)3.7G(サイコ4.8G・ハンガ4G・オウゴン・タイソウ・ニンジン2.4G・カンゾウ1.6G・ショウキョウ)	散剤	細粒	
						小柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ショウサイコトウAエキスサイリュウサンフショウヤク	三和生薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(45顆)3.7G(サイコ4.8G・ハンガ4G・オウゴン・タイソウ・ニンジン2.4G・カンゾウ1.6G・ショウキョウ)	散剤	細粒	
						小柴胡湯エキス顆粒KM	ショウサイコトウエキスカリユウKM	北日本製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス3.3G(サイコ7G・ハンガ5G・オウゴン3G・タイソウ3G・ニンジン3G・カンゾウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	一元製薬(株)
						小柴胡湯エキス顆粒SA	ショウサイコトウエキスカリユウSA	東洋漢方製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(35顆)2.07G(サイコ4.2G・ハンガ3G・ショウキョウ0.6G・オウゴン1.8G・タイソウ1.8G・ニンジン1.8G)	散剤	顆粒	湧永製薬(株)
						小柴胡湯エキス顆粒クラシエ	ショウサイコトウエキスカリユウクラシエ	クラシエ製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(12顆)2700MG(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・ニンジン1.5G・タイソウ1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
						小柴胡湯エキス(細粒)29	ショウサイコトウエキスサイリュウ29	松浦薬業株式会社	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(12顆)4G(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・ニンジン1.5G)	散剤	細粒	一心堂漢方(株)
						小柴胡湯エキス散(勝島)	ショウサイコトウエキスサンソウショウ	(株)東洋薬行	小柴胡湯	小柴胡湯水製エキス(「漢方処方応用の実際」)3G(サイコ6G・ハンガ5G・オウゴン3G・タイソウ3G・ニンジン3G・カンゾウ2G)	散剤	散	
						小柴胡湯エキス錠(大峰)	ショウサイコトウエキシジョウオオミネ	大峰堂薬品工業(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(12顆)2000MG(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・タイソウ1.5G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
						小柴胡湯エキス錠クラシエ	ショウサイコトウエキシジョウクラシエ	クラシエ製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(12顆)2700MG(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・タイソウ1.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
						小柴胡湯「タキザワ」	ショウサイコトウタキザワ	(株)タキザワ漢方廠	小柴胡湯	サイコ8G、オウゴン3G、ニンジン3G、シヤクヤク1G、ハンガ8G、タイソウ3G、カンゾウ3G	散剤	散	その他
						製販HPには掲載あり。	小柴胡粒状	ショウサイコトウジョウ	長倉製薬(株)	サイコ1.5G、オウゴン0.6G、ハンガ0.6G、チクセツニンジン0.6G、カンゾウ0.3G、ショウキョウ0.3G、タイソウ0.6G	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
						小柴胡粒状(分包)	ショウサイコトウジョウウブンボウ	長倉製薬(株)	小柴胡湯	オウゴン0.6G、カンゾウ0.3G、サイコ1.5G、ショウキョウ0.3G、タイソウ0.6G、チクセツニンジン0.6G、ハンガ0.6G	散剤	錠	(株)イチゲン
						錠剤小柴胡湯	ジュウザイショウサイコトウ	一元製薬(株)	小柴胡湯	ショウキョウ末3.3G、オウゴン末2.5G、カンゾウ末1.7G、サイコ末5.8G、ハンガ末4.2G、タイソウ末2.5G、ニンジン末2.5G	錠剤	錠	
						ショウサイニン「コタロー」	ショウサイニンコタロー	小太郎漢方製薬(株)	小柴胡湯	小柴胡湯エキス散(12顆)3.25G(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・タイソウ1.5G)	錠剤	錠	
						ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒	ツムラカンボウショウサイコトウエキスカリユウ	(株)ツムラ	小柴胡湯	小柴胡湯エキス(12顆)2.25G(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・オウゴン1.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1.5G)	散剤	顆粒	
						英寿	テンジュウ	日の丸漢方(株)	小柴胡湯	オウゴン10MG、カンゾウ7MG、サイコ23MG、ショウキョウ13MG、タイソウ10MG、デンブシ10MG、ニンジン10MG、ハンガ17MG	散剤	顆粒	
						東洋の小柴胡湯エキス顆粒S	トウヨウノショウサイコトウエキスカリユウS	東洋漢方製薬(株)	小柴胡湯	水製乾燥エキス2.2G(サイコ3.5G・ハンガ2.5G・オウゴン1.5G・ニンジン1.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ1G・ショウキョウ)	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
						トチモトの小柴胡湯	トチモトノショウサイコトウ	(株)栃本天海堂	小柴胡湯	オウゴン3G、カンゾウ2G、サイコ7G、ハンガ5G、オウゴン3G、タイソウ3G、ニンジン3G、ハンガ5G	散剤	散	その他
						ニタンダ小柴胡湯エキス顆粒	ニタンダショウサイコトウエキスカリユウ	二反田薬品工業(株)	小柴胡湯	小柴胡湯乾燥エキス4G(サイコ(柴胡)7G・ハンガ(半夏)5G・オウゴン(黄芩)3G・ニンジン(人參)3G・タイソウ(芍薬)3G)	散剤	錠	
						宝生(エキス顆粒)	ホウショウエキスカリユウ	(株)建林松鶴堂	小柴胡湯	水製エキス(乾燥エキス)1.2G(サイコ2G・ハンガ2G・ショウキョウ2G・オウゴン1.5G・タイソウ1G・ニンジン1G・カンゾウ1G)	散剤	錠	
						ホノミチキョウ錠	ホノミチキョウジョウ	荆盛堂薬品(株)	小柴胡湯	小柴胡湯水製エキス1.8G(オウゴン1.5G・カンゾウ1G・サイコ3.5G・ショウキョウ0.5G・タイソウ1.5G)	錠剤	錠	
						マルホの小柴胡湯	マルホノショウサイコトウ	堀江生薬(株)	小柴胡湯	サイコ7G、ハンガ5G、ショウキョウ16G、オウゴン3G、タイソウ3G、ニンジン3G、カンゾウ2G	散剤	散	
						力湧仙	リキユウセン	(株)和漢薬研究所	小柴胡湯	小柴胡湯水製エキス2.7G(サイコ6G・ハンガ5G・ショウキョウ1G・オウゴン3G・タイソウ3G・ニンジン3G・カンゾウ2G)	散剤	顆粒	カボニー産業(株)
						DHC漢方 小青竜湯エキス錠	DHCカンボウショウセイリウトウエキシジョウ	(株)ディーエイチシー	小青竜湯	小青竜湯エキス(12顆)1950mg(マオウ・シヤクヤク・カンキョウ・カンゾウ・ケイヒ・サイシン・ゴミシ各1.5g、ハンガ3g)	錠剤	錠	
						JPS漢方顆粒-25号	JPSカンボウカリユウ-25ゴウ	ジェービーエス製薬(株)	小青竜湯	小青竜湯エキス(45顆)	散剤	顆粒	
						JPS小青竜湯エキス錠N	JPSショウサイリュウトウエキシジョウN	ジェービーエス製薬(株)	小青竜湯	小青竜湯乾燥エキス2.5G(マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン1.5G)	錠剤	錠	
						ウチダの小青竜湯	ウチダノショウセイリウトウ	(株)ウチダ和漢薬	小青竜湯	マオウ、シヤクヤク、ショウキョウ、カンゾウ、ケイヒ etc.	散剤	散	その他
						ウチダの小青竜湯エキス散	ウチダノショウセイリウトウエキシサン	(株)ウチダ和漢薬	小青竜湯	小青竜湯エキス2.58G(マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン1.5G)	散剤	錠	
						オオクサ小青竜湯エキス錠	オオクサショウセイリウトウエキシジョウ	大草薬品(株)	小青竜湯	小青竜湯エキス(23顆)2783MG(マオウ(麻黄)2G・シヤクヤク(芍薬)2G・ショウキョウ(生姜)2G・カンゾウ(甘草)2G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
						大峰小青竜湯錠II	オオミネショウセイリウトウジョウII	大峰堂薬品工業(株)	小青竜湯	小青竜湯エキス(12顆)1950MG(マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン)	錠剤	錠	
						2017年閉店	紀伊国屋小青竜湯	キノクニショウセイリウトウ	(株)紀伊国屋漢薬局	カンゾウ2G、ケイヒ2G、ゴミシ3G、サイシン2G、シヤクヤク2G、ショウキョウ2G、ハンガ3G、マオウ2G	散剤	錠	

J	A	P	I	C	P	M	D	A	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○					○					薬日本堂小青龍湯エキス錠	クスリニホンドウショウセイリョウトウエキスジヨウ	大草薬品 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (23顆) 2783MG (マオウ2G・シヤクヤク2G・ショウキョウ2G・カンゾウ2G・ケイヒ2G・サイシン2G・ゴ	錠剤		薬日本堂 (株)
					○					「クラシエ」漢方小青竜湯エキスE X錠	クラシエカンボウショウセイリョウトウエキスE Xジヨウ	クラシエ製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (23顆) 3.467mg (マオウ・シヤクヤク・カンキョウ・カンゾウ・ケイヒ・サイシン・ゴミシ各2.0g, ハング4.0	錠剤		クラシエ薬品 (株)
○	○				○					「クラシエ」漢方小青竜湯エキス顆粒SII	クラシエカンボウショウセイリョウトウエキスカリユウSII	クラシエ製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス粉末3900MG (マオウ2.25G・シヤクヤク2.25G・カンキョウ2.25G・カンゾウ2.25G・ケイヒ2.25G・サイシ	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○				○					「クラシエ」漢方小青竜湯エキス錠	クラシエカンボウショウセイリョウトウエキスジヨウ	クラシエ製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (12顆) 2600MG (マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシ	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○				○					「クラシエ」ベルエムビS小青竜湯エキス錠	クラシエベルエムビSショウセイリョウトウエキスジヨウ	クラシエ製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (12顆) 2600MG (マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシ	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○				○					阪本漢法の小青竜湯エキス顆粒	サカモトカンボウノショウセイリョウトウエキスカリユウ	(株) 阪本漢法製薬	小青竜湯	小青竜湯乾燥エキス4.22G (マオウ3G・シヤクヤク3G・カンキョウ3G・カンゾウ3G・ケイヒ3G・サイシン3G・ゴミシ3G	散剤	顆粒	日本元製薬 (株)
○	○				○					錠剤小青竜湯	ジョウザイショウセイリョウトウ	一元製薬 (株)	小青竜湯	シヤクヤク末2.5G, カンゾウ末2.5G, ケイヒ末2.5G, マオウ末2.5G, ハング末5G, ゴミシ末2.5G, サイシン末2.5G, カン	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○				×				×	製販HPには掲載あり。	ショウセイリョウ錠	辰倉製薬 (株)	小青竜湯	ケイヒ0.3G, カンゾウ0.3G, ゴミシ0.5G, マオウ0.6G, シヤクヤク0.6G, サイシン0.6G, ハング0.6G, ショウキョウ0.2G, 水製乾燥	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○				○					小青竜湯Aエキス細粒三和生薬	ショウセイリョウトウAエキスサイリユウサンショウヤク	三和生薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (710顆) 4G (マオウ2.1G・シヤクヤク2.1G・カンキョウ2.1G・カンゾウ2.1G・ケイヒ2.1G・サイシン2.1G	散剤	細粒	
○	○				○					小青竜湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ショウセイリョウトウAエキスサイリユウブンボウサンショウヤク	三和生薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (710顆) 4G (マオウ2.1G・シヤクヤク2.1G・カンキョウ2.1G・カンゾウ2.1G・ケイヒ2.1G・サイシン2.1G	散剤	細粒	
○	○				○					小青竜湯エキス [顆粒] A	ショウセイリョウトウエキスカリユウA	御所薬舗 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (12顆) 2250MG (ハング3G・マオウ1.5G・カンゾウ1.5G・ゴミシ1.5G・サイシン1.5G・シヤクヤク1.5G	散剤	顆粒	
○	○				○					小青竜湯エキス顆粒Aクラシエ	ショウセイリョウトウエキスカリユウAクラシエ	クラシエ製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス5200MG (マオウ3G・シヤクヤク3G・カンキョウ3G・カンゾウ3G・ケイヒ3G・サイシン3G・ゴミシ3G・	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○				○					小青竜湯エキス顆粒KM	ショウセイリョウトウエキスカリユウKM	北日本製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス3.6G (ハング6G・カンゾウ3G・ケイヒ3G・ゴミシ3G・サイシン3G・シヤクヤク3G・ショウキョウ3G・マ	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○				○					小青竜湯エキス顆粒S A	ショウセイリョウトウエキスカリユウS A	帝國漢方製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (23顆) 2.81G (マオウ2G・シヤクヤク2G・カンキョウ2G・カンゾウ2G・ケイヒ2G・サイシン2G・ゴミシ	散剤	顆粒	湧永製薬 (株)
○	○				○					小青竜湯エキス顆粒Sクラシエ	ショウセイリョウトウエキスカリユウSクラシエ	クラシエ製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (34顆) 3.900mg (マオウ・シヤクヤク・カンキョウ・カンゾウ・ケイヒ・サイシン・ゴミシ各2.25g, ハング4	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○				○					小青竜湯エキス顆粒クラシエ	ショウセイリョウトウエキスカリユウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス (12顆) 2600MG (マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシ	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○				○					小青竜湯エキス顆粒「創生聖」	ショウセイリョウトウエキスカリユウソウジセイ	北日本製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯エキス6G (マオウ3G・シヤクヤク3G・ショウキョウ3G・カンゾウ3G・ケイヒ3G・サイシン3G・ゴミシ3G・ハ	散剤	顆粒	
○	○				○					小青竜湯エキス顆粒「トール」	ショウセイリョウトウエキスカリユウトール	北日本製薬 (株)	小青竜湯	小青竜湯水製乾燥エキス3G (マオウ (麻黄) 1.5G・ショウキョウ (生薬) 1.5G・ケイヒ (桂皮) 1.5G・ゴミシ (五味子) 1.5	散剤	顆粒	
○	○				○					小青竜湯エキス (細粒) 28	ショウセイリョウトウエキスサイリユウ28	松浦薬業株式会社	小青竜湯	小青竜湯エキス (12顆) 5.5G (乾燥物換算約22G) (マオウ1.5G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・サイシン1.5G・カンキョ	散剤	細粒	イスクラ産業株式会社
○	○				○					小青竜湯エキス細粒G「コタロー」	ショウセイリョウトウエキスサイリユウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	小青竜湯	水製エキス4G (マオウ2.4G・シヤクヤク2.4G・カンキョウ2.4G・カンゾウ2.4G・ケイヒ2.4G・サイシン2.4G・ゴミシ2.4G	散剤	細粒	
○	○				○					小青龍湯エキス細粒 (勝昌) 分包	ショウセイリョウトウエキスサイリユウショウショウブンボウ	(株) 東洋薬行	小青竜湯	小青龍湯水製エキスE (「漢方診療の実際」) 3G (マオウ3G・シヤクヤク3G・カンキョウ3G・カンゾウ3G・ケイヒ3G・サイ	散剤	細粒	
○	○				○					小青龍湯エキス散 (勝昌)	ショウセイリョウトウエキスサンショウショウ	(株) 東洋薬行	小青竜湯	小青龍湯水製エキス3G (マオウ3G・シヤクヤク3G・カンキョウ3G・カンゾウ3G・ケイヒ3G・サイシン3G・ゴミシ3G・	散剤	散	
○	○				○					小青龍湯エキス錠N「コタロー」	ショウセイリョウトウエキスジヨウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス散 (12顆) 2.5G (マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン1	錠剤	錠	
○	○				○					小青龍湯エキス錠 (大峰)	ショウセイリョウトウエキスジヨウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 2500MG (ハング3G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・ゴミシ1.5G・サイシン1.5G・シヤクヤク1.5G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○				○					小青龍湯「タキザワ」	ショウセイリョウトウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	小青竜湯	マオウ3G, カンゾウ3G, ゴミシ3G, シヤクヤク3G, ケイヒ3G, ハング6G, ショウキョウ3G, サイシン3G	その他	煎剤	
○	○				○					小青龍湯分包エキス顆粒 (大峰)	ショウセイリョウトウブンボウエキスカリユウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 2500MG (ハング3G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・ゴミシ1.5G・サイシン1.5G・シヤクヤク1.5G	散剤	顆粒	
○	○				×				×	製販HPには掲載あり。	ショウセイリョウウジョウ	辰倉製薬 (株)	小青竜湯	マオウ0.6G, ショウキョウ0.3G, ケイヒ0.3G, ゴミシ0.9G, シヤクヤク0.6G, カンゾウ0.3G, サイシン0.6G, ハング0.9G	錠剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○				○					ショウセリンN「コタロー」	ショウセリンNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス散 (12顆) 2.5G (マオウ1.5G・カンゾウ1.5G・ゴミシ1.5G・シヤクヤク1.5G・ケイヒ1.5G・ハング3G・カ	錠剤	錠	
○	○				○					新・ルート小青龍湯錠II	シン・ロートショウセイリョウトウジョウII	ルート製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 1950MG (マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン	錠剤	錠	
○	○				○					神農小青龍湯エキス錠	シンノウジョウセイリョウトウエキスジヨウ	ジェビーエス製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 2.5G (マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン1	錠剤	錠	
○	○				○					角野雲湯	スミノリョウウントウ	(有) 角野製薬所	小青竜湯	半夏3G, 麻黄2G, 芍薬2G, 甘草2G, 桂皮2G, 細辛2G, 乾姜2G, 五味子3G	その他	煎剤	
○	○				○					ツムラ漢方小青龍湯エキス顆粒	ツムラ	(株) ツムラ	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 2.5G (ハング3G・カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・ゴミシ1.5G・サイシン1.5G・シ	散剤	顆粒	
○	○				○					ツムラ漢方内服液小青龍湯S	ツムラカンボウナイフクエキショウセイリョウトウS	新生薬品工業株式会社	小青竜湯	小青龍湯エキス81ML (ハング6G・カンキョウ3G・カンゾウ3G・ケイヒ3G・ゴミシ3G・サイシン3G・シヤクヤク3G・マ	液剤	液	株式会社ツムラ
○	○				○					東洋漢方の小青龍湯	トウヨウカンボウノショウセイリョウトウ	東洋漢方製薬 (株)	小青竜湯	マオウ2G, シヤクヤク2G, ショウキョウ2G, カンゾウ2G, ケイヒ2G, サイシン2G, ゴミシ3G, ハング3G	その他	煎剤	
○	○				○					東洋の小青龍湯エキス顆粒S	トウヨウノショウセイリョウトウエキスカリユウS	東洋漢方製薬 (株)	小青竜湯	水製乾燥エキス2.25G (シヤクヤク1.5G・カンゾウ1.5G・マオウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン1.5G・ゴミシ1.5G・ショウキ	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○				○					東洋の小青龍湯エキス顆粒S分包	トウヨウノショウセイリョウトウエキスカリユウSブンボウ	東洋漢方製薬 (株)	小青竜湯	水製乾燥エキス2.25G (シヤクヤク1.5G・カンゾウ1.5G・マオウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン1.5G・ゴミシ1.5G・ショウキ	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○				○					トチモトの小青龍湯	トチモトノショウセイリョウトウ	(株) 新本天海堂	小青竜湯	カンゾウ2G, ケイヒ2G, ゴミシ3G, サイシン2G, シヤクヤク2G, ショウキョウ2G, ハング3G, マオウ2G	煎剤	顆粒	
○	○				○					ニタンダ小青龍湯エキス顆粒	ニタンダショウセイリョウトウエキスカリユウ	二反田薬品工業 (株)	小青竜湯	小青龍湯乾燥エキス4.2G (マオウ (麻黄) 3G・シヤクヤク (芍薬) 3G・カンキョウ (乾姜) 3G・カンゾウ (甘草) 3G・ケイ	散剤	顆粒	
○	○				○					ホノミチンガイン錠	ホノミチンガインジヨウ	形態堂薬品 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 1.8G (カンキョウ1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・ゴミシ1.5G・サイシン1.5G・シヤクヤク1.5G	錠剤	錠	
○	○				○					ホリエ小青龍湯	ホリエショウセイリョウトウ	堀江生薬 (株)	小青竜湯	マオウ2G, シヤクヤク2G, ショウキョウ2G, カンゾウ2G, ケイヒ2G, サイシン2G, ゴミシ3G, ハング3G	煎剤	顆粒	
○	○				○					本草小青龍湯エキス顆粒-H	ホンゾウショウセイリョウトウエキスカリユウ-H	本草製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (23顆) 3G (ハング4G・マオウ2G・シヤクヤク2G・カンゾウ2G・ケイヒ2G・サイシン2G・ゴミシ2G・	散剤	顆粒	
○	○				○					本草小青龍湯エキス錠-H	ホンゾウショウセイリョウトウエキスジヨウ-H	本草製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 2.25G (ハング3G・マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・カンゾウ1.5G・ケイヒ1.5G・サイシン1.5G・	錠剤	錠	
○	○				○					モリゼンチトウ	モリゼンチトウ	大杉製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス4.1G (マオウ (麻黄) 3G・シヤクヤク (芍薬) 3G・カンキョウ (乾姜) 3G・カンゾウ (甘草) 3G・ケイヒ	散剤	顆粒	
○	○				○					山本漢方小青龍湯エキス顆粒	ヤマモトカンボウショウセイリョウトウエキスカリユウ	山本漢方製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス (12顆) 3G (ハング3G・マオウ1.5G・シヤクヤク1.5G・サイシン1.5G・ゴミシ1.5G・ケイヒ1.5G・カン	散剤	顆粒	
○	○				○					ルート小青龍湯錠II	ロートショウセイリョウトウジョウII	ルート製薬 (株)	小青竜湯	小青龍湯エキス(12顆)1950mg (マオウ・シヤクヤク・カンキョウ・カンゾウ・ケイヒ・サイシン・ゴミシ各1.5g, ハング3g)	錠剤	錠	
○	○				○					呂仁「分包」	ロジブンボウ	漢方製剤 (小青竜湯)	小青竜湯		散剤		
○	○				○					ウチダの辛夷清肺湯	ウチダノシンセイハイトウ	(株) ウチダ和漢薬	辛夷清肺湯	シンイ, ビョウヨウ, チモ, ビヤクゴウ, オウゴン etc.	その他	煎剤	
○	○				○					ウチダの辛夷清肺湯エキス散	ウチダノシンセイハイトウエキスサン	(株) ウチダ和漢薬	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス3.2G (セッコウ2.5G・バクモンドウ2.5G・オウゴン1.5G・サンシシ1.5G・チモ1.5G・ショウマ0.5G・ビ	散剤	細粒	
○	○				○					辛夷清肺湯	シンセイハイトウ	東洋漢方製薬 (株)	辛夷清肺湯	チモ3G, オウゴン3G, サンシシ3G, バクモンドウ5G, セッコウ5G, ショウマ1G, シン42G, ビョウヨウ2G, ビヤクゴウ3G	その他	煎剤	
○	○				○					辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」	シンセイハイトウエキスカリユウクラシエ	大峰堂薬品工業 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス2500MG (チモ1.5G・オウゴン1.5G・シンイ1.5G・ビヤクゴウ1.5G・サンシシ0.75G・ショウマ0.75G・	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○				○					辛夷清肺湯エキス細粒G「コタロー」	シンセイハイトウエキスサイリユウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯水製エキス6G (シンイ1.6G・オウゴン2.4G・セッコウ4G・チモ2.4G・サンシシ2.4G・ショウマ0.8G・ビヤク	散剤	細粒	
○	○				○					辛夷清肺湯エキス錠 (チオセルエース)	シンセイハイトウエキスジヨウチオセルエース	原沢製薬工業 (株)	辛夷清肺湯	乾燥エキス3G (辛夷 (シンイ) 2G・山椒子 (サンシシ) 3G・枇杷葉 (ビョウヨウ) 2G・麦門冬 (バクモンドウ) 5G・百合 (錠剤		(株) ニッド
○	○				○					辛夷清肺湯「タキザワ」	シンセイハイトウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	辛夷清肺湯	シンイ3G, バクモンドウ6G, チモ3G, セッコウ6G, ビヤクゴウ3G, ショウマ1.5G, オウゴン3G, ビョウヨウ1G, サンシシ	その他	煎剤	
○	○				○					チオセルエース錠	チオセルエースジヨウ	原沢製薬工業 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯乾燥エキス	錠剤	錠	
○	○				○					チクナイン	チクナイン	小林製薬 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス粉末2.5G (シンイ1.5G・チモ1.5G・ビヤクゴウ1.5G・オウゴン1.5G・サンシシ0.75G・バクモンドウ3G・	その他	顆粒	
○	○				○					チクナインa	チクナインa	小林製薬 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス	その他	顆粒	
○	○				○					チクナインb	チクナインb	小林製薬 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス	錠剤	錠	
○	○				○					チクナイン錠	チクナインジヨウ	小林製薬 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス粉末2.5G (シンイ1.5G・チモ1.5G・ビヤクゴウ1.5G・オウゴン1.5G・サンシシ0.75G・バクモンドウ3G・	錠剤	錠	
○	○				×					デルマンエビス	デルマンエビス	(有) 本町薬品	辛夷清肺湯	水製乾燥エキス粉末5.9G (バクモンドウ5G・セッコウ5G・ユリネ3G・チモ3G・オウゴン3G・サンシシ3G・シンイ2G・ビョウヨウ2G)	錠剤	錠	

J	JA	P	M	D	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○				東洋の辛夷清肺湯エキス顆粒	トウヨウノシナイセイハイトウエキスカリユウ	東洋漢方製薬 (株)	辛夷清肺湯	水製乾燥エキス3.44G (シナイ2G・チモ3G・ビャクゴウ3G・オウゴン3G・サンシシ3G・バクモンドウ5G・セッコウ5G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○				東洋の辛夷清肺湯エキス顆粒 (分包)	トウヨウノシナイセイハイトウエキスカリユウブンボウ	東洋漢方製薬 (株)	辛夷清肺湯	水製乾燥エキス3.44G (シナイ2G・チモ3G・ビャクゴウ3G・オウゴン3G・サンシシ3G・バクモンドウ5G・セッコウ5G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○				ノーザVN「コタロー」	ノーザVNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	辛夷清肺湯	エキス散3.24g (シナイ・ビウヨウ各1g、チモ・ビャクゴウ・オウゴン・サンシシ各1.5g、バクモンドウ・セッコウ各2.5g、シ)	錠剤	錠	
○	○	○				ノーザV「コタロー」	ノーザVコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	辛夷清肺湯	水製エキス2.7G (シナイ1G・ビウヨウ1G・チモ1.5G・ビャクゴウ1.5G・オウゴン1.5G・サンシシ1.5G・バクモンドウ2.5G)	錠剤	錠	
○	○	×				ノズラン錠	ノズランジュウ	中村薬品工業 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯乾燥エキス (50%量) 2500MG (シナイ1G、チモ1.5G、ビャクゴウ1.5G、オウゴン1.5G、サンシシ1.5G、バクモンドウ2.5G、	錠剤	錠	セッコウ2.5G、
○	○	○				ノンバースD (錠剤辛夷清肺湯)	ノンバースDジュウザイシナイセイハイトウ	一元製薬 (株)	辛夷清肺湯	オウゴン末2.5G、サンシシ末2.5G、シナイ末1.7G、チモ末2.5G、ビャクゴウ末2.5G、バクモンドウ末4.1G、セッコウ末4.1G)	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○				ハイビナール	ハイビナール	大杉製薬 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス6.3G (シナイ (辛夷) 2G・チモ (知母) 3G・ビャクゴウ (百合) 3G・オウゴン (黄蘗) 3G・サンシシ	散剤	顆粒	
○	○	○				フジビートルS錠	フジビートルSジュウ	中村薬品工業株式会社	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯乾燥エキス (50%量) 2500mgシナイ1.0g、チモ1.5g、ビャクゴウ1.5g、オウゴン1.5g、サンシシ1.5g、バク	錠剤	錠	湧水製薬株式会社
○	○	○				ピノン	ピノン	松本製薬工業 (株)	辛夷清肺湯	辛夷清肺湯エキス2.6g (シナイ・ビウヨウ各1.0196g、チモ・ビャクゴウ・オウゴン・サンシシ各1.5294g、バクモンドウ・セツ	錠剤	錠	大木製薬 (株)
○	○	○				清心蓮子飲	セイシンレンシヤン	東洋漢方製薬 (株)	清心蓮子飲	レンニク4G、バクモンドウ4G、ブクリョウ4G、ニンジン3G、ジャゼンシ3G、オウゴン3G、オウキ2G、ジコッピ2G、カソ	その他	煎剤	
○	○	○				清心蓮子飲エキス顆粒H	セイシンレンシヤンエキスカリユウH	アスゲン製薬株式会社	清心蓮子飲	清心蓮子飲エキス4.5G (レンニク3.5G・オウゴン2.1G・バクモンドウ2.1G・オウギ2.8G・ブクリョウ2.8G・ジコッピ2.1G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業株式会社
○	○	○				清心蓮子飲エキス細粒G「コタロー」	セイシンレンシヤンエキスサイリユウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	清心蓮子飲	水製エキス4.16G (レンニク3.2G・バクモンドウ3.2G・ブクリョウ3.2G・ニンジン2.4G・ジャゼンシ2.4G・オウゴン2.4G)	散剤	細粒	
○	○	○				清造 (エキス顆粒)	セイショウエキスカリユウ	(株) 建林松鶴堂	清心蓮子飲	水製エキス (乾燥エキス) 1.6G (レンニク2G・バクモンドウ2G・ブクリョウ2G・ニンジン1.5G・ジャゼンシ1.5G・オウゴン	散剤	顆粒	
○	○	×				ユリナール	ユリナール	(株) バナゲイア製薬	清心蓮子飲	清心蓮子飲乾燥エキス-A.406G (レンニク3.5G・ブクリョウ2.8G・ジャゼンシ2.1G・オウギ2.8G・カンゾウ0.7G・バクモンドウ2.1G・ニンジン3.5G・オウゴン2.1G・ジコッピ2.1G)	散剤	錠	
○	○	○				ユリナールa	ユリナールa	小林製薬 (株)	清心蓮子飲	清心蓮子飲エキス	散剤	錠	
○	○	○				ユリナールb	ユリナールb	小林製薬 (株)	清心蓮子飲	清心蓮子飲エキス	錠剤	錠	
○	○	×				ユリナール」	ユリナール」	(株) バナゲイア製薬	清心蓮子飲	清心蓮子飲乾燥エキス E X2238M G (レンニク3.5G・ブクリョウ2.8G・ジャゼンシ2.1G・オウギ2.8G・カンゾウ0.7G・バクモンドウ2.1G・ニンジン3.5G・オウゴン2.1G・ジコッピ2.1G)	錠剤	錠	
○	○	○				リクトール顆粒	リクトールカリユウ	OJAS PHARMA (株)	清心蓮子飲	清心蓮子飲エキス粉末	散剤	顆粒	
○	○	○				JPS漢方顆粒-72号	JPSカンボウカウ-72ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯乾燥エキス4.8G (トウキ1.6G・ジオウ1.6G・ソウジュツ1.6G・センキュウ1.6G・トウニン1.6G・ブクリョウ1.6G)	散剤	顆粒	
○	○	○				JPS疎経活血湯エキス錠N	JPSソケイカクツツウエキスジュウN	ジェービーエス製薬 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯乾燥エキス3G (トウキ1G・ジオウ1G・ソウジュツ1G・センキュウ1G・トウニン1G・ブクリョウ1G・シヤクヤク	錠剤	錠	
○	○	○				ウチダの疎経活血湯	ウチダノソケイカクツツウ	(株) ウチダ和漢薬	疎経活血湯	トウキ2G、ジオウ2G、ソウジュツ2G、センキュウ2G、トウニン2G、ブクリョウ2G、シヤクヤク2.5G、ゴシツ1.5G、イレ	その他	煎剤	
○	○	○				ウチダの疎経活血湯エキス散	ウチダノソケイカクツツウエキスカン	(株) ウチダ和漢薬	疎経活血湯	疎経活血湯エキス4.03G (シヤクヤク1.25G・ジオウ1G・センキュウ1G・トウキ1G・ソウジュツ1G・トウニン1G・ブクリョウ	散剤	顆粒	
○	○	○				ウチダの疎経活血湯 (分包)	ウチダノソフウテイソツウブンボウ	(株) ウチダ和漢薬	疎経活血湯	疎経活血湯エキス4.03G (シヤクヤク1.25G・ジオウ1G・センキュウ1G・トウキ1G・ソウジュツ1G・トウニン1G・ブクリョウ	散剤	錠	
○	○	×				健美丸	ケンミガン	北宝製薬 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯水製エキス3.23G (トウキ2G・センキュウ2G・ソウジュツ2G・ブクリョウ2G・ジオウ2G・トウニン2G・キョウカ1.5G・ボウ	錠剤	錠	イレイセ1.5G・リュウタン1.5G・イレイセ1.5G・ボウ
○	○	○				救痛楽丸	ソウツウクラクガン	松浦薬業株式会社	疎経活血湯	疎経活血湯エキス2500MG (トウキ1000MG・ジオウ1000MG・ソウジュツ1000MG・センキュウ1000MG・トウニン1000M	錠剤	丸	イスクラ産業株式会社
○	○	○				角野の疎経活血湯	スミノソケイカクツツウ	(有) 角野製薬所	疎経活血湯	トウキ2G、ジオウ2G、センキュウ2G、ブクリョウ2G、トウニン2G、シヤクヤク2.5G、ゴシツ1.5G、ボウ	その他	煎剤	
○	○	○				疎経活血湯エキス顆粒OM	ソケイカクツツウエキスカリユウOM	大峰堂薬品工業 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯エキス3500MG (トウキ1G・ジオウ1G・センキュウ1G・ビャクジュツ1G・ブクリョウ1G・トウニン1G・シヤク	散剤	顆粒	
○	○	○				疎経活血湯エキス顆粒「クラシエ」	ソケイカクツツウエキスカリユウクラシエ	大峰堂薬品工業 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯エキス粉末3000MG (トウキ1G・ジオウ1G・センキュウ1G・ビャクジュツ1G・ブクリョウ1G・トウニン1G・シ	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				疎経活血湯エキス顆粒「東洋」分包	ソケイカクツツウエキスカリユウトウヨウブンボウ	(株) 東洋薬行	疎経活血湯	疎経活血湯水製エキス4G (トウキ2G・ジオウ2G・センキュウ2G・ソウジュツ2G・ブクリョウ2G・トウニン2G・シヤクヤク	散剤	顆粒	
○	○	○				疎経活血湯エキス細粒G「コタロー」	ソケイカクツツウエキサイリユウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	疎経活血湯	水製エキス3.6G (トウキ1G・ジオウ1G・ソウジュツ1G・センキュウ1G・トウニン1G・ブクリョウ1G・シヤクヤク1.25G)	散剤	細粒	
○	○	○				疎経活血湯エキス細粒 (勝昌)	ソケイカクツツウエキサイリユウショウショウ	(株) 東洋薬行	疎経活血湯	疎経活血湯水製エキス4G (トウキ2G・ジオウ2G・ソウジュツ2G・センキュウ2G・トウニン2G・ブクリョウ2G・シヤクヤク	散剤	細粒	
○	○	○				疎経活血湯エキス錠クラシエ	ソケイカクツツウエキスジュウクラシエ	大峰堂薬品工業 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯エキス粉末3000MG (ジオウ1G・トウキ1G・トウニン1G・センキュウ1G・ブクリョウ1G・ビャクジュツ1G・シ	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				疎経活血湯「タキザワ」	ソケイカクツツウタキザワ	(株) タキザワ薬廠	疎経活血湯	トウキ2G、ブクリョウ2G、ボウ1.5G、ショウキョウ0.5G、ジオウ2G、シヤクヤク2.5G、キョウカ1.5G、チンピ1.5G、	その他	煎剤	
○	○	○				ソケイカクツツウタキザワ	ソケイカクツツウタキザワ	小太郎漢方製薬 (株)	疎経活血湯	水製エキス3.6G (トウキ1G・ジオウ1G・ソウジュツ1G・センキュウ1G・トウニン1G・ブクリョウ1G・シヤクヤク1.25G)	錠剤	錠	
○	○	○				ソケイカクツツウタキザワ	ソケイカクツツウタキザワ	松浦薬業株式会社	疎経活血湯	疎経活血湯エキス2500MG (トウキ (当帰) 1000MG・ジオウ (地黄) 1000MG・ソウジュツ (番白) 1000MG・センキュウ	錠剤	錠	くすりの厚生会
○	○	○				痛経丸	ツウラクガン	東洋漢方製薬 (株)	疎経活血湯	トウキ2G、ジオウ2G、ソウジュツ2G、センキュウ2G、トウニン2G、ブクリョウ2G、シヤクヤク2.5G、ゴシツ1.5G、イレ	その他	煎剤	日邦薬品工業株式会社
○	○	○				東洋の疎経活血湯	トウヨウノソケイカクツツウ	東洋漢方製薬 (株)	疎経活血湯	疎経活血丸剤エキス末3.5G (トウキ2G・ジオウ2G・センキュウ2G・ソウジュツ2G・ブクリョウ2G・カンゾウ1G・トウニ	錠剤	丸	
○	○	×				風濕筋舒丸	フウシツジュンシュウ	ハッ目製薬 (株)	疎経活血湯	疎経活血丸剤エキス末3.5G (トウキ2G・ジオウ2G・センキュウ2G・ソウジュツ2G・ブクリョウ2G・カンゾウ1G・トウニ	錠剤	錠	
○	○	○				ホリエ龍門湯	ホリエリュウエントウ	堀江生薬 (株)	疎経活血湯	トウキ2G、ジオウ2G、センキュウ2G、ソウジュツ2G、ブクリョウ2G、トウニン2G、シヤクヤク2.5G、ゴシツ1.5G、ボウ	煎剤	錠	越島漢方薬局
○	○	○				ムツリキ	ムツリキ	刑盛堂薬品 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯水製エキス1.8G (イレイセ0.75G・カンゾウ0.5G・キョウカ0.75G・ゴシツ0.75G・ジオウ1G・シヤクヤク1.2	錠剤	錠	
○	○	○				モリハイツワン	モリハイツワン	大杉製薬 (株)	疎経活血湯	疎経活血湯エキス5.6G (トウキ (当帰) 2G・ジオウ (地黄) 2G・ビャクジュツ (白朮) 2G・センキュウ (川芎) 2G・ト	錠剤	顆粒	
○	○	○				JPS大黄甘草湯 (錠剤)	JPSダイオウカンゾウトウジョウザイ	ジェービーエス製薬 (株)	大黄甘草湯	ダイオウ末、カンゾウ末	錠剤	錠	
○	○	○				ウチダの大甘丸	ウチダノダイカンガン	(株) ウチダ和漢薬	大黄甘草湯	生薬末2.941G (ダイオウ末10G・カンゾウ末5G)	錠剤	丸	
○	○	○				カヨイツウ	カヨイツウ	北日本製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス1000MG (ダイオウ4000MG・カンゾウ1000MG)	錠剤	錠	
○	○	○				漢方便秘薬「創至聖」	カンボウベンビヤクコツブソウシセイ	北日本製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (12錠) 500MG (大薬2・甘草0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○				漢方便秘薬「創至聖」	カンボウベンビヤクコツブソウシセイ	北日本製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (12錠) 500MG (大薬2000MG・甘草500MG)	錠剤	錠	
○	○	○				漢方便秘薬「東亜」	カンボウベンビヤクトウア	北日本製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (12錠) 500MG (ダイオウ (大黄) 2000MG・カンゾウ (甘草) 500MG)	錠剤	錠	
○	○	×			2017年閉店	紀伊国屋大甘丸湯錠	キノクニヤダイオウカンゾウトウジョウ	(株) 紀伊国屋漢薬局	大黄甘草湯	カンゾウ末1G、ダイオウ末2G	錠剤	錠	
○	○	×			2017年閉店	紀伊国屋大甘丸	キノクニヤダイカンガン	(株) 紀伊国屋漢薬局	大黄甘草湯	カンゾウ末1G、ダイオウ末2G	錠剤	錠	
○	○	○				皇漢堂漢方便秘薬	コウカンドウカンボウベンビヤク	皇漢堂製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (「漢方珍療医典」(南山堂)、25錠) 400MG (ダイオウ1600MG・カンゾウ400MG)	錠剤	錠	
○	○	○				阪本漢法の漢方便秘薬	サカモトカンボウノカンボウベンビヤク	(株) 阪本漢法製薬	大黄甘草湯	ダイオウ末1000MG、カンゾウ末2500MG	錠剤	錠	
○	○	○				スーリル漢方便秘薬	スーリルカンボウベンビヤク	中村薬品工業株式会社	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (920錠) 450MG (ダイオウ1800MG・カンゾウ450MG)	錠剤	錠	
○	○	×				杉原の大甘丸	スギハラノダイカンガン	(有) 杉原達二商店	大黄甘草湯	カソツウ1G、ダイオウ2G	錠剤	錠	
○	○	○				大黄甘草湯Aエキス細粒三和生薬	ダイオウカンゾウトウAエキスサイリユウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (12錠) 0.8G (ダイオウ2G・カンゾウ0.5G)	散剤	細粒	
○	○	○				大黄甘草湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ダイオウカンゾウトウAエキスサイリユウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (12錠) 0.8G (ダイオウ2G・カンゾウ0.5G)	散剤	細粒	
○	○	○				大黄甘草湯エキス細粒G「コタロー」	ダイオウカンゾウトウAエキスサイリユウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (45錠) 1.2G (ダイオウ3.2G・カンゾウ1.6G)	散剤	細粒	
○	○	○				大黄甘草湯エキス錠	ダイオウカンゾウトウエキスジュウ	北日本製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス1G (ダイオウ4G・カンゾウ1G)	錠剤	錠	
○	○	○				大黄甘草湯「タキザワ」	ダイオウカンゾウトウタキザワ	(株) タキザワ薬廠	大黄甘草湯	ダイオウ4G、カンゾウ1G	その他	煎剤	
○	○	○				ダイカーン	ダイカーン	大杉製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス0.8G (ダイオウ (大黄) 4G・カンゾウ (甘草) 1G)	散剤	錠	
○	○	○				大正漢方便秘薬	タイショウカンボウベンビヤク	大正製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス末 (25錠) 400MG (ダイオウ1600MG・カンゾウ400MG)	錠剤	錠	
○	○	○				タケダ漢方便秘薬	タケダカンボウベンビヤク	武田コンシューマーヘルスケア (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス散 (企画要略、26.7%量) 800MG (ダイオウ1067MG・カンゾウ267MG)	錠剤	錠	
○	○	○				ツムラ漢方大甘丸甘草湯エキス顆粒	ツムラカンボウダイオウカンゾウトウエキスカリユウ	(株) ツムラ	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (12錠) 0.75G (ダイオウ2G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	

J	A	P	I	C	P	M	D	A	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○								東亜漢方便秘薬	トウアカンボウベンピヤク	北日本製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯水製乾燥エキス500MG (ダイオウ2G・カンゾウ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								東亜漢方便秘薬小粒	トウアカンボウベンピヤク小粒	北日本製薬 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯乾燥エキス(12顆)	錠剤	錠	
○	○	×							確認薬商品例	花扇大甘丸	ハナオウギダイカンガン	小西製薬 (株)	大黄甘草湯	ダイオウ1G、カンゾウ0.5G	錠剤	錠	
○	○	×								ハミノン漢方便秘薬	ハミノンカンボウベンピヤク	福井薬品工業 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス末 (25顆) 400MG (ダイオウ (大黄) 1600MG・カンゾウ (甘草) 400MG)	錠剤	錠	
○	○	○								ラフェルサ漢方便秘薬	ラフェルサカンボウベンピヤク	中村薬品工業 (株)	大黄甘草湯	大黄甘草湯エキス (920顆) 450MG (ダイオウ1800MG・カンゾウ450MG)	錠剤	錠	グレートアンドグランド (株)
○	○	○								JPS漢方顆粒-31号	JPSカンボウカリュウ-31ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (45顆) 3.6G (サイコ4.8G・ハンガ3.2G・ショウキョウ0.8G・ダイオウ0.8G・オウゴン2.4G・キジツヤク2.4G)	散剤	顆粒	
○	○	○								JPS大柴胡湯エキス錠N	JPSダイサイコトウエキス錠N	ジェービーエス製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯乾燥エキス2.25G (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ0.5G・ダイオウ0.5G・オウゴン1.5G・キジツヤク1.5G)	散剤	錠	
○	○	○								ウチダの大柴胡湯	ウチダノダイサイトウ	(株)ウチダ和漢薬	大柴胡湯	サイコ6G、ハンガ4G、ショウキョウ1.3G、オウゴン3G、シヤクヤク3G、タイソウ3G、キジツ2G、ダイオウ1G	その他	煎剤	
○	○	○								ウチダの大柴胡湯エキス散U	ウチダノダイサイトウエキス散U	(株)ウチダ和漢薬	大柴胡湯	大柴胡湯エキス2.91G (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G・タイソウ1.5G・キジツヤク1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○								ウチダの大少陽	ウチダノダイショウヨウ	(株)ウチダ和漢薬	大柴胡湯	大柴胡湯エキス2.91G (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G・タイソウ1.5G・キジツヤク1.5G)	散剤	細粒	
○	○	×							製販HPには掲載あり。	回腸 (エキス顆粒)	カイヨウエキスカリュウ	(株)建林松鶴堂	大柴胡湯	水製エキス (乾燥エキス) 1.8G (サイコ3G・ハンガ1.5G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G・タイソウ1.5G・キジツ1G・ダイオウ0.5G・ショウキョウ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								「クラシエ」漢方大柴胡湯エキス錠	クラシエカンボウダイサイトウエキス錠	クラシエ製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆) 2,700mg (サイコ3g・ハンガ2.0g, ショウキョウ・ダイオウ各0.5g, オウゴン・シヤクヤク・タイソウ各0.5g)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								ココアボG錠	ココアボG錠	クラシエ製薬株式会社	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆) 2700MG (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ0.5G・ダイオウ0.5G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								錠剤大柴胡湯	ジョウザイダイサイトウ	一元製薬 (株)	大柴胡湯	ショウキョウ末1G、オウゴン末2.5G、シヤクヤク末4.5G、ダイオウ末1G、サイコ末4.5G、ハンガ末3.5G、タイソウ末3G、キジツ末3G、ダイオウ1G	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○								大柴胡湯	ダイサイトウ	東洋漢方製薬 (株)	大柴胡湯	サイコ6G、ハンガ4G、ショウキョウ1.5G、オウゴン3G、シヤクヤク3G、タイソウ3G、キジツ2G、ダイオウ1G	その他	煎剤	
○	○	○								大柴胡湯Aエキス細粒三和生薬	ダイサイトウAエキスサイリュウサンショウヤク	三和生薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (710顆) 4G (サイコ3.42G・ハンガ2.8G・オウゴン2.1G・シヤクヤク2.1G・タイソウ2.1G・キジツ1.4G)	散剤	細粒	
○	○	○								大柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ダイサイトウAエキスサイリュウサンショウヤク	三和生薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (710顆) 4G (サイコ4.2G・ハンガ2.8G・オウゴン2.1G・シヤクヤク2.1G・タイソウ2.1G・キジツ1.4G)	散剤	細粒	
○	○	○								大柴胡湯エキス顆粒KM	ダイサイトウエキスカリュウKM	北日本製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス3.5G (サイコ6G・ハンガ4G・オウゴン3G・シヤクヤク3G・タイソウ3G・キジツ2G・ダイオウ2G・ショウキョウ0.5G)	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○								大柴胡湯エキス顆粒クラシエ	ダイサイトウエキスカリュウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆) 2700MG (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ0.5G・ダイオウ0.5G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G)	散剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								大柴胡湯エキス (細粒) 40	ダイサイトウエキスサイリュウ40	松浦薬業株式会社	大柴胡湯	大柴胡湯水製エキス3.7G (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ0.5G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G・タイソウ1.5G・キジツヤク1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○								大柴胡湯エキス散 (勝昌)	ダイサイトウエキスサンショウ	(株)東洋薬行	大柴胡湯	大柴胡湯水製エキス3G (サイコ6G・ハンガ3G・ショウキョウ1G・オウゴン3G・シヤクヤク3G・タイソウ3G・キジツ2G)	散剤	散	
○	○	○								大柴胡湯エキス錠OM	ダイサイトウエキス錠OM	大峰堂薬品工業 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆)	錠剤	フィルムコーティング錠	
○	○	○								大柴胡湯「タキザワ」	ダイサイトウタキザワ	(株)タキザワ漢方	大柴胡湯	サイコ8G、ショウキョウ1.5G、シヤクヤク3G、キジツ3G、ハンガ8G、オウゴン3G、タイソウ3G、ダイオウ2G	その他	煎剤	
○	○	×							製販HPには掲載あり。	大柴胡錠状	ダイサイリウジョウ	大柴胡湯	大柴胡湯	サイコ1.5G、オウゴン0.6G、ハンガ0.6G、シヤクヤク0.6G、キジツ0.4G、ダイオウ0.5G、ショウキョウ0.3G、タイソウ0.3G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	×								大柴胡錠状 (分包)	ダイサイリウジョウ	大柴胡湯	大柴胡湯	サイコ1.5G、オウゴン0.6G、ハンガ0.6G、シヤクヤク0.6G、キジツ0.4G、ダイオウ0.5G、ショウキョウ0.3G、タイソウ0.3G	錠剤	錠	
○	○	○								ダイサイN「コタロー」	ダイサイNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス散 (12顆) 2.64G (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ1G・キジツ1G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								ダイサイN「コタロー」 (大柴胡湯エキス錠)	ダイサイNコタロー (大柴胡湯エキス錠)	小太郎漢方製薬 (株)	大柴胡湯	水製エキス2.2g (サイコ3g、ハンガ2g、オウゴン・シヤクヤク・タイソウ各1.5g、ショウキョウ・キジツ各1g、ダイオウ0.5g)	錠剤	錠	
○	○	○								ツムラ漢方大柴胡湯エキス顆粒	ツムラカンボウダイサイトウエキスカリュウ	(株)ツムラ	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆) 2.25G (サイコ3G・ハンガ2G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G・タイソウ1.5G・キジツ1G・ショウキョウ0.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○								トチモトの大柴胡湯	トチモトノダイサイトウ	(株)栃本天海堂	大柴胡湯	サイコ6G、ハンガ4G、オウゴン3G、シヤクヤク3G、タイソウ3G、キジツ2G、ショウキョウ2G、ダイオウ1G	その他	煎剤	
○	○	×								ビスラット ゴールドa	ビスラット ゴールドa	小林製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯乾燥エキス2.25G (サイコ3G・ハンガ2G・ショウキョウ0.5G・シヤクヤク1.5G・キジツ1G・ダイオウ0.5G・オウゴン1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								ビスラット ゴールドb	ビスラット ゴールドb	小林製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆) 2G (サイコ3G・ショウキョウ0.5G・シヤクヤク1.5G・キジツ1G・ハンガ2G・オウゴン1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								ビスラット ゴールドEX	ビスラット ゴールドEX	小林製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (35顆)	錠剤	錠	
○	○	×								ピタトレール 大柴胡湯エキス錠	ピタトレールダイサイトウエキス錠	本草製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆) 1.7G (サイコ3G・ハンガ2G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G・タイソウ1.5G・キジツ1G・ダイオウ1G・ショウキョウ0.75G)	錠剤	錠	
○	○	×								平安	ヘイアン	日丸製薬 (株)	大柴胡湯	オウゴン10MG、キジツ7MG、サイコ21MG、シヤクヤク10MG、ショウキョウ12MG、ダイオウ7MG、タイソウ13MG、デンプン5MG、ハンガ15MG	錠剤	錠	
○	○	○								ホノミジックヨウ錠	ホノミジックヨウ	刑盛堂薬品 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯水製エキス1.46G (オウゴン1.5G・キジツ1G・サイコ3G・シヤクヤク1.5G・ショウキョウ0.5G・オウゴン0.5G)	錠剤	錠	
○	○	×								ホリエの大柴胡湯	ホリエノダイサイトウ	福江生薬 (株)	大柴胡湯	サイコ6G、ハンガ4G、オウゴン3G、シヤクヤク3G、タイソウ3G、キジツ2G、ショウキョウ2G、ダイオウ1G	錠剤	錠	
○	○	○								本草大柴胡湯エキス錠-H	ホンゾウダイサイトウエキス錠H	本草製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス (12顆) 1.7G (サイコ3G・ハンガ2G・オウゴン1.5G・シヤクヤク1.5G・タイソウ1.5G・キジツ1G・ダイオウ1G)	錠剤	錠	
○	○	○								モリカンボールン	モリカンボールン	大杉製薬 (株)	大柴胡湯	大柴胡湯エキス3.9G (サイコ (柴胡) 6G・ハンガ (半夏) 4G・ショウキョウ (生姜) 1G・オウゴン (黄芩) 3G・シヤクヤク (芍薬) 3G)	散剤	顆粒	
○	○	○								JPS漢方顆粒-63号	JPSカンボウカリュウ-63ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	約藤散	約藤散エキス (45顆) 4G (チョウトウコウ2.4G・チンピ2.4G・ハンガ2.4G・バクモンドウ2.4G・ブクリョウ2.4G・ニンジン2.4G)	散剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								JPS約藤散エキス錠N	JPSチョウトウサンリョウエキス錠N	ジェービーエス製薬 (株)	約藤散	約藤散乾燥エキス2.5G (チョウトウコウ1.5G・チンピ1.5G・ハンガ1.5G・バクモンドウ1.5G・ブクリョウ1.5G・ニンジン1.5G)	散剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								一元錠約藤散	イチゲンジョウザイチョウトウサン	一元製薬 (株)	約藤散	水製エキス1200MG (チョウトウコウ2000MG・クカカ2000MG・ハンガ2000MG・バクモンドウ2000MG・ブクリョウ2000MG)	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○								ウチダの双約噴気	ウチダノソウコウジュンキ	約藤散	約藤散	約藤散エキス3.22G (チョウトウコウ1.5G・キッピ1.5G・ハンガ1.5G・バクモンドウ1.5G・ブクリョウ1.5G・ニンジン1G)	その他	煎剤	
○	○	○								ウチダの約藤散	ウチダノチョウトウサン	(株)ウチダ和漢薬	約藤散	ハンガ、バクモンドウ、ブクリョウ、ニンジン、ハマボウワウ etc.	その他	煎剤	
○	○	○								ウチダの約藤散エキス散	ウチダノチョウトウサンリョウエキス散	約藤散	約藤散	約藤散エキス3.222G (チョウトウコウ1.5G・キッピ1.5G・ハンガ1.5G・バクモンドウ1.5G・ブクリョウ1.5G・ニンジン1G)	散剤	細粒	
○	○	○								クラシエ約藤散エキス錠	クラシエチョウトウサンリョウエキス錠	クラシエ製薬 (株)	約藤散	約藤散エキス (12顆) 1800MG (チョウトウコウ1.5G・チンピ1.5G・バクモンドウ1.5G・ハンガ1.5G・ブクリョウ1.5G・バクモンドウ1.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	×								健風丸	ケンフウガン	北宝薬品 (株)	約藤散	約藤散乾燥エキス2.16G (チョウトウコウ1.8G・キッピ1.8G・ハンガ1.8G・バクモンドウ1.8G・ブクリョウ1.8G・ニンジン1.2G・ボウフウ1.2G・クカカ1.2G・カンゾウ0.6G・ショウキョウ0.6G)	錠剤	錠	
○	○	×							製販HPには掲載あり。	真仙 (エキス顆粒)	シンセンエキスカリュウ	(株)建林松鶴堂	約藤散	約藤散エキス (12顆) 2G (チョウトウコウ1.5G・チンピ1.5G・ハンガ1.5G・バクモンドウ1.5G・ニンジン1G・カンゾウ0.5G・セッコウ2.5G・クカカ1.2G)	錠剤	錠	
○	○	○								ズッキノン	ズッキノン	小林製薬 (株)	約藤散	約藤散エキス (12顆) 2.5G (チョウトウコウ1.5G・チンピ1.5G・ハンガ1.5G・バクモンドウ1.5G・ブクリョウ1.5G・ニンジン1G)	その他	顆粒	
○	○	○								ストレージタイプZK	ストレージタイプZK	(株)ツムラ	約藤散	約藤散エキス (12顆) 2.25G (乾燥エキスとして) (セッコウ2.5G・チョウトウコウ1.5G・チンピ1.5G・バクモンドウ1.5G)	散剤	顆粒	武田コンシューマーヘルスケア (株)
○	○	○								約藤散エキス (細粒) 43	チョウトウサンエキスサイリュウ43	松浦薬業株式会社	約藤散	約藤散水製エキス4.6G (チョウトウコウ1.5G・チンピ1.5G・ハンガ1.5G・バクモンドウ1.5G・ブクリョウ1.5G・ニンジン1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○								約藤散エキス細粒G「コタロー」	チョウトウサンエキスサイリュウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	約藤散	水製エキス4.48G (チョウトウコウ2.4G・チンピ2.4G・ハンガ2.4G・バクモンドウ2.4G・ブクリョウ2.4G・ニンジン1.6G)	散剤	錠	
○	○	○								約藤散エキス細粒 (東洋)	チョウトウサンエキスサイリュウトウヨウ	(株)東洋薬行	約藤散	約藤散水製エキス (「漢方診療医典」) 4G (チョウトウコウ3G・キッピ3G・ハンガ3G・バクモンドウ3G・ブクリョウ3G)	散剤	錠	
○	○	○								約藤散「タキザワ」	チョウトウサンタキザワ	(株)タキザワ漢方	約藤散	チョウトウコウ3G、バクモンドウ3G、ボウフウ2G、ショウキョウ1G、キッピ3G、ブクリョウ3G、クカカ2G、セッコウ5G	その他	煎剤	
○	○	○								約藤散A	チョウトウサンリョウA	大杉製薬 (株)	約藤散	約藤散エキス4.6G (チョウトウコウ (約藤散) 3G・キッピ (橘皮) 3G・ハンガ (半夏) 3G・バクモンドウ (麦芽) 3G)	散剤	顆粒	
○	○	○								約藤散料エキス顆粒KM	チョウトウサンリョウエキスカリュウKM	北日本製薬 (株)	約藤散	約藤散料水製乾燥エキス4.5G (セッコウ5G・キッピ3G・チョウトウコウ3G・バクモンドウ3G・ハンガ3G・ブクリョウ3G)	散剤	錠	一元製薬 (株)
○	○	○								約藤散料エキス顆粒クラシエ	チョウトウサンリョウエキスカリュウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	約藤散	約藤散料エキス (12顆) 1800MG (チョウトウコウ1.5G・チンピ1.5G・バクモンドウ1.5G・ハンガ1.5G・ブクリョウ1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								チョウトーン「コタロー」	チョウトーンコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	約藤散	水製エキス3.5G (チンピ1.5G・ハンガ1.5G・バクモンドウ1.5G・ブクリョウ1.5G・ニンジン1G・ボウフウ1G・カンゾウ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								ツムラ漢方約藤散エキス顆粒	ツムラカンボウチョウトウサンエキスカリュウ	(株)ツムラ	約藤散	約藤散エキス (12顆) 2.25G (セッコウ2.5G・チンピ1.5G・バクモンドウ1.5G・ハンガ1.5G・ブクリョウ1.5G・チョウトウ1.5G)	散剤	錠	
○	○	○								東洋漢方の約藤散	トウヨウカンボウチョウトウサン	東洋漢方製薬 (株)	約藤散	カンゾウ1G、クカカ2G、キッピ3G、ショウキョウ1G、セッコウ5G、チョウトウコウ3G、ニンジン2G、バクモンドウ3G、	その他	煎剤	
○	○	○								トチモトの約藤散	トチモトノチョウトウサン	(株)栃本天海堂	約藤散	カンゾウ1G、ショウキョウ1G、セッコウ5G、チンピ3G、ニンジン2G、バクモンドウ3G、ハンガ3G、ブクリョウ3G、ボウフウ3G)	その他	煎剤	
○	○	×								ホリエの約藤散料	ホリエノチョウトウサンリョウ	福江生薬 (株)	約藤散	チョウトウコウ3G、キッピ3G、ハンガ3G、バクモンドウ3G、ブクリョウ3G、クカカ2G、ニンジン2G、ボウフウ2G、セッコウ5G、	煎剤	顆粒	
○	○	○								JPS漢方顆粒-32号	JPSカンボウカリュウ-32ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	播磨湯	播磨湯乾燥エキス2.08G (チョレ1.24			

J	A	P	I	C	P	M	D	A	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○								ウチダの猪苓湯エキス散	ウチダノショレイトウエキサン	(株)ウチダ和漢薬	猪苓湯	猪苓湯エキス4.08G、水製乾燥エキス1.08G (ショレイ3G・ブクリョウ3G・カッセキ3G・タクシャ3G)、アキョウ3G	錠剤	顆粒	
○	○	○								「クラシエ」漢方猪苓湯エキス顆粒	クラシエカンボウショレイトウエキスカリユウ	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	猪苓湯エキス粉末1250MG (ショレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・タクシャ1.5G・アキョウ1.5G・カッセキ1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								「クラシエ」漢方猪苓湯エキス錠	クラシエカンボウショレイトウエキスジョウ	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	猪苓湯エキス粉末1250MG (ショレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・タクシャ1.5G・アキョウ1.5G・カッセキ1.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								錠剤猪苓湯	ジョウザイショレイトウ	一元製薬 (株)	猪苓湯	タクシャ末5G、ブクリョウ末5G、ショレイ末5G、カッセキ末5G、アキョウ末5G	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○								神農猪苓湯エキス錠	シンノウショレイトウエキスジョウ	(株)タキザワ漢方	猪苓湯	猪苓湯乾燥エキス1.56G (ショレイ1.8G・ブクリョウ1.8G・カッセキ1.8G・タクシャ1.8G・アキョウ1.8G)	錠剤	錠	
○	○	○								猪苓湯	ショレイトウ	東洋漢方製薬 (株)	猪苓湯	ショレイ3G、ブクリョウ3G、タクシャ3G、セラチン3G、カッセキ3G	その他	煎剤	
○	○	○								猪苓湯Aエキス細粒三和生薬	ショレイトウAエキサイリウサンワシヨウヤク	三和生薬 (株)	猪苓湯	猪苓湯A水製エキス3.7g (ショレイ3g・ブクリョウ3g・カッセキ3g・タクシャ3g・セラチン3g)	散剤	細粒	
○	○	○								猪苓湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ショレイトウAエキサイリウサンワシヨウヤク	三和生薬 (株)	猪苓湯	猪苓湯A水製エキス3.7G (ショレイ3G・ブクリョウ3G・カッセキ3G・タクシャ3G・セラチン3G)	散剤	細粒	清永製薬 (株)
○	○	○								猪苓湯エキス顆粒KM	ショレイトウエキスカリユウKM	北日本製薬 (株)	猪苓湯	猪苓湯水製乾燥エキス3.75G (アキョウ3G・カッセキ3G・タクシャ3G・ショレイ3G・ブクリョウ3G)	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○								猪苓湯エキス (細粒) 42	ショレイトウエキサイリウ42	松浦薬業株式会社	猪苓湯	猪苓湯水製エキス0.8G (ショレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・カッセキ1.5G・タクシャ1.5G)、セラチン1.5G	散剤	細粒	全業工業株式会社
○	○	○								猪苓湯エキス散 (勝品)	ショレイトウエキサンショウショウ	(株)東洋漢行	猪苓湯	猪苓湯水製エキス (「漢方珍療医典」) 4G (ショレイ3G・ブクリョウ3G・タクシャ3G・カッセキ3G)	散剤	散	
○	○	○								猪苓湯エキス錠V「コタロー」	ショレイトウエキスジョウVコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	猪苓湯	水製エキス2.133g (ショレイ・タクシャ・カッセキ・ブクリョウ・セラチン各2g)	錠剤	錠	
○	○	○								猪苓湯エキス錠 (大樽)	ショレイトウエキスジョウオオミネ	大樽堂薬品工業 (株)	猪苓湯	猪苓湯エキス粉末2420MG (ショレイ3G・ブクリョウ3G・カッセキ3G・タクシャ3G・アキョウ3G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○								猪苓湯「タキザワ」	ショレイトウタキザワ	(株)タキザワ漢方	猪苓湯	ショレイ3G、タクシャ3G、ブクリョウ3G、アキョウ3G、カッセキ3G	その他	煎剤	
○	○	×							製販HPには掲載あり。	猪苓湯粒状	ショレイトウリュウジョウ	長倉製薬 (株)	猪苓湯	ショレイ1G、ブクリョウ1G、タクシャ1G、セラチン1G、カッセキ0.5G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○								ショレイN「コタロー」	ショレイNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	猪苓湯	エキス散2.2G (ショレイ2G・ブクリョウ2G・カッセキ2G・タクシャ2G・セラチン2G)	錠剤	錠	
○	○	○								ショレイN「コタロー」 (猪苓湯エキス錠)	ショレイNコタローショレイトウエキスジョウ	小太郎漢方製薬 (株)	猪苓湯	水製エキス2.133g (ショレイ・ブクリョウ・タクシャ・セラチン・カッセキ各2g)	錠剤	錠	
○	○	○								ツムラ漢方猪苓湯エキス顆粒A	ツムラカンボウショレイトウエキスカリユウA	(株)ツムラ	猪苓湯	乾燥エキス1.25G (タクシャ1.5G・ショレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・アキョウ1.5G・カッセキ1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○								ホノミボウネツ錠	ホノミボウネツジョウ	刑盛堂薬品 (株)	猪苓湯	猪苓湯水製エキス1.6G (セラチン1.5G・タクシャ1.5G・ショレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・カッセキ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								ホノミボウネツ散	ホノミボウネツツブ	刑盛堂薬品 (株)	猪苓湯	猪苓湯水製エキス1.25G (セラチン1.5G・タクシャ1.5G・ショレイ1.5G・ブクリョウ1.5G・カッセキ1.5G)	錠剤	顆粒	
○	○	○								ホノミボウネツ湯	ホノミボウネツトウ	堀江生薬 (株)	猪苓湯	ショレイ3G、ブクリョウ3G、タクシャ3G、アキョウ3G、カッセキ3G	煎剤	煎剤	
○	○	○								JPS漢方顆粒-33号	JPSカンボウカリユウ-33ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	猪苓湯	猪苓湯水製エキス1.92G (トウニン4G・ケイヒ3.2G・ダイオウ2.4G・カンゾウ1.2G・硫酸ナトリウム1.6G)	散剤	顆粒	
○	○	○								JPS桃核承気湯エキス錠N	JPSトウカジョウキトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	猪苓湯	桃核承気湯乾燥エキス1.92G (トウニン4G・ケイヒ3.2G・ダイオウ2.4G・カンゾウ1.2G・硫酸ナトリウム1.6G)	錠剤	錠	
○	○	○								大樽堂エキス錠桃核承気湯	オオミネエキスジョウトウカジョウキトウ	大樽堂薬品工業 (株)	猪苓湯	桃核承気湯エキス900MG (トウニン2.5G・ケイヒ2G・ダイオウ1.5G・乾燥硫酸ナトリウム0.5G・カンゾウ0.75G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○								「クラシエ」漢方桃核承気湯エキス顆粒	クラシエカンボウトウカジョウキトウエキスカリユウ	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	桃核承気湯エキス粉末1250MG (トウニン2.5G・ケイヒ2G・ダイオウ1.5G・カンゾウ0.75G・乾燥硫酸ナトリウム0.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								「クラシエ」漢方桃核承気湯エキス顆粒S	クラシエカンボウトウカジョウキトウエキスカリユウS	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	桃核承気湯エキス粉末1875MG (トウニン3.75G・ケイヒ3G・ダイオウ2.25G・カンゾウ1.125G・乾燥硫酸ナトリウム0.75G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								更腸 (エキス顆粒)	コウシエキスカリユウ	(株)建林松鶴堂	猪苓湯	水製エキス (乾燥エキス) 0.9G (トウニン2.5G・ケイヒ2G・ダイオウ1.5G・硫酸ナトリウム0.5G・カンゾウ0.75G)	散剤	顆粒	
○	○	○								錠剤桃核承気湯	ジョウザイトウカジョウキトウ	一元製薬 (株)	猪苓湯	ケイヒ2末5G、硫酸ナトリウム2G、ダイオウ末0.8G、カンゾウ末1.2G、トウニン末2.5G、水製エキス1G (トウニン2.7G・)	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○								神農桃核承気湯エキス錠	シンノウトウカジョウキトウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	猪苓湯	桃核承気湯乾燥エキス1.8G (トウニン3.75G・ケイヒ3G・ダイオウ2.25G・硫酸ナトリウム1.5G・カンゾウ1.125G)	錠剤	錠	
○	○	○								ソウケイ散	ソウケイサン	刑盛堂薬品 (株)	猪苓湯	桃核承気湯エキス1.1G (カンゾウ0.75G・ケイヒ2G・ダイオウ1.5G・トウニン2.5G・硫酸ナトリウム1G)	散剤	細粒	
○	○	○								ツムラ漢方桃核承気湯エキス顆粒	ツムラカンボウトウカジョウキトウエキスカリユウ	(株)ツムラ	猪苓湯	乾燥エキス1.5G (トウニン2.5G・ケイヒ2G・ダイオウ1.5G・カンゾウ0.75G・乾燥ポウショウ0.45G)	散剤	顆粒	
○	○	○								桃核承気丸	トウカジョウキガン	(株)ウチダ和漢薬	猪苓湯	ケイヒ末4G、ダイオウ末2G、硫酸ナトリウム3G、カンゾウ末1.5G、トウニン5G	錠剤	丸	
○	○	○								桃核承気丸	トウカジョウキガン	(有)杉原達二商店	猪苓湯	カンゾウ1G、ケイヒ1G、ダイオウ2G、トウニン2G、硫酸ナトリウム1.5G	錠剤	丸	
○	○	○								桃核承気湯	トウカジョウキトウ	東洋漢方製薬 (株)	猪苓湯	トウニン5G、ケイヒ4G、ダイオウ3G、硫酸ナトリウム2G、カンゾウ1.5G	その他	煎剤	
○	○	○								桃核承気湯Aエキス細粒三和生薬	トウカジョウキトウAエキサイリウサンワシヨウヤク	三和生薬 (株)	猪苓湯	桃核承気湯A水製エキス3G (トウニン5G・ケイヒ4G・乾燥硫酸ナトリウム1G・ダイオウ3G・カンゾウ1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○								桃核承気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	トウカジョウキトウAエキサイリウサンワシヨウヤク	三和生薬 (株)	猪苓湯	桃核承気湯A水製エキス3G (トウニン5G・ケイヒ4G・乾燥硫酸ナトリウム1G・ダイオウ3G・カンゾウ1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○								桃核承気湯エキス (細粒) 47	トウカジョウキトウエキサイリウ47	松浦薬業株式会社	猪苓湯	桃核承気湯水製エキス2.15G (トウニン2.5G・ケイヒ2G・ダイオウ1.5G・カンゾウ0.75G)、硫酸ナトリウム1G	散剤	細粒	
○	○	○								桃核承気湯エキス細粒 (勝品)	トウカジョウキトウエキサイリウサンワシヨウヤク	(株)東洋漢行	猪苓湯	桃核承気湯水製エキス3G (トウニン5G・ケイヒ4G・ダイオウ3G・硫酸ナトリウム2G・カンゾウ1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○								桃核承気湯「タキザワ」	トウカジョウキトウタキザワ	(株)タキザワ漢方	猪苓湯	トウニン5G、乾燥硫酸ナトリウム1G、ケイヒ4G、カンゾウ1.5G、ダイオウ3G	その他	煎剤	
○	○	×							製販HPには掲載あり。	桃核承気湯粒状	トウカジョウキリュウジョウ	長倉製薬 (株)	猪苓湯	トウニン1.2G、ダイオウ1.7G、ケイヒ0.6G、硫酸マグネシウム0.6G、カンゾウ0.4G	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○								トーガックV「コタロー」 (桃核承気湯エキス錠)	トーガックVコタロートウカジョウキトウエキスジョウ	小太郎漢方製薬 (株)	猪苓湯	水製エキス1.8G (トウニン3.33G・ケイヒ2.67G・ダイオウ2G・カンゾウ1G・硫酸ナトリウム1.33G)	錠剤	錠	
○	○	○								トーション	トーション	大杉製薬 (株)	猪苓湯	桃核承気湯エキス2.4G (トウニン (桃仁) 5G・ケイヒ (桂皮) 4G・ポウショウ (芒硝) 0.5G・カンゾウ (甘草) 1.5G・ダイオウ (大黃) 1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○								ホノミツウケツ錠	ホノミツウケツトウ	刑盛堂薬品 (株)	猪苓湯	桃核承気湯水製エキス1.1G (カンゾウ0.75G・ケイヒ2G・ダイオウ1.5G・トウニン2.5G・硫酸ナトリウム1G)	錠剤	錠	
○	○	○								ホリエ桃核承気湯	ホリエトウカジョウキトウ	堀江生薬 (株)	猪苓湯	トウニン5G、ケイヒ4G、ダイオウ3G、カンゾウ1.5G、硫酸ナトリウム2G	煎剤	煎剤	
○	○	○								JPS漢方顆粒-35号	JPSカンボウカリユウ-35ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	猪苓湯	当帰芍薬散エキス (45錠) 3.68G (トウキ2.4G・センキュウ2.4G・シャクヤク3.2G・ブクリョウ3.2G・ソウジュツ3.2G・タキザワ)	散剤	顆粒	
○	○	○								JPS当帰芍薬散料エキス錠N	JPSトウキシャクヤクサンリョウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	猪苓湯	当帰芍薬散エキス (12錠) 2.3G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シャクヤク2G・ブクリョウ2G・ソウジュツ2G・タキザワ)	錠剤	錠	
○	○	○								アサヒ当帰芍薬散錠II	アサヒトウキシャクヤクサンリョウジョウII	中村薬品工業株式会社	猪苓湯	当帰芍薬散エキス (12錠) 2200mg (トウキ1、5g・センキュウ1、5g・シャクヤク3、0g・ブクリョウ2、0g・ビヤクジュツ2、0g・タキザワ)	錠剤	錠	アサヒカルピスウェルネス株式会社
○	○	○								ウチダの当帰芍薬散	ウチダノトウキシャクヤクサンリョウ	(株)ウチダ和漢薬	猪苓湯	トウキ3G、センキュウ3G、シャクヤク4G、ブクリョウ4G、ソウジュツ4G、タクシャ4G	その他	煎剤	
○	○	○								ウチダの当帰芍薬散料	ウチダノトウキシャクヤクサンリョウ	(株)ウチダ和漢薬	猪苓湯	当帰芍薬散エキス2.7G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シャクヤク2G・ブクリョウ2G・ソウジュツ2G・タクシャ2G)	散剤	細粒	
○	○	○								ウチダの当帰芍薬散料エキス散	ウチダノトウキシャクヤクサンリョウエキサン	(株)ウチダ和漢薬	猪苓湯	当帰芍薬散エキス2.7G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シャクヤク2G・ブクリョウ2G・ソウジュツ2G・タクシャ2G)	散剤	錠	
○	○	○								ウチダの帰徳安潤	ウチダノトクアジュン	(株)ウチダ和漢薬	猪苓湯	当帰芍薬散エキス (925錠) 1.6G (シャクヤク1.44G・センキュウ1.08G・タクシャ1.44G・トウキ1.08G・ビヤクジュツ1.44G)	錠剤	錠	
○	○	○								カイケツE錠	カイケツEジョウ	刑盛堂薬品 (株)	猪苓湯	当帰芍薬散エキス (925錠) 1.6G (シャクヤク1.44G・センキュウ1.08G・タクシャ1.44G・トウキ1.08G・ビヤクジュツ1.44G)	錠剤	錠	
○	○	○								かんばう咲々当帰芍薬散	カンバウショウショウトウキシャクヤクサン	松浦薬業株式会社	猪苓湯	トウキ (当帰) 0.614G、センキュウ (川芎) 0.614G、シャクヤク (芍薬) 0.818G、ブクリョウ (茯苓) 0.818G、ビヤクジュツ (白朮) 0.818G	散剤	散	
○	○	○								漢方濃縮煎剤当帰芍薬散23	カンボウノウシヤクセンザイトウキシャクヤクサン23	松浦薬業株式会社	猪苓湯	当帰芍薬散抽出物8.8G (トウキ2G・センキュウ2G・シャクヤク2.67G・ブクリョウ2.67G・ビヤクジュツ2.67G・タクシャ2.67G)	その他	エキス	
○	○	○								「クラシエ」漢方当帰芍薬散料エキス顆粒	クラシエカンボウトウキシャクヤクサンリョウエキスカリユウ	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	当帰芍薬散エキス(12錠)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								「クラシエ」漢方当帰芍薬散料エキス顆粒S	クラシエカンボウトウキシャクヤクサンリョウエキスカリユウS	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	当帰芍薬散エキス(34錠)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								クラシエ当帰芍薬散錠	クラシエトウキシャクヤクサンジョウ	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	トウキ末409MG、センキュウ末409MG、シャクヤク末546MG、ブクリョウ末546MG、ソウジュツ末546MG、タクシャ末546MG	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○								錠剤当帰散	ジョウザイトウシヤクサン	一元製薬 (株)	猪苓湯	トウキ末3.7G、センキュウ末3.7G、シャクヤク末4.9G、ブクリョウ末4.9G、ソウジュツ末4.9G、タクシャ末4.9G、水性エキス	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○								衝任補血エキス顆粒A	ショウニンホツケツエキスカリユウA	クラシエ製薬 (株)	猪苓湯	当帰芍薬散エキス	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)

J	JA	P	M	D	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○				神農当帰芍薬散料エキス錠	シソノウトウクシヤクヤクサンリョウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散乾燥エキス2.3G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク2G・ブクリョウ2G・ソウジュツ2G・タクシヤ2G)	錠剤	錠	
○	○	○				角野血の薬	スミノチノクスリ	(有) 角野製薬所	当帰芍薬散	トウキ3G、センキュウ3G、シヤクヤク4G、ブクリョウ4G、ビヤクジュツ4G、タクシヤ4G	錠剤	その他	
○	○	○				立花振薬	タチバナナリグスリ	(株) 田尻300年製薬	当帰芍薬散	トウキ (当帰) 3G、センキュウ (川キユウ) 3G、シヤクヤク (芍薬) 4G、ブクリョウ (茯苓) 4G、ビヤクジュツ (白朮) 4G	錠剤	その他	
○	○	○				ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒	ツムラカンボウトウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウ	(株) ツムラ	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (12重) 2G (シヤクヤク2G・ソウジュツ2G・タクシヤ2G・ブクリョウ2G・センキュウ1.5G・トウキ1.5G)	散剤	顆粒	
○		○				ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス錠A	ツムラカンボウトウクシヤクヤクサンリョウエキスジョウA	(株) ツムラ	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (12重) 2G (シヤクヤク2G・ソウジュツ2G・タクシヤ2G・ブクリョウ2G・センキュウ1.5G・トウキ1.5G)	錠剤		
○	○	○				てんぐ当帰芍薬散 (顆粒)	テングトウクシヤクヤクサンカリユウ	二反田薬品工業 (株)	当帰芍薬散	トウキ末0.614G、センキュウ末0.614G、シヤクヤク末0.818G、タクシヤ末0.818G、ブクリョウ末0.818G、ビヤクジュツ末0.818G	散剤	顆粒	
○	○	×				当帰芍薬丸	トウクシヤクヤクガン	(有) 杉原達二商店	当帰芍薬散	シヤクヤク3.9G、センキュウ1.8G、タクシヤ1.8G、トウキ0.7G、ビヤクジュツ0.9G、ブクリョウ0.9G	錠剤	丸	(株) 池田屋安兵衛商店
○	○	○				当帰芍薬散	トウクシヤクヤクサン	(株) 延寿堂	当帰芍薬散	トウキ末13G、センキュウ末13G、シヤクヤク末25G、ブクリョウ末18G、ソウジュツ末18G、タクシヤ末13G	散剤	散	
○	○	×				当帰芍薬散	トウクシヤクヤクサン	(有) 杉原達二商店	当帰芍薬散	シヤクヤク40G、センキュウ17.6G、タクシヤ17.6G、トウキ6.6G、ビヤクジュツ8.8G、ブクリョウ8.8G	散剤	散	
○	○	○				当帰芍薬散エキス錠N S A	トウクシヤクヤクサンエキスカリユウ S A	帝國漢方製薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散水製乾燥エキス (35重) 1.92G (トウキ1.8G・センキュウ1.8G・シヤクヤク2.4G・ブクリョウ2.4G・ビヤクジュツ)	散剤	顆粒	湧永製薬 (株)
○	○	○				当帰芍薬散エキス錠N「コタロー」	トウクシヤクヤクサンエキスジョウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	当帰芍薬散	エキス散3.3G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク2G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	錠剤	錠	
○	○	○				当帰芍薬散エキス錠OM	トウクシヤクヤクサンエキスジョウOM	大峰堂薬品工業 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (12重) 2200MG (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク3G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○				當帰芍薬散 (顆粒)	トウクシヤクヤクサンカリユウ	東洋漢方製薬 (株)	当帰芍薬散	水製乾燥エキス1.5G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク3G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	散剤	顆粒	源平製薬株式会社
○	○	○				当帰芍薬錠 S H	トウクシヤクヤクサンジョウ S H	新日本製薬株式会社	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (12重) 2200MG (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク3G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	錠剤	錠	
○	○	×			製販HPIには掲載あり。	当帰芍薬散粒状	トウクシヤクヤクサンリョウエキスジョウ	長倉製薬 (株)	当帰芍薬散	トウキ末562.5MG、センキュウ末562.5MG、シヤクヤク末1.125G、タクシヤ末750MG、ビヤクジュツ末750MG、ブクリョウ末750MG	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○				當帰芍薬散料	東洋漢方製薬 (株)	東洋漢方製薬 (株)	当帰芍薬散	トウキ3G、センキュウ3G、シヤクヤク6G、ブクリョウ4G、ビヤクジュツ4G、タクシヤ4G	錠剤	錠	日邦薬品工業株式会社
○	○	○				当帰芍薬散料Aエキス細粒三和生薬	トウクシヤクヤクサンリョウAエキスサイリユウサンワシヨウヤク	三和生薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (45重) 3.8G (トウキ2.4G・センキュウ2.4G・シヤクヤク3.2G・ブクリョウ3.2G・ビヤクジュツ3.2G・タクシヤ2.4G)	散剤	細粒	
○	○	○				当帰芍薬散料Aエキス細粒「分包」三和生薬	トウクシヤクヤクサンリョウAエキスサイリユウサブボウサンワシヨウヤク	三和生薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (45重) 3.8G (トウキ2.4G・センキュウ2.4G・シヤクヤク3.2G・ブクリョウ3.2G・ビヤクジュツ3.2G・タクシヤ2.4G)	散剤	細粒	
○	○	○				当帰芍薬散料Aエキス錠三和生薬	トウクシヤクヤクサンリョウAエキスジョウサンワシヨウヤク	三和生薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (35重) 2.8G (トウキ1.8G・センキュウ1.8G・シヤクヤク2.4G・ブクリョウ2.4G・ビヤクジュツ2.4G・タクシヤ2.4G)	錠剤	錠	
○	○	○				当帰芍薬散料エキス顆粒KM-2	トウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウKM-2	北日本製薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス4G (シヤクヤク4G・ソウジュツ4G・タクシヤ4G・ブクリョウ4G・センキュウ3G・トウキ3G)	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○				当帰芍薬散料エキス顆粒クラシエ	トウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (12重) 2500MG (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G・シヤクヤク2G)	散剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				当帰芍薬散料エキス (細粒) 44	トウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウ44	松浦薬業株式会社	当帰芍薬散	当帰芍薬散水製エキス4G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク2G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	散剤	細粒	一心堂漢方株式会社
○	○	○				当帰芍薬散料エキス細粒G「コタロー」	トウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	当帰芍薬散	水製エキス4.4G (トウキ2.4G・センキュウ2.4G・シヤクヤク3.2G・ブクリョウ3.2G・ビヤクジュツ3.2G・タクシヤ3.2G)	散剤	細粒	
○	○	○				当帰芍薬散料エキス散 (勝品)	トウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウサンカシヨウシヨウ	(株) 東洋薬行	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス3G (トウキ3G・センキュウ3G・シヤクヤク4G・ブクリョウ4G・ビヤクジュツ4G・タクシヤ4G)	散剤	散	
○	○	○				当帰芍薬散錠 T 2 3	トウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウT 2 3	中村薬品工業株式会社	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (12重) 2200MG (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク3G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	錠剤	錠	ティーライフ株式会社
○	○	○				当帰芍薬散料「タキザワ」	トウクシヤクヤクサンリョウタキザワ	(株) タキザワ	当帰芍薬散	トウキ3G、ブクリョウ4G、センキュウ3G、シヤクヤク6G、ビヤクジュツ4G、タクシヤ5G	錠剤	錠	
○	○	○				トウシヤン「コタロー」	トウシヤンNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	当帰芍薬散	エキス散3.3G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク2G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	錠剤	錠	
○	○	○				東洋の当帰芍薬散料エキス顆粒	トウキョウトウクシヤクヤクサンリョウエキスカリユウ	東洋漢方製薬 (株)	当帰芍薬散	水製乾燥エキス1.5G (トウキ1G・センキュウ1G・シヤクヤク2G・ブクリョウ1.33G・ビヤクジュツ1.33G・タクシヤ1.33G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○				トチモトの当帰芍薬散料	トチモトトウクシヤクヤクサンリョウ	(株) 栃木天海堂	当帰芍薬散	トウキ3G、センキュウ3G、シヤクヤク6G、ブクリョウ4G、ビヤクジュツ4G、タクシヤ4G	錠剤	錠	
○	○	○				ヒロレス 当帰芍薬錠	ヒロレストウクシヤクヤクサンジョウ	ジェービーエス製薬株式会社	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス(12重)	錠剤	錠	小林製薬株式会社
○	○	×				富貴	フウキ	日の丸漢方 (株)	当帰芍薬散	シヤクヤク15MG、センキュウ13MG、タクシヤ20MG、デンブ9MG、トウキ13MG、ビヤクジュツ15MG、ブクリョウ15MG	錠剤	錠	
○	○	○				ブレママーレ	ブレママーレ	本暮製薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス(23重)	散剤	顆粒	ミモザ製薬 (株)
○	○	×				ホリエの当帰芍薬散料	ホリエノトウクシヤクヤクサンリョウ	堀江生薬 (株)	当帰芍薬散	トウキ3G、センキュウ3G、シヤクヤク6G、ブクリョウ4G、ソウジュツ4G、タクシヤ4G	散剤	錠	
○	○	×				ママヘルス	ママヘルス	国民製薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散料エキス (乾燥) 600MG (トウキ3G・センキュウ3G・シヤクヤク6G・ブクリョウ4G・ソウジュツ4G・タクシヤ4G)	散剤	錠	トウキ末225MG、センキュウ末255MG、シヤクヤク末45
○	○	○				モリ エーション	モリエーション	大杉製薬 (株)	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス4.2G (トウキ (当帰) 3G・センキュウ (川キユウ) 3G・シヤクヤク (芍薬) 4G・ブクリョウ (茯苓) 4G)	散剤	錠	
○	○	×			製販HPIには掲載あり。	涌出 (エキス顆粒)	ユウシュエキスカリユウ	(株) 建林松鶴堂	当帰芍薬散	当帰芍薬散エキス (12重) 1.5G (トウキ1.5G・センキュウ1.5G・シヤクヤク2G・ブクリョウ2G・ビヤクジュツ2G・タクシヤ2G)	散剤	錠	
○	○	○				ガチラック	ガチラック	独活葛根湯	独活葛根湯	独活葛根湯エキス1950MG (カッコン2.5G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・マオウ1G・ドクカツ1G・ショウキョウ0.25G)	錠剤	錠	
○	○	○				顧痛 (エキス顆粒)	コウウエキスカリユウ	(株) 建林松鶴堂	独活葛根湯	水製エキス (乾燥エキス) 1.2G (カッコン2.5G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・マオウ1G・ドクカツ1G・ショウキョウ0.1G)	散剤	錠	
○	○	○				シジラック	シジラック	小林製薬 (株)	独活葛根湯	独活葛根湯エキス2860MG (カッコン2.5G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・マオウ1G・ドクカツ1G・ショウキョウ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○				ドカール「コタロー」 (独活葛根湯エキス錠)	ドカールコタロードクカツカクソントウエキスジョウ	小太郎漢方製薬 (株)	独活葛根湯	水製エキス2.55g (カッコン2.5g、ケイヒ・シヤクヤク各1.5g、マオウ・ドクカツ各1g、ショウキョウ・タイソウ・カンゾウ各0.1g)	錠剤		
○	○	○				独活葛根湯エキス細粒G「コタロー」	ドクカツカクソントウエキスカリユウコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	独活葛根湯	水製エキス4.08G (カッコン4.0G・ケイヒ2.4G・シヤクヤク2.4G・マオウ1.6G・ドクカツ1.6G・ショウキョウ0.8G・タイソウ)	散剤	細粒	
○	○	○				独活葛根湯エキス錠クラシエ	ドクカツカクソントウエキスジョウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	独活葛根湯	独活葛根湯エキス粉末2800MG (カッコン2.5G・ケイヒ1.5G・シヤクヤク1.5G・マオウ1G・ドクカツ1G・ショウキョウ0.5G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				バス Stanton 顆粒	バス Stanton カリユウ	(株) 阪本漢法製薬	独活葛根湯	独活葛根湯乾燥エキス3.8G (カッコン5G・ケイヒ3G・シヤクヤク3G・マオウ2G・ドクカツ2G・ショウキョウ0.5G・ジョウ)	散剤	顆粒	
○	○	○				ラックルカリョウ	ラックルカリョウ	新生薬品工業株式会社	独活葛根湯	独活葛根湯乾燥エキス4.8G (カッコン2.5G・シヤクヤク3G・カンゾウ1G・カッコン5G・ジョウ4G・ケイヒ3G・マオウ2G)	散剤	錠	日本製薬製薬株式会社
○	○	○				ロート製薬葛根湯錠	ロートドクカツカクソントウジョウ	ロート製薬 (株)	独活葛根湯	独活葛根湯エキス1950mg (カッコン2.5g、ケイヒ・シヤクヤク各1.5g、マオウ・ドクカツ各1g、ショウキョウ0.25g、ジョウ2g)	錠剤	錠	
○	○	○				JPS漢方顆粒-37号	JPSカンボウカウユ-37ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (45重) 4.64G (バクモンドウ8G・ハンガ4G・コウベ4G・タイソウ2.4G・ニンジン1.6G・カンゾウ1.6G)	散剤	顆粒	
○	○	○				JPS麦門冬湯液	JPSバクモンドウトウエキ	ジェービーエス製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス22.5G (バクモンドウ10G・ハンガ5G・コウベ4.5G・タイソウ3G・ニンジン2G・カンゾウ2G)	液剤	液	
○	○	○				JPS麦門冬湯エキス錠N	JPSバクモンドウトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (12重) 2.9G (バクモンドウ5G・ハンガ2.5G・コウベ2.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・カンゾウ1G)	錠剤	錠	
○	○	○				ウチダの麦門冬湯	ウチダノバクモンドウトウ	(株) ウチダ和漢薬	麦門冬湯	バクモンドウ、ハンガ、コウベ、タイソウ、ニンジン etc.	錠剤	錠	
○	○	○				漢方せき止めトローチS「麦門冬湯」	カンボウセキドメトローチSバクモンドウトウ	小太郎漢方製薬 (株)	麦門冬湯	水製エキス4.5G (バクモンドウ5G・ハンガ2.5G・コウベ2.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・カンゾウ1G)	錠剤	トローチ	
○	○	○				漢方濃縮煎剤麦門冬湯29	カンボウノウシュクセンザイバクモンドウトウ29	松浦薬業株式会社	麦門冬湯	麦門冬湯抽出物13.6G (バクモンドウ10G・ハンガ5G・コウベ4.5G・ニンジン2G・タイソウ3G・カンゾウ2G)	錠剤	エキス	
○	○	○				「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒 A	クラシエカンボウバクモンドウトウエキスカリユウ A	クラシエ製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス散 (診療医典) 6200MG (バクモンドウ10G・ハンガ5G・コウベ4.5G・タイソウ3G・ニンジン2G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒 S	クラシエカンボウバクモンドウトウエキスカリユウ S	クラシエ製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス散 (診療医典、34重) 4650MG (バクモンドウ7.5G・ハンガ3.75G・コウベ4.375G・タイソウ2.25G・ニンジン1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒 SII	クラシエカンボウバクモンドウトウエキスカリユウ SII	クラシエ製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス散 (診療医典、34重) 4650MG (バクモンドウ7.5G・ハンガ3.75G・コウベ4.375G・タイソウ2.25G・ニンジン1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○				阪本漢法の麦門冬湯顆粒	サカトカンボウバクモンドウトウカリユウ	(株) 阪本漢法製薬	麦門冬湯	麦門冬湯エキス4.4G (バクモンドウ10G・ハンガ5G・コウベ4.5G・タイソウ3G・ニンジン2G・カンゾウ2G)	散剤	顆粒	
○	○	○				サンワ麦門冬湯エキス細粒	サンワバクモンドウトウエキスカリユウ	三和生薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (12重) 2.4G (バクモンドウ5G・ハンガ2.5G・コウベ2.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・カンゾウ1G)	散剤	細粒	

じほ	JAPIC	PMDA	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○		サンワ麦門冬湯エキス錠「分包」	サンワバクモンドウトウエキスサイリュウブンボウ	三和生薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (12顆) 2.4G (バクモンドウ5G・コウベイ2.5G・ニンジン1G・ハング2.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ1G)	錠剤	顆粒	湧永製薬 (株)
○	○	○		錠剤麦門冬湯	ジョウザイバクモンドウトウ	一元製薬 (株)	麦門冬湯	カンゾウ末1.88G, バクモンドウ末9.08G, ハング末4.58G, ニンジン末1.88G, コウベイ末4.58G, 水製エキス (麦門冬湯エキス)	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○		神農麦門冬湯エキス錠	シノウバクモンドウトウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (12顆) 2.9G (バクモンドウ5G・ハング2.5G・コウベイ2.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・カンゾウ1G)	錠剤	錠	(株) ツムラ
○	○	○		ツムラ漢方内服液麦門冬湯S	ツムラカンボウナドクエキバクモンドウトウS	新生薬品工業 (株)・奈	麦門冬湯	麦門冬湯エキス81ML (バクモンドウ10G・コウベイ5G・ハング5G・タイソウ3G・カンゾウ2G・ニンジン2G)	液剤	液	
○	○	○		ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒	ツムラカンボウバクモンドウトウエキスカリユウ	(株) ツムラ	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (12顆) 3G (バクモンドウ5G・ハング2.5G・コウベイ2.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ1G・ニンジン1G)	錠剤	顆粒	
○	○	○		東洋漢方の麦門冬湯	トウヨウカンボウバクモンドウトウ	東洋漢方製薬 (株)	麦門冬湯	バクモンドウ10G, ハング5G, コウベイ5G, タイソウ3G, ニンジン2G, カンゾウ2G	その他	煎剤	
○	○	×		東洋漢方の麦門冬湯エキス顆粒 (分包)	トウヨウカンボウバクモンドウトウエキスカリユウブンボウ	東洋漢方製薬 (株)	麦門冬湯	水製乾燥エキス3.943G (バクモンドウ10G・ハング5G・コウベイ5G・タイソウ3G・ニンジン2G・カンゾウ2G)	錠剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	×	確認票商品例	トチモトの麦門冬湯	トチモトバクモンドウトウ	(株) 栃本天海堂	麦門冬湯	カンゾウ2G, コウベイ5G, タイソウ3G, ニンジン2G, バクモンドウ10G, ハング5G	錠剤	顆粒	
○	○	○		ニタンダ麦門冬湯エキス顆粒	ニタンダバクモンドウトウエキスカリユウ	二反田薬品工業 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯乾燥エキス4.4G (バクモンドウ10G・ハング5G・コウベイ5G・タイソウ3G・ニンジン2G・カンゾウ2G)	錠剤	顆粒	
○	○	○		バクニン	バクニン	大杉製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス5.7G (バクモンドウ (麦門冬) 10G・ハング (半夏) 5G・タイソウ (大棗) 3G・ニンジン (人参) 2G・カン	錠剤	錠	
○	○	○		麦門冬湯エキス顆粒KM	バクモンドウトウエキスカリユウKM	北日本製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス6G (バクモンドウ10G・コウベイ5G・ハング5G・タイソウ3G・カンゾウ2G・ニンジン2G)	錠剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○		麦門冬湯エキス顆粒KM (分包)	バクモンドウトウエキスカリユウKMブンボウ	北日本製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯乾燥エキス6G (バクモンドウ10G・コウベイ5G・ハング5G・タイソウ3G・カンゾウ2G・ニンジン2G)	錠剤	顆粒	
○	○	○		麦門冬湯エキス (細粒) 54	バクモンドウトウエキスサイリュウ54	松浦薬業株式会社	麦門冬湯	麦門冬湯エキス4G (バクモンドウ5G・ハング2.5G・コウベイ2.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・カンゾウ1G)	錠剤	細粒	
○	○	○		麦門冬湯エキス細粒 (勝昌)	バクモンドウトウエキスサイリュウショウ	(株) 東洋薬行	麦門冬湯	麦門冬湯水製エキス4G (バクモンドウ10G・ハング5G・コウベイ5G・タイソウ3G・ニンジン2G・カンゾウ2G)	錠剤	細粒	
○	○	○		麦門冬湯「タキザワ」	バクモンドウトウタキサワ	(株) タキサワ漢方殿	麦門冬湯	バクモンドウ10G, ハング5G, コウベイ5G, タイソウ3G, ニンジン2G, カンゾウ2G	その他	煎剤	
○	○	×	製販HPには掲載あり。	麦門冬湯粒状	バクモンドウトウリュウジョウ	長倉製薬 (株)	麦門冬湯	ハング0.8G, チクセツニンジン0.8G, カンゾウ0.8G, カンピ0.5G, 玄米1.5G, 水製乾燥エキス0.4G (バクモンドウ8G・タイソウ2G・ハ	錠剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○		バクモンN「コタロー」	バクモンNコロ	小太郎漢方製薬 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス散(12顆)3.78g (バクモンドウ5g, ハング・コウベイ各2.5g, タイソウ1.5g, ニンジン・カンゾウ各1g)	錠剤	錠	
○	○	○		バクモンS「コタロー」 (麦門冬湯エキス錠)	バクモンSコタローバクモンドウトウエキスジョウ	小太郎漢方製薬 (株)	麦門冬湯	水製エキス3.15G (バクモンドウ5G・ハング2.5G・コウベイ2.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・カンゾウ1G)	錠剤	錠	
○	○	○		ホノミダイギャク錠	ホノミダイギャクジョウ	荆盛堂薬品 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (12顆) 2G (カンゾウ1G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・バクモンドウ5G・ハング2.5G・コウベイ2.5G)	錠剤	錠	
○	○	○		ホノミダイギャク粒	ホノミダイギャクツブ	荆盛堂薬品 (株)	麦門冬湯	麦門冬湯エキス (12顆) 2G (カンゾウ1G・コウベイ2.5G・タイソウ1.5G・ニンジン1G・バクモンドウ5G・ハング2.5G)	錠剤	顆粒	
○	○	○		DHC漢方 八味地黄丸エキス錠	DHCカンボウハチミジウガンエキスジョウ	(株) ディーエイチシー	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12顆)	錠剤	フィルムコーティング錠	
○	○	○		JPS漢方顆粒-61号	JPSカンボウカリユウ-61ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス (45顆) 3.68G (ジョウ4G・サンシュユ2.4G・サンヤク2.4G・タクシャ2.4G・プリョウ2.4G・ポタンビ	錠剤	錠	
○	○	○		JPS八味地黄丸エキス錠N	JPSハチミジウガンリュウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス (12顆) 2.3G (ジョウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・プリョウ1.5G・ポタンビ	錠剤	錠	
○	○	○		ウェルクスH	ウェルクスH	帝國漢方製薬株式会社	八味地黄丸	八味地黄丸エキス4.60G (ジョウ5.0G・サンシュユ3.0G・サンヤク3.0G・タクシャ3.0G・プリョウ3.0G・ポタンビ3.0G・	錠剤	顆粒	テイコクファルマクア株式会社
○	○	○		ウチダの八味丸	ウチダノハチミガン	(株) ウチダ和漢薬	八味地黄丸	混合粉末5.031G (ジョウ8G・サンシュユ3.4G・サンヤク4G・タクシャ3G・プリョウ3G・ポタンビ3G・ケイヒ1G)・フジ	錠剤	丸	
○	○	○		ウチダの八味丸料	ウチダノハチミガンリョウ	(株) ウチダ和漢薬	八味地黄丸	ジョウ4.5G, サンシュユ3G, サンヤク3G, タクシャ3G, プリョウ3G, ポタンビ3G, ケイヒ1G, プシ10.3G	その他	錠剤	
○	○	○		オオクサ八味丸	オオクサハチミガン	大草薬品 (株)	八味地黄丸	ジオウ (地黄) 1600MG, サンシュユ (山萸) 800MG, サンヤク (山薬) 800MG, タクシャ (沢瀉) 600MG, プリョウ	錠剤	丸	日邦薬品工業 (株)
○	○	○		オオクサ八味丸 (分包)	オオクサハチミガンブンボウ	大草薬品 (株)	八味地黄丸	ジオウ, サンシュユ, サンヤク, タクシャ, プリョウ etc.	錠剤	丸	日邦薬品工業 (株)
○	○	○		オオスギ八味地黄丸A	オオスギハチミジウガンA	大杉製薬 (株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス4.6G (ジオウ (地黄) 5G・サンシュユ (山萸) 3G・サンヤク (山薬) 3G・タクシャ (沢瀉) 3G・プリョウ	錠剤	丸	
○	○	○		大峰堂の八味丸A	オオミネドウノハチミガンB	大峰堂薬品工業 (株)	八味地黄丸	ジオウ1777MG, サンシュユ2889MG, サンヤク889MG, タクシャ667MG, プリョウ667MG, ポタンビ667MG, ケイヒ22錠	錠剤	丸	
○	○	×	2017年閉店	紀伊国屋腎気丸 (八味丸)	キノコニヤシキガンハチミガン	(株) 紀伊国屋漢薬局	八味地黄丸	加工ブシ末0.22G, ケイヒ末0.22G, サンシュユ0.89G, サンヤク0.89G, ジョウ1.78G, タクシャ末0.67G, プリョウ末0.67G, ポタンビ末0.67G	錠剤	錠	サンヤク500MG・ジオウ833.3MG)
○	○	×		養生八味丸	キホウハチミガン	北宝薬品 (株)	八味地黄丸	八味丸エキス500MG (ケイヒ166.7MG・加工ブシ166.7MG・タクシャ500MG・プリョウ500MG・ポタンビ500MG・サンシュユ500MG)	錠剤	錠	全国農業協同組合連合会
○	○	○		クミアイ八味地黄丸錠	クミアイハチミジウガンジョウ	協同薬品工業 (株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス1800MG (ジオウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・プリョウ1.5G・ポタンビ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○		「クラシエ」漢方八味地黄丸料エキス錠	クラシエカンボウハチミジウガンリュウエキスジョウ	クラシエ製薬 (株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス (12顆) 2600MG (ジョウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・プリョウ1.5G・ポタ	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○		クラシエ八味地黄丸A	クラシエハチミジウガンA	クラシエ製薬 (株)	八味地黄丸	ジオウ (熟ジオウ) 末890MG, サンシュユ末445MG, サンヤク末445MG, タクシャ末334MG, プリョウ末334MG, ポタ	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○		ケアチ顆粒A	ケアチリュウA	(株) ツムラ	八味地黄丸	八味地黄丸エキス (12顆) 2G (ジョウ3G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・プリョウ1.5G・ポタンビ1.2	錠剤	錠	
○	○	○		玄武峰寿丸	ゲンブホウジュガン	大峰堂薬品工業 (株)	八味地黄丸	ジオウ, サンシュユ, サンヤク, タクシャ, プリョウ etc.	錠剤	丸	日邦薬品工業 (株)
○	○	×		原末・八味地黄丸	ゲンマツノハチミジウガン	(株) ウチダ和漢薬	八味地黄丸	ジオウ, サンシュユ, サンヤク, タクシャ, プリョウ etc.	錠剤	丸	
○	○	×		サーミン八味丸	サーミンハチミガン	全国薬品工業 (株)	八味地黄丸	加工ブシ末0.2G, ケイヒ末0.3G, サンシュユ末1G, サンヤク末1G, ジョウ末2G, タクシャ末0.8G, ハチミツ0.5G, プリョウ末0.8G, ポタンビ末0.8G	錠剤	錠	
○	○	×		阪本漢法の八味丸300A	サカモトカンボウノハチミガン300A	(株) 阪本漢法製薬	八味地黄丸	ジオウ末1777MG, サンシュユ末888MG, サンヤク末888MG, タクシャ末666MG, プリョウ末666MG, ポタンビ末666MG, ケイヒ末222MG, ブシ末222MG	錠剤	錠	
○	○	○		三宝八味地黄丸	サンボウハチミジウガン	三寶製薬 (株)	八味地黄丸	加工ブシ末 (加工附子末) 0.125G, ケイヒ (桂皮) 0.25G, タクシャ (山萸) 0.75G, サンヤク (山薬) 0.75G, ジョウ (錠剤	錠	
○	○	○		サンワロン	サンワロン	三和生薬 (株)	八味地黄丸	サンワロン水製エキス1.5G (ジオウ1.8G・サンヤク1.05G・サンシュユ1.05G・プリョウ1.05G・タクシャ1.05G・ポタンビ	錠剤	錠	
○	○	○		サンワロン顆粒	サンワロンカリユウ	三和生薬 (株)	八味地黄丸	サンワロン水製エキス1.5G (ジオウ1.8G・サンヤク1.05G・サンシュユ1.05G・プリョウ1.05G・タクシャ1.05G・ポタンビ	錠剤	錠	
○	○	×	製販HPには掲載あり。	松鶴堂・八味地黄錠	ショウカクドウ・ハチミジウジョウ	(株) 建林松鶴堂	八味地黄丸	ジオウ1.07G, サンシュユ0.53G, サンヤク0.53G, タクシャ末0.4G, プリョウ末0.4G, ポタンビ末0.4G, ケイヒ末0.13G, プシ末0.13G	錠剤	錠	
○	○	○		神農八味地黄丸料エキス錠	シノウハチミジウガンリュウエキスジョウ	ジェービーエス製薬 (株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス (12顆) 2.3G (ジョウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・プリョウ1.5G・ポタンビ	錠剤	錠	
○	○	○		腎陽温補散 (散剤) 68	ジンヨウオンボウサンザイ68	松浦薬業株式会社	八味地黄丸	ジオウ1.77G, サンシュユ0.89G, サンヤク0.89G, タクシャ0.67G, プリョウ0.67G, ポタンビ0.67G, ケイヒ0.22G, フジ	錠剤	散	
○	○	×		杉原の八味丸	スギハラハチミガン	(有) 杉原達也商店	八味地黄丸	加工ブシ0.16G, ケイヒ0.16G, サンシュユ0.64G, サンヤク0.64G, ジョウ1.28G, タクシャ0.48G, プリョウ0.48G, ポタンビ0.48G	錠剤	丸	
○	○	○		ゼネル八味地黄丸	ゼネルハチミジウガン	ゼネル薬工伊部 (株)	八味地黄丸	ジオウ1500MG, サンシュユ750MG, タクシャ750MG, プリョウ750MG, ポタンビ750MG, ケイヒ2錠	錠剤	丸	ゼネル薬品工業 (株)
○	○	×		大寿八味丸	タイジュハチミガン	森本製薬 (株)	八味地黄丸	加工ブシ末0.125G, ケイヒ末0.125G, サンシュユ末0.5G, サンヤク末0.5G, ジョウ末1G, タクシャ末0.375G, ハチミツ適量, プリョウ	錠剤	丸	
○	○	○		ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒A	ツムラカンボウハチミジウガンリュウエキスカリユウA	(株) ツムラ	八味地黄丸	八味地黄丸エキス (12顆) 2G (ジョウ3G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・プリョウ1.5G・ポタンビ1.2	錠剤	顆粒	
○	○	○		てんく八味丸	テングハチミガン	二反田薬品工業 (株)	八味地黄丸	加工ブシ末0.22G, ケイヒ末0.22G, サンシュユ末0.89G, サンヤク末0.89G, ジョウ末1.77G, タクシャ末0.67G, プリョウ	錠剤	丸	
○	○	×	確認票商品例	トチモトの八味地黄丸料	トチモトノハチミジウガンリュウ	(株) 栃本天海堂	八味地黄丸	ケイヒ1G, サンシュユ3G, サンヤク3G, ジョウ6G, タクシャ3G, プリョウ3G, ホウブシ1G, ホウブシ3G	錠剤	煎剤	
○	○	○		奈良八味地黄丸錠	ナラハチミジウガンジョウ	OJAS PHARMA (株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12顆)	錠剤	錠	(株) 奈良大和生薬
○	○	○		八味丸	ハチミガン	第一薬品工業株式会社	八味地黄丸	地黄 (ジオウ) 末1000MG, 山萸 (サンシュユ) 末580MG, 山薬 (サンヤク) 末580MG, 澤瀉 (タクシャ) 末580MG, 茯苓	錠剤	丸	株式会社オノジョウ
○	○	○		八味丸 ダイコー	ハチミガンダイコー	大見生薬 (有)	八味地黄丸	ジオウ1461MG, サンシュユ731MG, サンヤク731MG, タクシャ548MG, プリョウ548MG, ポタンビ548MG, ケイヒ18錠	錠剤	丸	
○	○	○		八味地黄丸	ハチミジウガン	三屋製薬 (株)	八味地黄丸	ジオウ1.5G, サンヤク0.75G, プリョウ0.75G, ケイヒ0.25G, サンシュユ0.75G, タクシャ0.75G, ポタンビ0.75G, プシ末0.125G	錠剤	丸	長野製薬 (株)
○	○	○	表記違い	八味地黄丸	ハチミジウガン	二反田薬品工業株式会社	八味地黄丸	タクシャ末0.67g, プリョウ末0.67g, ポタンビ末0.67g, ケイヒ末0.22g, ジョウ末1.77g, サンシュユ末0.89g, サンヤク末0.89g, 加工ブ	錠剤	丸	松浦薬業株式会社
○	○	○		八味地黄丸 (フジワ八味丸)	ハチミジウガン	二反田薬品工業株式会社	八味地黄丸	タクシャ末, プリョウ末, ポタンビ末, ケイヒ末, ジョウ末 etc.	錠剤	丸	松浦薬業株式会社
○	○	○	表記違い	八味地黄丸	ハチミジウガン	大峰堂薬品工業 (株)	八味地黄丸	ジオウ896mg, サンシュユ448mg, サンヤク448mg, タクシャ336mg, プリョウ336mg, ケイヒ112mg,	錠剤	丸	伸和製薬 (株)
○	○	○		八味地黄丸 (峰寿丸)	ハチミジウガン	大峰堂薬品工業 (株)	八味地黄丸	ジオウ, サンシュユ, サンヤク, タクシャ, プリョウ etc.	錠剤	丸	伸和製薬 (株)
○	○	×		八味地黄丸	ハチミジウガン	(有) 薬師製薬	八味地黄丸	加工ブシ末85mg, ケイヒ末171mg, サンシュユ末513mg, サンヤク513mg, ジョウ末1026mg, タクシャ末513mg, プリョウ末513mg,	錠剤	丸	
○	○	○		八味地黄丸 占部大観堂	ハチミジウガンクラベタイカンドウ	占部大観堂製薬 (株)	八味地黄丸	ジオウ1500MG, サンシュユ750MG, サンヤク750MG, タクシャ750MG, プリョウ750MG, ポタンビ750MG, ケイヒ2錠	錠剤	丸	(株) はびねすくらぶ

J	A	P	M	P	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○				八味地黄丸「オオクサ」	ハチミジオウガンオオクサ	大草薬品株式会社	八味地黄丸	ジオウ(地黄)1600MG、サンシュユ(山茱萸)800MG、サンヤク(山薬)800MG、タクシャ(沢瀉)600MG、ブクリョウ	錠剤	丸	大草薬品販売株式会社
○	○	○				八味地黄丸「廣賢堂」	ハチミジオウガンコウカンドウ	(株)廣賢堂	八味地黄丸	ジオウ末1280MG、タクシャ末640MG、ブクリョウ末640MG、サンヤク末640MG、サンシュユ末640MG、ボタンビ末640MG	錠剤	丸	その他
○	○	○				八味地黄丸(錠剤)	ハチミジオウガンジョウザイ	ジェービーエス製薬(株)	八味地黄丸	八味地黄丸粉末6G(ジオウ8・サンシュユ4・サンヤク4・タクシャ3・ブクリョウ3・ボタンビ3・ケイヒ1・加工アズキ末)	錠剤	錠	(株)メディカルルーチ
○	○	○				八味地黄丸錠「創至堂」	ハチミジオウガンジョウウシセイ	北日本製薬(株)	八味地黄丸	ジオウ末800MG、サンシュユ末400MG、サンヤク末400MG、ケイヒ末133MG、タクシャ末400MG、ブクリョウ末400MG	錠剤	錠	(株)メディカルルーチ
○	○	○				八味地黄丸(東洋)	ハチミジオウガントウヨウ	(株)東洋薬行	八味地黄丸	ジオウ1512MG、サンシュユ756MG、サンヤク756MG、タクシャ567MG、ブクリョウ567MG、ボタンビ567MG、ケイヒ18	錠剤	錠	その他
○	○	○				八味地黄丸(分包)「オオクサ」	ハチミジオウガンブンポウオオクサ	大草薬品株式会社	八味地黄丸	ジオウ(地黄)1600MG、サンシュユ(山茱萸)800MG、サンヤク(山薬)800MG、タクシャ(沢瀉)600MG、ブクリョウ	錠剤	丸	大草薬品販売株式会社
○	○	○				八味地黄丸料エキス顆粒クラシエ	ハチミジオウガンリョウエキスカリョウクラシエ	クラシエ製薬(株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12量)2600MG(ジオウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボタ	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○				八味地黄丸料エキス細粒G「コタロー」	ハチミジオウガンリョウエキスサイリョウGコタロー	小太郎漢方製薬(株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12量)2.65G(ジオウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボタ	散剤	細粒	
○	○	○				八味地黄丸料エキス錠N「コタロー」	ハチミジオウガンリョウエキスジョウNコタロー	小太郎漢方製薬(株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス散(12量)3.18G(ジオウ2.5G・タクシャ1.5G・ケイヒ0.5G・サンシュユ1.5G・ブクリョウ1.5G・ブシ	錠剤	錠	
○	○	○				八味地黄丸料エキス錠(大峰)	ハチミジオウガンリョウエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業(株)	八味地黄丸	八味地黄丸料エキス2200MG(ジオウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボタンビ1.5	錠剤	錠	
○	○	○				八味地黄丸料錠 T O 7	ハチミジオウガンリョウジョウT O 7	中村薬品工業株式会社	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12量)2200MG(ジオウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボタ	錠剤	錠	フィルムコム
○	○	○				八味地黄丸料「タキザワ」	ハチミジオウガンリョウタキザワ	(株)タキザワ漢方	八味地黄丸	ジオウ5G、ブクリョウ3G、サンシュユ3G、ボタンビ3G、サンヤク3G、ケイヒ1G、タクシャ3G、ブシ0.5G	錠剤	錠	その他
○	○	×			製版HPには掲載あり。	ハチミジオウ錠	長倉製薬(株)	八味地黄丸	サンヤク0.8G、タクシャ0.4G、ブクリョウ0.4G、ボタンビ0.4G、サンシュユ0.6G、ケイヒ0.2G、水製乾燥エキス2G(ジオウ6G・サンヤ	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)	
○	○	×			製版HPには掲載あり。	八味地黄丸粒	ハチミジオウリョウジョウ	長倉製薬(株)	八味地黄丸	水浸エキス(ジオウ3G)、サンヤク1G、サンシュユ1G、ボタンビ0.8G、タクシャ0.8G、ブクリョウ0.8G、ケイヒ0.5G、ハチミツ0.5G	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○			確認票商品例	花扇八味地黄丸	ハチミジオウガン	小西製薬(株)	八味地黄丸	ジオウ1.6G、サンシュユ0.8G、サンヤク0.8G、タクシャ0.6G、ブクリョウ0.6G、ボタンビ0.6G、ケイヒ0.2G、炮附子0.2G	錠剤	錠	
○		×				ビタドレール 八味地黄丸料エキス錠	ビタドレールハチミジオウガンリョウエキスジョウ	本草製薬(株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12量)2.2G(ジオウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボタンビ1.5G・ケイヒ0.5G・ブシ	錠剤	錠	0.5G)
○	○	○				ベルアベトン	ベルアベトン	クラシエ製薬(株)	八味地黄丸	ジオウ(熟ジオウ)末890MG、サンシュユ末445MG、サンヤク末445MG、タクシャ末334MG、ブクリョウ末334MG、ボタ	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○				蜂寿丸	ホウジュガン	大峰堂薬品工業(株)	八味地黄丸	ジオウ896MG、サンシュユ448MG、サンヤク448MG、タクシャ336MG、ブクリョウ336MG、ボタンビ336MG、ケイヒ112	錠剤	錠	
○	○	○				ホノミカツジ錠	ホノミカツジジョウ	刑盛堂薬品(株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12量)1.65G(ケイヒ0.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・ジオウ2.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ	錠剤	錠	
○	○	○				ホリエ金剛湯	ホリエゴンコウトウ	堀江生薬(株)	八味地黄丸	ジオウ5G、タクシャ3G、ブクリョウ3G、ボタンビ3G、サンシュユ3G、サンヤク3G、ケイヒ1G、加工アズキ	錠剤	錠	
○	○	○				本草八味地黄丸料エキス錠-H	ホンゾウハチミジオウガンリョウエキスジョウ-H	本草製薬(株)	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12量)2.2G(ジオウ2.5G・サンシュユ1.5G・サンヤク1.5G・タクシャ1.5G・ブクリョウ1.5G・ボタンビ	錠剤	錠	(株)エーエフシー
○	○	○				モロモト漢方	モロモトカンポウジョウ	中村薬品工業株式会社	八味地黄丸	八味地黄丸エキス(12量)	錠剤	錠	株式会社ドクターシーラボ
○	○	○				養師八味地黄丸	ヤウシハチミジオウマツ	松浦薬業株式会社	八味地黄丸	ジオウ1.77G、サンシュユ0.89G、サンヤク0.89G、タクシャ0.67G、ブクリョウ0.67G、ボタンビ0.67G、ケイヒ0.22G、ブシ	散剤	錠	株式会社日本薬師堂
○	○	○				蘭州金匱腎気丸	ランシュウキンキンギン	ハツ目製薬(株)	八味地黄丸	ジオウ1.2G、サンシュユ0.6G、サンヤク0.6G、タクシャ0.45G、ブクリョウ0.45G、ボタンビ0.45G、ケイヒ0.15G、ブシ0.1	錠剤	錠	イスクラ産業(株)
○	○	○				リエイジE X錠	リエイジE Xジョウ	クラシエ製薬(株)	八味地黄丸	ジオウ1072MG、サンシュユ536MG、サンヤク536MG、タクシャ402MG、ブクリョウ402MG、ボタンビ402MG、ケイヒ末	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○				ウチナガ八味地黄丸	ウチナガハチミジオウガン	国産薬品工業(株)	八味地黄丸	ジオウ1461MG、サンシュユ731MG、サンヤク731MG、タクシャ548MG、ブクリョウ548MG、ボタンビ548MG、ケイヒ18	錠剤	錠	湧永製薬(株)
○	○	○				八味地黄丸	ハチミジオウガン	日本製薬(株)・滋	八味地黄丸		錠剤	錠	中嶋生薬(株)
○	○	○				ケアテカリョウ	ケアテカリョウ	(株)ツムラ	八味地黄丸(腎気)	八味地黄丸エキス(処方解説、12量)2.8g(ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タクシャ・ブクリョウ・ボタンビ各1.5g、ケイヒ	散剤	錠	
○	○	○				ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒	ツムラカンポウハチミジオウガンリョウエキスカリョウ	(株)ツムラ	八味地黄丸(腎気)	八味地黄丸エキス(処方解説、12量)2.8g(ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タクシャ・ブクリョウ・ボタンビ各1.5g、ケイヒ	散剤	錠	
○	○	○				胡慶・腎気丸	コケイ・ジンキガン	原沢製薬工業(株)	漢方製剤(八味地黄丸)		錠剤	錠	牛津製薬(株)
○	○	○				養精	カンセイ	一元製薬(株)	その他の漢方製剤	ケイヒ末0.6G、タクシャ末1.2G、ブクリョウ末1.2G、ボタンビ末1.2G、ジオウ末1.9G、サンヤク末1.3G、カンキョウ末0.4G	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○				健康丸	ケンコウガン	(株)橋本天海堂	その他の漢方製剤	ケイヒ0.6G、タクシャ0.9G、ブクリョウ0.9G、ボタンビ0.9G、サンシュユ1.2G、サンヤク1.2G、ジオウ2.4G、炮附子0.6G	錠剤	錠	
○	○	○				八味丸	ハチミガン	(株)益寿堂	その他の漢方製剤	ジオウ末、サンシュユ末、サンヤク末、タクシャ末、ブクリョウ末 etc.	錠剤	錠	(株)池田屋安兵衛商店
○	○	○				リバイチンS	リバイチンS	大草薬品(株)	その他の漢方製剤	ジオウ、サンヤク、ブクリョウ、サンシュユ、タクシャ etc.	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○				JPS半夏厚朴湯エキス錠N	JPSハンゴウポクトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(34量)1.65G(ハンゴウ4.5G・ブクリョウ3.75G・コウボク2.25G・ソヨウ1.5G・ショウキョウ0.75G)	錠剤	錠	
○	○	○				ウチダの半夏厚朴湯	ウチダハンゴウコウボクトウ	(株)ウチダ和漢薬	半夏厚朴湯	ハンゴウ、ブクリョウ、コウボク、ソヨウ、ショウキョウ	散剤	錠	その他
○	○	○				ウチダの半夏厚朴湯エキス散	ウチダハンゴウコウボクトウエキスサン	(株)ウチダ和漢薬	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス0.98G(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ソヨウ1G・ショウキョウ0.5G)	散剤	細粒	
○	○	○				ウチダの理気利心	ウチダノリキシン	(株)ウチダ和漢薬	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス0.98G(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ソヨウ1G・ショウキョウ0.5G)	散剤	細粒	
○	○	○				雲桂(エキス顆粒)	ウンケイエキスカリョウ	(株)建松鶴堂	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12量)1G(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ショウキョウ0.5G・ソヨウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○				「クラシエ」漢方半夏厚朴湯エキス顆粒	クラシエカンポウハンゴウコウボクトウエキスカリョウ	クラシエ製薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12量)750MG(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ソヨウ1G・ショウキョウ0.65G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○				光明	コウミョウ	日の丸漢方(株)(株)建松鶴堂	半夏厚朴湯	コウボク14MG、シンヨウ9MG、ショウキョウ18MG、デンブソウ10MG、ハンゴウ27MG、ブクリョウ22MG			
○	○	○				錠剤半夏厚朴湯	ジョウザイハンゴウコウボクトウ	一元製薬(株)	半夏厚朴湯	コウボク末4.1G、ブクリョウ末7G、ショウキョウ末2.8G、ハンゴウ末8.3G、シンヨウ末2.8G	錠剤	錠	(株)イチゲン
○	○	○				神農半夏厚朴湯エキス錠	シンノウハンゴウコウボクトウエキスジョウ	ジェービーエス製薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(34量)1.65G(ハンゴウ4.5G・ブクリョウ3.75G・コウボク2.25G・ソヨウ1.5G・ショウキョウ0.75G)	錠剤	錠	
○	○	○				ストレージタイプH	ストレージタイプH	(株)ツムラ	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12量)(乾燥エキス)1.25G(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ソヨウ1G・ショウキョウ0.5	散剤	顆粒	武田コンシューマーヘルスケア(株)
○	○	○				ツムラ漢方半夏厚朴湯エキス顆粒	ツムラカンポウハンゴウコウボクトウエキスカリョウ	(株)ツムラ	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12量)1.25G(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ソヨウ1G・ショウキョウ0.5G)	散剤	顆粒	
○	○	×				デルマンピネリア	デルマンピネリア	(有)本町薬品	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯水製乾燥エキス粉末2.2G(ハンゴウ8G・ブクリョウ5G・コウボク3G・シンヨウ2G・ショウキョウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○				トチモトの半夏厚朴湯	トチモトノハンゴウコウボクトウ	(株)橋本天海堂	半夏厚朴湯	ハンゴウ6G、ブクリョウ5G、コウボク3G、ショウキョウ1.5G、シンヨウ2G	散剤	錠	その他
○	○	○				ハイ・コメント	ハイ・コメント	大杉製薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス1.4G(ハンゴウ(半夏)6G・ブクリョウ(茯苓)5G・ショウキョウ(生姜)1G・コウボク(厚朴)3G・ソ	散剤	顆粒	
○	○	○				半夏厚朴湯	ハンゴウコウボクトウ	東洋漢方製薬(株)	半夏厚朴湯	ハンゴウ6G、ブクリョウ5G、コウボク3G、ソヨウ2G、ショウキョウ1G	散剤	錠	その他
○	○	○				半夏厚朴湯Aエキス細粒三和生薬	ハンゴウコウボクトウAエキスサイリョウサンワショウヤク	三和生薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス2.6G(ハンゴウ6G・ブクリョウ5G・ショウキョウ1G・コウボク3G・ソヨウ2G)	散剤	細粒	
○	○	○				半夏厚朴湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ハンゴウコウボクトウAエキスサイリョウブンポウサンワショウヤク	三和生薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス2.6G(ハンゴウ6G・ブクリョウ5G・ショウキョウ1G・コウボク3G・ソヨウ2G)	散剤	細粒	湧永製薬(株)
○	○	○				半夏厚朴湯エキス顆粒KM	ハンゴウコウボクトウエキスカリョウKM	北日本製薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス2.5G(ハンゴウ6G・ブクリョウ5G・コウボク3G・ソヨウ2G・ショウキョウ1G)	散剤	顆粒	一元製薬(株)
○	○	○				半夏厚朴湯エキス(細粒)51	ハンゴウコウボクトウエキスサイリョウ51	松浦薬業株式会社	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12量)1.5G(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ソヨウ1G・ショウキョウ0.5G)	散剤	錠	
○	○	○				半夏厚朴湯エキス細粒G「コタロー」	ハンゴウコウボクトウエキスサイリョウGコタロー	小太郎漢方製薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(45量)1.76G(ハンゴウ4.8G・ブクリョウ4G・ショウキョウ0.8G・コウボク2.4G・ソヨウ1.6G)	散剤	細粒	
○	○	○				半夏厚朴湯エキス錠(大峰)	ハンゴウコウボクトウエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12量)1400MG(ハンゴウ3G・ブクリョウ2.5G・コウボク1.5G・ショウキョウ0.5G・ソヨウ1G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○				半夏厚朴湯エキス錠「クラシエ」	ハンゴウコウボクトウエキスジョウクラシエ	大峰堂薬品工業(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12量)750mg(ハンゴウ3g、ブクリョウ2.5g、コウボク1.5g、ソヨウ1g、ショウキョウ0.65g)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○				半夏厚朴湯「タキザワ」	ハンゴウコウボクトウタキザワ	(株)タキザワ漢方	半夏厚朴湯	ハンゴウ6G、ソヨウ2G、ブクリョウ5G、ショウキョウ1G、コウボク3G	錠剤	錠	その他

J	A	P	I	C	PMDA	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	×					製版HPには掲載あり。半夏厚朴粒状	ハンゴクコボクリュウジョウ	長倉製薬(株)	半夏厚朴湯	ハンゲ15G、ブクリョウ1.25G、コウボク0.8G、ソヨウ0.5G、ショウキョウ0.20G、カンゾウ0.25G	顆粒		日邦薬品工業(株)
○	○	○					ハンゴクコーN「コタロー」	ハンゴクコーNコタロー	小太郎漢方製薬(株)	半夏厚朴湯	1.6G(ハンゲ4G・ブクリョウ3.33G・コウボク2G・ソヨウ1.33G・ショウキョウ0.67G)	錠剤	錠	
○	○	○					ホノミアンセイ錠	ホノミアンセイジョウ	刑盛堂薬品(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12錠) 0.77G(コウボク1.5G・ショウキョウ0.5G・ソヨウ1G・ハンゲ3G・ブクリョウ2.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					ホノミアンセイ粒	ホノミアンセイツブ	刑盛堂薬品(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(12錠) 0.77G(コウボク1.5G・ショウキョウ0.5G・ソヨウ1G・ハンゲ3G・ブクリョウ2.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○	×				ホリエの半夏厚朴湯	ホリエノハンゴクコボクトウ	堀江生薬(株)	半夏厚朴湯	ハンゲ6G、ブクリョウ5G、コウボク3G、ソヨウ2G、ショウキョウ1G	煎剤		
○	○	○					JPS漢方顆粒-40号	JPSカンボクカリュウ-40ゴウ	ジェー・ピー・エス製薬(株)	半夏厚朴湯	半夏厚朴湯エキス(45錠) 3.68G(ハンゲ4G・オウゴン2G・ショウキョウ2G・ニンジン2G・カンゾウ2G・タイソウ2G・オウゴン2G)	散剤	錠	
○	○	○					JPS半夏湯エキス錠N	JPSハンゴクシャシントウエキスジョウN	ジェー・ピー・エス製薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス2.3G(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・ショウキョウ1.25G・ニンジン1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G)	散剤	錠	
○	○	○					ウチダの中健和	ウチダノチュウケンワ	(株)ウチダ和漢薬	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス2.3G(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・ニンジン1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G・カンキョウ1.25G)	散剤	顆粒	
○	○	○					ウチダの半夏湯心湯	ウチダノハンゴクシャシントウ	(株)ウチダ和漢薬	半夏湯心湯	ハンゲ、オウゴン、ニンジン、カンゾウ、タイソウ etc.	その他	煎剤	
○	○	○					ウチダの半夏湯心湯エキス散	ウチダノハンゴクシャシントウエキスサン	(株)ウチダ和漢薬	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス2.3G(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・ニンジン1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G・オウレン0.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○					鶴寿(エキス顆粒)	カクジュキエキスカリョウ	(株)建林松鶴堂	半夏湯心湯	水製エキス(乾燥エキス) 1.6G(ハンゲ2G・オウゴン1.25G・ショウキョウ1G・ニンジン1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G)	散剤	顆粒	
○	○	○					三共胃腸薬「漢方」	サンキョウイチュウヤクカンボウ	第一三共ヘルスケア(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(12錠) 1.85G(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・カンキョウ1.25G・ニンジン1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G)	散剤	錠	
○	○	○					錠剤半夏心湯	ジョウザイハンゴクシャシントウ	一元製薬(株)	半夏湯心湯	オウゴン末2.5G、カンゾウ末2.5G、オウレン末2.5G、ショウキョウ末1.5G、ハンゲ末5G、ニンジン末2G、タイソウ末2.5G、	錠剤	錠	(株)イテゲン
○	○	×					神農半夏湯心湯エキス錠	シンノウハンゴクシャシントウエキスジョウ	神農製薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(12錠) 2.3G(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・カンキョウ1.25G・ニンジン1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G・オウレン0.5G)			
○	○	○					ストレージタイプG	ストレージタイプG	(株)ツムラ	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(12錠) 2.25G(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・カンキョウ(乾姜) 1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G)	散剤	顆粒	武田コンシューマーヘルスケア(株)
○	○	○					ツムラ漢方半夏湯心湯エキス顆粒	ツムラカンボクハンゴクシャシントウエキスカリョウ	(株)ツムラ	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(12錠) 2.25G(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G・ニンジン1.25G・カンキョウ)	散剤	顆粒	
○	○	○					東洋の半夏湯心湯エキス顆粒	トウヨウノハンゴクシャシントウエキスカリョウ	東洋漢方製薬(株)	半夏湯心湯	水製乾燥エキス3.44G(ハンゲ5G・オウゴン2.5G・カンキョウ2.5G・ニンジン2.5G・カンゾウ2.5G・タイソウ2.5G・オウレ)	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○					東洋の半夏湯心湯エキス顆粒(分包)	トウヨウノハンゴクシャシントウエキスカリョウブンボウ	東洋漢方製薬(株)	半夏湯心湯	水製乾燥エキス3.44G(ハンゲ5G・オウゴン2.5G・カンキョウ2.5G・ニンジン2.5G・カンゾウ2.5G・タイソウ2.5G・オウレ)	散剤	顆粒	日邦薬品工業(株)
○	○	○					半夏湯心湯	ハンゴクシャシントウ	東洋漢方製薬(株)	半夏湯心湯	ハンゲ5G、オウゴン2.5G、ショウキョウ2.5G、チサツニンジン2.5G、カンゾウ2.5G、タイソウ2.5G、オウレン1G	その他	煎剤	日邦薬品工業株式会社
○	○	○					半夏湯心湯Aエキス細粒三和生薬	ハンゴクシャシントウAエキスサイリョウサンワシヨウヤク	三和生薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(45錠) 3.9G(ハンゲ4G・オウゴン2G・カンキョウ2G・ニンジン2G・カンゾウ2G・タイソウ2G・オウレ)	散剤	顆粒	
○	○	○					半夏湯心湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	ハンゴクシャシントウAエキスサイリョウブンボウサンワシヨウヤク	三和生薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(45錠) 3.9G(ハンゲ4G・オウゴン2G・カンキョウ2G・ニンジン2G・カンゾウ2G・タイソウ2G・オウレ)	散剤	錠	湧永製薬(株)
○	○	○					半夏湯心湯エキス顆粒KM	ハンゴクシャシントウエキスカリョウKM	北日本製薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス4.5G(ハンゲ5G・オウゴン2.5G・カンゾウ2.5G・カンキョウ2.5G・タイソウ2.5G・ニンジン2.5G・オウレ)	散剤	顆粒	一元製薬(株)
○	○	○					半夏湯心湯エキス顆粒「クラシエ」	ハンゴクシャシントウエキスカリョウクラシエ	大峰堂薬品工業(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(12錠) 2000MG(オウレン0.5G・ハンゲ2.5G・ニンジン1.25G・オウゴン1.25G・ショウキョウ1.25G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○					半夏湯心湯エキス顆粒【東洋】分包	ハンゴクシャシントウエキスカリョウトウヨウブンボウ	(株)東洋薬行	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス3G(ハンゲ5G・オウゴン2.5G・カンキョウ2.5G・ニンジン2.5G・カンゾウ2.5G・タイソウ2.5G・オウレ)	散剤	顆粒	
○	○	○					半夏湯心湯エキス(細粒) 53	ハンゴクシャシントウエキスサイリョウ53	松浦薬業株式会社	半夏湯心湯	半夏湯心湯水製エキス3.5G(乾燥物換算約1.4G)(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・カンキョウ1.25G・ニンジン1.25G・カン)	散剤	錠	
○	○	○					半夏湯心湯エキス散(勝昌)	ハンゴクシャシントウエキスサンショウシヨウ	(株)東洋薬行	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス3G(ハンゲ5G・オウゴン2.5G・カンキョウ2.5G・ニンジン2.5G・カンゾウ2.5G・オウレン1G・タイソウ1.8G)	散剤	錠	
○	○	○					半夏湯心湯エキス錠Fクラシエ	ハンゴクシャシントウエキスジョウFクラシエ	クラシエ製薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(34錠) 2890mg(オウレン0.75g・ハンゲ3.75g・ニンジン1.875g・オウゴン1.875g・ショウキョウ1.875g・カンゾウ1.875g)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○					半夏湯心湯エキス錠(大峰)	ハンゴクシャシントウエキスジョウオオミナ	大峰堂薬品工業(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(12錠) 2000MG(ハンゲ2.5G・オウゴン1.25G・ショウキョウ1.25G・ニンジン1.25G・カンゾウ1.25G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○					半夏湯心湯「タキザワ」	ハンゴクシャシントウタキザワ	(株)タキザワ漢方廠	半夏湯心湯	ハンゲ5G、オウゴン2.5G、ショウキョウ2.5G、ニンジン2.5G、カンゾウ2.5G、タイソウ2.5G、オウレン1G	その他	煎剤	
○	○	○					ハンシャン「コタロー」	ハンシャンNコタロー	小太郎漢方製薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス散(23錠) 2.8G(ハンゲ3.33G・オウゴン1.67G・カンキョウ1.67G・ニンジン1.67G・カンゾウ1.67G・タイソウ1.67G)	錠剤	錠	
○	○	○					ホノミイチュウ錠	ホノミイチュウジョウ	刑盛堂薬品(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス(12錠) 1.38G(オウゴン1.25G・オウレン0.5G・カンキョウ1.25G・カンゾウ1.25G・タイソウ1.25G・ニン)	錠剤	錠	
○	○	○	×				ホリエ半夏湯心湯	ホリエハンゴクシャシントウ	堀江生薬(株)	半夏湯心湯	ハンゲ5G、オウゴン2.5G、ショウキョウ0.25G、ニンジン2.5G、カンゾウ2.5G、タイソウ2.5G、オウレン1G	煎剤		
○	○	○					モリ漢方胃腸薬	モリカンボクイチュウヤク	大杉製薬(株)	半夏湯心湯	半夏湯心湯エキス3.4G(ハンゲ(半夏) 5G・オウゴン(黄貢) 2.5G・カンキョウ(乾姜) 2.5G・ニンジン(人參) 2.5G・オウゴン2.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○					JPS漢方顆粒-44号	JPSカンボクカリュウ-44ゴウ	ジェー・ピー・エス製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯乾燥エキス2.24G(ポウイ4G・オウギ4G・ソウジュツ2.4G・タイソウ2.4G・ショウキョウ0.8G・カンゾウ1.2G)	散剤	錠	
○	○	○					JPS防已黄耆湯エキス錠N	JPSポウイオウギトウエキスジョウN	ジェー・ピー・エス製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯乾燥エキス2.24G(ポウイ4G・オウギ4G・ソウジュツ2.4G・タイソウ2.4G・ショウキョウ0.8G・カンゾウ1.2G)	錠剤	錠	
○	○	○					アクリアEX	アクリアEX	小林製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス	錠剤	錠	
○	○	○					ウェルクスB	ウェルクスB	帝國漢方製薬株式会社	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス	散剤	顆粒	テイコクファルマクア株式会社
○	○	○					ウチダの表温清湯	ウチダノヒョウシツセイチュウ	(株)ウチダ和漢薬	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス2.65G(ポウイ2.5G・オウギ2.5G・ソウジュツ1.5G・ショウキョウ0.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G)	散剤	顆粒	
○	○	○					ウチダの防已黄耆湯	ウチダノボウイオウギトウ	(株)ウチダ和漢薬	防已黄耆湯	ポウイ5G、オウギ5G、ソウジュツ3G、タイソウ3G、カンゾウ1.5G、ショウキョウ1G	その他	煎剤	
○	○	○					ウチダの防已黄耆湯エキス散	ウチダノボウイオウギトウエキスサン	(株)ウチダ和漢薬	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス2.65G(ポウイ2.5G・オウギ2.5G・ソウジュツ1.5G・ショウキョウ0.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G)	散剤	顆粒	
○	○	×					薬日本堂防已黄耆湯エキス錠	クスリニホンドウボウイオウギトウエキスジョウ	大塚薬品(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス末2.35G(ポウイ(防已) 2.5G・オウギ(黄耆) 2.5G・ビャクジュツ(白朮) 1.5G・ショウキョウ(生薬) 1G・タイソウ)	散剤	錠	0.5G・タイソウ(大塚) 1.5G・カンゾウ(甘藷) 0.75G)
○	○	○					コッコアポL錠	コッコアポLジョウ	クラシエ製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス粉末3200MG(ポウイ5G・オウギ5G・ビャクジュツ3G・タイソウ3G・カンゾウ1.5G・ショウキョウ1G)	錠剤	フィルムコー	クラシエ薬品(株)
○	○	○					サンワ防已黄耆湯エキス細粒	サンワボウイオウギトウエキスサイリョウ	三和生薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯水製エキス2G(ポウイ3G・オウギ3G・ソウジュツ1.8G・タイソウ1.8G・ショウキョウ0.6G・カンゾウ0.9G)	散剤	顆粒	
○	○	○					サンワ防已黄耆湯エキス細粒「分包」	サンワボウイオウギトウエキスサイリョウブンボウ	三和生薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯水製エキス2G(ポウイ3G・オウギ3G・ソウジュツ1.8G・タイソウ1.8G・ショウキョウ0.6G・カンゾウ0.9G)	散剤	錠	
○	○	○					ジーフェルスリムL	ジーフェルスリムL	中村薬品工業(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス12錠1.3g(ポウイ・オウギ各2.5g、タイソウ・ビャクジュツ各1.5g、カンゾウ0.75g、ショウキョウ0.5g)	錠剤	錠	
○	○	○					松鶴堂(エキス顆粒)	ショウカクカクシキスカリョウ	(株)建林松鶴堂	防已黄耆湯	水製エキス(乾燥エキス) 1.8G(ポウイ2.8G・ビャクジュツ2.1G・タイソウ2.8G・オウギ3.5G・ショウキョウ0.7G・カンゾウ)	散剤	錠	
○	○	○					錠剤防已黄耆湯	ジョウザイボウイオウギトウ	一元製薬(株)	防已黄耆湯	オウギ末5.6G、ビャクジュツ末3.2G、ショウキョウ末3.2G、カンゾウ末1.7G、ポウイ末5.6G、タイソウ末3.2G、水性エキス	錠剤	錠	(株)イテゲン
○	○	×					神農防已黄耆湯エキス錠	シンノウボウイオウギトウエキスジョウ	神農製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯乾燥エキス2.24G(ポウイ4G・オウギ4G・ソウジュツ2.4G・タイソウ2.4G・ショウキョウ0.8G・カンゾウ1.2G)			
○	○	○					ツムラ漢方防已黄耆湯エキス顆粒	ツムラカンボクボウイオウギトウエキスカリョウ	(株)ツムラ	防已黄耆湯	乾燥エキス1.875G(オウギ2.5G・ポウイ2.5G・ソウジュツ1.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G・ショウキョウ0.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○					東洋の防已黄耆湯エキス顆粒S	トウヨウノボウイオウギトウエキスカリョウS	東洋漢方製薬(株)	防已黄耆湯	水製乾燥エキス1.6G(ポウイ2.5G・オウギ2.5G・ビャクジュツ1.5G・ショウキョウ0.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業株式会社
○	○	○					ハクスイトウ	ハクスイトウ	大杉製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス3.8G(ポウイ(防已) 5G・オウギ(黄耆) 5G・ビャクジュツ(白朮) 3G・ショウキョウ(生薬) 1G・タイソウ)	散剤	錠	
○	○	×					ピタドール 防已黄耆湯エキス錠「東亜」	ピタドールボウイオウギトウエキスジョウトウア	北日本製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯乾燥エキス1.9G(ポウイ2.5G・ビャクジュツ1.5G・カンゾウ0.75G・オウギ2.5G・タイソウ1.5G・ショウキョウ0.5G)			
○	○	○					ピトラックS	ピトラックS	東洋漢方製薬(株)	防已黄耆湯	水製乾燥エキス1.6G(ポウイ2.5G・オウギ2.5G・ビャクジュツ1.5G・ショウキョウ0.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G)	散剤	錠	日邦薬品工業(株)
○	○	○					防已黄耆湯	ボウイオウギトウ	東洋漢方製薬(株)	防已黄耆湯	ポウイ5G、オウギ5G、ビャクジュツ3G、タイソウ3G、カンゾウ1.5G、ショウキョウ1G	その他	煎剤	日邦薬品工業(株)
○	○	○					防已黄耆湯エキス顆粒「クラシエ」	ボウイオウギトウエキスカリョウクラシエ	大峰堂薬品工業(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス1300MG(ポウイ2.5G・オウギ2.5G・ビャクジュツ1.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G・ショウキョウ0.75G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品(株)
○	○	○					防已黄耆湯エキス(細粒) 56	ボウイオウギトウエキスサイリョウ56	松浦薬業株式会社	防已黄耆湯	防已黄耆湯水製エキス3.4G(ポウイ2.5G・オウギ2.5G・ビャクジュツ1.5G・ショウキョウ0.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G)	散剤	錠	全業工業株式会社
○	○	○					防已黄耆湯エキス細粒G「コタロー」	ボウイオウギトウエキスサイリョウGコタロー	小太郎漢方製薬(株)	防已黄耆湯	水製エキス3.84G(オウギ4G・ポウイ4G・ビャクジュツ2.4G・ショウキョウ0.64G・タイソウ2.4G・カンゾウ1.2G)	散剤	錠	
○	○	○					防已黄耆湯エキス錠Fクラシエ	ボウイオウギトウエキスジョウFクラシエ	クラシエ製薬(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス粉末3200MG(ポウイ5G・オウギ5G・ビャクジュツ3G・タイソウ3G・カンゾウ1.5G・ショウキョウ1G)	錠剤	錠	クラシエ薬品(株)
○	○	○					防已黄耆湯エキス錠(大峰)	ボウイオウギトウエキスジョウオオミナ	大峰堂薬品工業(株)	防已黄耆湯	防已黄耆湯エキス1300MG(ポウイ2.5G・オウギ2.5G・ビャクジュツ1.5G・タイソウ1.5G・カンゾウ0.75G・ショウキョウ0.75G)	錠剤	錠	日邦薬品工業(株)

J	A	P	M	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実効成分	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○			ピラシム	ピラシム	東洋漢方製薬 (株)	防風通聖散	水製乾燥エキス3G (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G・ショウキョウ0.6G)	錠	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			ベラミSF	ベラミSF	聖薬化学工業 (株)	防風通聖散	防風通聖散乾燥エキス1.52G (トウキ0.6G・センキュウ0.6G・レンギョウ0.6G・ケイガイ0.6G・マオウ0.6G・キキョウ1G)	錠	錠	
○	○	×			防風通聖散	ボクフツウツウショウサン	(有)杉原達二商店	防風通聖散	オウゴン7.2G, カッセキ10G, カンゾウ7.2G, キキョウ7.2G, ケイガイ4.5G, サンシシ4.5G, シヤクヤク4.5G, ショウキョウ4.5G, セツ	散	散	
○	○	○			防風通聖散エキスZ錠クラシエ	ボクフツウツウショウサンエキスZジョウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散エキス6000MG (トウキ1.2G・シヤクヤク1.2G・センキュウ1.2G・サンシシ1.2G・レンギョウ1.2G・ハッカ1.2G)	錠	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			防風通聖散エキス (細粒) 57	ボクフツウツウショウサンエキスサイリウ57	松浦薬業株式会社	防風通聖散	防風通聖散水製エキス5.4G (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G)	錠	細粒	
○	○	○			防風通聖散エキス細粒G「コタロー」	ボクフツウツウショウサンエキスサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	防風通聖散	水製エキス4.8G (トウキ0.96G・シヤクヤク0.96G・センキュウ0.96G・サンシシ0.96G・レンギョウ0.96G・ハッカ0.96G)	散	錠	
○	○	○			防風通聖散エキス錠N「コタロー」	ボクフツウツウショウサンエキスジョウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	防風通聖散	エキス散3.6G (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G・ショウキョウ0.6G)	錠	錠	
○	○	○			防風通聖散エキス錠 (大峰)	ボクフツウツウショウサンエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	防風通聖散	防風通聖散エキス粉末2750MG (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G)	錠	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			防風通聖散錠DK	ボクフツウツウショウサンジョウDK	OJAS PHARMA (株)	防風通聖散	防風通聖散エキス(1625錠)	錠	錠	
○	○	×		製版HPには掲載あり。	防風通聖散粒状	ボクフツウツウショウサンリョウジョウ	長倉製薬 (株)	防風通聖散	トウキ0.3G, サンシシ0.3G, センキュウ0.3G, レンギョウ0.3G, ショウキョウ0.2G, ケイガイ0.3G, ハマボウフ0.3G, マオウ0.3G, ダイ	錠	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			防風通聖散料	ボクフツウツウショウサンリョウ	東洋漢方製薬 (株)	防風通聖散	トウキ1.2G, シヤクヤク1.2G, センキュウ1.2G, サンシシ1.2G, ショウキョウ0.4G, ハマボウフ0.4G, マオウ1.2G, ダイ	錠	その他	日邦薬品工業 (株)
○	○	○			防風通聖散料Aエキス細粒三和生薬	ボクフツウツウショウサンリョウAエキスサイリウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料A水製エキス4G (トウキ0.84G・シヤクヤク0.84G・センキュウ0.84G・サンシシ0.84G・レンギョウ0.84G)	散	細粒	
○	○	○			防風通聖散料Aエキス細粒「分包」三和生薬	ボクフツウツウショウサンリョウAエキスサイリウブンボウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料A水製エキス4G (トウキ0.84G・シヤクヤク0.84G・センキュウ0.84G・サンシシ0.84G・レンギョウ0.84G)	散	細粒	
○	○	○			防風通聖散料Aエキス錠三和生薬	ボクフツウツウショウサンリョウAエキスジョウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料A水製エキス2.7G (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G)	錠	錠	
○	○	○			防風通聖散料エキス顆粒KM	ボクフツウツウショウサンリョウエキスカリウKM	北日本製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料水製乾燥エキス4.5G (カッセキ3G・オウゴン2G・カンゾウ2G・キキョウ2G・セッコウ2G・ビヤクジュツ2G)	錠	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○			防風通聖散料エキス顆粒クラシエ	ボクフツウツウショウサンリョウエキスカリウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料エキス粉末2850MG (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッ	散	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			防風通聖散料エキス細粒 (勝昌)	ボクフツウツウショウサンリョウエキスサイリウショウショウ	(株) 東洋薬行	防風通聖散	防風通聖散料水製エキス4G (トウキ1.2G・シヤクヤク1.2G・センキュウ1.2G・サンシシ1.2G・レンギョウ1.2G・ハッカ1.2G)	散	細粒	
○	○	○			防風通聖散料エキス錠クラシエ	ボクフツウツウショウサンリョウエキスジョウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料エキス粉末2850MG (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッ	錠	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○			防風通聖散料エキス錠「至聖」	ボクフツウツウショウサンリョウエキスジョウシセイ	北日本製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス6G (トウキ1.2G・シヤクヤク1.2G・センキュウ1.2G・サンシシ1.2G・レンギョウ1.2G・ハッカ1.2G)	錠	錠	
○	○	○			防風通聖散料エキス錠「創至聖」	ボクフツウツウショウサンリョウエキスジョウソクシセイ	北日本製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料エキス4G (トウキ0.8G・シヤクヤク0.8G・センキュウ0.8G・サンシシ0.8G・レンギョウ0.8G・ハッカ0.8G)	錠	錠	
○	○	○			防風通聖散料エキス錠「東亜」	ボクフツウツウショウサンリョウエキスジョウトウア	北日本製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス3G (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G)	錠	錠	
○	○	○			防風通聖散料エキス錠「摩葉」	ボクフツウツウショウサンリョウエキスジョウネイヤク	聖薬化学工業 (株)	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス	錠	錠	
○	○	○			防風通聖散料「タキザワ」	ボクフツウツウショウサンリョウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	防風通聖散	トウキ1.5G, レンギョウ1.5G, ポウフク1.5G, ビヤクジュツ2G, カンゾウ2G, シヤクヤク1.5G, ハッカ1.5G, マオウ1.5G	錠	その他	
○	○	○			ポーテーステージA	ポーテーステージA	中村薬品工業 (株)	防風通聖散	防風通聖散エキス粉末2750MG (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G)	錠	錠	
○	○	×			ポーテーステージG	ポーテーステージG	中村薬品工業 (株)	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス3300MG (トウキ0.72G・マオウ0.72G・シヤクヤク0.72G・ダイオウ0.9G・センキュウ0.72G・乾燥硫酸ナトリウム0.45G)	錠	錠	サンシシ0.72G・ビヤクジュツ1.2G・レンギョウ
○	○	○			ポーソーンN「コタロー」	ポーソーンN「コタロー」	小太郎漢方製薬 (株)	防風通聖散	エキス散3.6G (トウキ0.6G・シヤクヤク0.6G・センキュウ0.6G・サンシシ0.6G・レンギョウ0.6G・ハッカ0.6G・ショウキョウ0.6G)	錠	錠	
○	○	○			ホリミサンインジョウ	ホリミサンインジョウ	利都盛堂薬品 (株)	防風通聖散	防風通聖散料エキス2G (オウゴン1G・カッセキ1.5G・カンゾウ1G・キキョウ1G・ケイガイ0.6G・サンシシ0.6G・シヤクヤク1.2G)	錠	錠	
○	○	×			ホリエ白濁湯	ホリエハクホトウ	福江生薬 (株)	防風通聖散	トウキ1.2G, シヤクヤク1.2G, センキュウ1.2G, マオウ1.2G, ハッカ1.2G, レンギョウ1.2G, ケイガイ1.2G, ポウフク1.2G	錠	錠	
○	○	○			本草防風通聖散エキス顆粒-H	ホンゾクボクフツウツウショウサンエキスカリウH	本草製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散水製乾燥エキス末3.33G (キキョウ1.33G・ビヤクジュツ1.33G・カンゾウ1.33G・オウゴン1.33G・セッコウ1.33G)	散	顆粒	
○	○	○			本草防風通聖散エキス錠-H	ホンゾクボクフツウツウショウサンエキスジョウH	本草製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散水製乾燥エキス末2.5G (キキョウ1G・ビヤクジュツ1G・カンゾウ1G・オウゴン1G・セッコウ1G・ダイオウ0.75G)	錠	錠	ゲンキー (株)
○	○	○			マストラックII	マストラックII	(株) 阪本漢法製薬	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス3000MG (キキョウ1.2G・ビヤクジュツ1.2G・カンゾウ1.2G・オウゴン1.2G・セッコウ1.2G・ダイ	錠	錠	
○	○	○			マストラックSS	マストラックSS	(株) 阪本漢法製薬	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス4000MG (キキョウ1600MG・ビヤクジュツ1600MG・カンゾウ1600MG・オウゴン1600MG・セツ	錠	錠	
○	○	○			マストラックゴールド	マストラックゴールド	(株) 阪本漢法製薬	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス5000MG (キキョウ2G, ビヤクジュツ2G, カンゾウ2G, セッコウ2G, ダイオウ1.5G, トウ	錠	錠	
○	○	×			メタシゲン	メタシゲン	薬王製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス	錠	錠	
○	○	○			モリ カッコモン	モリカッコモン	大杉製薬 (株)	防風通聖散	防風通聖散エキス5.2G (トウキ (当帰) 1.2G・シヤクヤク (芍薬) 1.2G・センキュウ (川キョウ) 1.2G・サンシシ (山梔子) 1.2G)	散	錠	
○	○	○			ラーメンドF	ラーメンドF	聖薬化学工業 (株)	防風通聖散	防風通聖散料乾燥エキス1.52G (トウキ0.6G・センキュウ0.6G・レンギョウ0.6G・ケイガイ0.6G・マオウ0.6G・キキョウ1G)	錠	錠	
○	○	×			香宝丸		北宝薬品 (株)	防風通聖散	防風通聖散料水製エキス1.28G (トウキ0.6G・サンシシ0.6G・マオウ0.6G・センキュウ0.6G・ハッカ0.6G・ボウフク0.6G・シヤクヤク0.6G)	錠	錠	レンギョウ0.6G・ケイガイ0.6G・ダイオウ0.75G
○	○	○			JPS漢方顆粒-46号	JPSカンボウカリウ-46ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (45錠) 3.76G (ニンジン3.2G・ソウジュツ3.2G・オウギ3.2G・トウキ2.4G・チンピ1.6G・タイソウ1.6G)	散	液	
○	○	○			JPS補中益気湯液	JPSホチュウエキツトウエキ	ジェービーエス製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス12G (ニンジン4G・ソウジュツ4G・オウギ4G・トウキ3G・チンピ2G・タイソウ2G・サイコ1G・カンゾ	液	液	
○	○	○			JPS補中益気湯エキス錠N	JPSホチュウエキツトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12錠) 2.35G (ニンジン2G・ソウジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・サイコ	錠	錠	
○	○	○			薬王湯エキス錠	イオトウエキスジョウ	薬王製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (120錠) 2870MG (ニンジン2.2G・ビヤクジュツ2.2G・オウギ2.2G・トウキ1.65G・チンピ1.1G・タイ	錠	錠	
○	○	○			ウチダの補中益気湯	ウチダノホチュウエキツトウ	(株) ウチダ和漢薬	補中益気湯	オウギ4G, ニンジン4G, ビヤクジュツ4G, トウキ3G, チンピ2G, タイソウ2G, カンゾウ1.5G, サイコ1G, ショウキョウ0.6G	錠	その他	
○	○	○			ウチダの補中益気湯エキス散	ウチダノホチュウエキツトウエキスサン	(株) ウチダ和漢薬	補中益気湯	補中益気湯エキス3.3G (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・カンゾウ0.75G)	散	錠	
○	○	○			ウチダの保中回帰	ウチダノホチュウカイキ	(株) ウチダ和漢薬	補中益気湯	補中益気湯エキス3.3G (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・カンゾウ0.75G)	散	錠	
○	○	○			悦我「分包」	エツガブ「ボウ」	太虎精堂製薬株式会社	補中益気湯	補中益気湯エキス (35錠) 3.6G (ニンジン2.4G・ビヤクジュツ2.4G・オウギ2.4G・トウキ1.8G・チンピ1.2G・タイソウ1.2G)	錠	錠	
○	○	○			漢方漢維煎劑補中益気湯41	カンボウノウシヤクセンザイホチュウエキツトウ41	松浦薬業株式会社	補中益気湯	補中益気湯抽出物7.4G (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・サイコ1G・チンピ1G・タイソウ1G・シ	錠	錠	その他
○	○	○			錠劑補中益気湯	ジョウザイホチュウエキツトウ	一元製薬 (株)	補中益気湯	オウギ末4.8G, ビヤクジュツ末4.8G, トウキ末3.2G, カンゾウ末2.4G, ショウキョウ末1.2G, ニンジン末4.8G, ショウマ末	錠	錠	(株) イチゲン
○	○	×			神農補中益気湯エキス錠	シンノウホチュウエキツトウエキスジョウ	神農製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12錠) 2.35G (ニンジン2G・ソウジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・サイコ0.5G・カンゾ	錠	錠	0.75G・ショウキョウ0.25G・ショウマ0.25G)
○	○	×		製版HPには掲載あり。	調膏 (エキス顆粒)	チョウジョウエキスカリウ	(株) 建林松鶴堂	補中益気湯	補中益気湯エキス (12錠) 1.6G (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ1.5G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・サイコ1G・カン	錠	錠	
○	○	○			ツムラ漢方補中益気湯エキス顆粒	ツムラカンボウホチュウエキツトウエキスカリウ	(株) ツムラ	補中益気湯	補中益気湯エキス (12錠) 2.5G (オウギ2G・ソウジュツ2G・ニンジン2G・トウキ1.5G・サイコ1G・タイソウ1G・チンピ1G)	錠	錠	
○	○	×		製版HPには掲載あり。	花扇補中益気湯	ハナオウギホチュウエキツトウ	小西製薬 (株)	補中益気湯	ニンジン4G, ビヤクジュツ4G, オウギ4G, トウキ3G, チンピ2G, ショウキョウ0.5G, タイソウ2G, サイコ1G, カンゾウ1.5G, ショウ	錠	錠	
○	○	○			ホエキンN「コタロー」	ホエキンNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス散 (12錠) 4.2G (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・サイ	錠	錠	
○	○	○			補中益気湯	ホチュウエキツトウ	東洋漢方製薬 (株)	補中益気湯	ニンジン4G, ビヤクジュツ4G, オウギ3G, トウキ3G, タイソウ2G, サイコ1G, カンゾウ1G, ショウキョウ0.5G, ショウ	錠	錠	日邦薬品工業株式会社
○	○	○			補中益気湯Aエキス細粒三和生薬	ホチュウエキツトウAエキスサイリウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (710錠) 3.7G (ニンジン2.8G・ビヤクジュツ2.8G・オウギ2.1G・トウキ2.1G・チンピ1.4G・タイソウ1.4G)	散	錠	
○	○	○			補中益気湯Aエキス錠三和生薬	ホチュウエキツトウAエキスジョウサンフショウヤク	三和生薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (710錠) 3.7G (ニンジン2.8G・オウギ2.1G・チンピ1.4G・ショウキョウ0.35G・カンゾウ1.06G・ビヤク	錠	錠	湧永製薬 (株)
○	○	○			補中益気湯エキス錠KM	ホチュウエキツトウエキスカリウKM	北日本製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12錠) 2.8G (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ1.5G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・サイ	錠	錠	
○	○	○			補中益気湯エキス錠クラシエ	ホチュウエキツトウエキスカリウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12錠) 3200MG (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ2G・タイソウ1G・サイコ1G・チンピ1G・トウ	錠	錠	一元製薬 (株)
○	○	○			補中益気湯エキス顆粒【東洋】分包	ホチュウエキツトウエキスカリウトウオウブンボウ	(株) 東洋薬行	補中益気湯	補中益気湯水製エキス (「漢方診療の実際」) 4G (ニンジン4G・ビヤクジュツ4G・オウギ4G・トウキ3G・チンピ2G・タイ	散	錠	
○	○	○			補中益気湯エキス (細粒) 58	ホチュウエキツトウエキスサイリウ58	松浦薬業株式会社	補中益気湯	補中益気湯エキス (12錠) 5.4G (乾燥物換算約2.7G) (ニンジン2G・ビヤクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G)	散	錠	

J	A	P	M	D	A	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	○					補中益気湯エキス錠G「コタロー」	ホチュウエッキトウエキサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (45量) 5.6G (ニンジン3.2G・ビャクジュツ3.2G・オウギ3.2G・トウキ2.4G・チンピ1.6G・タイソウ1.6G)	散剤	細粒	
○	○	○					補中益気湯エキス散 (勝昌)	ホチュウエッキトウエキサンショウショウ	(株) 東洋薬行	補中益気湯	補中益気湯水製エキス (「漢方処方用薬」) 3G (ニンジン4G・ビャクジュツ4G・オウギ3G・トウキ3G・チンピ2G)	散剤	散	
○	○	○					補中益気湯エキス錠N「コタロー」	ホチュウエッキトウエキSジョウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス錠 (12量) 4.2G (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G・サイコ1G)	錠剤	錠	
○	○	○					補中益気湯エキス錠 (大峰)	ホチュウエッキトウエキSジョウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12量) 2370MG (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・タイソウ1G・サイコ1G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○					補中益気湯エキス錠クラシエ	ホチュウエッキトウエキSジョウクラシエ	クラシエ製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12量) 3200MG (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・タイソウ1G・サイコ1G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					補中益気湯錠 T 4 1	ホチュウエッキトウジョウT 4 1	中村薬品工業株式会社	補中益気湯	補中益気湯エキス(12量)	錠剤	錠	株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ
○	○	○					補中益気湯「タキザワ」	ホチュウエッキトウタキザワ	(株) タキザワ漢方	補中益気湯	ニンジン4G、ソウジュツ4G、オウギ4G、トウキ3G、チンピ2G、タイソウ2G、サイコ1G、カンゾウ1.5G、ショウキョウ0.4G	その他	煎剤	
○	○	×				製販HPには掲載あり。	補中益気粒状	ホチュウエッキリウジョウ	長倉製薬 (株)	補中益気湯	ニンジン0.6G、トウキ0.6G、ビャクジュツ0.6G、カンゾウ0.5G、カンピ0.5G、サイコ0.4G、ショウマ0.3G、オウキ0.8G、ショウキョウ0.4G	その他	煎剤	日邦薬品工業 (株)
○	○	○					ホノミホイ錠	ホノミホイジョウ	刑盛堂薬品 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12量) 1.7G (オウギ2G・カンゾウ0.75G・サイコ0.5G・ショウキョウ0.25G・ショウマ0.25G・タイソウ1G)	錠剤	錠	
○	○	×					ホリエ補中益気湯	ホリエホチュウエッキトウ	堀江生薬 (株)	補中益気湯	ニンジン4G、ビャクジュツ4G、オウギ3G、トウキ3G、チンピ2G、タイソウ2G、サイコ1G、カンゾウ1G、ショウキョウ0.5G、ショウマ0.5G	錠剤	錠	
○	○	○					モリ エーボン	モリエーボン	大杉製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス6.2G (オウギ (黄耆) 4G・ニンジン (人參) 4G・ビャクジュツ (白朮) 4G・トウキ (当帰) 3G・チンピ 2G)	錠剤	錠	
○	○	○					薬主補中益気湯エキス錠	ヤクオウホチュウエッキトウエキSジョウ	薬主製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス(1120量)2.87g (ニンジン・ビャクジュツ・オウギ各2.2g、トウキ1.65g、チンピ・タイソウ・サイコ各1.1g)	錠剤	錠	
○	○	○					リハビット	リハビット	大峰堂薬品工業 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス(12量)2370mg (ニンジン・ビャクジュツ・オウギ各2g、トウキ1.5g、チンピ・タイソウ・サイコ各1g、カンゾウ1.5g)	錠剤	錠	ロート製薬 (株)
○	○	○					標方昇陽顆粒	リョウホシヨウヨウカリュウ	クラシエ製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12量) 3200MG (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・チンピ1G・タイソウ1G)	錠剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					ロート補中益気湯錠	ロートホチュウエッキトウジョウ	大峰堂薬品工業 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12量) 2.37G (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・タイソウ1G・サイコ1G)	錠剤	錠	ロート製薬 (株)
○	○	○					ワカゲン錠	ワカゲンジョウ	クラシエ製薬 (株)	補中益気湯	補中益気湯エキス (12量) 3200MG (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・オウギ2G・トウキ1.5G・タイソウ1G・サイコ1G)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					JPS漢方顆粒-47号	JPSカンボウカリュウ-47ゴウ	ジェビーエス製薬 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス (45量) 1.36G (マオウ4G・キョウニン4G・ケイヒ3.2G・カンゾウ1.2G)	散剤	顆粒	
○	○	○					JPS麻黄湯エキス錠N	JPSマオウトウエキSジョウN	麻黄湯	麻黄湯エキス	錠剤	錠		
○	○	○					一元乃錠麻黄湯	イチゲンジョウザイマオウトウ	一元製薬 (株)	麻黄湯	乾燥エキス1400MG (マオウ5000MG・キョウニン5000MG・ケイヒ4000MG・カンゾウ1500MG)	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○					ウチダの麻黄湯	ウチダノマオウトウ	(株) ウチダ和漢薬	麻黄湯	マオウ、キョウニン、ケイヒ、カンゾウ	その他	煎剤	
○	○	○					ウチダの麻黄湯エキス散	ウチダノマオウトウエキサン	株式会社ウチダ和漢薬	麻黄湯	麻黄湯エキス	散剤	細粒	
○	○	○					漢方かぜ顆粒MZ	カンボウカゼカリュウMZ	ジェビーエス製薬 (株)	麻黄湯	麻黄湯乾燥エキス2.1g (マオウ・キョウニン各5.0g、ケイヒ4.0g、カンゾウ1.5g)	散剤	錠	
○	○	○					漢方かぜ内服液「M」	カンボウカゼナイフエキM	新生薬品工業 (株)・奈	麻黄湯	麻黄湯エキス81ML (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	液剤	液	(株) ツムラ
○	○	○					「クラシエ」漢方麻黄湯エキス顆粒	クラシエカンボウマオウトウエキスカリュウ	クラシエ製薬 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス (12量) 800MG (マオウ2.5G・キョウニン2.5G・ケイヒ2G・カンゾウ0.75G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					「クラシエ」漢方麻黄湯エキス顆粒i	クラシエカンボウマオウトウエキスカリュウi	クラシエ製薬 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス (34量) 1200MG (マオウ3.75G・キョウニン3.75G・ケイヒ3G・カンゾウ1.125G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					コルゲンコーワ液体かぜ薬	コルゲンコーワエキタイカゼグスリ	興和株式会社	麻黄湯	麻黄湯エキス81ML (マオウ5G・ケイヒ4G・キョウニン5G・カンゾウ1.5G)	液剤	液	
○	○	○					コルゲンコーワ顆粒かぜ薬	コルゲンコーワカリュウカゼグスリ	興和株式会社	麻黄湯	麻黄湯エキス1.92G (マオウ5G・ケイヒ4G・キョウニン5G・カンゾウ1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○					阪本漢法の麻黄湯顆粒	サカモトカンボウマオウトウカリュウ	(株) 阪本漢法製薬	麻黄湯	麻黄湯エキス1.92G (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○					サンワ麻黄湯エキス錠	サンワマオウトウエキサイリウ	三和生薬 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス1.4G (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○					サンワ麻黄湯エキス錠粒「分包」	サンワマオウトウエキサイリウブンボウ	三和生薬 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス1.4G (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	散剤	細粒	
○	○	○					ツムラ漢方内服液麻黄湯	ツムラカンボウナイフエキマオウトウ	新生薬品工業 (株)・奈	麻黄湯	麻黄湯エキス81ML (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	液剤	液	(株) ツムラ
○	○	○					ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒	ツムラカンボウマオウトウエキスカリュウ	麻黄湯	麻黄湯エキス (12量) 0.875G (キョウニン2.5G・マオウ2.5G・ケイヒ2G・カンゾウ0.75G)	散剤	顆粒		
○	○	○					東洋の麻黄湯エキス顆粒	トウヨウマオウトウエキスカリュウ	東洋漢方製薬 (株)	麻黄湯	水製乾燥エキス1.8G (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○					トチモトの麻黄湯	トチモトノマオウトウ	(株) 都本天海堂	麻黄湯	カンゾウ1.5G、キョウニン5G、ケイヒ4G、マオウ5G	散剤	煎剤	
○	○	○					ヒストミン麻黄湯液	ヒストミンマオウトウエキ	小林薬品工業 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス2.21g (マオウ5g、キョウニン5g、ケイヒ4g、カンゾウ1.5g)	液剤	錠	
○	○	×					ビタトレール 麻黄湯エキス [顆粒] A	ビタトレールマオウトウエキスカリュウA	御所薬舗 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス1.92G (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					ホノミキネ錠	ホノミキネジョウ	刑盛堂薬品 (株)	麻黄湯	麻黄湯水製エキス0.9G (カンゾウ0.75G・キョウニン2.5G・ケイヒ2G・マオウ2.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					ホリエの麻黄湯	ホリエノマオウトウ	堀江生薬 (株)	麻黄湯	マオウ5G、キョウニン5G、ケイヒ4G、カンゾウ1.5G	錠剤	錠	
○	○	○					麻黄湯	マオウトウ	東洋漢方製薬 (株)	麻黄湯	マオウ5G、キョウニン5G、ケイヒ4G、カンゾウ1.5G	錠剤	煎剤	
○	○	○					麻黄湯エキスEX錠クラシエ	マオウトウエキSEXジョウクラシエ	大峰堂薬品工業 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス(23量)1280mg (マオウ・キョウニン各3.33g、ケイヒ2.67g、カンゾウ1g)	錠剤	錠	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					麻黄湯エキス (細粒) 59	マオウトウエキサイリウ59	松浦薬業株式会社	麻黄湯	麻黄湯エキス (12量) 1.8G (マオウ2.5G・キョウニン2.5G・ケイヒ2G・カンゾウ0.75G)	散剤	細粒	
○	○	○					麻黄湯「タキザワ」	マオウトウタキザワ	(株) タキザワ漢方	麻黄湯	マオウ5G、ケイヒ4G、キョウニン5G、カンゾウ1.5G	錠剤	煎剤	
○	○	×				製販HPには掲載あり。	麻黄湯粒状	マオウトウリウジョウ	長倉製薬 (株)	麻黄湯	マオウ1.5G、ケイヒ1G、カンゾウ0.6G、キョウニン1.3G、水溶性乾燥エキス0.1G (マオウ1.5G)	錠剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○					[満量処方] 麻黄湯エキス顆粒A	マンリョウジョウホウマオウトウエキスカリュウA	御所薬舗 (株)	麻黄湯	マオウ5G、キョウニン5G、ケイヒ4G、カンゾウ1.5G	散剤	顆粒	
○	○	○					[満量処方] 麻黄湯エキス顆粒S	マンリョウジョウホウマオウトウエキスカリュウS	御所薬舗 (株)	麻黄湯	マオウ5G、キョウニン5G、ケイヒ4G、カンゾウ1.5G	散剤	顆粒	
○	○	×					ユートビアルマン	ユートビアルマンA	(有) 本町薬業	麻黄湯	水製エキス粉末1.4G (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	錠剤	錠	
○	○	○					ルル内服液 (麻黄湯)	ルルナイフエキ (マオウトウ)	田村薬品工業 (株)	麻黄湯	麻黄湯エキス3100MG (マオウ5G・キョウニン5G・ケイヒ4G・カンゾウ1.5G)	液剤	液	第一三共ヘルスケア (株)
○	○	○					JPS漢方顆粒-53号	JPSカンボウカリュウ-53ゴウ	ジェビーエス製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (45量) 1.44G (ブクリョウ4.8G・ケイヒ3.2G・ソウジュツ2.4G・カンゾウ1.6G)	散剤	顆粒	
○	○	○					JPS香桂朮甘湯エキス錠N	JPSリョウケイジュツカントウエキSジョウN	ジェビーエス製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス1.8G (ブクリョウ6G・ケイヒ4G・ソウジュツ3G・カンゾウ2G)	錠剤	錠	
○	○	○					ウチダの香桂朮甘湯	ウチダノリョウケイジュツカントウ	(株) ウチダ和漢薬	香桂朮甘湯	ブクリョウ6G、ケイヒ4G、ソウジュツ3G、カンゾウ2G	錠剤	煎剤	
○	○	○					ウチダの香桂朮甘湯エキス散	ウチダノリョウケイジュツカントウエキサン	(株) ウチダ和漢薬	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス1.71G (ブクリョウ6G・ケイヒ4G・ビャクジュツ3G・カンゾウ2G)	散剤	細粒	
○	○	○					「クラシエ」漢方香桂朮甘湯エキス顆粒	クラシエカンボウリョウケイジュツカントウエキスカリュウ	クラシエ製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12量) 800MG (ブクリョウ3G・ケイヒ2G・ビャクジュツ1.5G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					「クラシエ」漢方香桂朮甘湯エキス顆粒S	クラシエカンボウリョウケイジュツカントウエキスカリュウS	クラシエ製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (34量) 1200MG (ブクリョウ4.5G・ケイヒ3G・ビャクジュツ2.25G・カンゾウ1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○					錠剤香桂朮甘湯	ジョウザイリョウケイジュツカントウ	一元製薬 (株)	香桂朮甘湯	ブクリョウ末8.6G、ケイヒ末5.2G、ソウジュツ末5.2G、カンゾウ末3.5G、水性エキス (香桂朮甘湯エキス) 2.5G (ケイヒ5.8G)	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○					紳農香桂朮甘湯エキス錠	シンノリョウケイジュツカントウエキSジョウ	ジェビーエス製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス1.8G (ブクリョウ6G・ケイヒ4G・ソウジュツ3G・カンゾウ2G)	錠剤	錠	
○	○	○					ストレージタイプZM	ストレージタイプZM	(株) ツムラ	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12量) 0.75G (乾燥エキスとして) (ブクリョウ3G・ケイヒ2G・ソウジュツ1.5G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	武田コンシューマーヘルスケア (株)
○	○	○					角野薬研湯	スミノヤクセントウ	(有) 角野製薬所	香桂朮甘湯	ブクリョウ6G、ケイヒ4G、ビャクジュツ3G、カンゾウ2G	錠剤	煎剤	
○	○	○					駿命湯	チョウメイセン	中村薬品工業株式会社	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12量) 1000MG (ブクリョウ3G・ケイヒ2G・ビャクジュツ1.5G・カンゾウ1G)	錠剤	錠	株式会社メディカルリーチ
○	○	○					ツムラ漢方香桂朮甘湯エキス顆粒	ツムラカンボウリョウケイジュツカントウエキスカリュウ	(株) ツムラ	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12量) 0.75G (ブクリョウ3G・ケイヒ2G・ソウジュツ1.5G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	

じほう	JAPIC	PMDA	備考	商品名	製品名よみ	製造販売元	実薬効分類	組成	剤形 (PMDA)	剤形 (JAPIC)	販売元
○	○	×		デルマンバランスエリア	デルマンバランスエリア	(有) 本町薬品	香桂朮甘湯	水製乾燥エキス粉末2.2G (ブクリョウ6G・ケイヒ4G・ビャクジュツ3G・カンゾウ2G)			
○	○	○		天祐 (エキス顆粒)	テンユウエキスカリユ	(株) 建林松鶴堂	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12顆) 0.9G (ブクリョウ3G・ケイヒ2G・ビャクジュツ1.5G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		東洋漢方の香桂朮甘湯エキス顆粒	トウヨウカンボウリョウケイジュツカントウエキスカリユ	東洋漢方製薬 (株)	香桂朮甘湯	水製乾燥エキス1.66G (ブクリョウ6G・ケイヒ4G・ビャクジュツ3G・カンゾウ2G)	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○	確認票商品例	トチモトの香桂朮甘湯	トチモトノリョウケイジュツカントウ	(株) 栃木天海堂	香桂朮甘湯	ブクリョウ6G、ケイヒ4G、ビャクジュツ3G、カンゾウ2G	その他		
○	○	○		ホノミキジョウ錠	ホノミキジョウジョウ	荆盛堂薬品 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12顆) 0.6G (カンゾウ1G・ケイヒ2G・ビャクジュツ1.5G・ブクリョウ3G)	錠剤	錠	
○	○	×		マルホの香桂朮甘湯	マルホノリョウケイジュツカントウ	堀江生薬 (株)	香桂朮甘湯	ブクリョウ6G、ケイヒ4G、ビャクジュツ3G、カンゾウ2G	煎剤		
○	○	○		香桂朮甘湯	リョウケイジュツカントウ	東洋漢方製薬 (株)	香桂朮甘湯	ブクリョウ6G、ケイヒ4G、ビャクジュツ3G、カンゾウ2G	その他	煎剤	
○	○	○		香桂朮甘湯Aエキス細粒三和生薬	リョウケイジュツカントウAエキスサイリウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス1.7G (ブクリョウ6G・ケイヒ4G・ビャクジュツ3G・カンゾウ2G)	散剤	細粒	
○	○	○		香桂朮甘湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	リョウケイジュツカントウAエキスサイリウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス1.7G (ブクリョウ6G・ケイヒ4G・ビャクジュツ3G・カンゾウ2G)	散剤	細粒	湧永製薬 (株)
○	○	○		香桂朮甘湯エキス (細粒) 63	リョウケイジュツカントウエキスサイリウ63	松浦薬業株式会社	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12顆) 2.5G (ブクリョウ3G・ケイヒ2G・ビャクジュツ1.5G・カンゾウ1G)	散剤	細粒	全業工業株式会社
○	○	○		香桂朮甘湯エキス細粒G「コタロー」	リョウケイジュツカントウエキスサイリウGコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (45顆) 1.36G (ブクリョウ4.8G・ビャクジュツ2.4G・カンゾウ1.6G・ケイヒ3.2G)	散剤	細粒	
○	○	○		香桂朮甘湯エキス錠N「コタロー」	リョウケイジュツカントウエキスジョウNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス散 (34顆) 1.53G (ブクリョウ4.5G・ケイヒ3G・カンゾウ1.5G・ビャクジュツ2.25G)	錠剤	錠	
○	○	○		香桂朮甘湯エキス錠 (大峰)	リョウケイジュツカントウエキスジョウオオミネ	大峰堂薬品工業 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス (12顆) 1000MG (ケイヒ2G・ブクリョウ3G・カンゾウ1G・ビャクジュツ1.5G)	錠剤	錠	日邦薬品工業 (株)
○	○	○		香桂朮甘湯「タキザワ」	リョウケイジュツカントウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	香桂朮甘湯	ブクリョウ6G、ケイヒ4G、ビャクジュツ3G、カンゾウ2G	その他	煎剤	
○	○	×	製販HPには掲載あり。	香桂朮甘粒状	リョウケイジュツカントウリョウジョウ	長倉製薬 (株)	香桂朮甘湯	ブクリョウ2G、ケイヒ0.8G、ビャクジュツ1G、カンゾウ0.7G	顆粒	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○		レイジツトN「コタロー」	レイジツトNコタロー	小太郎漢方製薬 (株)	香桂朮甘湯	香桂朮甘湯エキス散 (34顆) 1.53G (ブクリョウ4.5G・ケイヒ3G・カンゾウ1.5G・ビャクジュツ2.25G)	錠剤	錠	
○	○	○		JPS漢方顆粒-52号	JPSカンボウカリユウ-52ゴウ	ジェービーエス製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス (45顆) 3.6G (ニンジン3.2G・ソウジュツ3.2G・ブクリョウ3.2G・ハンガ3.2G・チンピ1.6G・タイソウ1.6G)	散剤	顆粒	
○	○	○		JPS六君子湯エキス錠N	JPSリックンシトウエキスジョウN	ジェービーエス製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス (12顆) 2.25G (ニンジン2.2G・ソウジュツ2.2G・ブクリョウ2.2G・ハンガ2.2G・チンピ1.6G・タイソウ1.6G)	錠剤	錠	
○	○	○		JPS六建湯顆粒	JPSロケットウカリユ	ジェービーエス製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス2.25G (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・ブクリョウ2G・ハンガ2G・チンピ1G・タイソウ1G・カンゾウ0.5G)	散剤	顆粒	
○	○	○		ウチダの六君子湯	ウチダノリックンシトウ	(株) ウチダ和漢薬	六君子湯	ニンジン、ビャクジュツ、ブクリョウ、ハンガ、チンピ etc.	その他	煎剤	
○	○	○		ウチダの六君子湯エキス散	ウチダノリックンシトウエキスサン	(株) ウチダ和漢薬	六君子湯	六君子湯エキス2.1G (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・ブクリョウ2G・ハンガ2G・チンピ1G・タイソウ1G・カンゾウ0.5G)	散剤	細粒	
○	○	○		漢方濃縮煎剤六君子湯43	カンボウノウシュクセンザイリックンシトウ43	松浦薬業株式会社	六君子湯	六君子湯抽出物5G (ニンジン2G・ブクリョウ2G・ビャクジュツ2G・ハンガ2G・チンピ1G・タイソウ1G・カンゾウ0.5G)	その他	エキス	
○	○	○		ギャクリア	ギャクリア	小林製薬株式会社	六君子湯	六君子湯エキス(12顆)	散剤	顆粒	
○	○	○		「クラシエ」漢方六君子湯エキス顆粒	クラシエカンボウリックンシトウエキスカリユ	クラシエ製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス (12顆) 2050MG (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・ブクリョウ2G・ハンガ2G・チンピ1G・タイソウ1G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)
○	○	○		「クラシエ」漢方六君子湯エキス顆粒S	クラシエカンボウリックンシトウエキスカリユS	クラシエ製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス粉末M3075mg (ニンジン・ビャクジュツ・ブクリョウ・ハンガ各3g、チンピ・タイソウ各1.5g、カンゾウ0.75g)	散剤		クラシエ薬品 (株)
○	○	○		錠剤六君子湯	ジョウザイリックンシトウ	一元製薬 (株)	六君子湯	ビャクジュツ末4.25G、ブクリョウ末4.25G、ショウキョウ末2G、カンゾウ末1.25G、ニンジン末4.25G、ハンガ末4.25G、チンピ末4.25G	錠剤	錠	(株) イチゲン
○	○	○		ツムラ漢方六君子湯エキス顆粒	ツムラカンボウリックンシトウエキスカリユ	(株) ツムラ	六君子湯	六君子湯エキス (12顆) 2G (ソウジュツ2G・ニンジン2G・ハンガ2G・ブクリョウ2G・タイソウ1G・チンピ1G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	
○	○	○		ハイルク錠	ハイルク錠	大杉製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス4.4G (ニンジン (人参) 4G・ビャクジュツ (白朮) 4G・ブクリョウ (茯苓) 4G・ハンガ (半夏) 4G・チンピ 4G)	散剤	錠	
○	○	○		ホノミキ錠	ホノミキジョウ	荆盛堂薬品 (株)	六君子湯	六君子湯エキス (12顆) 1.2G (カンゾウ0.5G・ショウキョウ0.25G・タイソウ1G・チンピ1G・ニンジン2G・ハンガ2G・ビャクジュツ2G)	錠剤	錠	
○	○	○		リックンS「コタロー」 (六君子湯エキス錠)	リックンSコタローリックンシトウエキスジョウ	小太郎漢方製薬 (株)	六君子湯	水製エキス2.45G (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・ブクリョウ2G・ハンガ2G・チンピ1G・タイソウ1G・カンゾウ0.5G)	錠剤	錠	
○	○	○		六君子湯	リックンシトウ	東洋漢方製薬 (株)	六君子湯	ニンジン4G、ビャクジュツ4G、ブクリョウ4G、ハンガ4G、タイソウ2G、カンゾウ1G、ショウキョウ0.5G、チンピ2G	その他	煎剤	日邦薬品工業 (株)
○	○	○		六君子湯Aエキス細粒三和生薬	リックンシトウAエキスサイリウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス (45顆) 3.9G (ニンジン3.2G・ビャクジュツ3.2G・ブクリョウ3.2G・ハンガ3.2G・チンピ1.6G・ショウキョウ0.4G)	散剤	細粒	
○	○	○		六君子湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	リックンシトウAエキスサイリウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス3.9G (ニンジン3.2G・ビャクジュツ3.2G・ブクリョウ3.2G・ハンガ3.2G・チンピ1.6G・ショウキョウ0.4G)	散剤	細粒	湧永製薬 (株)
○	○	○		六君子湯Aエキス錠三和生薬	リックンシトウAエキスジョウサンワショウヤク	三和生薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス (35顆) 2.9G (ニンジン2.4G・ビャクジュツ2.4G・ブクリョウ2.4G・ハンガ2.4G・チンピ1.2G・ショウキョウ0.6G)	錠剤	錠	
○	○	○		六君子湯エキス顆粒KM	リックンシトウエキスカリユKM	北日本製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス4G (ニンジン4G・ハンガ4G・ビャクジュツ4G・ブクリョウ4G・タイソウ2G・チンピ2G・カンゾウ1G)	散剤	顆粒	一元製薬 (株)
○	○	○		六君子湯エキス (細粒) 65	リックンシトウエキスサイリウ65	松浦薬業株式会社	六君子湯	六君子湯エキス (12顆) 4.7G (乾燥物換算約2.1G) (ニンジン2G・ビャクジュツ2G・ブクリョウ2G・ハンガ2G・チンピ1G)	散剤	細粒	
○	○	○		六君子湯エキス散 (勝昌)	リックンシトウエキスサンショウシウ	(株) 東洋薬行	六君子湯	六君子湯水製エキス (「漢方精選百八方-その運用とかんどころ」) 3G (ニンジン3G・ビャクジュツ3G・ブクリョウ3G)	散剤	散	
○	○	○		六君子湯「タキザワ」	リックンシトウタキザワ	(株) タキザワ漢方廠	六君子湯	ニンジン4G、ソウジュツ4G、ブクリョウ4G、ハンガ4G、チンピ2G、タイソウ2G、カンゾウ1G、ショウキョウ0.5G	その他	煎剤	
○	○	×	製販HPには掲載あり。	六君子湯粒状	リックンシトウリョウジョウ	長倉製薬 (株)	六君子湯	ニンジン0.4G、トウヒ0.8G、ハンガ0.8G、ビャクジュツ0.6G、ブクリョウ0.6G、カンゾウ0.2G、ショウキョウ0.4G、タイソウ0.4G	散剤	顆粒	日邦薬品工業 (株)
○	○	○		療方健牌顆粒	リョウホウケンペカリユ	クラシエ製薬 (株)	六君子湯	六君子湯エキス (34顆) 3075MG (ニンジン3G・ビャクジュツ3G・ブクリョウ3G・ハンガ3G・チンピ1.5G・タイソウ1.5G)	散剤	顆粒	クラシエ薬品 (株)

1187 1169 1175

令和2年度厚生労働行政推進調査事業補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究

分担研究報告書

分担研究課題 漢方製剤の安全性確保に関する研究

分担研究社 名城大学薬学部 教授 能勢充彦

研究要旨 カンゾウは、医療用および一般用漢方エキス製剤の7割以上に配合され、わが国の漢方エキス製剤において欠くことのできない重要生薬である一方で、偽アルドステロン症を引き起こすことが知られている。カンゾウエキスや主成分であり、かつ副作用の原因化合物であるグリチルリチン酸（GL）を経口投与した際の血中グリチルレチン酸（GA）濃度推移については先行研究があるものの、多くのカンゾウ配合漢方処方投与時の血中GA濃度推移についての報告はほとんど見当たらない。そこで、本研究では、これまでに作製したカンゾウ配合漢方エキスの中からいくつかをマウスに経口投与し、その後の血中GA濃度を測定して、処方による血中GA濃度推移の違いを検証した。その結果、各処方の血中GA濃度の薬物動態パラメーターのうち、0時間から48時間までの血中濃度曲線下面積（ AUC_{0-48} ($\mu\text{g}/\text{mL}\cdot\text{h}$))は、配合カンゾウ量やGL含量とよい相関を示した。一方、その最高血中濃度（ C_{max} ）やその到達時間（ t_{max} ）は、配合カンゾウ量やGL含量とは相関せず、構成生薬の違いによる影響を受けていることが示唆された。漢方エキス製剤の安全性確保のためには、配合されたカンゾウによる薬理作用や副作用発現の詳細を明らかにするためには、処方単位での血中GA濃度推移を明らかにする必要があり、さらに処方毎の違いに寄与する要因を明らかにしなければならない。

A. 研究目的

これまでに、漢方エキス製剤の安全性確保に資する研究として、医療用および一般用漢方エキス製剤の7割以上に配合され、かつ漢方エキス製剤の副作用発現の原因生薬として最も報告件数の多いカンゾウに着目し、いくつかの検討を行ってきた。まず、カンゾウ配合漢方処方のうち、代表的な25種のエキスについて、用いる生薬のロットを固定し、構成生薬の組み合わせがそれぞ

れの処方エキスのGL含量に及ぼす影響を検討した¹⁾。その結果、エキス一日量中のGL含量は配合されるカンゾウ量に概ねよい相関を示すことを明らかとしたが、小青竜湯などその相関から外れる処方があることも見出した。また、種々のpHを示す緩衝液を用いた検討から、カンゾウからのGL抽出率は煎じ液のpHが強く影響することを明らかにし、小青竜湯の場合ではゴミシの配合が煎じ液のpHを低下させ、GLの抽

出効率を著しく低下させたのではないかと結論づけた¹⁾。

ゴミシは、マツブサ科のチョウセンゴミシの果実を用いる生薬であり、クエン酸などの有機酸を含むことが知られており、これらにより煎じ液の pH が低下すると考えた。そこで、他の果実生薬の影響を検討したところ、サンシュユによっても pH は低下したものの、GL 含量に対してはほとんど影響を与えず、現時点ではゴミシだけがカンゾウからの GL 抽出効率に影響を与える生薬として同定されている。そこで、ゴミシとカンゾウがともに配合される漢方処方をすべて調製し、その GL 含量を測定し、抽出効率を算出したところ、配合カンゾウ量よりもエキスの pH に依存することが明らかとなった²⁾。

これまでに検討したすべてのカンゾウ配合漢方エキス 35 種について、配合カンゾウ量やエキスの pH と GL 含量やその抽出効率を比較検討したところ、エキスの pH と GL 抽出効率は非常に良い相関を示した。漢方エキスメーカーにおいては、医療用エキス製剤のインタビューフォームにエキス製剤を精製水に溶解した際の pH が掲載されており、それらの値は本研究での実測値とよい相関を示し、臨床において使用するカンゾウ配合漢方エキス製剤の GL 含量の予測に有益であることを示唆している²⁾。

また、臨床では、健常人ボランティアを用いたパイロットスタディにおいて、小柴胡湯と小青竜湯の服用時における血中 GA 濃度推移が大きく異なることが報告されており、構成生薬の違いが消化管内における腸内細菌叢による GL 加水分解効率や GA の吸収に影響を与えることが示唆された³⁾。

そこで、本研究においても、マウスを用いて小柴胡湯と小青竜湯の単回経口投与時における血中 GA 濃度推移を検証し、両処方の結果にヒトと類似した血中 GA 濃度推移の相違を見出した。これまでに知られているように、小柴胡湯は GL と同様糖部にグルクロン酸をもつ配糖体であるバイカリンを多量に含有するため、腸内細菌叢による加水分解反応において阻害される可能性を確認した⁴⁾。

さらに、GL の偽アルドステロン症発現の危険因子の一つとして考えられる加齢についても、80 週以上飼育した雌性 BALB/c マウスを用いて、GL 単回経口投与時の血中 GA 濃度を若齢マウスデータと比較検討したところ、予想に反して血中 GA 濃度は低い値を示し、その要因として腸内細菌叢による GL 加水分解活性の低下に起因することが示唆された⁵⁾。若齢および加齢マウスの腸内細菌叢についてのアンプリコンシーケンス解析により、加齢による腸内細菌叢の構造変化が推定されたが、GL 加水分解活性との関連など、その詳細はまだ不明である。

本年度は、これまでの解析結果を先に進め、より臨床に資するものと発展させる目的で、カンゾウ配合漢方エキスをマウスに単回経口投与した際の血中 GA 濃度推移の実例を増やし、その薬物動態パラメーターとカンゾウ配合量や GL としての投与量との比較を行った。また、昨年度の若齢および加齢マウスの盲腸内容物のアンプリコンシーケンスデータを用いた予測ゲノム解析を行い、腸内細菌叢の糖質加水分解酵素活性の予測とこれまでのデータとの整合性について検証を行った。さらに、マオウエキスお

よびマオウ配合漢方エキス投与時の血中エフェドリン・プソイドエフェドリン濃度推移についても、蛍光ラベル化法による分析を試みたが、生体内の夾雑物との分離がうまくいかず、現時点では未完成となっている。

以下、カンゾウに関する検討結果について報告する。

B. 研究方法

1. 実験動物

実験動物として、雌性 BALB/c マウス (6 週令、日本 SLC) を用いた。マウスは、名城大学薬学部実験動物センターにて飼養し、適宜実験に供した。すなわち、温度・湿度ともに制御されている SPF 環境下で、個別喚起飼育ケージ内で飼育し、餌 (MM-3、フナバシファーム製) と水 (RO 水) は自由摂取とした。実験動物センターに到着後、少なくとも 7 日間の馴化を行い、各実験に供した。尚、動物の飼育管理ならびにすべての動物実験については、名城大学実験動物委員会の審議・承認を経て、同委員会の定める規定を順守して実施した (承認番号: 2020PE1)。

2. 試薬

GL および GA は、名古屋市立大学薬学部名誉教授荻原幸夫博士から供与されたものを用いた。血中濃度の分析に用いた溶媒は、すべて HPLC グレードのものを用い、それ以外の試薬は特級のものを使用した。また、アンプリコンシーケンスデータの解析による腸内細菌叢機能予測データ解析については、テクノスルガ・ラボラトリーに依頼した。

3. 実験スケジュール

雌性 BALB/c マウスは、18 時間絶食し、

実験に供した。GL 標準品やカンゾウ配合漢方エキスは、それぞれ精製水に溶解あるいは懸濁して経口投与した。漢方エキスの投与量については、それぞれ収量が異なることから、ヒト常用量を算出し、その 10 倍量とした。それぞれの投与後、結果に示す時間に 1.5% イソフルラン麻酔下にて下大静脈から採血し、室温下 30 分~60 分放置した後、3,000 rpm、15 分間の遠心処理をして血清とした。血清は、GA の HPLC 分析まで、 -35°C にて保存した。

4. 血中グリチルレチン酸濃度の測定

血清 200 μL に、内部標準である 2-methylanthraquinone (MAQ) を 10 ng 添加し、HPLC 用アセトニトリル (1,800 μL) を加えて氷上に放置し、除タンパクを行った。その後 4°C 、10,000 rpm、10 分間の遠心処理を行い、得られた上清 (1,800 μL) を回収した。この上清を減圧乾固し、得られた残渣に HPLC 用メタノール (100 μL) を加えて溶解し、その 30 μL を HPLC 分析に供した。

HPLC 条件は、以下のとおりである。

カラム: COSMOSIL 5C18-AR-II (5 μm 、4.6 mm I.D. \times 150 mm)
移動相: $\text{CH}_3\text{CN}-\text{CH}_3\text{OH}-2\% \text{ acetic acid} = 48:10:42$
流速: 1.0 mL/min
検出波長: 254 nm
カラム温度: 40°C

C. 結果および考察

1. カンゾウ配合漢方エキスの経口投与における血中 GA 濃度推移について

これまでに、平成 28 年度報告において GL やカンゾウ単味エキス、さらに先行研究で報告されている小柴胡湯や小青竜湯をマウスに投与した際の血中 GA 濃度推移を報告してきた。また、平成 30 年度報告では、GL 標準品の投与量を変えて、GL 投与における線形性・非線形性の検討を行った。その結果、GL (100 mg/kg) 投与時には投与後 8 時間と 12 時間に血中 GA 濃度のピークが認められ、 t_{max} は 8 h、また C_{max} は 1.6 $\mu\text{g/mL}$ であった。この二峰性の経時変化については、一つ目は GL が腸内細菌叢により GA に加水分解され、吸収された際のもので、二つ目は吸収された GA が肝臓でグルクロン酸抱合されたグリチルレチン酸モノグルクロナイド (GAMG、3-O-モノグルクロン酸化グリチルレチン酸:3MGA) が胆汁排泄され、消化管にて再び腸内細菌叢による加水分解を受けて生じた GA が吸収された際のピークであると推定している (Fig. 1 再掲)。また、小柴胡湯や小青竜湯をヒト常用量の 10 倍量で経口投与した際の血中 GA 濃度推移も再掲する (Fig. 2)。

今回新たに、芍薬甘草湯、半夏瀉心湯、苓甘姜味辛夏仁湯、苓桂味甘湯、杏蘇散、六君子湯、補中益気湯、十全大補湯の 8 処方を持ちいて、それぞれ絶食マウスにヒト常用量の 10 倍量を経口投与し、48 時間までの血中 GA 濃度を測定した。

それぞれの結果を Fig. 3 ~ Fig. 6 までに示す。

まず、カンゾウの配合量が多く、GL 含量の高い芍薬甘草湯では、投与後 6 時間と 12 時間に二つのピークが確認され、血中 GA 濃度推移としては GL 投与の場合と類似していた。芍薬甘草湯では、構成生薬がシャク

ヤクとカンゾウの二味であり、そのため構成生薬による影響が少ないと考えられた。

一方、配合カンゾウ量や GL としての投与量が同程度の小柴胡湯や苓甘姜味辛夏仁湯では、 C_{max} で約 4 倍、AUC で約 2 倍苓甘姜味辛夏仁湯の方が大きな値を示した。

その他の処方についても、血中 GA 濃度推移のパターンを比較すると、いくつかのパターンをとることが推定された。すなわち、血中 GA 濃度の明らかなピークは認めないものの、比較的長い時間に渡って血中に GA が存在するものとして、半夏瀉心湯や小柴胡湯、補中益気湯が挙げられ、また投与後 8 時間あたりに一つのピークとして現れ、24 時間以降はほとんど血中に存在しないものとして、苓桂味甘湯や六君子湯、十全大補湯や杏蘇散などが挙げられる。その中でも、十全大補湯や杏蘇散投与群では、投与後 4 時間という早期に GA の一つ目のピークが出現した。

さらに、薬物動態学的パラメーターと配合カンゾウ量と AUC_{0-48} を比較すると、概ねよい相関を示した (Fig. 7(A))。また、GL としての投与量と AUC_{0-48} を比較すると、その相関性は低下した (Fig. 7(B))。その一方で、 C_{max} とそれぞれ配合量や GL 投与量との間には明確な相関性は認められなかった (Fig. 8(A)(B))。以上の結果は、カンゾウ配合処方の投与時に、GL の主代謝物として血中に存在する GA に着目すると、その AUC_{0-48} を配合カンゾウ量で推定することはできるが、 C_{max} を推定することは難しいということを意味する。

先行研究においては、わが国の副作用データベース (JADER : Japanese adverse drug event report database) を活用した研

究がいくつかあり、漢方エキス製剤による偽アルドステロン症の原因生薬はやはりカンゾウであることが確認されている⁶⁻¹⁰⁾。また、文献調査により、偽アルドステロン症の発症頻度はカンゾウの一日投与量、すなわち配合カンゾウ量の用量依存的な傾向が示唆されたとするものがあり¹¹⁾、本研究結果と考え合わせると、カンゾウに由来する副作用については、この AUC の値と副作用報告件数との間の関連性について興味もたれる。一方、GL としての投与量と AUC を比較した場合には相関係数の低下が観察されたが、その理由は不明である。

また、Cmax とは配合カンゾウ量や GL としての投与量ともに関連性を見出すことができず、他の構成生薬による影響が想像された。いわゆる化学薬品に比べ、漢方エキス製剤のような天然物医薬品は混合物であり、有効成分と考えられる化合物の体内動態も単一化合物である化学薬品とは異なることは想定されているが、その要因についても実証していかなければならない。現段階では、その要因として共存する化合物による①腸内細菌叢の GL 加水分解活性への影響、②消化管運動への影響、さらに③GA の消化管吸収に及ぼす影響などが想像され、それぞれの関与について実験科学的に検証する必要があると考えている。

さらに、先行研究と本検討結果から、副作用に関連する薬物動態学的パラメーターは AUC であり、薬理作用に関わるのは Cmax ではないかとも考えられ、カンゾウに由来する薬理作用と Cmax との関連性にも興味もたれる。

2. 若齢および加齢マウスの盲腸内腸内細菌

叢のアンプリコンシーケンス解析を用いた予測ゲノム解析について

昨年度の検討により、加齢マウスへの GL 単回経口投与における血中 GA 濃度が予想に反して低値を示すことが明らかとなった。また、盲腸内容物から調製した腸内細菌叢酵素液による GL 加水分解活性が加齢により低下するという結果も得られ、血中 GA 濃度が低値を示した要因として理解されている。腸内細菌叢は、加齢による影響を受けることが考えられており、GL を加水分解する酵素を産生する細菌の組成が減少していることや酵素活性自体の低下も考えられているが、本年度アンプリコンシーケンスデータを活用した機能予測解析が可能であるということがわかったので、追加解析を行った。

その結果、若齢マウスと加齢マウスから採取した盲腸内の腸内細菌叢の β グルコシダーゼ活性と β グルクロニダーゼ活性をゲノムデータから比較したところ、両酵素活性ともに加齢による影響はないことが示唆された (Fig. 9)。昨年度の解析によれば、菌叢自体の数や均一性には変化はなく、種類に変化があるということが明らかとなっていたが、今回の解析では酵素機能としての違いを確認できなかった。昨年度検討した酵素活性の実験結果とは異なる結果であり、その整合性について結論づけることはできない。ただし、今回の機能予測は一般的な β グルコシダーゼ ([EC3.2.1.21]) と β グルクロニダーゼ ([EC 3.2.1.31]) に関するものであり、GL を加水分解可能な β グルクロニダーゼがそれに含まれるかどうかについては不明である。GL を加水分解可能な酵素については、ヒトでは *Eubacterium* sp.

から初めて見出され、*Peptostreptococcus* sp.や *Ruminococcus* sp.もまた弱いながらも加水分解可能な腸内細菌として見出された¹²⁾。一方で、大腸菌から精製されたβグルクロニダーゼは、phenolphthalein mono-β-D-glucuronide (PPG) や *p*-nitrophenol mono-β-D-glucuronide (*p*NPG)を加水分解できるが、GLを加水分解することはできない。また、牛の肝臓由来のβグルクロニダーゼもまたわずかにしかGLを加水分解できないなど、GL加水分解酵素は一般的なβグルクロニダーゼ ([EC 3.2.1.31]) と基質特性が異なる¹²⁾。今回得られたゲノム機能予測解析との結果を検証するためには、もう一度加齢マウスを作製し、一般的な基質に対する加水分解活性とGLに対する加水分解活性を比較検討する必要があると考えている。

D. 結論

カンゾウは医療用および一般用漢方エキス製剤の7割以上に使用されることから、患者にとって処方薬あるいはセルフメディケーションの中で服用する可能性は高い。そのため、その副作用の発症機構を科学的に明らかにし、発症を未然に防ぐ努力が必要である。副作用の原因成分としてはGLが考えられており、その代謝物が真の原因化合物であるとして諸説あるものの^{13,14)}、中心となっている代謝物は依然としてGAである。われわれは、これまでに副作用を予測する手段として配合カンゾウ量からGL含量への転換を提案し、エキス製剤のインタビューフォームに記載されるエキスのpHもまた一つの目安となることを示している。今回、これまでにGL含量やその抽出効率

などを検証してきたエキスを用いて、いくつかのカンゾウ配合漢方エキス投与時のマウス血中GA濃度推移を観察した。その結果、カンゾウ配合量が血中曲線下面積 (AUC₀₋₄₈) とよい相関を示した。また、最高血中濃度 (C_{max}) については、配合カンゾウ量とは相関性を示さず、他の構成生薬由来の成分との相互作用が関わることが示唆された。現時点では、漢方メーカーの提供するインタビューフォームにおいても各カンゾウ配合漢方エキス投与時の血中GA濃度やその分布・排泄などのデータは記載されておらず、あってもわずかに標準品やカンゾウエキスでの血中GA濃度推移しかない。漢方エキス製剤の安全使用に資する基礎研究としては、やはり代表的なカンゾウ配合漢方エキス投与時の血中GA濃度推移をはじめとする体内動態を明らかにしていく必要がある。また、本研究では代表的なカンゾウ配合漢方エキスの単回投与における血中GA濃度を明らかにしたに過ぎず、反復投与におけるGLやGAの体内動態を明らかにする必要があると考えている。今後、本研究で得られた成果をさらに発展させていきたい。

参考文献

- 1) M. Nose, M. Tada, R. Kojima, K. Nagata, S. Hisaka, S. Masada, M. Homma, T. Hakamatsuka, Comparison of glycyrrhizin content in 25 major kinds of Kampo extracts containing Glycyrrhizae Radix used clinically in Japan. *J.Nat.Med.*, 71, 711 – 722 (2017).
- 2) M. Nose, M. Tada, A. Kato, S. Hisaka, S. Masada, M. Homma, T. Hakamatsuka,

- Effect of Schizandrae Fructus on glycyrrhizin content in Kampo extracts containing Glycyrrhizae Radix used clinically in Japan. *J.Nat.Med.*, 73, 834 – 840 (2019).
- 3) 宮村充彦、小野正英、京谷庄二郎、西岡豊、甘草配合漢方エキス中のグリチルリチンの物性とエキス投与後のグリチルレチン酸の血中濃度推移、*薬学雑誌*、116、209 – 216 (1996).
- 4) 平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業部) 一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究報告書 (2019).
- 5) 令和元年度厚生労働行政推進調査事業補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策事業部) 一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究報告書 (2020).
- 6) Y. Kato, R. Umetsu, N. Hosoya, N. Ueda, J. Abe, Y. Nakayama, Y. Motooka, Y. Kinoshita, M. Oyama, M. Nakamura, Analysis of licorice-induced pseudoaldosteronism in the Japanese Adverse Drug Event Report Database, *Trad. Kamp Med.*, 3, 63 – 70 (2016).
- 7) I. Arai, Y. Hasegawa, Y. Motoo, Estimated incidence of adverse reactions to Kampo medicines in randomized controlled clinical trials, *Trad. Kamp Med.*, 5, 106 – 112 (2018).
- 8) I. Arai, Y. Harada, H. Koda, K. Tsutani, Y. Motoo, Estimated incidence per population of adverse drug reactions to Kampo medicines from the Japanese Adverse Drug Event Report Database (JADER), *Trad. Kamp Med.*, 7, 3 – 16 (2020).
- 9) Y. Shimada, M. Fujimoto, T. Nogami, H. Watari, Adverse Events Associated with Ethical Kampo Formulations: Analysis of the Domestic Adverse-Event Data Reports of the Ministry of Health, Labor, and Welfare in Japan, *Evid Based Complement Alternat Med.* 2019 Apr 15;2019:1643804. doi: 10.1155/2019/1643804.
- 10) Y. Shimada, Adverse Effects of Kampo Medicines, *Intern Med.* 2021 Feb 8. doi: 10.2169/internalmedicine.6292-20.
- 11) 萬谷直樹、岡洋志、佐橋佳郎、鈴木理央、綾部原子、鈴木まゆみ、神山博史、長田潤、木村容子、伊藤隆、甘草の使用量と偽アルドステロン症の頻度に関する文献調査、*日本東洋医学会誌*、66、197 – 202 (2015).
- 12) T. Akao, T. Akao, K. Kobashi, Glycyrrhizin β -D-glucuronidase of *Eubacterium* sp. From human intestinal flora, *Chem. Pharm. Bull.*, 35, 705 – 710 (1987).
- 13) K. Ishiuchi, O. Morinaga, T. Ohkita, C. Tian, A. Hirasawa, M. Mitamura, Y. Maki, T. Kondo, T. Yasujima, H. Yuasa, K. Minamizawa, T. Namiki, T. Makino, 18 β -glycyrrhetyl-3-O-sulfate would be a causative agent of licorice-induced pseudoaldosteronism, *Sci Rep.* 2019 Feb 7;9(1):1587. doi: 10.1038/s41598-018-38182-2.
- 14) K. Takahashi, T. Yoshino, Y. Maki, K. Ishiuchi, T. Namiki, K. Ogawa-Ochiai, K.

Minamizawa, T. Makino, T. Nakamura, M. Mimura, K. Watanabe, Identification of glycyrrhizin metabolites in humans and of a potential biomarker of liquorice-induced pseudoaldosteronism: a multi-centre cross-sectional study, *Arch Toxicol.*, 93, 3111 – 3119 (2019).

E. 研究成果

1. 論文発表

投稿準備中

2. 学会発表

準備中

G. 知的財産権の出願・登録状況

特になし。




Fig. 1 グリチルリチン酸 (GL) 標準品の投与における血中グリチルレチン酸 (GA) 濃度推移

Each point represents the mean ± S.E.M. of 3 mice.




Fig. 2 小青竜湯あるいは小柴胡湯投与時の血中グリチルレチン酸（GA）濃度推移
 Each point represents the mean \pm S.E.M. of 3 mice.




Fig. 3 芍薬甘草湯あるいは半夏瀉心湯投与時の血中グリチルレチン酸 (GA) 濃度推移
 Each point represents the mean \pm S.E.M. of 3 mice.




Fig. 4 苓甘姜味辛夏仁湯あるいは苓桂味甘湯投与時の血中グリチルレチン酸 (GA) 濃度推移

Each point represents the mean \pm S.E.M. of 3 mice.




Fig. 5 補中益気湯あるいは十全大補湯投与時の血中グリチルレチン酸 (GA) 濃度推移
 Each point represents the mean \pm S.E.M. of 3 mice.




Fig. 6 杏蘇散あるいは六君子湯投与時の血中グリチルレチン酸（GA）濃度推移
 Each point represents the mean \pm S.E.M. of 3 mice.




Fig. 7 カンゾウ配合漢方エキス 10 種のカンゾウ配合量あるいは投与量と血中曲線下面積 (0-48 時間) との相関性





Fig. 8 カンゾウ配合漢方エキス 10 種のカンゾウ配合量あるいは投与量と最高血中濃度との相関性




Fig. 9 予測メタゲノム解析による糖質加水分解酵素活性の比較
 K01188 : β -glucosidase、K01195 : β -glucuronidase

分担研究課題 一般用漢方製剤の使用上の注意の見直しに関する研究

研究代表者 袴塚高志 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長
研究分担者 政田さやか 国立医薬品食品衛生研究所 主任研究官

研究要旨

一般用漢方製剤の添付文書における「製品の特徴」と「養生訓（病気の予防，症状の改善等につながる注意事項）」の統一記載案作成に向けた基礎的検討を行った。前年度に，漢方製剤以外の一般用医薬品において使用されている表現を応用できるか検討したが，合成薬における「製品の特徴」は各有効成分に基づく説明が主であり漢方製剤に応用することは難しいことが分かったため，既存の一般用漢方製剤の添付文書に記載のある「製品の特徴」と「養生訓」を参考資料として改めて検討を行った。その結果，一般用漢方製剤を何らかの基準に従い分類した上で分類毎に記載案を作成する方向性が妥当と結論されたが，現状では適切な分類を施すことは簡単ではないことが分かった。

研究協力者

小田口浩 北里大学東洋医学研究所長
本間真人 筑波大学附属病院薬剤部長
能勢充彦 名城大学薬学部 教授
八木多佳子 株式会社阿部薬局
真鍋励次郎 香川県薬剤師会
香取征典・粟飯原史孝・杉山泰哲・倉橋まどか
日本漢方生薬製剤協会安全性委員会
内山奈穂子 国立衛研生薬部第二室長

A. 目的

一般用医薬品の使用及び取扱い上の注意は，医薬品医療機器等法第 52 条の規定に基づき，一般用医薬品の適正な使用を図り，安全を確保するために，一般使用者に対して必要な情報を提供する目的で当該医薬品の製造販売業者が医薬品の添付文書又はその容器若しくは被包に記載するものである。一般用医薬品の使用上の注意記載要領は，平成 23 年 10 月 14 日付薬食発 1014 第 3 号「一般用医薬品の使用上の注意記載要領について」に示され，使用及び取扱い上の注意の記載項目は，「してはいけないこ

と」「相談すること」「その他の注意」「保管及び取扱い上の注意」から構成される。一般用漢方製剤の使用上の注意は，平成 25 年 3 月 27 日付薬食安発 0327 第 1 号／薬食審査発 0327 第 1 号「一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」に，一般用漢方製剤製造販売承認基準収載の 294 処方について示されている。また，一般用医薬品の添付文書は，平成 23 年 10 月 14 日付薬食発 1014 第 6 号「一般用医薬品の添付文書記載要領の留意事項について」及び平成 23 年 10 月 14 日付薬食安発 1014 第 1 号「一般用医薬品の添付文書記載要領について」によることとされ，その記載項目のうち，「製品の特徴」及び「病気の予防，症状の改善等につながる注意事項（いわゆる養生訓）」は，一定のルールの下で製造販売業者等が自由記載できることとなっている。

一般用漢方製剤における「製品の特徴」及び「養生訓」については，この部分の不統一が一般の使用者の混乱を招いているとの指摘もあることから，業界自主申し合わせの範囲で，漢方処方特有の考え方を取り入れた統一記載の

策定が求められている。前年度までの本研究において、一般財団法人日本医薬情報センターより購入した「一般用医薬品添付文書情報データ（テキスト）」をもとに、現在市販されているすべての一般用医薬品の「製品の特徴」及び「養生訓」の記載について情報を収集し、漢方製剤以外の一般用医薬品において使用されている表現を応用できるか検討したが、合成薬における「製品の特徴」は各有効成分に基づく説明が主であり漢方製剤に応用することは難しいことが分かった。

そこで本年度は、既存の一般用漢方製剤の添付文書を参考資料として、「製品の特徴」及び「養生訓」の記載案作成に向けた基礎的検討を行った。

B. 方法

1. 班会議等

国立医薬品食品衛生研究所生薬部を事務局とし、日本漢方生薬製剤協会（日漢協）安全性委員会の協力を得ながら打ち合わせを行った。

2. 添付文書情報の収集

一般用漢方製剤のうち添付文書に「製品の特徴」及び「養生訓」の記載がある製品について、その添付文書情報を 23 例収集した。

（倫理面への配慮）

ヒト由来サンプル及び実験動物を使用しておらず、該当する事由はない。

C. 結果・考察

1. 「製品の特徴」及び「養生訓」の記載について

医薬品添付文書における「製品の特徴」は、「使用者が製品の概要を知るために必要な内容を簡潔に記載すること」とされ（平成 23 年 10 月 14 日，薬食発 1014 第 6 号），さらに、「使用者に当該医薬品の特徴をわかりやすく説明することを目的として，当該項目の記載内容が

効能又は効果，用法及び用量，成分及び分量等に記載の一部と重複することは差し支えないが，過度に重複することのないよう注意すること」とされている（平成 23 年 10 月 14 日，薬食発 1014 第 1 号）。一方，「養生訓（病気の予防，症状の改善等につながる注意事項）」については，「記載順序，記載項目を定めないが，必要に応じ関連項目中に記載することは差し支えない。ただし，使用上の注意の項中に記載しないこと」とされている（平成 11 年 8 月 12 日，医薬安第 96 号）。さらに，「製品の特徴」は，省略しても差し支えないものとされており，また，「養生訓」も必ず記載しなければならないものではなく，各社の判断で自主記載して良い，とされている。

これまで，「製品の特徴」と「養生訓」は記載を義務付けられておらず，また，その内容についても各社に任せられているため，同一処方であっても企業毎に記載内容が異なるケースがある。これにより，医薬品の使用者の混乱を招いているとの指摘があり，また，企業側にも記載例としての統一基準を待望する動きがあった。

実際に，一般用漢方製剤のうち添付文書に「製品の特徴」及び「養生訓」の記載がある製品について，その添付文書情報を 23 例収集して検討したところ（資料 1），同じ葛根湯であっても例 3，例 11 及び例 13 に示すようにほとんど統一性はなく，各社の特徴的な記述となっていることが分かった。同じ大黃甘草湯である，例 4，例 12 及び例 14 においても同様であった。

「養生訓」については，元来の趣旨が「病気の予防，症状の改善等につながる注意事項」であり，多岐に渡る効能効果のうち，どれに焦点を絞って訴求するかは企業の特徴の一つであるため，統一することの意義は大きくないと考えられた。一方，「製品の特徴」については，それが依拠する漢方処方の特徴を記述するものとするれば，ある程度の標準的記載が可能であろうと考えられた。ただし，一般用漢方製剤製造

販売承認基準に収載の 294 処方に関して個々に「製品の特徴」を策定するのは、リソース的に困難であることから、漢方処方にある程度の分類を行い、その分類毎の特徴を策定することとなった。しかし、294 処方の分類に関して広くコンセンサスを得ることができるものとして、大塚敬節先生の傷寒雑病論要方解説にある 16 分類が存在するが、これでは分類が大き過ぎるため、本研究に適用することは困難と判断された。これ以外の分類法は、広くコンセンサスを得ているものと言いたため、これ以上の検討を行うことはできなかった。今後は、例えば、日本薬局方に収載されている漢方処方エキス（令和 3 年 3 月時点で 35 処方）について試行的に「製品の特徴」を策定することから始めるなどの作業が必要と考えられる。

D. 結論

一般用漢方製剤のうち添付文書に「製品の特徴」及び「養生訓」の記載がある製品について、その添付文書情報を収集し、「製品の特徴」及び「養生訓」の記載案作成に関して検討した。「養生訓」については、企業の特徴を表現できる項目であるため、統一案を作成することの意義は大きくないと考えられた。「製品の特徴」については、一般用漢方製剤製造販売承認基準に収載の 294 処方に関して個々に策定することは困難であるため、広くコンセンサスを得ることができる分類を施して分類毎に記載案を策定するか、例えば日本薬局方に収載されている漢方処方エキスに限定して記載案を策定するなどの工夫が必要と考えられた。

E. 研究発表

1. 論文発表

該当なし

2. 学会発表

該当なし

F. 知的財産権の出願・登録状況

該当なし

2012年11月(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

神経性胃炎・慢性胃炎に

太田漢方胃腸薬Ⅱ<錠剤> 第2類医薬品

あんちゆうさんかぶくりょう
— 安中散加茯苓製剤 —

特 徴

太田漢方胃腸薬Ⅱ<錠剤>は、ストレスなどの原因により自律神経が乱れること
によって起こる、神経性胃炎や慢性胃炎を改善する胃腸薬で、ストレスの多
い現代社会に適しております。漢方処方の安中散にブクリョウ(茯苓)*を加
えることによって、効きめを強化しました。また、胃腸虚弱にもすぐれた効果を
あらわします。小粒でのみやすい錠剤です。

※ブクリョウ(茯苓):サルノコシカケ科に属し、主として松の根に発生する菌体です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があつて、ときに
胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症:

神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

神経性胃炎とは・・・

飲みすぎや食べすぎでもないのに胃の調子がおかしいという時は、ストレス
による場合が多いようです。ストレスが自律神経の失調をおこし、胃の働き
が異常となり、胃痛、食欲不振、はきけなどの症状としてあらわれます。
これを神経性胃炎といいます。

裏面に続きます

用法・用量

次の量を食間(就寝前を含む)又は空腹時に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
7～14歳	2錠	
7歳未満	服用しないこと	

※ 食間とは食後2～3時間のことをいいます。

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分 1日量(9錠)中

安中散加茯苓末……………2,100mg

下記生薬の混合末	
ブクリョウ(茯苓)	500 mg
ケイヒ(桂皮)	300 mg
エンゴサク(延胡索)	300 mg
ボレイ(牡蛎)	300 mg
ウイキョウ(茴香)	200 mg
シュクシャ(縮砂)	200 mg
カンゾウ(甘草)	200 mg
リョウキョウ(良姜)	100 mg

安中散料加茯苓エキス……………270mg

下記生薬のエキス	
ブクリョウ(茯苓)	810 mg
ケイヒ(桂皮)	486 mg
エンゴサク(延胡索)	486 mg
ボレイ(牡蛎)	486 mg
ウイキョウ(茴香)	324 mg
シュクシャ(縮砂)	324 mg
カンゾウ(甘草)	324 mg
リョウキョウ(良姜)	162 mg

[添加物]ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロタルサイト、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、セルロース

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

日常生活でのご注意

上手に気分転換をして、
ストレスの解消を
心がけましょう。

暴飲・暴食をさけ、
嗜好品のとり過ぎに
注意しましょう。

十分な休養をとり、
規則的な生活を
心がけましょう。

包装 (錠剤) 54錠・108錠

・ 太田漢方TM II の他に、溶けやすのみやすい散剤タイプの太田漢方TM III もあります。

・ この他、下記の姉妹品があります。目的に合わせてご利用ください。

飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に太田胃散(缶)、携帯に便利な太田胃散<分包>
胃のもたれ・食べすぎに小粒でのみやすい太田胃散A<錠剤>

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」
☎ (03) 3944-1311(代表)
受付時間 9:30～17:00(土日、祝日を除く)



製造販売元
株式会社 太田胃散
東京都文京区千石2-3-2
<http://www.ohta-isan.co.jp/>

02833-H5



例 2

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

関節痛に効く漢方薬

ロコフィットGL

第2類医薬品 販売名：ロコフィットGL

ほういおうぎとう
防已黄耆湯製剤

特 徴

年を重ねるたびに、痛み出すひざなどの関節。
痛みをかばって、運動せずにいると
体重が増え、関節への負担も大きくなります。

そんな方のために生まれたのが、
「ロコフィットGL」。

くりかえす「ひざの痛み」を改善する漢方薬です。



漢方処方【防已黄耆湯】が悪循環を断つ！



関節痛緩和

効果1

抗炎症作用により、
「ひざの痛み」をしっかり抑えます



肥満症緩和

効果2

代謝を上げる作用により、
「体重も落とします」

だから

関節への負担も減り、くりかえす
「ひざの痛み」によく効きます



⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：
肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、
いわゆる水ぶとり）

■ 用法・用量

次の量を食前、食間（就寝前を含む）又は空腹時に白湯又は水で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間のことをいいます。

■ 成分 1日量（12錠）中

防己黄耆湯エキス…1,600mg

〔下記生薬のエキス

ボウイ 2,508mg、オウギ 2,508mg、ソウジュツ 1,505mg、タイソウ 1,505mg、
カンゾウ 752mg、ショウキョウ 502mg

〔添加物〕塩酸グルコサミン、ケイ酸Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスカルメロースNa、
クロスポビドン、ステアリン酸Mg

※緩衝剤として「塩酸グルコサミン」を1,000mg配合しています。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) ビンの中の詰め物は錠剤が輸送中に破損するのを防ぐものですので、開封後は捨ててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (6) 水分の付着が変色等の原因となりますので、ぬれた手で錠剤に触れないでください。また、ぬれた手等で触れた錠剤はビンに戻さないでください。

■ 日常生活での注意点

関節痛の緩和には時間がかかります。

徐々に効いていくお薬ですので、根気よく、長期的に治療していきましょう。

- 暴飲暴食による過度なカロリー摂取は避け、バランスのよい食生活を心がけましょう。
- 肥満や筋力低下を抑えるためにも、毎日歩くことを習慣づけましょう。
- 開眼片足立ち、スクワット、ストレッチなど、有効なトレーニングをはじめましょう。



包 装 120錠・260錠（ビン入り）

■ 製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」

☎(03)3944-1311(代表)

受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)



製造販売元

株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2

<http://www.ohta-isan.co.jp/>

副作用救済制度 0120-149-931

2012年12月改訂

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

漢方の痛みと風邪の薬

風治散

第2類医薬品
(顆粒)

『風治散の特長』

風治散は漢方治療の古典の一つである「傷寒論」に記載されている本来は煎じて服用する葛根湯をエキス化して飲みやすく、はやく吸収されて効果が出るように顆粒剤にしたものです。

風治散はかぜのひきはじめて「何となくさむけがする」「くしゃみがでる」「首筋や背中がこわばる」「熱があるのに汗がでない」などの症状や肩こりや筋肉痛などに服用してください。



鼻かぜ



悪寒



頭痛



手や肩の痛み

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。	(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。	(8) 次の症状のある人。
(3) 体の虚弱な人。 (体力の衰えている人、体の弱い人)	むくみ、排尿困難
(4) 胃腸の弱い人。	(9) 次の診断を受けた人。
(5) 発汗傾向の著しい人。	高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
(6) 高齢者。	
- 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症；

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をご覧ください。

用法・用量

次の量を食前又は食後に、温湯又は水にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包(2.5g)	3回
15才未満～7才以上	2/3量	
7才未満～4才以上	1/2量	
4才未満～2才以上	1/3量	
2才未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

成分	分量
カッコン (葛根)	4.0g
マオウ (麻黄)	3.0g
ショウキョウ (生姜)	1.0g
タイソウ (大棗)	3.0g
ケイヒ (桂皮)	2.0g
シャクヤク (芍薬)	2.0g
カンソウ (甘草)	2.0g
	水製エキス 2.8g (白芍薬根湯エキス)

添加物として
デンプンを含有します。

〔注意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

かぜ薬の効果的なのみ方

かぜの症状があらわれ
たら早めにのみ始め、
かぜを軽くさせま
しょう。

年齢に応じて決めら
れた量を、胃腸の負
担の少ない食前又は
食後 30 分以内の
みましよう。

寝たまのますに、必
ず起き上げてコップ
1杯ほどのお湯または
水で、かまずにのみこ
みましよう。

中断するのはよくありま
せんが、もしのみ忘れたら、
気づいた時の次の食前又
は食後から再度決められ
た量をのみ始めましよう。

効きめがあって、かぜ
の症状がなくなった時
が薬をやめる時です。
しかし、副作用があら
われたら中止します。



保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は
下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室
0120-432-894 (フリーダイヤル)
[月～金曜日/10:00～17:00まで(祝祭日を除く)]

製造販売元: 株式会社 **和漢薬研究所**
〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193

発売元: **カポニー産業株式会社**
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8 (日本公衆衛生協会ビル)



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。




タケダ漢方便秘薬

漢方製剤〈大黃甘草湯〉

第2類医薬品

特徴

- タケダ漢方便秘薬は、生薬の“大黃”を主薬に“甘草”を配合した漢方処方「大黃甘草湯」にもとづく製品で、大腸の運動をととのえ自然に近いお通じを促します。
- おやすみ前におのみになると、翌朝には自然に近いおだやかなお通じが得られます。
- 「タケダ」が研究開発し、国内で栽培している「信州大黃」を用いています。
- 甘草が信州大黃の作用を助け、おだやかな排便を促します。
- 便秘に伴うお腹の張り(腹部膨満)・ふきでものなども緩和します。
- 黄かっ色の割線の入った錠剤です。



信州大黃 甘草

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
5. 1ヵ月以上連続して服用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

- 便秘
- 便秘に伴う腹部膨満・ふきでもの(にきび)・腸内異常醗酵・痔・頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・食欲不振(食欲減退)などの症状の緩和

<効能に関連する注意>

体力に関わらず、使用できる。

用法・用量

次の量を1日1回、就寝前に水またはお湯で、かますに服用すること。

年 齢	軽い便秘 (2～3日便通がないとき)	頑固な便秘 (4日以上便通がないとき)
	15歳以上	1錠～3錠
5歳～14歳	半錠～1錠半	1錠～2錠
5歳未満	服用しないこと	

錠剤には割線が入っているので、便通の具合をみながら、半錠ないし1錠ずつ増量(上記の最大量まで)または減量すること。

(裏面へ続く)

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。
- (3)次の人は服用量を控えめにすること。
体の衰弱している人、月経時の人
- (4)初回は最小量を用いること。
- (5)便通の改善がみられたら量を減らし、服用間隔をあけること。

成分 4錠(15歳以上の1日最大服用量)中に次の成分を含有する。

大黃甘草湯エキス散(金匱要略、26.7%量) ---- 800mg

〔ダイオウ 1,067mg
カンゾウ 267mg より抽出〕

添加物：無水ケイ酸、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

<成分に関連する注意>

- (1)本剤の服用により尿が橙色ないし赤色をおびることがありますが、ダイオウによるものなので心配ありません。
- (2)生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

ビン入り品、分包品について

- (1)小児の手の届かない所に保管すること。
- (2)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

ビン入り品について

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (3)ビンの中の詰め物は、フタをあげた後はすてること(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (4)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (5)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (6)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



分包品について

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、4日以内に服用すること。

便秘解消のアドバイス

便秘を治したい方に：

便秘薬を長期間にわたって使用すると、しだいに量を増やさないと効きにくくなる傾向にあります。規則正しい排便の習慣をとりもどすため、次のことに注意しましょう。

1. 排便の習慣をつけましょう。
2. 腹筋を強くしましょう。
3. 食事に注意しましょう。



1日1回きまった時間(朝食後が最適)にトイレへ行きましょう。便意はがまんしないことです。



腹部マッサージ、体をねじる運動、水泳などで腹筋を強くして排便しやすくしましょう。



朝起きた時に、冷たい水や牛乳をのんだり、果物や野菜等せん維質の多い食品を多く食べて腸の運動を促しましょう。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田コンシューマーヘルスケア株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

タケダ健康サイト

検索

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元  **武田コンシューマーヘルスケア株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ルビーナめぐり®

漢方製剤〈当帰芍薬散加人参〉

特徴

第2類医薬品

- ルビーナめぐりは、漢方処方「当帰芍薬散加人参」にもとづく製品です。
- 次のはたらきにより体全体のバランスを良くしていき、つらいむくみ・生理痛・頭重などを改善します。
 - ・血のめぐりを良くしていくことで、手足の先から体を温めます。
 - ・水のめぐりを良くしていくことで、冷えの原因となる水が体にたまっているのを改善します。
 - ・弱った胃腸のはたらきを活発にすることで、体を芯から温めます。
- 体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすい方に適しています。
- 特有の香味をもったかつ色の錠剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 胃腸の弱い人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：むくみ、月経痛、頭重、足腰の冷え症、月経不順、月経異常、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、更年期障害、めまい・立ちくらみ、肩こり、腰痛、しみ、耳鳴り、しもやけ

用法・用量

次の量を、食前または食間に、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
7歳～14歳	2錠	
7歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

(裏面へ続く)

成分 9錠(15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

当帰芍薬散加人参乾燥エキス	2,150mg
トウキ	1,750mg
タクシャ	1,750mg
センキュウ	1,500mg
シャクヤク	2,000mg
ブクリョウ	1,750mg
ビャクジュツ	1,500mg
ニンジン	1,000mg

上記生薬より抽出

添加物：無水ケイ酸、セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



漢方処方「当帰芍薬散加人参」について

冷えはむくみや生理痛を悪化させる原因にもなるため、冷え症でむくみや生理痛などの不調がある方は、冷え症への対処も大切です。

「当帰芍薬散加人参」は、血や水のめぐりを良くしていくことで体全体のバランスを整えて不調を改善する「当帰芍薬散」に、弱った胃腸のはたらきを活発にすることで体を温める「人参」を加えた漢方処方です。冷え症に優れた効果をあらわします。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田コンシューマーヘルスケア株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

タケダ健康サイト

検索

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元



武田コンシューマーヘルスケア株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

提携

日東薬品工業株式会社

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方薏苡仁湯エキス顆粒

(ヨクイニントウ)

特 徴

- 「薏苡仁湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「明医指掌」に収載され、しびれ、痛みや重だるいなどの疼痛に用いられる薬方です。これらの疼痛は水分の代謝障害やこれに血行障害、筋肉のけいれんなどが加わって起こるもので、熱感や腫脹また水がたまるなどの関節痛や筋肉痛に見られます。
- 関節痛、筋肉痛に効果があります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

* 効 能

体力中等度で、関節や筋肉のはれや痛みがあるものの次の諸症：関節痛、筋肉痛、神経痛



関節痛



筋肉痛

(裏面につづきます)

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分

成人1日の服用量3包(1包1.2g)中、次の成分を含んでいます。

薏苡仁湯エキス粉末M2,300mg

〔ヨクイニン4.0g、マオウ・トウキ・ビャクジュツ各2.0g、ケイヒ・シャクヤク各1.5g、カンゾウ1.0gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

●保温を心がけましょう



寒冷や湿気によって痛みが強くなる場合があります。保温を心がけましょう。お風呂などで体を温めると、痛みが和らぐだけでなく、関節も動かしやすくなります。

●カルシウムの摂取を



骨や筋肉を強くするため、ふだんからカルシウムの多い食物を摂取するとともに、日光浴や運動などを心がけることが大切です。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方乙字湯エキス顆粒

(オツジトウ)

特 徴

- 「乙字湯」は、江戸時代に著名な医学者の^{ハラナンヨウ}原南陽が「ぢ疾」専門の漢方処方として創製し、その後、処方内容を改良して今日まで広く使用されている薬方です。いぼ痔、きれ痔、便秘に効果があります。
- 穏やかな排便作用により、便通を整えます。
- 体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向の方の痔核、きれ痔や軽度の脱肛に効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の方は服用しないでください
生後3ヵ月未満の乳児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

🗨 相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
(5) 高齢者
(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(7) 次の症状のある人
むくみ
(8) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位（きれ痔、便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面につづきます)

効能

体力中等度以上で、大便秘結、便秘傾向のあるものの次の諸症：
痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛



痔核（いぼ痔）



きれ痔

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分

成人1日の服用量3包（1包1.2g）中、次の成分を含んでいます。

* 乙字湯エキス（1/2量）……………2,100mg
〔トウキ3.0g、サイコ2.5g、オウゴン1.5g、カンゾウ1.0g、
シヨウマ0.75g、ダイオウ0.5gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。

＜成分に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

● 便通を整えましょう



痔の予防のためには便通を整えることが大切です。偏食をさけ特に食物繊維を含んだ野菜、芋類、豆類、海藻類をとるよう心がけましょう。

● 保温と清潔を



毎日入浴して、おしりを清潔にしましょう。入浴は清潔にするだけでなく、おしりを温め血をよくする効果もあります。

● 排便習慣を身につけましょう



毎朝きちんとした排便習慣を身につけ、便秘と下痢をさけるようにすることが大切です。排便をするとき、あまりいきまないようにしましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334

受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

*:2018年2月改訂



中国の民間伝説「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

第2類医薬品
漢方製剤

ぼう こう せん
膀胱炎 様症状 **排尿痛 頻尿** など
五淋散エキス錠N「コタロー」

商品番号
T039

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



ちょっとしたかぜや、からだ（特に下半身）が冷えたり、疲れたとき、あるいは排尿を長時間我慢したことが引き金となって、昼夜を問わずトイレが近くなり、そのたびに耐えられない排尿痛があり、尿の色が濃いまたは濁っている、といったことが起こることがあります。

一般に女性に多いものですが、専門的な治療を受けてよくなっても、患部に不快感や残尿感がのこっていたり、すぐまた再発する場合も少なくありません。

五淋散エキス錠N「コタロー」は、このような泌尿器の炎症による症状をとるのに用いられる漢方薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
腸間膜静脈硬化症*	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。*

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(裏面につづく)

【効能・効果】

体力中等度のものの次の諸症：
排尿痛、頻尿、残尿感、尿のにごり

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	5錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量（本剤15錠中）					
ブクリョウ	3.0g	シャクヤク	1.0g	モクツウ	1.5g
トウキ	1.5g	サンシシ	1.0g	カッセキ	1.5g
オウゴン	1.5g	ジオウ	1.5g	シャゼンシ	1.5g
カンゾウ	1.5g	タクシャ	1.5g		
より抽出したエキス散3.36gを含有しています。					

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6)ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

毎日の生活で気をつけたいこと

- 水分を十分に補給する。
- 患部はいつも清潔にする。
- トイレを我慢しない。
- 過労を避け、からだを冷やさない。
- 辛いものや刺激物（アルコール、コーヒーなど）を避ける。

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)



左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きのうえ、お申込ください。漢方薬と食薬を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106
<http://www.kotaro.co.jp/>

A3021



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品
漢方製剤

小太郎 漢方鼻炎薬A 「コタロー」

商品番号
M070



私達をとり巻く環境や食生活は著しく変化し、鼻炎に悩まされている人が増えて
います。鼻がつまるのはうっとうしいもので、慢性化すると根気や集中力まで低下
することもしばしばです。

小太郎漢方鼻炎薬A「コタロー」(葛根湯加辛夷川芎エキス錠)は、鼻炎が続くと
発症しやすい鼻づまりを中心に、慢性鼻炎や蓄膿症ちくのうじにも用いられます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(裏面につづく)

【効能・効果】

慢性鼻炎、鼻づまり、蓄膿症

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回
15歳未満7歳以上	2錠	
7歳未満5歳以上	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量（本剤9錠中）					
カッコン	2.0g	シャクヤク	1.0g	カンゾウ	1.0g
マオウ	2.0g	タイソウ	1.5g	センキュウ	1.5g
ケイヒ	1.0g	ショウキョウ	0.5g	シンイ	1.5g
より抽出した葛根湯加川芎辛夷エキス（1/2量）2.25gを含有しています。					

添加物として含水二酸化ケイ素、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒプロメロース、アメ粉、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) めれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

【養生】

毎日の生活で気をつけたいこと

- * バランスのとれた食生活をし、アレルギーを起こすものは避ける。
- * こまめに掃除して室内を清潔にし、ジュウタンは敷かない。
- * 換気に気をつけて、新鮮な空気を吸う。
- * 犬、猫などのペットは飼わない。
- * 夜ふかしをせず、睡眠を十分にとる。
- * 適度な運動をして、気分転換をはかり、ストレスをためない。
- * 天気が良くて、風の強い日の外出はひかえる。



商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)



左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きのうえ、お申込みください。漢方薬と食事を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106
http://www.kotaro.co.jp/

A2931

※2016年6月改訂

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

関節炎、神経痛、腰痛に
生薬製剤

第②類医薬品

ロイマン湯

製品の特徴

関節炎、神経痛、腰痛などは、寒冷や湿度の変化に過敏に反応して痛みが強まるなど人知れぬ苦痛を伴うものです。

ロイマン湯は、7種類の生薬を配合した製剤で、関節炎、神経痛、腰痛、筋肉痛などの痛みをやわらげます。服用しやすいティーバッグにした製品です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

関節炎、神経痛、腰痛、関節リウマチ、筋肉痛

用法・用量

毎食前、1包に熱湯約180mL(コップ1杯)を加え、10分間振り出した後、服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用させないでください	

成分・分量 (3包中*)

ケイヒ末1,000mg シャクヤク末1,000mg
カンゾウ末600mg ショウキョウ末330mg
ビャクジュツ末1,300mg 加工ブシ末600mg
水製エキス*4,140mg*

〔ケイヒ2,000mg シャクヤク2,000mg タイソウ3,000mg〕
〔カンゾウ1,400mg ショウキョウ670mg ビャクジュツ2,700mg〕

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) アルミ袋開封後は品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

●ワンポイント情報

神経痛に対する心がけ

神経痛の原因には色々ありますが、適度な運動と十分な睡眠をとり、過度な疲労を避け、血行を良くして新陳代謝を活発にすることで改善が期待できます。また、痛みから不安やイライラがあると、ますます症状を悪化させますので、リラックスした生活を心がけてください。

毎日の食生活への配慮も肝要で、ビタミン・ミネラル類の豊富な野菜類・海藻類・果物類を適量、豆製品など良質な植物性タンパク質を多くとるよう心がけましょう。そして、アルコール類、コーヒー、動物性コレステロールの高い食品、過剰な塩分、刺激の強い香辛料などはなるべく控えましょう。身体を冷やす食物はなるべく避け、身体の中から温め、血液循環を良くして、新陳代謝を促すことが大切です。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370番2

GF807



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

漢方薬
かぜのひき始め、筋肉の痛み、肩こりに
サトウ葛根湯顆粒〈満量処方〉

サトウ葛根湯顆粒〈満量処方〉は…

- 漢方薬「葛根湯(かっこんとう)」をのみやすい顆粒にしました。
- 「葛根湯」は、中国で著わされた「傷寒論(しょうかんろん)」に記載されている漢方薬です。
- かぜのひき始め、鼻かぜ、肩こりなどに効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全 身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3.1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

★裏面につづく

【効能】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

下記の1回服用量を服用します。朝昼夕、食前または食間にそのまま水がお湯にて服用してください。またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上 7才未満	1/2包	
2才以上 4才未満	1/3包	
2才未満	服用しないでください	

※食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】3包中(1包1.6g)

葛根湯エキス ……………4.4g
 [カッコン 8g、マオウ 4g、タイソウ 4g、ケイヒ 3g、シャクヤク 3g、]
 カンゾウ 2g、ショウキョウ 1gより抽出。
 添加物として、D-マンニトール、アセスルファムK、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然物を用いていますので顆粒の色が多少異なることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎このような時におのみください

- かぜのひき始めの熱、寒け、頭痛、のどの痛み、関節痛、筋肉の痛みなどがあり、汗が出ないとき。
- 鼻かぜによるくしゃみ、鼻水、鼻づまりがあるとき。
- 肩がはった感じで頭が痛いとき。
- 首すじから肩・腕にかけて、こりや痛みを感じる時。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/le/ko/ijga/camp/index.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
 電話 03(5412)7393
 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

大黃甘草湯製剤

大正漢方便秘薬

販売名：大正漢方便秘薬 **第2類医薬品** 〈便秘薬〉

- ◆大正漢方便秘薬は、便秘や便秘に伴う肌あれ等の症状を改善する漢方処方「大黃甘草湯」の便秘薬です。
- ◆就寝前に服用していただくと、翌朝自然に近いお通じが得られます。
- ◆割線の入った、小粒で服用しやすい錠剤です。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
- 2 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること



- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 4 5～6日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、吐き気・嘔吐、腹痛

成 分

4錠中

大黃甘草湯エキス末(2/5量) 400mg
〔ダイオウ1600mg〕の抽出乾燥エキス末
〔カンゾウ 400mg〕

ダイオウとカンゾウの有効成分を抽出したエキスが大腸のはたらきを調節し、自然に近いお通じが得られます。

[注意]

- (1) 本剤の服用により、尿が橙色ないし赤色になることがあります。これは本剤中のダイオウによるもので、ご心配ありません。
- (2) 本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸、バレイシヨデンブ、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、硬化油

効能、用法・用量、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。 11

効 能





便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常発酵・痔などの症状の緩和

[注意] 体力に関わらず、使用できます。

用法・用量

次の量を就寝前にかまずに水又はぬるま湯で服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量(下記の最大量まで)又は減量してください。

年 令	1回量		服用回数
	2～3日便通がないとき	4日以上便通がないとき	
成人 (15才以上)	1錠～3錠 	2錠～4錠 	1日1回
小児 (5～14才)	半錠～1錠半 	1錠～2錠 	
5才未満	服用しないこと		

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)月経時の婦人は服用量を減らしてください。
- (4)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

- ①瓶口シールをはがして捨ててください。
- ②詰め物を取り出して捨ててください。

(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6カ月以内に服用してください。(品質保持のため)



便秘解消のポイント

〈まずは、生活習慣の見直しからはじめましょう〉

(1)規則正しい排便習慣

1日1回決まった時間(朝食後が最適)にトイレに行きましょう。便意は我慢しないことが大切です。



(2)食生活の改善

1日3度の規則正しい食生活と食物繊維を多く含んだ食品(野菜類、豆類、芋類、海藻等)を毎日とること、水分を多めにとることも大切です。



(3)適度な運動

運動不足は便秘の大敵。適度な運動をして腹筋をきたえたり、おなかをマッサージすることも大切です。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

KY7A1

2013年5月下旬部改訂
2013年5月(記載要領変更に伴う改訂)

(と-3)

この添付文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かぜの漢方製剤

葛根湯エキス顆粒DS

第2類医薬品

「葛根湯」は、漢方の古典「傷寒論」などに記載されている7種類の生薬からなる漢方製剤です。葛根湯エキス顆粒DSは、「葛根湯」のエキスを服用しやすい顆粒剤にしたもので、感冒の初期や鼻かぜ、肩こりなどに効果を発揮します。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3か月未満の乳児。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1か月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください






効能・効果

体力中等度以上のもので次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

(裏面もお読みください。)

用法・用量

次の量を、食前又は食間に服用してください。なるべく温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包 	3回
7才以上15才未満	2/3包 	
4才以上 7才未満	1/2包 	
2才以上 4才未満	1/3包 	
2才未満	1/4包 	

- 食前とは、食事の1時間から30分位前のことです。
- 食間とは、食事のあと、2時間位たったときのことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量 3包(成人1日量)中 (1包:1.2g)

葛根湯エキス(1/3量)..... 1604mg

〔カッコン 2.0g マオウ 1.5g タイソウ 1.5g
ケイヒ 1.0g シャクヤク 1.0g カンゾウ 1.0g〕より抽出
ショウキョウ 0.5g

添加物としてトウモロコシデンプン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスガビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素を含有します。

養生訓

かぜを早く治すコツは、早めにクスリを飲んで、休養、保温に心掛け、栄養のある食事をとりましょう。

休養：無理をせず身体を休め、十分に睡眠をとりましょう。

体力の回復とともにかぜの治りを助けます。

保温：保温をして血液循環をよくしましょう。

温度・湿度：室内の適切な温度と湿度を保ちましょう。

栄養：食事はビタミン、カロリーに富んだ消化のよいもの、あたたかいものをとりましょう。水分も十分補給しましょう。



ビタミン

発熱時はビタミンを多量に消耗します。



タンパク質

かぜウイルスに負けない体力が必要です。



水分

汗をかいたら水分の補給が大切です。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を2回しっかり折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 本品は大変吸湿しやすいので、分割して服用した後、袋の口をしっかりと折り返していなかったり、開封したままで放置したりすると、変色したり固まったりすることがあります。変色したり固まったりした場合には服用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話(076)435-5055

午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

発売元 白石薬品株式会社
大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元 第一薬品工業株式会社
富山市草島15-1

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

漢方製剤

第2類医薬品

漢方便秘薬「創至聖」



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

〈効能・効果に関連する注意〉

体力に関わらず、使用できる。

用法・用量

次の量を就寝前に水でかまずに服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量（下記の最大量まで）または減量する。

年 齢	2～3日便通がないとき (軽い便秘のとき)	4日以上便通がないとき (頑固な便秘のとき)	1日服用回数
成人(15才以上)	1錠～3錠	2錠～4錠	1 回
5才以上15才未満	半錠～1錠半	1錠～2錠	
5才未満	服用しないこと		

〈用法及び用量に関連する注意〉

5才以上の幼児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させること。

裏面も必ずお読みください。

成分・分量 1日量（4錠）中

大黄甘草湯エキス（1/2量）…………… 500mg

{ダイオウ(大黄) 2,000mg, カンゾウ(甘草) 500mgより製した乾燥エキス}

添加物：乳糖，セルロース，CMC-Ca，ステアリン酸Mg，タルクを含有

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり，品質が変わる。）
4. ビンの中の詰め物は，輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてあるので，フタを開けた後は捨てること。
5. ビンのフタの閉め方が不十分な場合，湿気などの影響で薬が変質することがあるので，服用のつどフタをよくしめること。
6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
7. 箱の「開封年月日」記入欄に，ビンを開封した日付を記入すること。一度開封した後は，品質保持の点から開封日より6カ月以内に服用すること。
8. この文書は本剤を服用する際に必要な注意事項などが記載されているのでビンとともに箱に入れたまま保管すること。



その他 (1) 本剤を服用中に尿が橙色ないし，赤色を帯びることがあります。これは本剤中のダイオウ（大黄）によるものです。

(2) 本剤は生薬（薬草の草根木皮）を用いた製品なので，製品により錠剤の色調が多少異なることがあります，効果は変わりありません。

漢方便秘薬「創至聖」は以下のような症状の方におすすめします。

1. 常習便秘に悩まされている方に適します。
2. 体力の強弱にあまり関係なく服用できます。
3. 本剤を就寝前に服用して翌朝ちょうどよい便通があれば，しばらくその錠数を服用してください。

便秘解消のアドバイス	 <p>朝食は必ず取りましょう。腸に刺激を与えます。毎朝，きまった時間にトイレに入り規則的な排便習慣をつけましょう。</p>	 <p>野菜や果物，イモ類など繊維の多いものを多く取って，腸の運動を活発にしましょう。起きがけの冷たい水や牛乳も腸を刺激します。</p>	 <p>腹筋運動や水泳などの適度な運動や，おなかのマッサージで腸のはたらきを助けましょう。</p>
------------	---	---	--

製品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号 076-472-1011 受付時間 9：00～16：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **北日本製薬株式会社**
富山県中新川郡上市町若杉55

A

*2018年2月改訂

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

おなかの脂肪が
多い方に

アトシトール

製品特徴

アトシトールは、体に脂肪が付きすぎた、いわゆる脂肪太りで、特におなかに脂肪がたまりやすい方の肥満症や、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘に効果があります。

○18種類の生薬から抽出した漢方エキスを、乾燥して錠剤に仕上げたお薬です。

○脂肪の分解・燃焼を促し、肥満症の改善に効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
*腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合又は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：
肥満症、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）

用法及び用量

次の量を、食前または食間に服用してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3 回
7歳以上15歳未満	4錠	
5歳以上7歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

- (1)定められた用法及び用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)食間とは…「食事と食事の間」を意味し、食後約2時間のことをいいます。


成分及び分量 1日量(18錠)中

トウキ	0.66g	ビャクジュツ	1.10g
シャクヤク	0.66g	キキョウ	1.10g
センキュウ	0.66g	オウゴン	1.10g
サンシシ	0.66g	カンゾウ	1.10g
レンギョウ	0.66g	セッコウ	1.10g
ハッカ	0.66g	ショウキョウ	0.22g
ケイガイ	0.66g	ポウショウ	0.825g
ポウフウ	0.66g	ダイオウ	0.825g
マオウ	0.66g	カッセキ	1.65g

上記生薬より得た防風通聖散料乾燥エキス2,750mgを含みます。
添加物として、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、ステアリン酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)



- (4)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

肥満の目安を調べる方法

○身長と体重から計算されるBMIという数値で肥満の目安を調べることができます。

※BMI:Body Mass Index(肥満指数)

BMIは、つぎの計算式で計算できます。

$$BMI = \frac{\text{体重 (kg)}}{\text{身長 (m)} \times \text{身長 (m)}}$$

BMI	肥満の判定
18.5未満	低体重(やせ)
18.5以上25未満	普通体重
25以上	肥満

肥満症とは

からだの組織に脂肪が過剰に蓄積した状態をいい、脂肪の付き方によって2つに分類されます。おなか回りが太くなるリンゴ型(内臓脂肪型)は男性に多く、下半身に皮下脂肪が多い洋ナシ型(皮下脂肪型)は女性に多いとされています。

お問い合わせ先

お買い求めのお店又は、下記にお願いいたします。
薬王製薬株式会社「お客様相談室」 電話0744-33-8855
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **薬王製薬株式会社** 奈良県磯城郡田原本町245番地

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



ツラレス[®] SPゼリー

販売名:ツラレスSPゼリー

<漢方製剤>
第2類医薬品

- 足のつり、こむらがえりの症状によく効きます。
- 漢方処方「芍薬甘草湯」が、急な筋肉の緊張をほぐし、痛い足のつりやこわばりをしっかり鎮めます。
- スティックゼリータイプで、携帯に便利。運動中や就寝中などに起こる急な症状に。水なしでどこでも服用できます。
- 後味すっきり、服用しやすいウメ風味です。

こんなときによく起こる
足のつり・こむらがえりに



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の診断を受けた人は服用しないでください。:心臓病 2. 症状があるときのための服用にとどめ、連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 次の症状のある人:むくみ (5) 次の診断を受けた人:高血圧、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、口の中でゼリーをくずして服用してください。

※食間とは、食後2～3時間をさす。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回
15歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)開封後はすみやかに服用してください。
- (3)薬剤がのどにつかえることのないよう注意してください。
- (4)本品は1回1包飲みきりですので、分割服用しないでください。
- (5)ゼリー剤のため、水分が出ることがあります。開封時及び服用時に、中身の飛び出しに注意してください。
- (6)切り取り部分で唇を切らないよう注意してください。

<服用方法>

①スティックを立てて持ち、**押**印を指で押さえ、切り口から切れ目に沿って切り取ってください。

②切り口をくわえ、指でしばり出すようにして服用してください。



【成分・分量】1日量2包(24g)中

芍薬甘草湯エキス(1/2量)……2.4g(シャクヤク3g、カンゾウ3gより抽出)

添加物として、カンテン末、カラギーナン、粉末還元麦芽糖水アメ、クエン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、スクラロース、デキストリン、ローカストビーンガム、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、プロピレングリコール、香料を含む。

※本剤は天然物(生薬)を成分としていますので、ゼリーの色が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先:ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元: **ロート製薬株式会社**
大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元: **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21

15917817K
OGL-18DA

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

足のむくみに飲んで効く
ムクトレール
九味檳榔湯乾燥エキス

第2類医薬品



特徴

- なかなか改善しない、つらい足のむくみを飲んで治します。
- 9種類の生薬が体の巡りを促し、水分代謝を整えます。
- 人が本来持っている治す力（自己治癒力）を高め、むくみを改善していきます。
- 1日2回の服用で、ずっと我慢していた繰り返すむくみに効果を発揮する漢方薬です。

こんな症状の方に

足のだるさ・
重さを感じる

くつ下の
跡が消えない

どっしり
足が太って見える

パンパンで
靴が履けない



⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力中等度以上で、全身倦怠感があり、とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸症：むくみ、疲労倦怠感、関節のはれや痛み、更年期障害、動悸、息切れ、神経症、胃腸炎

用法・用量

次の量を1日2回、食前又は食間に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	4錠	2回
15才未満	服用しないこと	

成分・分量

8錠（1日量）中
九味檳榔湯乾燥エキス・・・1.7g

（ビンロウジ 2.0g	コウボク 1.5g	ケイヒ 1.5g	）に相当
キッピ 1.5g	ソヨウ 0.75g	カンゾウ 0.5g	
ダイオウ 0.5g	モッコウ 0.5g	ショウキョウ 0.5g	

添加物として、軽質無水ケイ酸、カルメロースCa、合成ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 吸湿しやすいため、服用の都度ビンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (6) 錠剤に微少な斑点が見受けられることがありますが、これは成分によるもので、品質には問題ありません。
- (7) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (8) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911

受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）



カイゲンファーマ株式会社 大阪市中央区道修町二丁目5番14号

2012年10月
(記載要領変更に伴う改訂)
漢方製剤

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

ツムラの漢方製剤 ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒

「小柴胡湯」は、漢方の原典である『傷寒論』、『金匱要略』に記載されている漢方薬で、「かぜ」をひいてから数日たち少しこじらせてしまい、熱がでたり寒気がする、わき腹からみぞおちにかけてなんとなく重苦しい、食欲不振、はきけがするといった症状を伴う「かぜの後期」に用いられるほか、「胃炎」、「胃腸虚弱」、「疲労感」にも用いられています。
『ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒』は、「小柴胡湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。
肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
 - (8) インターフェロン製剤で治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください



●効能・効果

体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくもの次の諸症：

食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1包(1.875g)	2回
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品2包(3.75g)中、下記の割合の小柴胡湯エキス(1/2量)2.25gを含有します。

日局サイコ……………3.5g 日局ニンジン……………1.5g
 日局ハンゲ……………2.5g 日局カンゾウ……………1.0g
 日局オウゴン……………1.5g 日局ショウキョウ……………0.5g
 日局タイソウ……………1.5g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、お買求めのお店または下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

製造販売元



お客様相談窓口
 電話 0120-329-930
 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
<http://www.tsumura.co.jp/>

漢方製剤

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

清心蓮子飲エキス顆粒H

本品は漢方処方「清心蓮子飲」に基づく漢方製剤です。清心蓮子飲の「清心」には心身の高ぶりや炎症をさまし清涼するという意味が込められており、「蓮子」はハスの実のことで、この製剤の主薬（レンニク）でもあります。尿路の熱や腫れをひき、また痛みをやわらげ、尿の出をよくします。具体的には、残尿感、頻尿、排尿痛、排尿困難などの排尿異常に適応します。胃腸が弱く疲れやすい人で、不安感やイライラ感、不眠など精神症状をとまなう時に適した製剤です。清心蓮子飲エキス顆粒Hは9種類（レンニク、バクモンドウ、ブクリヨウ、ニンジン、シャゼンシ、オウゴン、オウギ、ジコツピ、カンゾウ）の生薬から抽出したエキスが、一緒に作用することにより、より良い効果を発揮します。

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の人は服用しないでください
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。



3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるもの次の諸症：残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ（おりもの）

（裏面へ続く）

〔用法・用量〕

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	1回 1包	3回
7歳以上 15歳未満	1回 2/3包	
4歳以上 7歳未満	1回 1/2包	
2歳以上 4歳未満	1回 1/3包	
2歳未満	1回 1/4包以下	



* 食間とは食事と食事の間を意味し、食後約2時間のことをいいます。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

〔成分・分量〕

成人1日服用量：3包 (6.0g) 中、次の成分を含有します。

清心蓮子飲エキス	4.5g
レンニク	3.5g
バクモンドウ	2.1g
ブクリョウ	2.8g
ニンジン	3.5g
シヤゼンシ	2.1g
オウゴン	2.1g
オウギ	2.8g
ジコツピ	2.1g
カンゾウ	0.7g

より得た乾燥エキス粉末

添加物として乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素を含有します。

※本剤は、和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因により品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
電話 03-3370-7174 (代表)
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 **アスゲン製薬株式会社**
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

2014年5月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

漢方製剤 さい こ けい し とう **ニタンダ 柴胡桂枝湯エキス顆粒**

第2類医薬品

漢方処方「柴胡桂枝湯」は、中国の漢方の原典「傷寒論」には、風邪の後期の症状、風邪のこじれた症状に適応するとされ、また、「金匱要略」には、みぞおち周辺部の腹痛に対して適応すると記述されています。

「ニタンダ柴胡桂枝湯エキス顆粒」は、胃腸炎やかぜの中期から後期の症状に効果があります。症状として、みぞおちから上腹部にかけてつまったような感じがあり、はきけや腹痛があるもの、かぜをひいて、熱は下がったが微熱があって体のだるさがとれない、自然に汗ばんだり寒気がしたりする、頭痛がする、胸苦しさなどがあって胃腸に不快感があるもの等に効果があります。

また、本剤中に柴胡桂枝湯エキスが、現在厚生労働省で認められている最大量配合されています。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<成分・分量>

1日量3包(9g)中に柴胡桂枝湯乾燥エキスが3.67g含まれています。

サイコ	5.0g
ハンゲ	4.0g
ケイヒ	2.5g
シャクヤク	2.5g
オウゴン	2.0g
ニンジン	2.0g
タイソウ	2.0g
カンゾウ	1.5g
ショウキョウ	1.0g

より抽出。

添加物として乳糖、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

<効能・効果>

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、食前又は食間なるべく空腹時に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成人(15歳以上)	1包
7～14歳	2/3包
4～6歳	1/2包
2～3歳	1/3包
2歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、原料の相違により、顆粒の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号

1501-16



服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品 せいけ ちばくじおうがん
漢方製剤 精華 **知柏地黄丸** 商品番号
E303

本剤は、漢方の古典「い そうきんかん医宗金鑑」に収載されたちばくじ おうがん知柏地黄丸に準拠して製造された丸剤です。

中高年になって、体がだるく、あるいは腰痛が起こるなどして下半身のおとろえを感じ、また顔や手足がほてる、あるいは口のかわきを覚えながら、排尿困難、逆にトイレが近い、といったことが起こります。

これらは中医学でいんきょかお陰虚火旺の症状とあって、体の中の潤いをもたらす体液（陰液）が不足（虚）し、腎の働きがいわばオーバーヒートした状態（火旺）で起こる症状とみなします。これは若い人でも過労などで体力・気力を過酷に消耗したあとにもみられる状態です。

ちばくじ おうがん知柏地黄丸は、ろくみじ おうがん六味地黄丸に、神経系の興奮をおさえるとされるち知母（ハナスゲの根茎）とおぼく黄柏（キハダの樹皮）を加えた漢方薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気、胸やけ、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

（裏面につづく）

【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渴があるものの次の諸症：
顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ

【用法・用量】

水又は白湯（さゆ）で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15歳以上）	9丸	2回
15歳未満	服用しないでください	

【成分・分量】

成分・分量（本剤18丸中）		
チモ……………0.65 g	サンヤク……………1.30 g	
オウバク……………0.65 g	ボタンピ……………0.98 g	
ジオウ……………2.59 g	ブクリョウ……………0.98 g	
サンシュユ……………1.30 g	タクシャ……………0.98 g	
より抽出した知柏地黄丸エキス3.0 gを含有しています。		

添加物としてバレイシヨデンブンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。
水分は丸剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で丸剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6)ピンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に丸剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

発売元  **小太郎漢方製薬株式会社**
大阪市北区中津2丁目5番23号
製造販売元 **八ッ目製薬株式会社**
東京都江戸川区船堀2-14-14

A25B1

2017年2月作成

第2類医薬品

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

漢方の安定剤で 穏やかな眠りを

漢方製剤 抑肝散

スリーピンα

■製品の特徴

「スリーピンα」は、7種類の天然生薬からなる漢方処方「抑肝散」配合の医薬品です。ストレスによる自律神経のアンバランスを整え、神経のたかぶりや不安などからくる不眠症、神経症に効果があります。

「いろいろ考えて寝付けない」「夜中に目が覚めて眠れない」「熟睡できない」など、毎日の睡眠に不安を感じる幅広い世代の方に服用いただけます。

加齢による不眠にも安心してお使いいただけますので、シニア世代にもおすすめです。

- 自律神経に働きかけて精神を安定し不安をラクにすることで、つらい不眠を改善します。
- 睡眠リズムを整えることから、睡眠の質を高める効果が期待できます。
- 「朝起きてても疲れがとれない」「ぐっすり眠った感じがしない」という方にも。
- 夜眠りにくいときに、枕元に置いて服用しやすい分包タイプです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)胃腸の弱い人。
 - (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
心不全	動くと息が苦しい、疲れやすい、足がむくむ、急に体重が増えた。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：

不眠症、神経症、歯ぎしり、更年期障害、血の道症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）

〈効能・効果に関連する注意〉

- (1)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期などの女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことである。
- (2)小児疳症（しょうにかんしょう）とは、神経の興奮によっておこる「イライラ・怒りっぽいなどの感情のたかぶり、ひきつけ、興奮して眠れない、筋肉のひきつりやけいれんなど」の小児の症状です。

■ 用法・用量

次の量を、食前または食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)食間とは食後2～3時間を指します。

■ 成分・分量（成人の1日量12錠中）

抑肝散乾燥エキス（11/20量）……………1.88g

〔チョウトウコウ・トウキ・センキュウ各1.65g、ブクリヨウ・ビヤクジュツ各2.2g、サイコ1.1g、カンゾウ〕
0.825g

添加物として、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ステアリン酸を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)1包を分割した残りは袋の切り口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電話：0744-33-8855

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245番地

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第2類医薬品

漢方製剤

のどがはれて痛む扁桃炎・扁桃周囲炎に

き きょうとう

【救心漢方】桔梗湯エキス散

【救心漢方】桔梗湯エキス散は、漢方医学の原典『傷寒論』、『金匱要略』に記載されている「桔梗湯」をのみやすい微粒状のエキス散剤としたものです。

「桔梗湯」は、のどの痛みに使用する「甘草湯」に、消炎効果のある「桔梗」を加えた薬方で、のどが赤くはれて痛む扁桃炎や扁桃周囲炎などに用いられます。

◆【救心漢方】桔梗湯エキス散は、次のような症状（扁桃炎・扁桃周囲炎）を目標として使用すると、すぐれた効きめを発揮します。

- ◇かぜなどにより、のどが赤くはれて痛む
- ◇のどの使いすぎで、のどがはれて痛む
- ◇気候の急激な変化によって、のどがはれて痛む
- ◇のどのはれや痛みで、異物感があり、ものをのみ下しにくい
- ◇のどがはれて、声がかすれ、咳や痰が出る

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】
次の人は服用しないこと
生後3カ月未満の乳児

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の症状のある人
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効 能

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症:扁桃炎、扁桃周囲炎

用法・用量

食前または食間に少しずつ口の中に含み、水またはお湯で徐々に溶かして服用すること

年 齢	1 回量	服用回数
大人 (15才以上)	1 包	1 日 3 回
7~14才	$\frac{2}{3}$ 包	
4~6才	$\frac{1}{2}$ 包	
2~3才	$\frac{1}{3}$ 包	
2才未満	$\frac{1}{4}$ 包	

食間とは…
食後2~3時間
を指します。

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
(2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること

【効果的なのみ方】

本剤は、一息にのみほさずに、少しずつ口の中に含み、水またはお湯でゆっくり溶かすようにしておのみください。有効成分が炎症を起こしているのどに直接作用して、より効果的です。

成 分

【救心漢方】桔梗湯エキス散は、黄かっ色の微粒状の散剤で、3包(1包1.5g)中、下記生薬の抽出乾燥エキス(桔梗湯乾燥エキス)1,470mgを含有します。

[キキョウ……………2.0g、カンゾウ……………3.0g]

添加物として乳糖、部分アルファ化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸を含有します。

保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話：03-5385-3211(代表)

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)



救心製薬株式会社
東京都杉並区和田1-21-7

研究成果の刊行に関する一覧表

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年

その他 ダウンロードサイト

タイトル名	URL	発表年
漢方セルフメディケーション	https://www.kampo-self.jp	2020（改訂）

厚生労働大臣 殿

機関名 国立医薬

所属研究機関長 職名 所長

氏名 合田 幸

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業
2. 研究課題名 一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究
3. 研究者名 (所属部局・職名) 生薬部 部長
(氏名・フリガナ) 袴塚 高志 (ハカマツカ タカシ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入(※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査(※2)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称:)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

(※2) 未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 <input checked="" type="checkbox"/> 未受講 <input type="checkbox"/>
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由:)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合は委託先機関:)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由:)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (有の場合はその内容:)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣 殿

機関名 国立医薬

所属研究機関長 職名 所長

氏名 合田 幸

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業
2. 研究課題名 一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究
3. 研究者名 (所属部局・職名) 生薬部・主任研究官
(氏名・フリガナ) 政田 さやか (マサダ サヤカ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入 (※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査 (※2)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称:)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2) 未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 <input checked="" type="checkbox"/> 未受講 <input type="checkbox"/>
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由:)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合は委託先機関:)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由:)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (有の場合はその内容:)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣 殿

機関名 名城大学

所属研究機関長 職名 学長

氏名 小原 章

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反の管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業
2. 研究課題名 一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究
3. 研究者名 (所属部局・職名) 薬学部 教授
(氏名・フリガナ) 能勢 充彦 (ノセ ミツヒコ)

4. 倫理審査の状況

	該当性の有無		左記で該当がある場合のみ記入(※1)		
	有	無	審査済み	審査した機関	未審査(※2)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
遺伝子治療等臨床研究に関する指針	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	名城大学	<input type="checkbox"/>
その他、該当する倫理指針があれば記入すること (指針の名称:)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

(※2) 未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況	受講 <input checked="" type="checkbox"/> 未受講 <input type="checkbox"/>
-------------	---

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由:)
当研究機関におけるCOI委員会設置の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合は委託先機関:)
当研究に係るCOIについての報告・審査の有無	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (無の場合はその理由:)
当研究に係るCOIについての指導・管理の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (有の場合はその内容:)

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。