

## 予防啓発活動におけるPDCAサイクルシステムの開発と機能的展開に関する研究

研究代表者：塩野徳史（大阪青山大学 健康科学部看護学科 准教授）

研究協力者：市川誠一（人間環境大学）、生島嗣（NPO 法人ふれいす東京）、  
高久陽介（NPO 法人 JaNP+）

研究協力：北海道；にじいろほっかいどう 東北；やろっこ/ZEL 首都圏；NPO 法人 akta/akta  
横浜；NPO 法人 SHIP 東海；ANGEL LIFE NAGOYA/rise 近畿；MASH 大阪/dista  
中国・四国；HaaT えひめ/BRIGE プロジェクト 沖縄；nankr 沖縄/mabui

### 研究要旨

調査結果については表 1～表 7 に示した。基本属性では、居住形態では独居、勤務形態、最終学歴、婚姻暦等で有意差がみられた。現在の職業も常勤（正規雇用）が 70.2%から 68.3%となり有意差がみられた ( $p=0.02$ )。またコンドーム携帯率や購入経験についても有意差がみられ、商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合であった。

U=U の認知についても商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で「よく知っている」と回答する割合が高く 44.6%であった。

これまでの HIV 抗体検査受検経験も商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合で、84.4%、過去 1 年間の受検経験は 67.3%であった。

「HIV 感染予防のためのセックス前の服薬（PrEP）」や「HIV に感染したかもしれないときの予防服薬（PEP）」に関する情報について、よく知っていた割合は 52.8%、現在 PrEP をしたことがあると回答した割合は 21.2%であった。

4 群間に分類すると、商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で、ほとんどの割合が高く、リスクの高い層に介入効果が示されていると考えられる。一方で、PrEP をしたことがあると回答した割合も高く、2 割程度となっており、コミュニティのコアな層では使用行動が進んでいることが示唆された。またコンドームの常用割合は年々低くなっており、本調査結果でも 4 群間で有意差はみられず、3 割程度となっていた。そのため、包括的な取り組みが必要である。

### A. 研究目的

本研究では、北海道・東北・東京・神奈川県・東海・大阪・中国・四国・沖縄地域の CBO と協働し、現在展開されている予防啓発活動を整理し、可視化することを目的としている。そして、アウトプットをもとに、班会議等で社会疫学的視点や、CBO による相互間、相談支援者・HIV 陽性当事者の視点を含み、評価する体制を構築する。

またインターネットの近年の普及やゲイ・ツーリズムを背景として、全地域が共同して取り組むことが求められている。またコミュニティセンターのない地域での HIV 感染報告も増加傾向であり、単独地域のみでは現行の予防啓発活動にも限界があると考えられる。したがって予防活動の方針や計画を確認、見直しの必要があり、それらもふまえて班会議で検討し、オールジャパンでの予防啓発活動

について年数回 CBO 当事者を主体とした会議で計画を検討する。最終年度には予防啓発活動の方向性について、包括的な視点を含んだアクション・プランを策定することを目標としている。

評価の方法としては、プログラムレベル・コミュニティレベル・ソーシャルレベルなどの視点から得られたデータを再構成する必要があると思われるが、初年度は、基礎的な資料を得ることを目的として、MSM における新しい予防(PEP/PrEP)の準備性について、質問紙調査を実施した。本年度はコロナ禍のため、班会議等の集会を持つことが困難であり、日本の MSM における状況を把握することを目的に、初年度と同様の方法で調査を実施した。

2015 年の国勢調査を基に、20 歳から 59 歳の成人男性を 47 都道府県と年齢階級によって層化し、その割合に基づき、A 社・B 社保有のニター登録者を比例配分したのち、得られた成人男性を対象にしてスクリーニング調査を実施した。

## B. 研究方法

本調査は「日本に居住する生涯の性交相手が同性または両方である男性」を対象として、スクリーニング調査と同様に居住ブロックと年齢階級によって 2 段階抽出を行い、N 社 2,000 人を比例配分し、本調査を実施した。

本調査の質問項目は HIV や性感染症に関する知識、新たな予防方法についての知識・意識、過去 6 ヶ月間の HIV やエイズに関する対話経験、検査行動、性感染症既往歴、性行動などの全 19 問とした。

本調査の質問項目は婚姻状況、HIV や性感染症に関する知識、過去 6 ヶ月間の HIV やエイズに関する対話経験、検査行動、性感染症既往歴、性行動、セックスワーク時の環境などを尋ね、分析では商業施設利用別かつコミュニティセンター認知別、インターネット利用等で 4 群に分類し、クロス集計を行った。さらに各地域別に分析した。カイ 2 乗検定を用いて検討した。有意水準

を 5% 未満とした。データの集計および統計処理には IBM SPSS Statistics 23 (Windows) を用いた。

(倫理面への配慮)

本研究実施については大阪青山大学研究倫理審査委員会より実施の承認を得た。

## C. 研究結果

調査結果については表 1～表 7 に示した。基本属性では、居住形態では独居、勤務形態、最終学歴、婚姻暦等で有意差がみられた。現在の職業も常勤(正規雇用)が 70.2%から 68.3%となり有意差がみられた ( $p=0.02$ )。またコンドーム携帯率や購入経験についても有意差がみられ、商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合であった。

U=U の認知についても商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で「よく知っている」と回答する割合が高く 44.6%であった。

これまでの HIV 抗体検査受検経験も商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合で、84.4%、過去 1 年間の受検経験は 67.3%であった。

「HIV 感染予防のためのセックス前の服薬(PrEP)」や「HIV に感染したかもしれないときの予防服薬(PEP)」に関する情報について、よく知っていた割合は 52.8%、現在 PrEP をしたことがあると回答した割合は 21.2%であった。

## D. 考察

先行研究と比べ、MSM 割合は著変なく、再現性も認められたと考えられる。商業施設利用については先行研究と比較してやや高い割合か変動がみられず、コロナ禍で時短営業や休業が続く結果でもあったが、生涯の経験について尋ねた結果が反映されていると考えられる。

4 群間に分類すると、商業施設を利用する

コミュニティセンター利用者で、ほとんどの割合が高く、リスクの高い層に介入効果が示されていると考えられる。一方で、PrEPをしたことがあると回答した割合も高く、2割程度となっており、コミュニティのコアな層では使用行動が進んでいることが示唆された。またコンドームの常用割合は年々低くなっており、本調査結果でも4群間で有意差はみられず、3割程度となっていた。そのため、包括的な取り組みが必要である。

## E. 結論

各地域のPrEPに関する情報の浸透は低い割合にとどまっており、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い検査行動が減少していることも示唆される。オールジャパンでの予防啓発の浸透度はある程度可視化され、予防啓発活動の効果評価についても可視化されつつあると考えられる。コロナ禍の影響がいつまで継続するのかによって、周囲の状況の変化は著しく、啓発介入の手法を再考する必要性にせまられている。

この結果を今後の予防啓発活動に還元していくことが必要である。

## G. 研究発表

### 1. 論文発表

- 1) ○塩野徳史, 市川誠一, 金子典代, 佐々木由理: 都市部保健所における HIV 抗体検査受検者の特性, 厚生指標, 2018, 65(5): 35-42
- 2) ○金子典代, 塩野徳史, 本間隆之, 岩橋恒太, 健山正男, 市川誠一: 地方都市在住の MSM (Men who have sex with men) における調査時点までと過去1年の HIV 検査経験と関連要因. 日本エイズ学会誌, 2019, 21(1) (受理済).

### 2. 学会発表

- 1) ○塩野徳史 ゲイコミュニティにおける HIV 抗体検査—『これまで』と『これから』

シンポジウム 3 HIV 将来予測と流行阻止 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 2) ○塩野徳史 HIV 検査の受検阻害要因としてのスティグマ シンポジウム 4 スティグマの払拭は誰が担うのか 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 3) ○塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 宮田りりい, 大畑泰次郎, 伴仲昭彦, 鬼塚哲郎, 市川誠一 商業施設を利用しはじめの若年層 MSM を対象とした予防啓発介入の開発と効果評価 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 4) ○荒木順子, 金子典代, 木南拓也, 岩橋恒太, 佐久間久弘, 阿部甚兵, 大島 岳, 太田 貴, 石田敏彦, 塩野徳史, 新山 賢, 金城 健, 本間隆之, 市川誠一 akta で展開したセーフアークスキャンペーンとコミュニティベース調査による効果評価 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 5) ○宮田りりい, 塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 大畑泰次郎, 市川誠一 MSM における性交相手との出会いの場所と方法—一年齢層による差異について— 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 6) ○塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 宮田りりい MSM における検査行動に関する尺度開発とコミュニティセンターdista利用者の変化 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 7) ○後藤大輔, 中村理恵, 宮田りりい, 塩野徳史 若年層向けの行政と連携した予防啓発方法の試み 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 8) ○川畑拓也, 小島洋子, 森 治代, 駒野 淳, 岩佐 厚, 亀岡 博, 菅野展史, 近藤雅彦, 杉本賢治, 高田昌彦, 田端運久, 中

村幸生, 古林敬一, 清田敦彦, 伏谷加奈子, 塩野徳史, 後藤大輔, 町 登志雄, 柴田敏之, 木下 優 大阪府における MSM 向け HIV/STI 検査相談事業・平成 28 年度実績報告 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 9) ○Takaku Michiko, Dorjgotov Myagmardorj, Gombo Erdenetuya, Galsanjamts Nyampurev, Jagdagsuren Davaalkham, Ichikawa Seiichi, Shiono Satoshi, Kaneko Noriyo, Oka Shinichi Studies on NGOs' HIV prevention interventions targeting MSM community in Mongolia The 31st Annual Meeting of the Japanese Society for AIDS Research, Tokyo, Nov. 24-26, 2017
- 10) ○櫻井理恵, 真木景子, 浦林純江, 青木理恵, 浅井千絵, 松本健二, 小向 潤, 植田英也, 半羽宏之, 松村直樹, 久保徹朗, 安井典子, 塩野徳史, 市川誠一 保健福祉センターにおける HIV 抗原抗体検査受検者アンケートから見た MSM 対策の評価 ワークショップ 3 検査・相談体制 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26
- 11) ○塩野徳史: U=U をめぐるメッセージと予防啓発 第 32 回日本エイズ学会学術集会・総会 シンポジウム 9 U=U 誰が何をどう伝えるか: 陽性者の人権とスティグマゼロへの取り組みを視野に入れて 大阪, H30. 12. 2-
- 12) ○塩野徳史: 社会分野における予防指針の課題 第 32 回日本エイズ学会学術集会・総会 日本エイズ学会シンポジウム エイズ予防指針改定の背景と課題 大阪, H30. 12. 2-4

2. 実用新案登録

なし。

3. その他

なし。

## H. 知的財産権の出願・登録状況

(予定を含む)

1. 特許取得

なし。

表 1-1 基本属性

	商業施設利用				商業施設非利用				合計		Pearson カイ2乗	
	センター利用		センター非利用		ネット利用		ネット非利用		n=2000			
	n=269		n=665		n=363		n=703		n=2000			
居住地												
北海道・東北	25	9.3%	68	10.2%	40	11.0%	80	11.4%	213	10.7%	0.43	
関東	110	40.9%	236	35.5%	132	36.4%	235	33.4%	713	35.7%		
北陸・甲信越	15	5.6%	43	6.5%	14	3.9%	46	6.5%	118	5.9%		
東海	33	12.3%	66	9.9%	48	13.2%	93	13.2%	240	12.0%		
近畿	40	14.9%	104	15.6%	61	16.8%	103	14.7%	308	15.4%		
中国・四国	15	5.6%	53	8.0%	27	7.4%	65	9.2%	160	8.0%		
九州	31	11.5%	95	14.3%	41	11.3%	81	11.5%	248	12.4%		
現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。												
1年未満	26	9.7%	25	3.8%	23	6.3%	23	3.3%	97	4.9%		<0.01
1-5年未満	36	13.4%	89	13.4%	55	15.2%	84	11.9%	264	13.2%		
5-10年未満	49	18.2%	74	11.1%	55	15.2%	81	11.5%	259	13.0%		
10-20年未満	41	15.2%	120	18.0%	65	17.9%	140	19.9%	366	18.3%		
20年以上	117	43.5%	357	53.7%	165	45.5%	375	53.3%	1014	50.7%		
現在、一人暮らしですか。												
はい(1人暮らし)	144	53.5%	258	38.8%	111	30.6%	174	24.8%	687	34.4%	<0.01	
いいえ	113	42.0%	407	61.2%	250	68.9%	512	72.8%	1282	64.1%		
定住している家はない	12	4.5%	0	0.0%	2	0.6%	17	2.4%	31	1.6%		
最終学歴												
中学校	11	4.1%	22	3.3%	13	3.6%	20	2.8%	66	3.3%	0.01	
高等学校	41	15.2%	164	24.7%	98	27.0%	168	23.9%	471	23.6%		
専門学校/短大/高専	37	13.8%	119	17.9%	44	12.1%	100	14.2%	300	15.0%		
大学/大学院	180	66.9%	360	54.1%	208	57.3%	415	59.0%	1163	58.2%		
現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。												
常勤(正規雇用)	185	68.8%	418	62.9%	255	70.2%	507	72.1%	1365	68.3%	<0.01	
常勤(非正規雇用)	15	5.6%	52	7.8%	33	9.1%	28	4.0%	128	6.4%		
パート/アルバイト/フリーランス	40	14.9%	59	8.9%	32	8.8%	60	8.5%	191	9.6%		
経営者/個人事業主	20	7.4%	60	9.0%	19	5.2%	55	7.8%	154	7.7%		
働いていない	9	3.3%	76	11.4%	24	6.6%	53	7.5%	162	8.1%		
現在結婚していますか。												
結婚している	136	50.6%	214	32.2%	179	49.3%	420	59.7%	949	47.5%	<0.01	
離別・死別	22	8.2%	45	6.8%	23	6.3%	38	5.4%	128	6.4%		
未婚	111	41.3%	406	61.1%	161	44.4%	245	34.9%	923	46.2%		
これまでに性交渉(セックス)をした相手の性別は次のどれに該当しますか。												
同性のみ	124	46.1%	273	41.1%	152	41.9%	463	65.9%	1012	50.6%	<0.01	
同性と異性の両方	145	53.9%	392	58.9%	211	58.1%	240	34.1%	988	49.4%		
これまでに性交渉(セックス)をした男性の人数は何人ですか。												
1人	69	25.7%	99	14.9%	111	30.6%	357	50.8%	636	31.8%	<0.01	
2人	59	21.9%	49	7.4%	53	14.6%	78	11.1%	239	12.0%		
3人以上	141	52.4%	517	77.7%	199	54.8%	268	38.1%	1125	56.3%		
これまでに男性と性交渉(セックス)をした回数は何回ですか。												
1回	53	19.7%	87	13.1%	121	33.3%	370	52.6%	631	31.6%	<0.01	
2回	69	25.7%	27	4.1%	44	12.1%	62	8.8%	202	10.1%		
3回以上	147	54.6%	551	82.9%	198	54.5%	271	38.5%	1167	58.4%		
自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。*												
誰にも話していない	16	14.5%	143	53.0%	25	50.0%	10	43.5%	194	42.8%	<0.01	
1-2人	41	37.3%	43	15.9%	9	18.0%	8	34.8%	101	22.3%		
3人以上	53	48.2%	84	31.1%	16	32.0%	5	21.7%	158	34.9%		
これまでに相手にお金を払って性交渉(セックス)をしたことがありますか。												
ある	199	74.0%	302	45.4%	200	55.1%	254	36.1%	955	47.8%	<0.01	
ない	70	26.0%	363	54.6%	163	44.9%	449	63.9%	1045	52.3%		
これまでに相手からお金をもらって性交渉(セックス)をしたことがありますか。												
ある	181	67.3%	145	21.8%	61	16.8%	65	9.2%	452	22.6%	<0.01	
ない	88	32.7%	520	78.2%	302	83.2%	638	90.8%	1548	77.4%		
身近なHIV感染者の有無												
いない・いないと思う	63	23.4%	343	51.6%	219	60.3%	451	64.2%	1076	53.8%	<0.01	
わからない	22	8.2%	153	23.0%	100	27.5%	204	29.0%	479	24.0%		
いる・いると思う	184	68.4%	169	25.4%	44	12.1%	48	6.8%	445	22.3%		
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。												
ある	202	75.1%	211	31.7%	118	32.5%	152	21.6%	683	34.2%	<0.01	
ない	67	24.9%	454	68.3%	245	67.5%	551	78.4%	1317	65.9%		
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。												
いつも身近に持っていた	171	63.6%	181	27.2%	104	28.7%	111	15.8%	567	28.4%	<0.01	
時々は身近に持っていた	67	24.9%	173	26.0%	97	26.7%	134	19.1%	471	23.6%		
まったく身近にはなかった	31	11.5%	311	46.8%	162	44.6%	458	65.1%	962	48.1%		

\*ゲイと回答した人のみ

表 1-2 予防啓発活動の浸透度

	商業施設利用				商業施設非利用				合計		Pearson カイ2乗
	センター利用		センター非利用		ネット利用		ネット非利用		n=2000		
	n=269		n=665		n=363		n=703				
日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。											
よく知っている	132	49.1%	112	16.8%	14	3.9%	14	2.0%	272	13.6%	<0.01
少し知っている	100	37.2%	239	35.9%	70	19.3%	87	12.4%	496	24.8%	
あまり知らない	32	11.9%	138	20.8%	89	24.5%	177	25.2%	436	21.8%	
全く知らない	5	1.9%	176	26.5%	190	52.3%	425	60.5%	796	39.8%	
これまでに性感染症にかかったことがありますか。											
ある	165	61.3%	187	28.1%	82	22.6%	89	12.7%	523	26.2%	<0.01
ない	104	38.7%	478	71.9%	281	77.4%	614	87.3%	1477	73.9%	
生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)											
梅毒	50	18.6%	42	6.3%	8	2.2%	2	0.3%	102	5.1%	<0.01
A型肝炎	50	18.6%	4	0.6%	1	0.3%	1	0.1%	56	2.8%	<0.01
B型肝炎	41	15.2%	17	2.6%	9	2.5%	1	0.1%	68	3.4%	<0.01
HIV感染症	33	12.3%	30	4.5%	10	2.8%	46	6.5%	119	6.0%	<0.01
PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。											
とてもよく知っている	142	52.8%	35	5.3%	20	5.5%	16	2.3%	213	10.7%	<0.01
具体的には知らないが、聞いたことはある	102	37.9%	211	31.7%	69	19.0%	111	15.8%	493	24.7%	
まったく知らなかった	25	9.3%	419	63.0%	274	75.5%	576	81.9%	1294	64.7%	
友達や知り合い、セックスの相手で、HIV陰性者 (HIVに感染していない人) の中にPrEPをしている人はいると思いますか。											
いる	94	34.9%	25	3.8%	7	1.9%	6	0.9%	132	6.6%	<0.01
いると思う	95	35.3%	89	13.4%	32	8.8%	22	3.1%	238	11.9%	
いないと思う	43	16.0%	211	31.7%	129	35.5%	220	31.3%	603	30.2%	
いない	12	4.5%	82	12.3%	58	16.0%	155	22.0%	307	15.4%	
わからない	25	9.3%	258	38.8%	137	37.7%	300	42.7%	720	36.0%	
あなたはPrEPをしたいと思いますか。											
服薬したい	67	24.9%	89	13.4%	34	9.4%	29	4.1%	219	11.0%	<0.01
どちらかといえば、服薬したい	96	35.7%	209	31.4%	107	29.5%	108	15.4%	520	26.0%	
どちらかといえば、服薬したくない	45	16.7%	171	25.7%	117	32.2%	215	30.6%	548	27.4%	
服薬したくない	28	10.4%	166	25.0%	95	26.2%	305	43.4%	594	29.7%	
治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている	33	12.3%	30	4.5%	10	2.8%	46	6.5%	119	6.0%	
あなたはPrEPをしたことがありますか。											
過去に飲んだことがある	119	44.2%	11	1.7%	13	3.6%	5	0.7%	148	7.4%	<0.01
現在飲んでいる	57	21.2%	6	0.9%	8	2.2%	21	3.0%	92	4.6%	
一度も飲んだことがない	93	34.6%	648	97.4%	342	94.2%	677	96.3%	1760	88.0%	
コミュニティセンター-ZEL(宮城県仙台市)											
これまでに1度は行ったことがある	125	46.5%	0	0.0%	2	0.6%	5	0.7%	132	6.6%	<0.01
知っているけど行ったことはない	72	26.8%	50	7.5%	28	7.7%	39	5.5%	189	9.5%	
知らない	72	26.8%	615	92.5%	333	91.7%	659	93.7%	1679	84.0%	
コミュニティセンター-akta(東京都新宿区)											
これまでに1度は行ったことがある	146	54.3%	0	0.0%	6	1.7%	7	1.0%	159	8.0%	<0.01
知っているけど行ったことはない	89	33.1%	100	15.0%	29	8.0%	38	5.4%	256	12.8%	
知らない	34	12.6%	565	85.0%	328	90.4%	658	93.6%	1585	79.3%	
コミュニティセンター-rise(愛知県名古屋市)											
これまでに1度は行ったことがある	118	43.9%	0	0.0%	2	0.6%	3	0.4%	123	6.2%	<0.01
知っているけど行ったことはない	80	29.7%	44	6.6%	32	8.8%	34	4.8%	190	9.5%	
知らない	71	26.4%	621	93.4%	329	90.6%	666	94.7%	1687	84.4%	
コミュニティセンター-dista(大阪府大阪市)											
これまでに1度は行ったことがある	145	53.9%	0	0.0%	3	0.8%	8	1.1%	156	7.8%	<0.01
知っているけど行ったことはない	70	26.0%	58	8.7%	26	7.2%	30	4.3%	184	9.2%	
知らない	54	20.1%	607	91.3%	334	92.0%	665	94.6%	1660	83.0%	
コミュニティセンター-Haco(福岡県福岡市)											
これまでに1度は行ったことがある	115	42.8%	0	0.0%	2	0.6%	6	0.9%	123	6.2%	<0.01
知っているけど行ったことはない	84	31.2%	54	8.1%	25	6.9%	37	5.3%	200	10.0%	
知らない	70	26.0%	611	91.9%	336	92.6%	660	93.9%	1677	83.9%	
コミュニティセンター-mabui(沖縄県那覇市)											
これまでに1度は行ったことがある	109	40.5%	0	0.0%	5	1.4%	7	1.0%	121	6.1%	<0.01
知っているけど行ったことはない	80	29.7%	41	6.2%	24	6.6%	34	4.8%	179	9.0%	
知らない	80	29.7%	624	93.8%	334	92.0%	662	94.2%	1700	85.0%	
「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない (U=U) 」を知っていましたか。											
よく知っている	120	44.6%	37	5.6%	18	5.0%	17	2.4%	192	9.6%	<0.01
少し知っている	91	33.8%	107	16.1%	42	11.6%	92	13.1%	332	16.6%	
あまり知らない	33	12.3%	179	26.9%	84	23.1%	190	27.0%	486	24.3%	
全く知らない	25	9.3%	342	51.4%	219	60.3%	404	57.5%	990	49.5%	

表 1-3 検査行動

	商業施設利用				商業施設非利用				合計		Pearson カイ2乗
	センター利用 n=269		センター非利用 n=665		ネット利用 n=363		ネット非利用 n=703		n=2000		
これまでに、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。											
ある	227	84.4%	277	41.7%	100	27.5%	101	14.4%	705	35.3%	<0.01
ない	42	15.6%	388	58.3%	263	72.5%	602	85.6%	1295	64.8%	
これまでに受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>											
保健所の即日検査	118	52.0%	113	40.8%	42	42.0%	33	32.7%	306	43.4%	0.01
保健所の夜間検査	76	33.5%	19	6.9%	7	7.0%	8	7.9%	110	15.6%	<0.01
保健所の即日・夜間検査以外	85	37.4%	68	24.5%	18	18.0%	12	11.9%	183	26.0%	<0.01
病院	75	33.0%	69	24.9%	26	26.0%	33	32.7%	203	28.8%	0.16
クリニック・医院・診療所	56	24.7%	45	16.2%	13	13.0%	21	20.8%	135	19.1%	0.04
郵送検査キット	31	13.7%	14	5.1%	4	4.0%	4	4.0%	53	7.5%	<0.01
その他	3	1.3%	5	1.8%	2	2.0%	3	3.0%	13	1.8%	0.79
過去1年間に、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。											
ある	181	67.3%	80	12.0%	39	10.7%	17	2.4%	317	15.9%	<0.01
ない	88	32.7%	585	88.0%	324	89.3%	686	97.6%	1683	84.2%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>											
保健所の即日検査	101	55.8%	34	42.5%	15	38.5%	6	35.3%	156	49.2%	0.05
保健所の夜間検査	76	42.0%	5	6.3%	7	17.9%	1	5.9%	89	28.1%	<0.01
保健所の即日・夜間検査以外	59	32.6%	13	16.3%	4	10.3%	3	17.6%	79	24.9%	<0.01
病院	57	31.5%	23	28.8%	8	20.5%	6	35.3%	94	29.7%	0.54
クリニック・医院・診療所	49	27.1%	13	16.3%	5	12.8%	1	5.9%	68	21.5%	0.03
郵送検査キット	27	14.9%	4	5.0%	3	7.7%	1	5.9%	35	11.0%	0.08
その他	0	0.0%	1	1.3%	1	2.6%	0	0.0%	2	0.6%	0.25
あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。											
定期的に受けていない	118	43.9%	609	91.6%	338	93.1%	687	97.7%	1752	87.6%	<0.01
定期的に受けている	151	56.1%	56	8.4%	25	6.9%	16	2.3%	248	12.4%	
新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。											
減った/利用することができなくなった	91	33.8%	106	15.9%	43	11.8%	66	9.4%	306	15.3%	<0.01
変わらない	142	52.8%	548	82.4%	306	84.3%	595	84.6%	1591	79.6%	
増えた	36	13.4%	11	1.7%	14	3.9%	42	6.0%	103	5.2%	
2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。											
HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない	108	40.1%	463	69.6%	280	77.1%	530	75.4%	1381	69.1%	<0.01
HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない	78	29.0%	80	12.0%	26	7.2%	48	6.8%	232	11.6%	
検査を受けようと思ったが、受けることができなかった	33	12.3%	47	7.1%	21	5.8%	38	5.4%	139	7.0%	
この期間に、検査を受けることができた	50	18.6%	75	11.3%	36	9.9%	87	12.4%	248	12.4%	
あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。											
保健所の即日検査	96	35.7%	290	43.6%	151	41.6%	171	24.3%	708	35.4%	<0.01
保健所の夜間検査	43	16.0%	51	7.7%	21	5.8%	26	3.7%	141	7.1%	
保健所の即日・夜間検査以外の検査	39	14.5%	27	4.1%	20	5.5%	18	2.6%	104	5.2%	
病院での検査	35	13.0%	62	9.3%	39	10.7%	78	11.1%	214	10.7%	
クリニック・医院・診療所での検査	27	10.0%	58	8.7%	24	6.6%	58	8.3%	167	8.4%	
郵送検査	14	5.2%	73	11.0%	36	9.9%	69	9.8%	192	9.6%	
南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査	8	3.0%	16	2.4%	7	1.9%	10	1.4%	41	2.1%	
検査を受けたいとは思わない	7	2.6%	88	13.2%	65	17.9%	273	38.8%	433	21.7%	
これまでに、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。											
ある	173	64.3%	54	8.1%	23	6.3%	22	3.1%	272	13.6%	<0.01
ない	96	35.7%	611	91.9%	340	93.7%	681	96.9%	1728	86.4%	
過去1年間に、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。											
ある	151	56.1%	30	4.5%	19	5.2%	13	1.8%	213	10.7%	<0.01
ない	118	43.9%	635	95.5%	344	94.8%	690	98.2%	1787	89.4%	

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 1-4 予防行動

	商業施設利用				商業施設非利用				合計		Pearson カイ2乗
	センター利用		センター非利用		ネット利用		ネット非利用		n=2000		
	n=269	n=665	n=363	n=703							
過去6ヶ月間の行動を振り返って、あなたは自分自身がHIVに感染している可能性があると思いますか。											
全く可能性はなかった	65	24.2%	331	49.8%	191	52.6%	463	65.9%	1050	52.5%	<b>&lt;0.01</b>
あまり可能性はなかった	67	24.9%	114	17.1%	67	18.5%	44	6.3%	292	14.6%	
どちらとも言えない	58	21.6%	145	21.8%	74	20.4%	125	17.8%	402	20.1%	
少し可能性があった	27	10.0%	36	5.4%	15	4.1%	14	2.0%	92	4.6%	
かなり可能性があった	19	7.1%	9	1.4%	6	1.7%	11	1.6%	45	2.3%	
すでにHIVに感染している	33	12.3%	30	4.5%	10	2.8%	46	6.5%	119	6.0%	
これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。											
ある	219	81.4%	462	69.5%	363	100.0%	0	0.0%	1044	52.2%	<b>&lt;0.01</b>
ない	50	18.6%	203	30.5%	0	0.0%	703	100.0%	956	47.8%	
過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。											
ある	188	69.9%	282	42.4%	104	28.7%	45	6.4%	619	31.0%	<b>&lt;0.01</b>
ない	81	30.1%	383	57.6%	259	71.3%	658	93.6%	1381	69.1%	
過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。											
ある	163	60.6%	210	31.6%	61	16.8%	28	4.0%	462	23.1%	<b>&lt;0.01</b>
ない	106	39.4%	455	68.4%	302	83.2%	675	96.0%	1538	76.9%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステイタスを話しましたか。 <sup>3)</sup>											
セックスする前に相手に話していた	98	52.1%	33	11.7%	12	11.5%	2	4.4%	145	23.4%	<b>&lt;0.01</b>
セックスした後相手に話した	44	23.4%	6	2.1%	12	11.5%	3	6.7%	65	10.5%	
話していない	36	19.1%	180	63.8%	47	45.2%	23	51.1%	286	46.2%	
覚えていない	7	3.7%	8	2.8%	3	2.9%	5	11.1%	23	3.7%	
自分自身のHIVステイタスを知らない	3	1.6%	55	19.5%	30	28.8%	12	26.7%	100	16.2%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステイタスを知っていましたか。 <sup>3)</sup>											
ほぼすべての相手がHIV陰性であった	85	45.2%	76	27.0%	29	27.9%	9	20.0%	199	32.1%	<b>&lt;0.01</b>
一部の相手がHIV陽性であった	50	26.6%	4	1.4%	6	5.8%	2	4.4%	62	10.0%	
ほぼすべての相手がHIV陽性であった	12	6.4%	3	1.1%	1	1.0%	1	2.2%	17	2.7%	
相手がHIV陽性か陰性かわからない	41	21.8%	199	70.6%	68	65.4%	33	73.3%	341	55.1%	
過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>											
非常用	103	63.2%	134	63.8%	35	57.4%	11	39.3%	283	61.3%	0.07
常用	60	36.8%	76	36.2%	26	42.6%	17	60.7%	179	38.7%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	148	78.7%	173	61.3%	45	43.3%	25	55.6%	391	63.2%	<b>&lt;0.01</b>
ない	40	21.3%	109	38.7%	59	56.7%	20	44.4%	228	36.8%	
過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>											
非常用	79	53.4%	111	64.2%	25	55.6%	9	36.0%	224	57.3%	<b>0.03</b>
常用	69	46.6%	62	35.8%	20	44.4%	16	64.0%	167	42.7%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定“以外”の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	151	80.3%	157	55.7%	48	46.2%	10	22.2%	366	59.1%	<b>&lt;0.01</b>
ない	37	19.7%	125	44.3%	56	53.8%	35	77.8%	253	40.9%	
過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>											
非常用	83	55.0%	93	59.2%	23	47.9%	5	50.0%	204	55.7%	0.54
常用	68	45.0%	64	40.8%	25	52.1%	5	50.0%	162	44.3%	
過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>											
いずれもなし	61	32.4%	224	79.4%	81	77.9%	39	86.7%	405	65.4%	<b>&lt;0.01</b>
パイアグラのみ	32	17.0%	36	12.8%	15	14.4%	1	2.2%	84	13.6%	
薬物併用	95	50.5%	22	7.8%	8	7.7%	5	11.1%	130	21.0%	

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。



表 2-1 (北海道・東北) 基本属性

	商業施設利用				商業施設非利用				合計 n=213	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=25		センター非利用 n=68		ネット利用 n=40		ネット非利用 n=80				
現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。											
1年未満	4	16.0%	1	1.5%	2	5.0%	6	7.5%	13	6.1%	0.06
1-5年未満	3	12.0%	8	11.8%	5	12.5%	10	12.5%	26	12.2%	
5-10年未満	2	8.0%	8	11.8%	9	22.5%	6	7.5%	25	11.7%	
10-20年未満	3	12.0%	10	14.7%	8	20.0%	5	6.3%	26	12.2%	
20年以上	13	52.0%	41	60.3%	16	40.0%	53	66.3%	123	57.7%	
現在、一人暮らしですか。											
はい(1人暮らし)	9	36.0%	25	36.8%	12	30.0%	29	36.3%	75	35.2%	<0.01
いいえ	10	40.0%	43	63.2%	28	70.0%	48	60.0%	129	60.6%	
定住している家はない	6	24.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%	9	4.2%	
最終学歴											
中学校	3	12.0%	1	1.5%	3	7.5%	5	6.3%	12	5.6%	0.18
高等学校	7	28.0%	16	23.5%	17	42.5%	25	31.3%	65	30.5%	
専門学校/短大/高専	6	24.0%	10	14.7%	6	15.0%	13	16.3%	35	16.4%	
大学/大学院	9	36.0%	41	60.3%	14	35.0%	37	46.3%	101	47.4%	
現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。											
常勤(正規雇用)	9	36.0%	48	70.6%	21	52.5%	53	66.3%	131	61.5%	<0.01
常勤(非正規雇用)	3	12.0%	5	7.4%	7	17.5%	4	5.0%	19	8.9%	
パート/アルバイト/フリーランス	9	36.0%	5	7.4%	7	17.5%	9	11.3%	30	14.1%	
経営者/個人事業主	4	16.0%	2	2.9%	1	2.5%	5	6.3%	12	5.6%	
働いていない	0	0.0%	8	11.8%	4	10.0%	9	11.3%	21	9.9%	
現在結婚していますか。											
結婚している	9	36.0%	25	36.8%	16	40.0%	37	46.3%	87	40.8%	0.22
離別・死別	7	28.0%	6	8.8%	6	15.0%	9	11.3%	28	13.1%	
未婚	9	36.0%	37	54.4%	18	45.0%	34	42.5%	98	46.0%	
これまでに性交渉(セックス)をした相手の性別は次のどれに該当しますか。											
同性のみ	10	40.0%	26	38.2%	15	37.5%	50	62.5%	101	47.4%	0.01
同性と異性の両方	15	60.0%	42	61.8%	25	62.5%	30	37.5%	112	52.6%	
これまでに性交渉(セックス)をした男性の人数は何人ですか。											
1人	6	24.0%	12	17.6%	11	27.5%	44	55.0%	73	34.3%	<0.01
2人	7	28.0%	7	10.3%	8	20.0%	9	11.3%	31	14.6%	
3人以上	12	48.0%	49	72.1%	21	52.5%	27	33.8%	109	51.2%	
これまでに男性と性交渉(セックス)をした回数は何回ですか。											
1回	6	24.0%	9	13.2%	13	32.5%	39	48.8%	67	31.5%	<0.01
2回	9	36.0%	3	4.4%	7	17.5%	10	12.5%	29	13.6%	
3回以上	10	40.0%	56	82.4%	20	50.0%	31	38.8%	117	54.9%	
自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。*											
誰にも話していない	2	25.0%	17	25.0%	2	33.3%	1	25.0%	22	52.4%	0.04
1-2人	4	50.0%	1	4.2%	1	16.7%	1	25.0%	7	16.7%	
3人以上	2	25.0%	6	25.0%	3	50.0%	2	50.0%	13	31.0%	
これまでに相手にお金を払って性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	22	88.0%	30	44.1%	19	47.5%	25	31.3%	96	45.1%	<0.01
ない	3	12.0%	38	55.9%	21	52.5%	55	68.8%	117	54.9%	
これまでに相手からお金をもらって性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	17	68.0%	11	16.2%	8	20.0%	9	11.3%	45	21.1%	<0.01
ない	8	32.0%	57	83.8%	32	80.0%	71	88.8%	168	78.9%	
身近なHIV感染者の有無											
いない・いないと思う	9	36.0%	41	60.3%	28	70.0%	49	61.3%	127	59.6%	<0.01
わからない	4	16.0%	13	19.1%	5	12.5%	23	28.8%	45	21.1%	
いる・いると思う	12	48.0%	14	20.6%	7	17.5%	8	10.0%	41	19.2%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。											
ある	17	68.0%	25	36.8%	13	32.5%	23	28.8%	78	36.6%	<0.01
ない	8	32.0%	43	63.2%	27	67.5%	57	71.3%	135	63.4%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。											
いつも身近に持っていた	13	52.0%	21	30.9%	8	20.0%	11	13.8%	53	24.9%	<0.01
時々は身近に持っていた	8	32.0%	15	22.1%	10	25.0%	18	22.5%	51	23.9%	
まったく身近にはなかった	4	16.0%	32	47.1%	22	55.0%	51	63.8%	109	51.2%	

\*ゲイと回答した人のみ

表 2-2 (北海道・東北) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

	商業施設利用		商業施設非利用		合計		Pearson カイ2乗				
	センター利用 n=25	センター非利用 n=68	ネット利用 n=40	ネット非利用 n=80	n=213						
日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。											
よく知っている	10	40.0%	10	14.7%	3	7.5%	2	2.5%	25	11.7%	<0.01
少し知っている	7	28.0%	24	35.3%	8	20.0%	11	13.8%	50	23.5%	
あまり知らない	8	32.0%	15	22.1%	8	20.0%	20	25.0%	51	23.9%	
全く知らない	0	0.0%	19	27.9%	21	52.5%	47	58.8%	87	40.8%	
これまでに性感染症にかかったことがありますか。											
ある	17	68.0%	15	22.1%	10	25.0%	13	16.3%	55	25.8%	<0.01
ない	8	32.0%	53	77.9%	30	75.0%	67	83.8%	158	74.2%	
生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)											
梅毒	6	24.0%	1	1.5%	1	2.5%	0	0.0%	8	3.8%	<0.01
A型肝炎	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	<0.01
B型肝炎	2	8.0%	0	0.0%	2	5.0%	0	0.0%	4	1.9%	<0.01
HIV感染症	4	16.0%	3	4.4%	0	0.0%	7	8.8%	14	6.6%	<0.01
PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。											
とてもよく知っている	12	48.0%	4	5.9%	1	2.5%	4	5.0%	21	9.9%	<0.01
具体的には知らないが、聞いたことはある	11	44.0%	22	32.4%	12	30.0%	12	15.0%	57	26.8%	
まったく知らなかった	2	8.0%	42	61.8%	27	67.5%	64	80.0%	135	63.4%	
あなたはPrEPをしたいと思えますか。											
服薬したくない	8	32.0%	36	52.9%	25	62.5%	59	73.8%	128	60.1%	<0.01
服薬したい	13	52.0%	29	42.6%	15	37.5%	14	17.5%	71	33.3%	
治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている	4	16.0%	3	4.4%	0	0.0%	7	8.8%	14	6.6%	
あなたはPrEPをしたことがありますか。											
ない	11	44.0%	66	97.1%	36	90.0%	76	95.0%	189	88.7%	<0.01
ある	14	56.0%	2	2.9%	4	10.0%	4	5.0%	24	11.3%	
コミュニティセンター-ZEL(宮城県仙台市)											
これまでに1度は行ったことがある	18	72.0%	0	0.0%	1	2.5%	1	1.3%	20	9.4%	<0.01
知っているけど行ったことはない	5	20.0%	18	26.5%	5	12.5%	7	8.8%	35	16.4%	
知らない	2	8.0%	50	73.5%	34	85.0%	72	90.0%	158	74.2%	
にじいるほっかいどう											
知っている	17	68.0%	7	10.3%	1	2.5%	4	5.0%	29	13.6%	<0.01
知らない	8	32.0%	61	89.7%	39	97.5%	76	95.0%	184	86.4%	
「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。											
よく知っている	13	52.0%	2	2.9%	3	7.5%	6	7.5%	24	11.3%	<0.01
少し知っている	5	20.0%	14	20.6%	6	15.0%	11	13.8%	36	16.9%	
あまり知らない	6	24.0%	22	32.4%	9	22.5%	18	22.5%	55	25.8%	
全く知らない	1	4.0%	30	44.1%	22	55.0%	45	56.3%	98	46.0%	
これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	12	48.0%	5	7.4%	3	7.5%	2	2.5%	22	10.3%	<0.01
ない	13	52.0%	63	92.6%	37	92.5%	78	97.5%	191	89.7%	
過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	11	44.0%	2	2.9%	3	7.5%	0	0.0%	16	7.5%	<0.01
ない	14	56.0%	66	97.1%	37	92.5%	80	100.0%	197	92.5%	
これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	21	84.0%	29	42.6%	8	20.0%	10	12.5%	68	31.9%	<0.01
ない	4	16.0%	39	57.4%	32	80.0%	70	87.5%	145	68.1%	
これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>											
保健所の即日検査	8	38.1%	12	41.4%	6	75.0%	2	20.0%	28	41.2%	0.13
保健所の夜間検査	3	14.3%	3	10.3%	0	0.0%	1	10.0%	7	10.3%	0.73
保健所の即日・夜間検査以外	8	38.1%	2	6.9%	0	0.0%	2	20.0%	12	17.6%	0.02
病院	9	42.9%	10	34.5%	2	25.0%	2	20.0%	23	33.8%	0.59
クリニック・医院・診療所	6	28.6%	3	10.3%	0	0.0%	3	30.0%	12	17.6%	0.14
郵送検査キット	1	4.8%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.9%	0.53
その他	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0.71
過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	14	56.0%	7	10.3%	4	10.0%	2	2.5%	27	12.7%	<0.01
ない	11	44.0%	61	89.7%	36	90.0%	78	97.5%	186	87.3%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>											
保健所の即日検査	8	57.1%	2	28.6%	3	75.0%	0	0.0%	13	48.1%	0.21
保健所の夜間検査	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	0.37
保健所の即日・夜間検査以外	3	21.4%	2	28.6%	0	0.0%	1	50.0%	6	22.2%	0.53
病院	3	21.4%	3	42.9%	1	25.0%	1	50.0%	8	29.6%	0.69
クリニック・医院・診療所	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	0.23
郵送検査キット	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	0.57
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 2-3 (北海道・東北) 予防行動

	商業施設利用		商業施設非利用		ネット利用		ネット非利用		合計		Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=25	センター非利用 n=68	ネット利用 n=40	ネット非利用 n=80	合計 n=213							
あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。												
定期的に受けていない	13	52.0%	60	88.2%	37	92.5%	76	95.0%	186	87.3%	<b>&lt;0.01</b>	
定期的に受けている	12	48.0%	8	11.8%	3	7.5%	4	5.0%	27	12.7%		
新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。												
減った/利用することができなくなった	6	24.0%	8	11.8%	8	20.0%	7	8.8%	29	13.6%	<b>0.04</b>	
変わらない	15	60.0%	59	86.8%	29	72.5%	67	83.8%	170	79.8%		
増えた	4	16.0%	1	1.5%	3	7.5%	6	7.5%	14	6.6%		
2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。												
HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない	5	20.0%	45	66.2%	24	60.0%	56	70.0%	130	61.0%	<b>&lt;0.01</b>	
HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない	11	44.0%	10	14.7%	5	12.5%	7	8.8%	33	15.5%		
検査を受けようと思ったが、受けることができなかった	5	20.0%	4	5.9%	5	12.5%	4	5.0%	18	8.5%		
この期間に、検査を受けることができた	4	16.0%	9	13.2%	6	15.0%	13	16.3%	32	15.0%		
あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。												
保健所の即日検査	6	24.0%	28	41.2%	11	27.5%	16	20.0%	61	28.6%	<b>&lt;0.01</b>	
保健所の夜間検査	2	8.0%	6	8.8%	2	5.0%	4	5.0%	14	6.6%		
保健所の即日・夜間検査以外の検査	4	16.0%	0	0.0%	1	2.5%	5	6.3%	10	4.7%		
病院での検査	5	20.0%	5	7.4%	6	15.0%	10	12.5%	26	12.2%		
クリニック・医院・診療所での検査	4	16.0%	4	5.9%	1	2.5%	2	2.5%	11	5.2%		
郵送検査	2	8.0%	14	20.6%	4	10.0%	9	11.3%	29	13.6%		
南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査	2	8.0%	0	0.0%	2	5.0%	2	2.5%	6	2.8%		
検査を受けたいとは思わない	0	0.0%	11	16.2%	13	32.5%	32	40.0%	56	26.3%		
これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉(セックス)をしたことがありますか。												
ある	18	72.0%	47	69.1%	40	100.0%	0	0.0%	105	49.3%		<b>&lt;0.01</b>
ない	7	28.0%	21	30.9%	0	0.0%	80	100.0%	108	50.7%		
過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。												
ある	13	52.0%	31	45.6%	9	22.5%	5	6.3%	58	27.2%	<b>&lt;0.01</b>	
ない	12	48.0%	37	54.4%	31	77.5%	75	93.8%	155	72.8%		
過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。												
ある	13	52.0%	23	33.8%	7	17.5%	3	3.8%	46	21.6%	<b>&lt;0.01</b>	
ない	12	48.0%	45	66.2%	33	82.5%	77	96.3%	167	78.4%		
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>												
セックスする前に相手に話していた	7	53.8%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	10	17.2%	<b>&lt;0.01</b>	
セックスした後に相手に話した	1	7.7%	0	0.0%	4	44.4%	1	20.0%	6	10.3%		
話していない	5	38.5%	28	90.3%	5	55.6%	4	80.0%	42	72.4%		
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。												
知らない	5	38.5%	21	67.7%	4	44.4%	3	60.0%	33	56.9%	0.28	
知っている	8	61.5%	10	32.3%	5	55.6%	2	40.0%	25	43.1%		
過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>												
非常用	9	69.2%	17	73.9%	4	57.1%	2	66.7%	32	69.6%	0.87	
常用	4	30.8%	6	26.1%	3	42.9%	1	33.3%	14	30.4%		
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>												
ある	12	92.3%	19	61.3%	6	66.7%	3	60.0%	40	69.0%	0.22	
ない	1	7.7%	12	38.7%	3	33.3%	2	40.0%	18	31.0%		
過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>												
非常用	6	50.0%	13	68.4%	3	50.0%	2	66.7%	24	60.0%	0.71	
常用	6	50.0%	6	31.6%	3	50.0%	1	33.3%	16	40.0%		
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>												
ある	12	92.3%	18	58.1%	6	66.7%	1	20.0%	37	63.8%	<b>0.03</b>	
ない	1	7.7%	13	41.9%	3	33.3%	4	80.0%	21	36.2%		
過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>												
非常用	9	75.0%	13	72.2%	4	66.7%	1	100.0%	27	73.0%	0.91	
常用	3	25.0%	5	27.8%	2	33.3%	0	0.0%	10	27.0%		
過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>												
いずれもなし	4	30.8%	25	80.6%	3	33.3%	4	80.0%	36	62.1%	<b>0.01</b>	
ハイアグラのみ	3	23.1%	4	12.9%	3	33.3%	0	0.0%	10	17.2%		
薬物併用	6	46.2%	2	6.5%	3	33.3%	1	20.0%	12	20.7%		

3) 過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4) 過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5) 過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6) 過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 3-1 (関東) 基本属性

	商業施設利用				商業施設非利用				合計 n=713	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=110		センター非利用 n=236		ネット利用 n=132		ネット非利用 n=235				
現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。											
1年未満	10	9.1%	11	4.7%	10	7.6%	5	2.1%	36	5.0%	0.08
1-5年未満	16	14.5%	35	14.8%	24	18.2%	36	15.3%	111	15.6%	
5-10年未満	24	21.8%	33	14.0%	23	17.4%	32	13.6%	112	15.7%	
10-20年未満	19	17.3%	51	21.6%	21	15.9%	59	25.1%	150	21.0%	
20年以上	41	37.3%	106	44.9%	54	40.9%	103	43.8%	304	42.6%	
現在、一人暮らしですか。											
はい(1人暮らし)	65	59.1%	103	43.6%	40	30.3%	59	25.1%	267	37.4%	<0.01
いいえ	45	40.9%	133	56.4%	92	69.7%	172	73.2%	442	62.0%	
定住している家はない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.7%	4	0.6%	
最終学歴											
中学校	2	1.8%	8	3.4%	4	3.0%	9	3.8%	23	3.2%	0.03
高等学校	12	10.9%	55	23.3%	26	19.7%	46	19.6%	139	19.5%	
専門学校/短大/高専	9	8.2%	40	16.9%	17	12.9%	27	11.5%	93	13.0%	
大学/大学院	87	79.1%	133	56.4%	85	64.4%	153	65.1%	458	64.2%	
現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。											
常勤(正規雇用)	80	72.7%	139	58.9%	104	78.8%	179	76.2%	502	70.4%	<0.01
常勤(非正規雇用)	5	4.5%	26	11.0%	8	6.1%	8	3.4%	47	6.6%	
パート/アルバイト/フリーランス	15	13.6%	22	9.3%	11	8.3%	20	8.5%	68	9.5%	
経営者/個人事業主	5	4.5%	27	11.4%	5	3.8%	15	6.4%	52	7.3%	
働いていない	5	4.5%	22	9.3%	4	3.0%	13	5.5%	44	6.2%	
現在結婚していますか。											
結婚している	56	50.9%	65	27.5%	70	53.0%	140	59.6%	331	46.4%	<0.01
離別・死別	4	3.6%	15	6.4%	2	1.5%	11	4.7%	32	4.5%	
未婚	50	45.5%	156	66.1%	60	45.5%	84	35.7%	350	49.1%	
これまでに性交渉(セックス)をした相手の性別は次のどれに該当しますか。											
同性のみ	45	40.9%	105	44.5%	49	37.1%	144	61.3%	343	48.1%	<0.01
同性と異性の両方	65	59.1%	131	55.5%	83	62.9%	91	38.7%	370	51.9%	
これまでに性交渉(セックス)をした男性の人数は何人ですか。											
1人	25	22.7%	30	12.7%	35	26.5%	121	51.5%	211	29.6%	<0.01
2人	21	19.1%	18	7.6%	13	9.8%	28	11.9%	80	11.2%	
3人以上	64	58.2%	188	79.7%	84	63.6%	86	36.6%	422	59.2%	
これまでに男性と性交渉(セックス)をした回数は何回ですか。											
1回	18	16.4%	31	13.1%	36	27.3%	121	51.5%	206	28.9%	<0.01
2回	27	24.5%	10	4.2%	15	11.4%	24	10.2%	76	10.7%	
3回以上	65	59.1%	195	82.6%	81	61.4%	90	38.3%	431	60.4%	
自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。*											
誰にも話していない	8	16.3%	48	47.5%	8	42.1%	7	77.8%	71	39.9%	<0.01
1-2人	20	40.8%	21	20.8%	5	26.3%	2	22.2%	48	27.0%	
3人以上	21	42.9%	32	31.7%	6	31.6%	0	0.0%	59	33.1%	
これまでに相手にお金を払って性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	79	71.8%	110	46.6%	74	56.1%	92	39.1%	355	49.8%	<0.01
ない	31	28.2%	126	53.4%	58	43.9%	143	60.9%	358	50.2%	
これまでに相手からお金をもらって性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	78	70.9%	48	20.3%	25	18.9%	24	10.2%	175	24.5%	<0.01
ない	32	29.1%	188	79.7%	107	81.1%	211	89.8%	538	75.5%	
身近なHIV感染者の有無											
いない・いないと思う	26	23.6%	121	51.3%	75	56.8%	138	58.7%	360	50.5%	<0.01
わからない	8	7.3%	52	22.0%	37	28.0%	81	34.5%	178	25.0%	
いる・いると思う	76	69.1%	63	26.7%	20	15.2%	16	6.8%	175	24.5%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。											
ある	85	77.3%	75	31.8%	45	34.1%	47	20.0%	252	35.3%	<0.01
ない	25	22.7%	161	68.2%	87	65.9%	188	80.0%	461	64.7%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。											
いつも身近に持っていた	74	67.3%	54	22.9%	44	33.3%	37	15.7%	209	29.3%	<0.01
時々は身近に持っていた	25	22.7%	62	26.3%	35	26.5%	47	20.0%	169	23.7%	
まったく身近にはなかった	11	10.0%	120	50.8%	53	40.2%	151	64.3%	335	47.0%	

\*ゲイと回答した人のみ

表 3-2 (関東) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

	商業施設利用				商業施設非利用				合計	Pearson カイ2乗	
	センター利用		センター非利用		ネット利用		ネット非利用				
	n=110		n=236		n=132		n=235		n=713		
日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。											
よく知っている	63	57.3%	45	19.1%	8	6.1%	6	2.6%	122	17.1%	<0.01
少し知っている	34	30.9%	72	30.5%	25	18.9%	32	13.6%	163	22.9%	
あまり知らない	10	9.1%	41	17.4%	29	22.0%	67	28.5%	147	20.6%	
全く知らない	3	2.7%	78	33.1%	70	53.0%	130	55.3%	281	39.4%	
これまでに性感染症にかかったことがありますか。											
ある	67	60.9%	64	27.1%	35	26.5%	34	14.5%	200	28.1%	<0.01
ない	43	39.1%	172	72.9%	97	73.5%	201	85.5%	513	71.9%	
生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)											
梅毒	21	19.1%	12	5.1%	4	3.0%	2	0.9%	39	5.5%	<0.01
A型肝炎	21	19.1%	3	1.3%	1	0.8%	0	0.0%	25	3.5%	<0.01
B型肝炎	15	13.6%	5	2.1%	5	3.8%	1	0.4%	26	3.6%	<0.01
HIV感染症	9	8.2%	10	4.2%	4	3.0%	16	6.8%	39	5.5%	<0.01
PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。											
とてもよく知っている	57	51.8%	9	3.8%	13	9.8%	5	2.1%	84	11.8%	<0.01
具体的には知らないが、聞いたことはある	42	38.2%	78	33.1%	19	14.4%	39	16.6%	178	25.0%	
まったく知らなかった	11	10.0%	149	63.1%	100	75.8%	191	81.3%	451	63.3%	
あなたはPrEPをしたいと思いますか。											
服薬したくない	29	26.4%	127	53.8%	70	53.0%	166	70.6%	392	55.0%	<0.01
服薬したい	72	65.5%	99	41.9%	58	43.9%	53	22.6%	282	39.6%	
治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている	9	8.2%	10	4.2%	4	3.0%	16	6.8%	39	5.5%	
あなたはPrEPをしたことがありますか。											
ない	39	35.5%	230	97.5%	121	91.7%	224	95.3%	614	86.1%	<0.01
ある	71	64.5%	6	2.5%	11	8.3%	11	4.7%	99	13.9%	
コミュニティセンターakta(東京都新宿区)											
これまでに1度は行ったことがある	77	70.0%	0	0.0%	3	2.3%	4	1.7%	84	11.8%	<0.01
知っているけど行ったことはない	25	22.7%	50	21.2%	12	9.1%	19	8.1%	106	14.9%	
知らない	8	7.3%	186	78.8%	117	88.6%	212	90.2%	523	73.4%	
コミュニティセンターSHIP(神奈川県横浜市)											
これまでに1度は行ったことがある	47	42.7%	0	0.0%	2	1.5%	2	0.9%	51	7.2%	<0.01
知っているけど行ったことはない	33	30.0%	25	10.6%	15	11.4%	14	6.0%	87	12.2%	
知らない	30	27.3%	211	89.4%	115	87.1%	219	93.2%	575	80.6%	
「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。											
よく知っている	44	40.0%	8	3.4%	8	6.1%	6	2.6%	66	9.3%	<0.01
少し知っている	37	33.6%	42	17.8%	17	12.9%	34	14.5%	130	18.2%	
あまり知らない	15	13.6%	57	24.2%	25	18.9%	63	26.8%	160	22.4%	
全く知らない	14	12.7%	129	54.7%	82	62.1%	132	56.2%	357	50.1%	
これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	67	60.9%	15	6.4%	8	6.1%	8	3.4%	98	13.7%	<0.01
ない	43	39.1%	221	93.6%	124	93.9%	227	96.6%	615	86.3%	
過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	61	55.5%	8	3.4%	5	3.8%	7	3.0%	81	11.4%	<0.01
ない	49	44.5%	228	96.6%	127	96.2%	228	97.0%	632	88.6%	
これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	92	83.6%	105	44.5%	44	33.3%	46	19.6%	287	40.3%	<0.01
ない	18	16.4%	131	55.5%	88	66.7%	189	80.4%	426	59.7%	
これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>											
保健所の即日検査	52	56.5%	36	34.3%	16	36.4%	15	32.6%	119	41.5%	0.01
保健所の夜間検査	38	41.3%	5	4.8%	3	6.8%	4	8.7%	50	17.4%	<0.01
保健所の即日・夜間検査以外	33	35.9%	34	32.4%	11	25.0%	3	6.5%	81	28.2%	<0.01
病院	31	33.7%	23	21.9%	9	20.5%	16	34.8%	79	27.5%	0.13
クリニック・医院・診療所	21	22.8%	19	18.1%	10	22.7%	12	26.1%	62	21.6%	0.70
郵送検査キット	12	13.0%	2	1.9%	2	4.5%	4	8.7%	20	7.0%	0.02
その他	3	3.3%	3	2.9%	0	0.0%	2	4.3%	8	2.8%	0.63
過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことはありますか。											
ある	76	69.1%	30	12.7%	18	13.6%	10	4.3%	134	18.8%	<0.01
ない	34	30.9%	206	87.3%	114	86.4%	225	95.7%	579	81.2%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>											
保健所の即日検査	41	53.9%	10	33.3%	7	38.9%	4	40.0%	62	46.3%	0.22
保健所の夜間検査	32	42.1%	3	10.0%	2	11.1%	1	10.0%	38	28.4%	<0.01
保健所の即日・夜間検査以外	27	35.5%	8	26.7%	3	16.7%	0	0.0%	38	28.4%	0.07
病院	23	30.3%	7	23.3%	2	11.1%	3	30.0%	35	26.1%	0.40
クリニック・医院・診療所	20	26.3%	5	16.7%	5	27.8%	1	10.0%	31	23.1%	0.51
郵送検査キット	13	17.1%	1	3.3%	2	11.1%	1	10.0%	17	12.7%	0.28
その他	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0.32

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 3-3 (関東) 予防行動

	商業施設利用		商業施設非利用		合計		Pearson カイ2乗				
	センター利用 n=110	センター非利用 n=236	ネット利用 n=132	ネット非利用 n=235	n=713						
あなたは定期的、HIV検査を受けていますか。											
定期的に受けていない	41	37.3%	216	91.5%	122	92.4%	230	97.9%	609	85.4%	<b>&lt;0.01</b>
定期的に受けている	69	62.7%	20	8.5%	10	7.6%	5	2.1%	104	14.6%	
新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。											
減った/利用することができなくなった	41	37.3%	42	17.8%	11	8.3%	27	11.5%	121	17.0%	<b>&lt;0.01</b>
変わらない	54	49.1%	191	80.9%	119	90.2%	198	84.3%	562	78.8%	
増えた	15	13.6%	3	1.3%	2	1.5%	10	4.3%	30	4.2%	
2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。											
HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない	46	41.8%	160	67.8%	102	77.3%	180	76.6%	488	68.4%	<b>&lt;0.01</b>
HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない	28	25.5%	40	16.9%	11	8.3%	14	6.0%	93	13.0%	
検査を受けようと思ったが、受けることができなかった	14	12.7%	11	4.7%	7	5.3%	9	3.8%	41	5.8%	
この期間に、検査を受けることができた	22	20.0%	25	10.6%	12	9.1%	32	13.6%	91	12.8%	
あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。											
保健所の即日検査	41	37.3%	98	41.5%	58	43.9%	44	18.7%	241	33.8%	<b>&lt;0.01</b>
保健所の夜間検査	19	17.3%	12	5.1%	5	3.8%	4	1.7%	40	5.6%	
保健所の即日・夜間検査以外の検査	14	12.7%	13	5.5%	10	7.6%	4	1.7%	41	5.8%	
病院での検査	11	10.0%	20	8.5%	11	8.3%	31	13.2%	73	10.2%	
クリニック・医院・診療所での検査	8	7.3%	23	9.7%	12	9.1%	23	9.8%	66	9.3%	
郵送検査	8	7.3%	24	10.2%	17	12.9%	22	9.4%	71	10.0%	
南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査	5	4.5%	9	3.8%	3	2.3%	4	1.7%	21	2.9%	
検査を受けたいとは思わない	4	3.6%	37	15.7%	16	12.1%	103	43.8%	160	22.4%	
これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	90	81.8%	162	68.6%	132	100.0%	0	0.0%	384	53.9%	
ない	20	18.2%	74	31.4%	0	0.0%	235	100.0%	329	46.1%	
過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。											
ある	82	74.5%	94	39.8%	49	37.1%	12	5.1%	237	33.2%	<b>&lt;0.01</b>
ない	28	25.5%	142	60.2%	83	62.9%	223	94.9%	476	66.8%	
過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。											
ある	69	62.7%	68	28.8%	27	20.5%	6	2.6%	170	23.8%	<b>&lt;0.01</b>
ない	41	37.3%	168	71.2%	105	79.5%	229	97.4%	543	76.2%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>											
セックスする前に相手に話していた	16	19.5%	78	83.0%	41	83.7%	11	91.7%	146	61.6%	<b>&lt;0.01</b>
セックスした後に相手に話した	19	23.2%	2	2.1%	4	8.2%	1	8.3%	26	11.0%	
話していない	47	57.3%	14	14.9%	4	8.2%	0	0.0%	65	27.4%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。											
知らない	20	24.4%	60	63.8%	35	71.4%	11	91.7%	126	53.2%	<b>&lt;0.01</b>
知っている	62	75.6%	34	36.2%	14	28.6%	1	8.3%	111	46.8%	
過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>											
非常用	43	62.3%	41	60.3%	16	59.3%	2	33.3%	102	60.0%	0.58
常用	26	37.7%	27	39.7%	11	40.7%	4	66.7%	68	40.0%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	65	79.3%	58	61.7%	19	38.8%	6	50.0%	148	62.4%	<b>&lt;0.01</b>
ない	17	20.7%	36	38.3%	30	61.2%	6	50.0%	89	37.6%	
過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>											
非常用	35	53.8%	36	62.1%	12	63.2%	2	33.3%	85	57.4%	0.47
常用	30	46.2%	22	37.9%	7	36.8%	4	66.7%	63	42.6%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	65	79.3%	50	53.2%	23	46.9%	1	8.3%	139	58.6%	<b>&lt;0.01</b>
ない	17	20.7%	44	46.8%	26	53.1%	11	91.7%	98	41.4%	
過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>											
非常用	36	55.4%	26	52.0%	11	47.8%	0	0.0%	73	52.5%	0.68
常用	29	44.6%	24	48.0%	12	52.2%	1	100.0%	66	47.5%	
過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>											
いずれもなし	30	36.6%	83	88.3%	40	81.6%	9	75.0%	162	68.4%	<b>&lt;0.01</b>
バイアグラのみ	16	19.5%	5	5.3%	7	14.3%	1	8.3%	29	12.2%	
薬物併用	36	43.9%	6	6.4%	2	4.1%	2	16.7%	46	19.4%	

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 4-1 (東海) 基本属性

	商業施設利用				商業施設非利用				合計 n=240	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=33		センター非利用 n=66		ネット利用 n=48		ネット非利用 n=93				
現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。											
1年未満	3	9.1%	1	1.5%	2	4.2%	0	0.0%	6	2.5%	0.30
1-5年未満	3	9.1%	8	12.1%	8	16.7%	8	8.6%	27	11.3%	
5-10年未満	6	18.2%	10	15.2%	4	8.3%	13	14.0%	33	13.8%	
10-20年未満	7	21.2%	13	19.7%	11	22.9%	18	19.4%	49	20.4%	
20年以上	14	42.4%	34	51.5%	23	47.9%	54	58.1%	125	52.1%	
現在、一人暮らしですか。											
はい(1人暮らし)	17	51.5%	23	34.8%	16	33.3%	16	17.2%	72	30.0%	<0.01
いいえ	14	42.4%	43	65.2%	32	66.7%	75	80.6%	164	68.3%	
定住している家はない	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	4	1.7%	
最終学歴											
中学校	0	0.0%	6	9.1%	0	0.0%	4	4.3%	10	4.2%	0.03
高等学校	4	12.1%	14	21.2%	18	37.5%	15	16.1%	51	21.3%	
専門学校/短大/高専	5	15.2%	9	13.6%	5	10.4%	12	12.9%	31	12.9%	
大学/大学院	24	72.7%	37	56.1%	25	52.1%	62	66.7%	148	61.7%	
現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。											
常勤(正規雇用)	22	66.7%	48	72.7%	31	64.6%	74	79.6%	175	72.9%	0.39
常勤(非正規雇用)	3	9.1%	2	3.0%	2	4.2%	3	3.2%	10	4.2%	
パート/アルバイト/フリーランス	5	15.2%	3	4.5%	4	8.3%	7	7.5%	19	7.9%	
経営者/個人事業主	2	6.1%	7	10.6%	5	10.4%	5	5.4%	19	7.9%	
働いていない	1	3.0%	6	9.1%	6	12.5%	4	4.3%	17	7.1%	
現在結婚していますか。											
結婚している	18	54.5%	25	37.9%	26	54.2%	62	66.7%	131	54.6%	0.02
離別・死別	0	0.0%	2	3.0%	2	4.2%	3	3.2%	7	2.9%	
未婚	15	45.5%	39	59.1%	20	41.7%	28	30.1%	102	42.5%	
これまでに性交渉(セックス)をした相手の性別は次のどれに該当しますか。											
同性のみ	17	51.5%	27	40.9%	21	43.8%	67	72.0%	132	55.0%	<0.01
同性と異性の両方	16	48.5%	39	59.1%	27	56.3%	26	28.0%	108	45.0%	
これまでに性交渉(セックス)をした男性の人数は何人ですか。											
1人	8	24.2%	8	12.1%	17	35.4%	50	53.8%	83	34.6%	<0.01
2人	8	24.2%	2	3.0%	8	16.7%	12	12.9%	30	12.5%	
3人以上	17	51.5%	56	84.8%	23	47.9%	31	33.3%	127	52.9%	
これまでに男性と性交渉(セックス)をした回数は何回ですか。											
1回	7	21.2%	10	15.2%	18	37.5%	50	53.8%	85	35.4%	<0.01
2回	7	21.2%	1	1.5%	7	14.6%	5	5.4%	20	8.3%	
3回以上	19	57.6%	55	83.3%	23	47.9%	38	40.9%	135	56.3%	
自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。*											
誰にも話していない	2	25.0%	16	57.1%	5	71.4%	0	0.0%	23	50.0%	0.01
1-2人	1	12.5%	6	21.4%	0	0.0%	3	100.0%	10	21.7%	
3人以上	5	62.5%	6	21.4%	2	28.6%	0	0.0%	13	28.3%	
これまでに相手にお金を払って性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	24	72.7%	30	45.5%	21	43.8%	33	35.5%	108	45.0%	<0.01
ない	9	27.3%	36	54.5%	27	56.3%	60	64.5%	132	55.0%	
これまでに相手からお金をもらって性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	23	69.7%	16	24.2%	6	12.5%	9	9.7%	54	22.5%	<0.01
ない	10	30.3%	50	75.8%	42	87.5%	84	90.3%	186	77.5%	
身近なHIV感染者の有無											
いない・いないと思う	7	21.2%	33	50.0%	29	60.4%	62	66.7%	131	54.6%	<0.01
わからない	3	9.1%	13	19.7%	18	37.5%	25	26.9%	59	24.6%	
いる・いると思う	23	69.7%	20	30.3%	1	2.1%	6	6.5%	50	20.8%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。											
ある	25	75.8%	23	34.8%	14	29.2%	22	23.7%	84	35.0%	<0.01
ない	8	24.2%	43	65.2%	34	70.8%	71	76.3%	156	65.0%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。											
いつも身近に持っていた	24	72.7%	17	25.8%	13	27.1%	15	16.1%	69	28.8%	<0.01
時々は身近に持っていた	7	21.2%	18	27.3%	12	25.0%	18	19.4%	55	22.9%	
まったく身近にはなかった	2	6.1%	31	47.0%	23	47.9%	60	64.5%	116	48.3%	

\*ゲイと回答した人のみ

表 4-2 (東海) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

	商業施設利用				商業施設非利用				合計	Pearson カイ2乗	
	センター利用		センター非利用		ネット利用		ネット非利用				
	n=33		n=66		n=48		n=93		n=240		
日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。											
よく知っている	17	51.5%	9	13.6%	0	0.0%	2	2.2%	28	11.7%	<0.01
少し知っている	13	39.4%	28	42.4%	7	14.6%	11	11.8%	59	24.6%	
あまり知らない	2	6.1%	18	27.3%	15	31.3%	17	18.3%	52	21.7%	
全く知らない	1	3.0%	11	16.7%	26	54.2%	63	67.7%	101	42.1%	
これまでに性感染症にかかったことがありますか。											
ある	20	60.6%	27	40.9%	6	12.5%	5	5.4%	58	24.2%	<0.01
ない	13	39.4%	39	59.1%	42	87.5%	88	94.6%	182	75.8%	
生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)											
梅毒	3	9.1%	11	16.7%	1	2.1%	0	0.0%	15	6.3%	<0.01
A型肝炎	4	12.1%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.1%	<0.01
B型肝炎	5	15.2%	7	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.0%	<0.01
HIV感染症	1	3.0%	3	4.5%	1	2.1%	2	2.2%	7	2.9%	<0.01
PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。											
とてもよく知っている	17	51.5%	4	6.1%	0	0.0%	1	1.1%	22	9.2%	<0.01
具体的には知らないが、聞いたことはある	13	39.4%	19	28.8%	9	18.8%	12	12.9%	53	22.1%	
まったく知らなかった	3	9.1%	43	65.2%	39	81.3%	80	86.0%	165	68.8%	
あなたはPrEPをしたいと思いますか。											
服薬したくない	10	30.3%	34	51.5%	35	72.9%	77	82.8%	156	65.0%	<0.01
服薬したい	22	66.7%	29	43.9%	12	25.0%	14	15.1%	77	32.1%	
治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている	1	3.0%	3	4.5%	1	2.1%	2	2.2%	7	2.9%	
あなたはPrEPをしたことがありますか。											
ない	11	33.3%	63	95.5%	46	95.8%	90	96.8%	210	87.5%	<0.01
ある	22	66.7%	3	4.5%	2	4.2%	3	3.2%	30	12.5%	
コミュニティセンター(愛知県名古屋)											
これまでに1度は行ったことがある	23	69.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	24	10.0%	<0.01
知っているけど行ったことはない	6	18.2%	13	19.7%	6	12.5%	2	2.2%	27	11.3%	
知らない	4	12.1%	53	80.3%	42	87.5%	90	96.8%	189	78.8%	
「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。											
よく知っている	14	42.4%	4	6.1%	1	2.1%	1	1.1%	20	8.3%	<0.01
少し知っている	10	30.3%	10	15.2%	2	4.2%	7	7.5%	29	12.1%	
あまり知らない	6	18.2%	16	24.2%	14	29.2%	25	26.9%	61	25.4%	
全く知らない	3	9.1%	36	54.5%	31	64.6%	60	64.5%	130	54.2%	
これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	19	57.6%	9	13.6%	2	4.2%	3	3.2%	33	13.8%	<0.01
ない	14	42.4%	57	86.4%	46	95.8%	90	96.8%	207	86.3%	
過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	16	48.5%	3	4.5%	1	2.1%	1	1.1%	21	8.8%	<0.01
ない	17	51.5%	63	95.5%	47	97.9%	92	98.9%	219	91.3%	
これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	26	78.8%	29	43.9%	10	20.8%	11	11.8%	76	31.7%	<0.01
ない	7	21.2%	37	56.1%	38	79.2%	82	88.2%	164	68.3%	
これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>											
保健所の即日検査	17	65.4%	13	44.8%	5	50.0%	3	27.3%	38	50.0%	0.17
保健所の夜間検査	7	26.9%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	9	11.8%	0.03
保健所の即日・夜間検査以外	12	46.2%	7	24.1%	1	10.0%	2	18.2%	22	28.9%	0.09
病院	6	23.1%	8	27.6%	2	20.0%	5	45.5%	21	27.6%	0.51
クリニック・医院・診療所	8	30.8%	3	10.3%	1	10.0%	1	9.1%	13	17.1%	0.16
郵送検査キット	5	19.2%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.9%	0.07
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	0.08
過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	22	66.7%	10	15.2%	3	6.3%	0	0.0%	35	14.6%	<0.01
ない	11	33.3%	56	84.8%	45	93.8%	93	100.0%	205	85.4%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>											
保健所の即日検査	14	63.6%	5	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	20	57.1%	0.53
保健所の夜間検査	12	54.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	34.3%	<0.01
保健所の即日・夜間検査以外	8	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	22.9%	0.05
病院	8	36.4%	5	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	14	40.0%	0.74
クリニック・医院・診療所	7	31.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.0%	0.08
郵送検査キット	3	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.6%	0.38
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.9%	<0.01

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。



表 4-3 (東海) 予防行動

	商業施設利用		商業施設非利用		合計		Pearson カイ2乗				
	センター利用 n=33	センター非利用 n=66	ネット利用 n=48	ネット非利用 n=93	n=240						
あなたは定期的、HIV検査を受けていますか。											
定期的に受けていない	18	54.5%	60	90.9%	46	95.8%	92	98.9%	216	90.0%	<b>&lt;0.01</b>
定期的に受けている	15	45.5%	6	9.1%	2	4.2%	1	1.1%	24	10.0%	
新型コロナ感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナ感染症の感染拡大後どう変わりましたか。											
減った/利用することができなくなった	13	39.4%	15	22.7%	7	14.6%	7	7.5%	42	17.5%	<b>&lt;0.01</b>
変わらない	16	48.5%	49	74.2%	38	79.2%	81	87.1%	184	76.7%	
増えた	4	12.1%	2	3.0%	3	6.3%	5	5.4%	14	5.8%	
2020年2月からの新型コロナ感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。											
HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない	13	39.4%	49	74.2%	36	75.0%	74	79.6%	172	71.7%	<b>&lt;0.01</b>
HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない	11	33.3%	4	6.1%	3	6.3%	4	4.3%	22	9.2%	
検査を受けようと思ったが、受けられなかった	4	12.1%	6	9.1%	3	6.3%	7	7.5%	20	8.3%	
この期間に、検査を受けることができた	5	15.2%	7	10.6%	6	12.5%	8	8.6%	26	10.8%	
あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。											
保健所の即日検査	15	45.5%	30	45.5%	18	37.5%	28	30.1%	91	37.9%	<b>&lt;0.01</b>
保健所の夜間検査	6	18.2%	4	6.1%	0	0.0%	6	6.5%	16	6.7%	
保健所の即日・夜間検査以外の検査	5	15.2%	2	3.0%	2	4.2%	2	2.2%	11	4.6%	
病院での検査	1	3.0%	12	18.2%	6	12.5%	7	7.5%	26	10.8%	
クリニック・医院・診療所での検査	4	12.1%	5	7.6%	6	12.5%	7	7.5%	22	9.2%	
郵送検査	2	6.1%	7	10.6%	7	14.6%	8	8.6%	24	10.0%	
南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査	0	0.0%	1	1.5%	1	2.1%	0	0.0%	2	0.8%	
検査を受けたいとは思わない	0	0.0%	5	7.6%	8	16.7%	35	37.6%	48	20.0%	
これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	29	87.9%	49	74.2%	48	100.0%	0	0.0%	126	52.5%	<b>&lt;0.01</b>
ない	4	12.1%	17	25.8%	0	0.0%	93	100.0%	114	47.5%	
過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。											
ある	24	72.7%	31	47.0%	12	25.0%	2	2.2%	69	28.8%	<b>&lt;0.01</b>
ない	9	27.3%	35	53.0%	36	75.0%	91	97.8%	171	71.3%	
過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。											
ある	21	63.6%	25	37.9%	8	16.7%	0	0.0%	54	22.5%	<b>&lt;0.01</b>
ない	12	36.4%	41	62.1%	40	83.3%	93	100.0%	186	77.5%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>											
セックスする前に相手に話していた	6	25.0%	28	90.3%	11	91.7%	2	100.0%	47	68.1%	<b>&lt;0.01</b>
セックスした後に相手に話した	6	25.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	11.6%	
話していない	12	50.0%	1	3.2%	1	8.3%	0	0.0%	14	20.3%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。 <sup>3)</sup>											
知らない	5	20.8%	27	87.1%	9	75.0%	2	100.0%	43	62.3%	<b>&lt;0.01</b>
知っている	19	79.2%	4	12.9%	3	25.0%	0	0.0%	26	37.7%	
過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>											
非常用	12	57.1%	21	84.0%	3	37.5%	0	0.0%	36	66.7%	<b>0.03</b>
常用	9	42.9%	4	16.0%	5	62.5%	0	0.0%	18	33.3%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	17	70.8%	20	64.5%	6	50.0%	0	0.0%	43	62.3%	0.18
ない	7	29.2%	11	35.5%	6	50.0%	2	100.0%	26	37.7%	
過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>											
非常用	8	47.1%	17	85.0%	2	33.3%	0	0.0%	27	62.8%	<b>0.02</b>
常用	9	52.9%	3	15.0%	4	66.7%	0	0.0%	16	37.2%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	19	79.2%	20	64.5%	7	58.3%	0	0.0%	46	66.7%	0.11
ない	5	20.8%	11	35.5%	5	41.7%	2	100.0%	23	33.3%	
過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>											
非常用	8	42.1%	15	75.0%	2	28.6%	0	0.0%	25	54.3%	<b>0.04</b>
常用	11	57.9%	5	25.0%	5	71.4%	0	0.0%	21	45.7%	
過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>											
いずれもなし	8	33.3%	26	83.9%	12	100.0%	2	100.0%	48	69.6%	<b>&lt;0.01</b>
バイアグラのみ	4	16.7%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	7	10.1%	
薬物併用	12	50.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	14	20.3%	

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 5-1 (近畿) 基本属性

	商業施設利用				商業施設非利用				合計 n=308	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=40		センター非利用 n=104		ネット利用 n=61		ネット非利用 n=103				
現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。											
1年未満	5	12.5%	3	2.9%	6	9.8%	5	4.9%	19	6.2%	0.31
1-5年未満	6	15.0%	15	14.4%	9	14.8%	12	11.7%	42	13.6%	
5-10年未満	8	20.0%	9	8.7%	7	11.5%	9	8.7%	33	10.7%	
10-20年未満	6	15.0%	17	16.3%	11	18.0%	19	18.4%	53	17.2%	
20年以上	15	37.5%	60	57.7%	28	45.9%	58	56.3%	161	52.3%	
現在、一人暮らしですか。											
はい(1人暮らし)	19	47.5%	31	29.8%	17	27.9%	22	21.4%	89	28.9%	<0.01
いいえ	18	45.0%	73	70.2%	43	70.5%	79	76.7%	213	69.2%	
定住している家はない	3	7.5%	0	0.0%	1	1.6%	2	1.9%	6	1.9%	
最終学歴											
中学校	2	5.0%	3	2.9%	4	6.6%	0	0.0%	9	2.9%	0.13
高等学校	8	20.0%	25	24.0%	17	27.9%	31	30.1%	81	26.3%	
専門学校/短大/高専	4	10.0%	18	17.3%	3	4.9%	16	15.5%	41	13.3%	
大学/大学院	26	65.0%	58	55.8%	37	60.7%	56	54.4%	177	57.5%	
現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。											
常勤(正規雇用)	25	62.5%	67	64.4%	42	68.9%	77	74.8%	211	68.5%	0.79
常勤(非正規雇用)	3	7.5%	6	5.8%	6	9.8%	6	5.8%	21	6.8%	
パート/アルバイト/フリーランス	5	12.5%	11	10.6%	3	4.9%	6	5.8%	25	8.1%	
経営者/個人事業主	5	12.5%	9	8.7%	5	8.2%	7	6.8%	26	8.4%	
働いていない	2	5.0%	11	10.6%	5	8.2%	7	6.8%	25	8.1%	
現在結婚していますか。											
結婚している	20	50.0%	42	40.4%	27	44.3%	61	59.2%	150	48.7%	0.17
離別・死別	3	7.5%	6	5.8%	4	6.6%	7	6.8%	20	6.5%	
未婚	17	42.5%	56	53.8%	30	49.2%	35	34.0%	138	44.8%	
これまでに性交渉(セックス)をした相手の性別は次のどれに該当しますか。											
同性のみ	20	50.0%	36	34.6%	29	47.5%	72	69.9%	157	51.0%	<0.01
同性と異性の両方	20	50.0%	68	65.4%	32	52.5%	31	30.1%	151	49.0%	
これまでに性交渉(セックス)をした男性の人数は何人ですか。											
1人	12	30.0%	19	18.3%	12	19.7%	43	41.7%	86	27.9%	<0.01
2人	9	22.5%	9	8.7%	12	19.7%	9	8.7%	39	12.7%	
3人以上	19	47.5%	76	73.1%	37	60.7%	51	49.5%	183	59.4%	
これまでに男性と性交渉(セックス)をした回数は何回ですか。											
1回	7	17.5%	11	10.6%	19	31.1%	54	52.4%	91	29.5%	<0.01
2回	9	22.5%	5	4.8%	9	14.8%	9	8.7%	32	10.4%	
3回以上	24	60.0%	88	84.6%	33	54.1%	40	38.8%	185	60.1%	
自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。*											
誰にも話していない	0	0.0%	21	63.6%	5	71.4%	0	0.0%	26	45.6%	<0.01
1-2人	3	17.6%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.8%	
3人以上	14	82.4%	10	30.3%	2	28.6%	0	0.0%	26	45.6%	
これまでに相手にお金を払って性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	30	75.0%	48	46.2%	36	59.0%	42	40.8%	156	50.6%	<0.01
ない	10	25.0%	56	53.8%	25	41.0%	61	59.2%	152	49.4%	
これまでに相手からお金をもらって性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	25	62.5%	20	19.2%	10	16.4%	10	9.7%	65	21.1%	<0.01
ない	15	37.5%	84	80.8%	51	83.6%	93	90.3%	243	78.9%	
身近なHIV感染者の有無											
いない・いないと思う	6	15.0%	52	50.0%	40	65.6%	62	60.2%	160	51.9%	<0.01
わからない	4	10.0%	26	25.0%	14	23.0%	33	32.0%	77	25.0%	
いる・いると思う	30	75.0%	26	25.0%	7	11.5%	8	7.8%	71	23.1%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。											
ある	29	72.5%	31	29.8%	23	37.7%	26	25.2%	109	35.4%	<0.01
ない	11	27.5%	73	70.2%	38	62.3%	77	74.8%	199	64.6%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。											
いつも身近に持っていた	21	52.5%	27	26.0%	20	32.8%	16	15.5%	84	27.3%	<0.01
時々は身近に持っていた	11	27.5%	27	26.0%	18	29.5%	16	15.5%	72	23.4%	
まったく身近にはなかった	8	20.0%	50	48.1%	23	37.7%	71	68.9%	152	49.4%	

\*ゲイと回答した人のみ

表 5-2 (近畿) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

	商業施設利用				商業施設非利用				合計 n=308	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=40		センター非利用 n=104		ネット利用 n=61		ネット非利用 n=103				
日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。											
よく知っている	13	32.5%	14	13.5%	3	4.9%	0	0.0%	30	9.7%	<0.01
少し知っている	22	55.0%	38	36.5%	14	23.0%	13	12.6%	87	28.2%	
あまり知らない	4	10.0%	25	24.0%	18	29.5%	24	23.3%	71	23.1%	
全く知らない	1	2.5%	27	26.0%	26	42.6%	66	64.1%	120	39.0%	
これまでに性感染症にかかったことがありますか。											
ある	28	70.0%	22	21.2%	10	16.4%	17	16.5%	77	25.0%	<0.01
ない	12	30.0%	82	78.8%	51	83.6%	86	83.5%	231	75.0%	
生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)											
梅毒	9	22.5%	4	3.8%	1	1.6%	0	0.0%	14	4.5%	<0.01
A型肝炎	11	27.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.6%	<0.01
B型肝炎	9	22.5%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.2%	<0.01
HIV感染症	8	20.0%	3	2.9%	3	4.9%	11	10.7%	25	8.1%	<0.01
PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。											
とてもよく知っている	20	50.0%	4	3.8%	1	1.6%	3	2.9%	28	9.1%	<0.01
具体的には知らないが、聞いたことはある	15	37.5%	31	29.8%	15	24.6%	20	19.4%	81	26.3%	
まったく知らなかった	5	12.5%	69	66.3%	45	73.8%	80	77.7%	199	64.6%	
あなたはPrEPをしたいと思いますか。											
服薬したくない	10	25.0%	53	51.0%	33	54.1%	72	69.9%	168	54.5%	<0.01
服薬したい	22	55.0%	48	46.2%	25	41.0%	20	19.4%	115	37.3%	
治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている	8	20.0%	3	2.9%	3	4.9%	11	10.7%	25	8.1%	
あなたはPrEPをしたことがありますか。											
ない	15	37.5%	102	98.1%	60	98.4%	99	96.1%	276	89.6%	<0.01
ある	25	62.5%	2	1.9%	1	1.6%	4	3.9%	32	10.4%	
コミュニティセンターdista(大阪府大阪市)											
これまでに1度は行ったことがある	23	57.5%	0	0.0%	2	3.3%	1	1.0%	26	8.4%	<0.01
知っているけど行ったことはない	13	32.5%	20	19.2%	6	9.8%	7	6.8%	46	14.9%	
知らない	4	10.0%	84	80.8%	53	86.9%	95	92.2%	236	76.6%	
「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。											
よく知っている	17	42.5%	6	5.8%	3	4.9%	1	1.0%	27	8.8%	<0.01
少し知っている	17	42.5%	15	14.4%	8	13.1%	17	16.5%	57	18.5%	
あまり知らない	3	7.5%	30	28.8%	16	26.2%	29	28.2%	78	25.3%	
全く知らない	3	7.5%	53	51.0%	34	55.7%	56	54.4%	146	47.4%	
これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	33	82.5%	8	7.7%	4	6.6%	5	4.9%	50	16.2%	<0.01
ない	7	17.5%	96	92.3%	57	93.4%	98	95.1%	258	83.8%	
過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	31	77.5%	5	4.8%	4	6.6%	2	1.9%	42	13.6%	<0.01
ない	9	22.5%	99	95.2%	57	93.4%	101	98.1%	266	86.4%	
これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	35	87.5%	33	31.7%	16	26.2%	10	9.7%	94	30.5%	<0.01
ない	5	12.5%	71	68.3%	45	73.8%	93	90.3%	214	69.5%	
これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>											
保健所の即日検査	14	40.0%	18	54.5%	6	37.5%	1	10.0%	39	41.5%	0.09
保健所の夜間検査	11	31.4%	2	6.1%	1	6.3%	2	20.0%	16	17.0%	0.03
保健所の即日・夜間検査以外	14	40.0%	7	21.2%	4	25.0%	1	10.0%	26	27.7%	0.17
病院	10	28.6%	10	30.3%	6	37.5%	5	50.0%	31	33.0%	0.60
クリニック・医院・診療所	8	22.9%	4	12.1%	0	0.0%	2	20.0%	14	14.9%	0.17
郵送検査キット	6	17.1%	1	3.0%	1	6.3%	0	0.0%	8	8.5%	0.13
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.1%	0.04
過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	29	72.5%	9	8.7%	7	11.5%	2	1.9%	47	15.3%	<0.01
ない	11	27.5%	95	91.3%	54	88.5%	101	98.1%	261	84.7%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>											
保健所の即日検査	13	44.8%	6	66.7%	2	28.6%	0	0.0%	21	44.7%	0.25
保健所の夜間検査	11	37.9%	1	11.1%	1	14.3%	0	0.0%	13	27.7%	0.25
保健所の即日・夜間検査以外	11	37.9%	0	0.0%	1	14.3%	2	100.0%	14	29.8%	0.02
病院	8	27.6%	2	22.2%	3	42.9%	0	0.0%	13	27.7%	0.64
クリニック・医院・診療所	6	20.7%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	7	14.9%	0.49
郵送検査キット	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0.73
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 5-3 (近畿) 予防行動

	商業施設利用		商業施設非利用		商業施設利用		商業施設非利用		合計 n=308	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=40	センター非利用 n=104	ネット利用 n=61	ネット非利用 n=103	センター利用 n=40	センター非利用 n=104	ネット利用 n=61	ネット非利用 n=103			
あなたは定期的、HIV検査を受けていますか。											
定期的を受けていない	20	50.0%	100	96.2%	57	93.4%	99	96.1%	276	89.6%	<b>&lt;0.01</b>
定期的に受けている	20	50.0%	4	3.8%	4	6.6%	4	3.9%	32	10.4%	
新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。											
減った/利用することができなくなった	12	30.0%	16	15.4%	6	9.8%	4	3.9%	38	12.3%	<b>&lt;0.01</b>
変わらない	25	62.5%	88	84.6%	55	90.2%	88	85.4%	256	83.1%	
増えた	3	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	11	10.7%	14	4.5%	
2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。											
HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない	19	47.5%	76	73.1%	52	85.2%	73	70.9%	220	71.4%	0.01
HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない	10	25.0%	10	9.6%	3	4.9%	9	8.7%	32	10.4%	
検査を受けようと思ったが、受けることができなかった	3	7.5%	5	4.8%	0	0.0%	9	8.7%	17	5.5%	
この期間に、検査を受けることができた	8	20.0%	13	12.5%	6	9.8%	12	11.7%	39	12.7%	
あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。											
保健所の即日検査	11	27.5%	51	49.0%	27	44.3%	22	21.4%	111	36.0%	<b>&lt;0.01</b>
保健所の夜間検査	6	15.0%	8	7.7%	6	9.8%	8	7.8%	28	9.1%	
保健所の即日・夜間検査以外の検査	7	17.5%	3	2.9%	2	3.3%	2	1.9%	14	4.5%	
病院での検査	9	22.5%	8	7.7%	9	14.8%	13	12.6%	39	12.7%	
クリニック・医院・診療所での検査	4	10.0%	5	4.8%	3	4.9%	8	7.8%	20	6.5%	
郵送検査	1	2.5%	7	6.7%	4	6.6%	11	10.7%	23	7.5%	
南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査	1	2.5%	4	3.8%	1	1.6%	3	2.9%	9	2.9%	
検査を受けたいとは思わない	1	2.5%	18	17.3%	9	14.8%	36	35.0%	64	20.8%	
これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	33	82.5%	71	68.3%	61	100.0%	0	0.0%	165	53.6%	
ない	7	17.5%	33	31.7%	0	0.0%	103	100.0%	143	46.4%	
過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。											
ある	32	80.0%	37	35.6%	14	23.0%	8	7.8%	91	29.5%	<b>&lt;0.01</b>
ない	8	20.0%	67	64.4%	47	77.0%	95	92.2%	217	70.5%	
過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。											
ある	25	62.5%	24	23.1%	6	9.8%	7	6.8%	62	20.1%	<b>&lt;0.01</b>
ない	15	37.5%	80	76.9%	55	90.2%	96	93.2%	246	79.9%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>											
セックスする前に相手に話していた	11	34.4%	34	91.9%	10	71.4%	8	100.0%	63	69.2%	<b>&lt;0.01</b>
セックスした後に相手に話した	6	18.8%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	8	8.8%	
話していない	15	46.9%	3	8.1%	2	14.3%	0	0.0%	20	22.0%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。											
知らない	8	25.0%	27	73.0%	9	64.3%	4	50.0%	48	52.7%	<b>&lt;0.01</b>
知っている	24	75.0%	10	27.0%	5	35.7%	4	50.0%	43	47.3%	
過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>											
非常用	16	64.0%	13	54.2%	5	83.3%	0	0.0%	34	54.8%	<b>0.01</b>
常用	9	36.0%	11	45.8%	1	16.7%	7	100.0%	28	45.2%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	22	68.8%	17	45.9%	4	28.6%	7	87.5%	50	54.9%	<b>0.01</b>
ない	10	31.3%	20	54.1%	10	71.4%	1	12.5%	41	45.1%	
過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>											
非常用	13	59.1%	11	64.7%	3	75.0%	0	0.0%	27	54.0%	<b>0.02</b>
常用	9	40.9%	6	35.3%	1	25.0%	7	100.0%	23	46.0%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	24	75.0%	17	45.9%	5	35.7%	3	37.5%	49	53.8%	<b>0.02</b>
ない	8	25.0%	20	54.1%	9	64.3%	5	62.5%	42	46.2%	
過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>											
非常用	13	54.2%	8	47.1%	3	60.0%	0	0.0%	24	49.0%	0.33
常用	11	45.8%	9	52.9%	2	40.0%	3	100.0%	25	51.0%	
過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>											
いずれもなし	10	31.3%	27	73.0%	12	85.7%	8	100.0%	57	62.6%	<b>&lt;0.01</b>
バイアグラのみ	4	12.5%	4	10.8%	1	7.1%	0	0.0%	9	9.9%	
薬物併用	18	56.3%	6	16.2%	1	7.1%	0	0.0%	25	27.5%	

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 6-1 (中国・四国) 基本属性

	商業施設利用				商業施設非利用				合計 n=160	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=15		センター非利用 n=53		ネット利用 n=27		ネット非利用 n=65				
現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。											
1年未満	0	0.0%	3	5.7%	0	0.0%	3	4.6%	6	3.8%	0.09
1-5年未満	2	13.3%	5	9.4%	3	11.1%	5	7.7%	15	9.4%	
5-10年未満	2	13.3%	2	3.8%	7	25.9%	4	6.2%	15	9.4%	
10-20年未満	0	0.0%	12	22.6%	3	11.1%	15	23.1%	30	18.8%	
20年以上	11	73.3%	31	58.5%	14	51.9%	38	58.5%	94	58.8%	
現在、一人暮らしですか。											
はい(1人暮らし)	8	53.3%	20	37.7%	7	25.9%	16	24.6%	51	31.9%	0.11
いいえ	6	40.0%	33	62.3%	20	74.1%	46	70.8%	105	65.6%	
定住している家はない	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.6%	4	2.5%	
最終学歴											
中学校	0	0.0%	1	1.9%	1	3.7%	0	0.0%	2	1.3%	0.25
高等学校	1	6.7%	17	32.1%	8	29.6%	12	18.5%	38	23.8%	
専門学校/短大/高専	4	26.7%	5	9.4%	3	11.1%	7	10.8%	19	11.9%	
大学/大学院	10	66.7%	30	56.6%	15	55.6%	46	70.8%	101	63.1%	
現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。											
常勤(正規雇用)	13	86.7%	37	69.8%	16	59.3%	46	70.8%	112	70.0%	0.13
常勤(非正規雇用)	0	0.0%	3	5.7%	5	18.5%	2	3.1%	10	6.3%	
パート/アルバイト/フリーランス	0	0.0%	1	1.9%	3	11.1%	4	6.2%	8	5.0%	
経営者/個人事業主	2	13.3%	4	7.5%	1	3.7%	6	9.2%	13	8.1%	
働いていない	0	0.0%	8	15.1%	2	7.4%	7	10.8%	17	10.6%	
現在結婚していますか。											
結婚している	7	46.7%	19	35.8%	15	55.6%	44	67.7%	85	53.1%	<b>0.01</b>
離別・死別	3	20.0%	4	7.5%	2	7.4%	3	4.6%	12	7.5%	
未婚	5	33.3%	30	56.6%	10	37.0%	18	27.7%	63	39.4%	
これまでに性交渉(セックス)をした相手の性別は次のどれに該当しますか。											
同性のみ	8	53.3%	24	45.3%	13	48.1%	41	63.1%	86	53.8%	0.25
同性と異性の両方	7	46.7%	29	54.7%	14	51.9%	24	36.9%	74	46.3%	
これまでに性交渉(セックス)をした男性の人数は何人ですか。											
1人	4	26.7%	9	17.0%	10	37.0%	31	47.7%	54	33.8%	<b>&lt;0.01</b>
2人	3	20.0%	4	7.5%	2	7.4%	12	18.5%	21	13.1%	
3人以上	8	53.3%	40	75.5%	15	55.6%	22	33.8%	85	53.1%	
これまでに男性と性交渉(セックス)をした回数は何回ですか。											
1回	4	26.7%	8	15.1%	13	48.1%	33	50.8%	58	36.3%	<b>&lt;0.01</b>
2回	4	26.7%	3	5.7%	1	3.7%	8	12.3%	16	10.0%	
3回以上	7	46.7%	42	79.2%	13	48.1%	24	36.9%	86	53.8%	
自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。*											
誰にも話していない	3	50.0%	14	56.0%	2	66.7%	0	0.0%	19	54.3%	0.63
1-2人	1	16.7%	6	24.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.0%	
3人以上	2	33.3%	5	20.0%	1	33.3%	1	100.0%	9	25.7%	
これまでに相手にお金を払って性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	11	73.3%	22	41.5%	19	70.4%	26	40.0%	78	48.8%	<b>0.01</b>
ない	4	26.7%	31	58.5%	8	29.6%	39	60.0%	82	51.3%	
これまでに相手からお金をもらって性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	10	66.7%	6	11.3%	4	14.8%	4	6.2%	24	15.0%	<b>&lt;0.01</b>
ない	5	33.3%	47	88.7%	23	85.2%	61	93.8%	136	85.0%	
身近なHIV感染者の有無											
いない・いないと思う	6	40.0%	25	47.2%	15	55.6%	48	73.8%	94	58.8%	<b>&lt;0.01</b>
わからない	2	13.3%	11	20.8%	9	33.3%	13	20.0%	35	21.9%	
いる・いると思う	7	46.7%	17	32.1%	3	11.1%	4	6.2%	31	19.4%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。											
ある	10	66.7%	16	30.2%	6	22.2%	11	16.9%	43	26.9%	<b>&lt;0.01</b>
ない	5	33.3%	37	69.8%	21	77.8%	54	83.1%	117	73.1%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。											
いつも身近に持っていた	6	40.0%	17	32.1%	8	29.6%	13	20.0%	44	27.5%	0.12
時々は身近に持っていた	6	40.0%	15	28.3%	7	25.9%	13	20.0%	41	25.6%	
まったく身近にはなかった	3	20.0%	21	39.6%	12	44.4%	39	60.0%	75	46.9%	

\*ゲイと回答した人のみ

表 6-2 (中国・四国) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

	商業施設利用		商業施設非利用		合計		Pearson カイ2乗				
	センター利用 n=15	センター非利用 n=53	ネット利用 n=27	ネット非利用 n=65	n=160						
日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。											
よく知っている	6	40.0%	9	17.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	9.4%	<0.01
少し知っている	6	40.0%	25	47.2%	4	14.8%	8	12.3%	43	26.9%	
あまり知らない	3	20.0%	8	15.1%	8	29.6%	20	30.8%	39	24.4%	
全く知らない	0	0.0%	11	20.8%	15	55.6%	37	56.9%	63	39.4%	
これまでに性感染症にかかったことがありますか。											
ある	5	33.3%	18	34.0%	8	29.6%	9	13.8%	40	25.0%	0.06
ない	10	66.7%	35	66.0%	19	70.4%	56	86.2%	120	75.0%	
生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)											
梅毒	0	0.0%	2	3.8%	1	3.7%	0	0.0%	3	1.9%	0.16
A型肝炎	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	<0.01
B型肝炎	0	0.0%	1	1.9%	1	3.7%	0	0.0%	2	1.3%	0.16
HIV感染症	1	6.7%	4	7.5%	1	3.7%	2	3.1%	8	5.0%	0.25
PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。											
とてもよく知っている	7	46.7%	5	9.4%	1	3.7%	2	3.1%	15	9.4%	<0.01
具体的には知らないが、聞いたことはある	7	46.7%	17	32.1%	4	14.8%	9	13.8%	37	23.1%	
まったく知らなかった	1	6.7%	31	58.5%	22	81.5%	54	83.1%	108	67.5%	
あなたはPrEPをしたいと思えますか。											
服薬したくない	5	33.3%	23	43.4%	16	59.3%	52	80.0%	96	60.0%	<0.01
服薬したい	9	60.0%	26	49.1%	10	37.0%	11	16.9%	56	35.0%	
治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている	1	6.7%	4	7.5%	1	3.7%	2	3.1%	8	5.0%	
あなたはPrEPをしたことがありますか。											
ない	5	33.3%	51	96.2%	26	96.3%	63	96.9%	145	90.6%	<0.01
ある	10	66.7%	2	3.8%	1	3.7%	2	3.1%	15	9.4%	
HaaTえひめ											
知っている	8	53.3%	13	24.5%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.1%	<0.01
知らない	7	46.7%	40	75.5%	27	100.0%	65	100.0%	139	86.9%	
BRIDGEプロジェクト											
知っている	5	33.3%	2	3.8%	1	3.7%	1	1.5%	9	5.6%	<0.01
知らない	10	66.7%	51	96.2%	26	96.3%	64	98.5%	151	94.4%	
「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。											
よく知っている	5	33.3%	6	11.3%	0	0.0%	1	1.5%	12	7.5%	<0.01
少し知っている	6	40.0%	11	20.8%	3	11.1%	7	10.8%	27	16.9%	
あまり知らない	1	6.7%	14	26.4%	10	37.0%	20	30.8%	45	28.1%	
全く知らない	3	20.0%	22	41.5%	14	51.9%	37	56.9%	76	47.5%	
これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	7	46.7%	4	7.5%	2	7.4%	2	3.1%	15	9.4%	<0.01
ない	8	53.3%	49	92.5%	25	92.6%	63	96.9%	145	90.6%	
過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	5	33.3%	4	7.5%	2	7.4%	1	1.5%	12	7.5%	<0.01
ない	10	66.7%	49	92.5%	25	92.6%	64	98.5%	148	92.5%	
これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	13	86.7%	23	43.4%	10	37.0%	9	13.8%	55	34.4%	<0.01
ない	2	13.3%	30	56.6%	17	63.0%	56	86.2%	105	65.6%	
これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>											
保健所の即日検査	5	38.5%	8	34.8%	4	40.0%	6	66.7%	23	41.8%	0.42
保健所の夜間検査	2	15.4%	3	13.0%	1	10.0%	0	0.0%	6	10.9%	0.69
保健所の即日・夜間検査以外	2	15.4%	4	17.4%	1	10.0%	0	0.0%	7	12.7%	0.59
病院	4	30.8%	5	21.7%	3	30.0%	1	11.1%	13	23.6%	0.70
クリニック・医院・診療所	1	7.7%	5	21.7%	1	10.0%	2	22.2%	9	16.4%	0.63
郵送検査キット	1	7.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0.71
その他	0	0.0%	1	4.3%	1	10.0%	0	0.0%	2	3.6%	0.57
過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を?											
ある	9	60.0%	8	15.1%	2	7.4%	1	1.5%	20	12.5%	<0.01
ない	6	40.0%	45	84.9%	25	92.6%	64	98.5%	140	87.5%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>											
保健所の即日検査	5	55.6%	4	50.0%	1	50.0%	1	100.0%	11	55.0%	0.82
保健所の夜間検査	2	22.2%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	3	15.0%	0.27
保健所の即日・夜間検査以外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
病院	3	33.3%	1	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	5	25.0%	0.57
クリニック・医院・診療所	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.0%	0.15
郵送検査キット	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0.73
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 6-3 (中国・四国) 予防行動

	商業施設利用		商業施設非利用		合計		Pearson カイ2乗				
	センター利用 n=15	センター非利用 n=53	ネット利用 n=27	ネット非利用 n=65	n=160						
あなたは定期的、HIV検査を受けていますか。											
定期的に受けていない	8	53.3%	48	90.6%	25	92.6%	63	96.9%	144	90.0%	<b>&lt;0.01</b>
定期的に受けている	7	46.7%	5	9.4%	2	7.4%	2	3.1%	16	10.0%	
新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。											
減った/利用することができなくなった	3	20.0%	8	15.1%	3	11.1%	8	12.3%	22	13.8%	0.45
変わらない	11	73.3%	44	83.0%	20	74.1%	53	81.5%	128	80.0%	
増えた	1	6.7%	1	1.9%	4	14.8%	4	6.2%	10	6.3%	
2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。											
HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない	5	33.3%	33	62.3%	21	77.8%	48	73.8%	107	66.9%	0.06
HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない	5	33.3%	8	15.1%	0	0.0%	6	9.2%	19	11.9%	
検査を受けようと思ったが、受けることができなかった	2	13.3%	5	9.4%	3	11.1%	7	10.8%	17	10.6%	
この期間に、検査を受けることができた	3	20.0%	7	13.2%	3	11.1%	4	6.2%	17	10.6%	
あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。											
保健所の即日検査	7	46.7%	24	45.3%	10	37.0%	22	33.8%	63	39.4%	0.06
保健所の夜間検査	1	6.7%	8	15.1%	4	14.8%	1	1.5%	14	8.8%	
保健所の即日・夜間検査以外の検査	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	2	1.3%	
病院での検査	3	20.0%	4	7.5%	2	7.4%	8	12.3%	17	10.6%	
クリニック・医院・診療所での検査	4	26.7%	6	11.3%	1	3.7%	6	9.2%	17	10.6%	
郵送検査	0	0.0%	6	11.3%	2	7.4%	10	15.4%	18	11.3%	
南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	2	1.3%	
検査を受けたいとは思わない	0	0.0%	3	5.7%	8	29.6%	16	24.6%	27	16.9%	
これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	13	86.7%	38	71.7%	27	100.0%	0	0.0%	78	48.8%	
ない	2	13.3%	15	28.3%	0	0.0%	65	100.0%	82	51.3%	
過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。											
ある	8	53.3%	23	43.4%	4	14.8%	5	7.7%	40	25.0%	<b>&lt;0.01</b>
ない	7	46.7%	30	56.6%	23	85.2%	60	92.3%	120	75.0%	
過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。											
ある	8	53.3%	20	37.7%	3	11.1%	4	6.2%	35	21.9%	<b>&lt;0.01</b>
ない	7	46.7%	33	62.3%	24	88.9%	61	93.8%	125	78.1%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>											
セックスする前に相手に話していた	5	62.5%	17	73.9%	3	75.0%	5	100.0%	30	75.0%	0.11
セックスした後に相手に話した	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.0%	
話していない	1	12.5%	6	26.1%	1	25.0%	0	0.0%	8	20.0%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。 <sup>3)</sup>											
知らない	2	25.0%	16	69.6%	3	75.0%	5	100.0%	26	65.0%	<b>0.03</b>
知っている	6	75.0%	7	30.4%	1	25.0%	0	0.0%	14	35.0%	
過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>											
非常用	6	75.0%	11	55.0%	1	33.3%	3	75.0%	21	60.0%	0.53
常用	2	25.0%	9	45.0%	2	66.7%	1	25.0%	14	40.0%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	6	75.0%	18	78.3%	3	75.0%	3	60.0%	30	75.0%	0.87
ない	2	25.0%	5	21.7%	1	25.0%	2	40.0%	10	25.0%	
過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>											
非常用	4	66.7%	9	50.0%	1	33.3%	2	66.7%	16	53.3%	0.75
常用	2	33.3%	9	50.0%	2	66.7%	1	33.3%	14	46.7%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	7	87.5%	13	56.5%	1	25.0%	3	60.0%	24	60.0%	0.20
ない	1	12.5%	10	43.5%	3	75.0%	2	40.0%	16	40.0%	
過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>											
非常用	5	71.4%	9	69.2%	0	0.0%	3	100.0%	17	70.8%	0.30
常用	2	28.6%	4	30.8%	1	100.0%	0	0.0%	7	29.2%	
過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>											
いずれもなし	3	37.5%	12	52.2%	2	50.0%	5	100.0%	22	55.0%	0.12
バイアグラのみ	2	25.0%	9	39.1%	2	50.0%	0	0.0%	13	32.5%	
薬物併用	3	37.5%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.5%	

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 7-1 (九州) 基本属性

	商業施設利用				商業施設非利用				合計		Pearson カイ2乗
	センター利用		センター非利用		ネット利用		ネット非利用		n=248		
	n=31		n=95		n=41		n=81				
現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。											
1年未満	4	12.9%	4	4.2%	2	4.9%	3	3.7%	13	5.2%	0.29
1-5年未満	4	12.9%	14	14.7%	4	9.8%	7	8.6%	29	11.7%	
5-10年未満	6	19.4%	7	7.4%	5	12.2%	9	11.1%	27	10.9%	
10-20年未満	3	9.7%	12	12.6%	8	19.5%	19	23.5%	42	16.9%	
20年以上	14	45.2%	58	61.1%	22	53.7%	43	53.1%	137	55.2%	
現在、一人暮らしですか。											
はい(1人暮らし)	19	61.3%	42	44.2%	14	34.1%	20	24.7%	95	38.3%	<b>0.01</b>
いいえ	12	38.7%	53	55.8%	26	63.4%	59	72.8%	150	60.5%	
定住している家はない	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	2	2.5%	3	1.2%	
最終学歴											
中学校	2	6.5%	1	1.1%	0	0.0%	1	1.2%	4	1.6%	0.09
高等学校	9	29.0%	21	22.1%	8	19.5%	28	34.6%	66	26.6%	
専門学校/短大/高専	6	19.4%	29	30.5%	9	22.0%	12	14.8%	56	22.6%	
大学/大学院	14	45.2%	44	46.3%	24	58.5%	40	49.4%	122	49.2%	
現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。											
常勤(正規雇用)	25	80.6%	56	58.9%	32	78.0%	48	59.3%	161	64.9%	0.15
常勤(非正規雇用)	0	0.0%	8	8.4%	1	2.4%	5	6.2%	14	5.6%	
パート/アルバイト/フリーランス	4	12.9%	12	12.6%	3	7.3%	9	11.1%	28	11.3%	
経営者/個人事業主	1	3.2%	6	6.3%	2	4.9%	12	14.8%	21	8.5%	
働いていない	1	3.2%	13	13.7%	3	7.3%	7	8.6%	24	9.7%	
現在結婚していますか。											
結婚している	14	45.2%	29	30.5%	19	46.3%	50	61.7%	112	45.2%	<b>&lt;0.01</b>
離別・死別	4	12.9%	9	9.5%	4	9.8%	3	3.7%	20	8.1%	
未婚	13	41.9%	57	60.0%	18	43.9%	28	34.6%	116	46.8%	
これまでに性交渉(セックス)をした相手の性別は次のどれに該当しますか。											
同性のみ	18	58.1%	39	41.1%	18	43.9%	53	65.4%	128	51.6%	<b>0.01</b>
同性と異性の両方	13	41.9%	56	58.9%	23	56.1%	28	34.6%	120	48.4%	
これまでに性交渉(セックス)をした男性の人数は何人ですか。											
1人	9	29.0%	12	12.6%	17	41.5%	47	58.0%	85	34.3%	<b>&lt;0.01</b>
2人	7	22.6%	6	6.3%	8	19.5%	6	7.4%	27	10.9%	
3人以上	15	48.4%	77	81.1%	16	39.0%	28	34.6%	136	54.8%	
これまでに男性と性交渉(セックス)をした回数は何回ですか。											
1回	7	22.6%	11	11.6%	14	34.1%	48	59.3%	80	32.3%	<b>&lt;0.01</b>
2回	9	29.0%	4	4.2%	5	12.2%	5	6.2%	23	9.3%	
3回以上	15	48.4%	80	84.2%	22	53.7%	28	34.6%	145	58.5%	
自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。*											
誰にも話していない	1	5.6%	19	20.0%	3	7.3%	1	1.2%	24	9.7%	<b>&lt;0.01</b>
1-2人	11	35.5%	5	5.3%	2	4.9%	2	2.5%	20	8.1%	
3人以上	6	19.4%	21	22.1%	2	4.9%	1	1.2%	30	12.2%	
これまでに相手にお金を払って性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	21	67.7%	41	43.2%	24	58.5%	20	24.7%	106	42.7%	<b>&lt;0.01</b>
ない	10	32.3%	54	56.8%	17	41.5%	61	75.3%	142	57.3%	
これまでに相手からお金をもらって性交渉(セックス)をしたことがありますか。											
ある	17	54.8%	32	33.7%	4	9.8%	5	6.2%	58	23.4%	<b>&lt;0.01</b>
ない	14	45.2%	63	66.3%	37	90.2%	76	93.8%	190	76.6%	
身近なHIV感染者の有無											
いない・いないと思う	7	22.6%	46	48.4%	24	58.5%	59	72.8%	136	54.8%	<b>&lt;0.01</b>
わからない	1	3.2%	23	24.2%	13	31.7%	18	22.2%	55	22.2%	
いる・いると思う	23	74.2%	26	27.4%	4	9.8%	4	4.9%	57	23.0%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。											
ある	23	74.2%	30	31.6%	13	31.7%	15	18.5%	81	32.7%	<b>&lt;0.01</b>
ない	8	25.8%	65	68.4%	28	68.3%	66	81.5%	167	67.3%	
あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐ使えるようにいつも身近に持っていましたか。											
いつも身近に持っていた	21	67.7%	32	33.7%	9	22.0%	15	18.5%	77	31.0%	<b>&lt;0.01</b>
時々は身近に持っていた	7	22.6%	24	25.3%	12	29.3%	13	16.0%	56	22.6%	
まったく身近にはなかった	3	9.7%	39	41.1%	20	48.8%	53	65.4%	115	46.4%	

\*ゲイと回答した人のみ



表 7-2 (九州) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

	商業施設利用				商業施設非利用				合計 n=248	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=31		センター非利用 n=95		ネット利用 n=41		ネット非利用 n=81				
日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。											
よく知っている	17	54.8%	17	17.9%	0	0.0%	1	1.2%	35	14.1%	<0.01
少し知っている	11	35.5%	35	36.8%	9	22.0%	10	12.3%	65	26.2%	
あまり知らない	3	9.7%	21	22.1%	7	17.1%	17	21.0%	48	19.4%	
全く知らない	0	0.0%	22	23.2%	25	61.0%	53	65.4%	100	40.3%	
これまでに性感染症にかかったことがありますか。											
ある	21	67.7%	34	35.8%	12	29.3%	5	6.2%	72	29.0%	<0.01
ない	10	32.3%	61	64.2%	29	70.7%	76	93.8%	176	71.0%	
生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)											
梅毒	8	25.8%	10	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	18	7.3%	<0.01
A型肝炎	8	25.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	3.2%	<0.01
B型肝炎	7	22.6%	2	2.1%	1	2.4%	0	0.0%	10	4.0%	<0.01
HIV感染症	7	22.6%	6	6.3%	1	2.4%	4	4.9%	18	7.3%	<0.01
PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。											
とてもよく知っている	20	64.5%	7	7.4%	3	7.3%	1	1.2%	31	12.5%	<0.01
具体的には知らないが、聞いたことはある	9	29.0%	30	31.6%	6	14.6%	11	13.6%	56	22.6%	
まったく知らなかった	2	6.5%	58	61.1%	32	78.0%	69	85.2%	161	64.9%	
あなたはPrEPをしたいと思えますか。											
服薬したくない	9	29.0%	41	43.2%	24	58.5%	58	71.6%	132	53.2%	<0.01
服薬したい	15	48.4%	48	50.5%	16	39.0%	19	23.5%	98	39.5%	
治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている	7	22.6%	6	6.3%	1	2.4%	4	4.9%	18	7.3%	
あなたはPrEPをしたことがありますか。											
ない	8	25.8%	94	98.9%	40	97.6%	79	97.5%	221	89.1%	<0.01
ある	23	74.2%	1	1.1%	1	2.4%	2	2.5%	27	10.9%	
コミュニティセンターHaco(福岡県福岡市)											
これまでに1度は行ったことがある	24	77.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	9.7%	<0.01
知っているけど行ったことはない	5	16.1%	28	29.5%	4	9.8%	4	4.9%	41	16.5%	
知らない	2	6.5%	67	70.5%	37	90.2%	77	95.1%	183	73.8%	
コミュニティセンターmabui(沖縄県那覇市)											
これまでに1度は行ったことがある	18	58.1%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	19	7.7%	<0.01
知っているけど行ったことはない	6	19.4%	16	16.8%	4	9.8%	4	4.9%	30	12.1%	
知らない	7	22.6%	79	83.2%	36	87.8%	77	95.1%	199	80.2%	
「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。											
よく知っている	18	58.1%	7	7.4%	2	4.9%	1	1.2%	28	11.3%	<0.01
少し知っている	10	32.3%	11	11.6%	4	9.8%	13	16.0%	38	15.3%	
あまり知らない	2	6.5%	28	29.5%	6	14.6%	18	22.2%	54	21.8%	
全く知らない	1	3.2%	49	51.6%	29	70.7%	49	60.5%	128	51.6%	
これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	24	77.4%	9	9.5%	3	7.3%	1	1.2%	37	14.9%	<0.01
ない	7	22.6%	86	90.5%	38	92.7%	80	98.8%	211	85.1%	
過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。											
ある	18	58.1%	6	6.3%	3	7.3%	1	1.2%	28	11.3%	<0.01
ない	13	41.9%	89	93.7%	38	92.7%	80	98.8%	220	88.7%	
これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	28	90.3%	45	47.4%	10	24.4%	10	12.3%	93	37.5%	<0.01
ない	3	9.7%	50	52.6%	31	75.6%	71	87.7%	155	62.5%	
これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>											
保健所の即日検査	13	46.4%	20	44.4%	4	40.0%	5	50.0%	42	45.2%	0.97
保健所の夜間検査	9	32.1%	3	6.7%	1	10.0%	1	10.0%	14	15.1%	0.03
保健所の即日・夜間検査以外	11	39.3%	11	24.4%	1	10.0%	3	30.0%	26	28.0%	0.30
病院	12	42.9%	7	15.6%	4	40.0%	1	10.0%	24	25.8%	0.03
クリニック・医院・診療所	9	32.1%	8	17.8%	1	10.0%	0	0.0%	18	19.4%	0.11
郵送検査キット	4	14.3%	3	6.7%	1	10.0%	0	0.0%	8	8.6%	0.51
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。											
ある	22	71.0%	10	10.5%	4	9.8%	0	0.0%	36	14.5%	<0.01
ない	9	29.0%	85	89.5%	37	90.2%	81	100.0%	212	85.5%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>											
保健所の即日検査	12	54.5%	4	40.0%	1	25.0%	0	0.0%	17	47.2%	0.48
保健所の夜間検査	12	54.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	14	38.9%	0.01
保健所の即日・夜間検査以外	6	27.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	22.2%	0.47
病院	9	40.9%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	30.6%	0.18
クリニック・医院・診療所	7	31.8%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	27.8%	0.42
郵送検査キット	4	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	5	13.9%	0.31
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 7-3 (九州) 予防行動


	商業施設利用		商業施設非利用		ネット利用		ネット非利用		合計	Pearson カイ2乗	
	センター利用 n=31	センター非利用 n=95	センター利用 n=41	センター非利用 n=81	センター利用 n=248	センター非利用	センター利用	センター非利用			
あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。											
定期的に受けていない	13	41.9%	85	89.5%	38	92.7%	81	100.0%	217	87.5%	<0.01
定期的に受けている	18	58.1%	10	10.5%	3	7.3%	0	0.0%	31	12.5%	
新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。											
減った/利用することができなくなった	9	29.0%	15	15.8%	7	17.1%	7	8.6%	38	15.3%	<0.01
変わらない	17	54.8%	79	83.2%	32	78.0%	73	90.1%	201	81.0%	
増えた	5	16.1%	1	1.1%	2	4.9%	1	1.2%	9	3.6%	
2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。											
HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない	15	48.4%	71	74.7%	32	78.0%	64	79.0%	182	73.4%	0.05
HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない	6	19.4%	5	5.3%	3	7.3%	6	7.4%	20	8.1%	
検査を受けようと思ったが、受けることができなかった	4	12.9%	10	10.5%	3	7.3%	2	2.5%	19	7.7%	
この期間に、検査を受けることができた	6	19.4%	9	9.5%	3	7.3%	9	11.1%	27	10.9%	
あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。											
保健所の即日検査	10	32.3%	43	45.3%	17	41.5%	26	32.1%	96	38.7%	<0.01
保健所の夜間検査	5	16.1%	6	6.3%	4	9.8%	3	3.7%	18	7.3%	
保健所の即日・夜間検査以外の検査	8	25.8%	7	7.4%	4	9.8%	3	3.7%	22	8.9%	
病院での検査	5	16.1%	7	7.4%	4	9.8%	4	4.9%	20	8.1%	
クリニック・医院・診療所での検査	1	3.2%	12	12.6%	1	2.4%	8	9.9%	22	8.9%	
郵送検査	1	3.2%	10	10.5%	1	2.4%	5	6.2%	17	6.9%	
南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
検査を受けたいとは思わない	1	3.2%	10	10.5%	10	24.4%	32	39.5%	53	21.4%	
これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。											
ある	24	77.4%	68	71.6%	41	100.0%	0	0.0%	133	53.6%	<0.01
ない	7	22.6%	27	28.4%	0	0.0%	81	100.0%	115	46.4%	
過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。											
ある	21	67.7%	49	51.6%	13	31.7%	7	8.6%	90	36.3%	<0.01
ない	10	32.3%	46	48.4%	28	68.3%	74	91.4%	158	63.7%	
過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。											
ある	20	64.5%	39	41.1%	9	22.0%	3	3.7%	71	28.6%	<0.01
ない	11	35.5%	56	58.9%	32	78.0%	78	96.3%	177	71.4%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>											
セックスする前に相手に話していた	2	9.5%	45	91.8%	9	69.2%	5	71.4%	61	67.8%	<0.01
セックスした後に相手に話した	9	42.9%	1	2.0%	1	7.7%	1	14.3%	12	13.3%	
話していない	10	47.6%	3	6.1%	3	23.1%	1	14.3%	17	18.9%	
過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。											
知らない	0	0.0%	37	75.5%	7	53.8%	3	42.9%	47	52.2%	<0.01
知っている	21	100.0%	12	24.5%	6	46.2%	4	57.1%	43	47.8%	
過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>											
非常用	14	70.0%	27	69.2%	5	55.6%	1	33.3%	47	66.2%	0.53
常用	6	30.0%	12	30.8%	4	44.4%	2	66.7%	24	33.8%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	19	90.5%	33	67.3%	6	46.2%	2	28.6%	60	66.7%	0.01
ない	2	9.5%	16	32.7%	7	53.8%	5	71.4%	30	33.3%	
過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>											
非常用	10	52.6%	23	69.7%	3	50.0%	0	0.0%	36	60.0%	0.17
常用	9	47.4%	10	30.3%	3	50.0%	2	100.0%	24	40.0%	
過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>											
ある	19	90.5%	31	63.3%	5	38.5%	1	14.3%	56	62.2%	<0.01
ない	2	9.5%	18	36.7%	8	61.5%	6	85.7%	34	37.8%	
過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>											
非常用	11	57.9%	19	61.3%	3	60.0%	1	100.0%	34	60.7%	0.87
常用	8	42.1%	12	38.7%	2	40.0%	0	0.0%	22	39.3%	
過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>											
いずれもなし	2	9.5%	40	81.6%	11	84.6%	6	85.7%	59	65.6%	<0.01
バイアグラのみ	3	14.3%	6	12.2%	1	7.7%	0	0.0%	10	11.1%	
薬物併用	16	76.2%	3	6.1%	1	7.7%	1	14.3%	21	23.3%	

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。



MSMにおける予防啓発活動の評価手法の確立及びPOCAサイクル構築のための研究

2020年1月、47都道府県と年齢層別によって2段階抽出を行い、A社モニターに登録している成人男性を2,000人で比例配分し、スクリーニング調査と本調査を実施した。20歳～59歳までの成人男性でかつこれまでに男性と性的接触のあると回答した人を対象に有効回答3,367人のデータを分析した結果。

