

HHD	15人中	平均	推奨度
抗生物質外用	15	3.53	A
ステロイド外用	14	4.20	A
テトラサイクリン・マクロライド内服	10	3.14	B
抗真菌剤外用	9	3.07	B
レチノイド内服	9	3.20	B
ビタミンD3外用	8	3.00	B
鎮痛剤内服	8	3.15	B
ステロイド内服	7	2.53	C1
創傷被覆材（抗菌剤含有も含む）	6	3.67	A
ゲンタマイシン外用（リードスルー）	5	2.80	C1
アプレミラスト内服	3	2.79	C1
タクロリムス外用	2	2.79	C1
抗ウイルス剤外用	2	2.60	C1
CO2レーザー	2	2.47	
紫外線治療	1	2.14	
手術（植皮、アブレーション含む）	1	2.60	C1

ボツリヌス毒素注射	0	2.36	
レーザー治療	0	2.29	
マグネシウム内服	0	2.21	
免疫抑制剤内服（CyA・MTX・AZT）	0	2.14	
ナルトレキソン内服	0	2.14	
デュピルマブ注射	0	2.14	
PDT療法	0	2.14	
アフアメラノチド内服	0	2.07	
抗コリン剤内服	0	2.07	
ビタミンD内服	0	2.00	
エタネルセプト注射	0	2.00	
抗コリン剤外用	0	1.93	
神経遮断術	0	1.86	
サリドマイド内服	0	1.79	
電子線	0	1.64	
5-FU外用	0	1.43	

DD	13人中	平均	推奨度
ステロイド外用	10	3.62	A
抗生物質外用	9	3.42	B
サリチル酸ワセリン外用	8	3.23	B
抗真菌剤外用	8	3.00	B
レチノイド内服	8	3.92	A
ビタミンD3外用	7	3.54	A
鎮痛剤内服	6	2.92	C1
テトラサイクリン内服	5	3.17	B
レチノイド外用	3	3.00	B
ジクロフェナクナトリウム外用	3	2.31	
ステロイド内服	2	2.08	
セチリジン	2	2.75	C1
ジクロフェナクナトリウム内服	2	2.42	
創傷被覆材	2	2.85	C1
タクロリムス外用	1	2.67	C1
抗ウイルス剤外用	1	2.50	C1
アプレミラスト内服	1	2.75	C1
ビタミンD内服	1	2.42	
CO2レーザー	1	2.58	C1
レーザー治療	1	2.42	
紫外線治療	1	2.17	

手術（植皮、アブレーション含む）	0	2.33	
マグネシウム内服	0	2.33	
ボツリヌス毒素注射	0	2.25	
PDT療法	0	2.25	
メトロニダゾール外用	0	2.17	
ナルトレキソン内服	0	2.17	
アフアメラノチド内服	0	2.08	
マイクロジノン（ピル）内服	0	2.08	
大量γグロブリン注射	0	2.00	
免疫抑制剤内服	0	1.92	
抗コリン剤内服	0	1.92	
サリドマイド内服	0	1.83	
電子線/放射線	0	1.83	
5-FU外用	0	1.67	

同意度 10回中 内容

5	9回以上	強く同意する
4	7回以上	同意する
3	5回以上	条件付きで同意する
2	4回以下	あまり同意できない
1	1回以下	同意できない

平均同意度 推奨度 内容

3.5以上	A	行うよう強く勧められる
3.0以上	B	行うよう勧められる
2.5以上	C1	行うことを考慮してもよいが、十分な根拠がない
	C2	根拠がないので積極的に勧められない
	D	行わないよう勧められる