分担研究報告書

グレーズーンの植物体に関する研究

ツツジ科スノキ属ギイマの成分研究

分担研究者 大塚 英昭 安田女子大薬学部 教授

研究要旨

ツツジは本邦で広く植栽されている園芸植物である。またブルーベリーの基原植物アメリカスノキはツツジ科スノキ属であり、その果実は生食またはジャム等加工されている。しかしながら本科の植物であるハナヒリノキの全草には神経毒となるグラヤノトキシン類(図1)、アセビにはアセボトキン(=グラヤノトキシンI)などの毒成分が含まれている。観賞用のシャクナゲにも同様の成分が含有されている。ギイマ(ギーマ)は奄美大島、沖縄本島台湾に分布するツツジ科植物である。葉は互生しギイマの実は秋に黒熟し、甘酸っぱくて美味しいとされ果実酒等に用いられる。ギイマ(*Vaccinium wrightii*)はスノキ属であるので一応安全とは思われるが、ツツジ科植物であるので、その成分を検討することとした。

研究協力者名

広島大学 教授 松浪勝義

安田女子大学 教授 稲垣昌宣、助教 川上 晋

A. 研究目的

ギイマ(*Vaccinium wrightii* A. Gray.)はツツジ科スノキ属の植物で奄美大島、沖縄および台湾の亜熱帯地方に分布する低木で、高さ約3mである(図1)[1]。葉は互生し、長さ約2~5cmで楕円形、革質で縁にかすかに鈍い鋸歯がある。総状花序に10個ほどの花をつけ、花冠は鐘状で紅白色を

帯び、長さは約5mmである。液果は紫褐色に熟し、径は約5mmである。液果は甘酸っぱく美味であり果実酒などに加工される。

しかしツツジ科の植物の多くに神経に毒性を示す多環性ジテルペン類の含有が報告されており、本年度の研究ではギイマの葉に同様の成分が含有されるかを精査をす

ることを目的とした。

写真1 ギイマの葉

写真2 ギイマの未熟実

図1 Grayanotoxin I (=Asebotoxin)

B. 研究方法

沖縄県国頭郡で採集したギイマの葉 (9.69 kg) MeOH で抽出し、濃縮残渣を

Chart 1

Chart 2

水に懸濁して、EtOAc で分配して EtOAc 可溶画分と水可溶画分を得た。水画分はさらに 1-BuOH と分配して 1-BuOH 画分を 448 g 得た。1-BuOH 画分を順相、逆相シリカゲルカラムクロマトグラフィー、液滴向流クロマトグラフィー(DCCC)、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で精製して 20 種の化合物を得た(Chart 2)。

C. 研究結果

化合物 **1**~**9** は文献未記載の化合物であった。化合物 **10**~**20** は既知化合物であり、核磁気共鳴スペクトルを中心とする、機器分析によって、quercetin 3-*O*-rutinoside (**10**)、quercetin 3-*O*- α -L-rhamonopyranoside (**11**)、taxifolin 3-*O*- β -D-xylopyranoside (**12**)、kaempferol 3-*O*-rutinoside (**13**)、(3*S*,5*R*,6*R*,7*E*,9*S*)-megastigman-7-ene-3,5,6,9-tetrol 3-*O*- β -D-glucopyranoside (**14**)、macangaside D (**15**)、nigaichigoside F1 (**16**)、(+)-lyoniresin-4'-yl β -glucopyranoside (**17**)、1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-[4(3-hydroxypropyl)-2-hydroxyphenoxy]-1,3-propanediol (**18**)、chlorogenic acid (**19**)、neochlorogenic acid methyl ester (**20**)と構造を決定した。

化合物 **1** は比旋光度 $[\alpha]_D -7.6$ を示す無色粉末として得られた。赤外線吸収スペクトルにおいて二重結合 (1650 cm^{-1}) に由来する吸収が認められ、高分解能質量分析の結果、その分子式は $\text{C}_{26}\text{H}_{50}\text{O}_{10}$ と決定された。NMR スペクトルにおいて4つのメチル基、8つのメチレン基、1つの酸素原子を有するメチレン基、1つの酸素原子を有する二級炭素と1つの酸素原子を有する三級炭素、エキソサイクリックな二重結合と

もに β -D-glucopyranoside に由来するシグナルが観測された。高分解能質量分析から不飽和度は2であり、グルコースとエキソメチレンを除く炭素は直鎖であることが示唆された。これらの官能基の結合性を ^1H - ^1H COSY と HMBC スペクトルで解析し、図2の構造を有すると結論した。

図2 化合物 **2** の構造と 2次元解析の結果

三級水酸基その他の三か所の不斉炭素の絶対配置は決定に至っていない。

化合物 **2** ($[\alpha]_D -13.6$) と **3** ($[\alpha]_D -1.72$) の分子式は高分解能質量分析ではいずれも $\text{C}_{24}\text{H}_{48}\text{O}_{10}$ であり、化合物 **1** より二個減炭している。NMR スペクトルにおいて両化合物は同じ官能基を有し β -D-glucopyranoside に由来するシグナルが認められることとより、残りの炭素は直鎖状であることが示唆された。これらの官能基の結合性を ^1H - ^1H COSY と HMBC スペクトルで解析し、図3の構造を有するとの結論に達した。

図3 化合物 **2** と **3** の構造と、二次元相関図
化合物 **2** と **3** の ^{13}C -NMR スペクトルを比

較すると極めて類似しており、ほぼ同一物質と見做してもよいほどである。しかし、キラル中心を有さない担体のカラムで分離されているので明らかに異なる化合物である。4つの不飽和炭素の絶対配置の異なるジアステレオマーであると思われるが、それらの絶対配置の決定には至っていない。

化合物 **4** ($[\alpha]_D -14.3$) は無色粉末としてえられ、その分子式は $C_{24}H_{44}O_9$ であった。赤外線吸収スペクトルにおいてケトン基に由来する強い吸収 (1709 cm^{-1}) が認められた。NMR スペクトルでは β -glucopyranoside に由来する6本のシグナル以外に5本のメチル基、8本のメチレン基、酸素官能基を有する二級炭素、2本の酸素官能基を有する三級炭素並びにケトン基に由来するシグナルが観測された。分子式の要求する不飽和度から1個の環状構造の存在が示唆された。2次元スペクトルの解析から図4の構造を有すると結論された。

図4 化合物 **4** の構造と、二次元相関図

環構造部の相対配置は位相検波型 NOE スペクトルを解析して決定した (図5)。側鎖部はエカトリアル配置をしており、環上のメチル基もエカトリアル配置であった。よって側鎖結合部のメチルはアキシアル位であった。絶対構造の決定には至らなかった。

図5 化合物 **4** の NOESY 相関図

化合物 **5** ($[\alpha]_D -7.0$) , **6** ($[\alpha]_D -8.0$) の分子式は同じであり ($C_{24}H_{44}O_{10}$)、化合物 **4** より酸素原子を1つ多く有していた。NMR スペクトルを化合物 **4** と比較すると側鎖部は同一であり、環上に水酸基を有している推定された。そこで2次元スペクトルを検討、水酸基の位置を図6に示す様に決定した。両化合物の環状部の ^{13}C -NMR データには有意の差が認められ、三か所が存在する不斉炭素の立体配置が異なると思われる、このことを NOE スペクトルを用いて明らかにした。

図6 化合物 **5** と **6** の構造と ^{13}C -NMR スペクトルデータおよび二次元相関図

化合物 5 では 3 位のアキシャル水素と 7 位の水素に相関が見られることより側鎖はアキシャル位に、化合物 6 では 3 位のアキシャル水素と 18 位のメチル基と相関が見られることより 18 位メチルはアキシャル位であることが明らかになった。3 位の水素と 4 位の水素の結合定数はアキシャル同士としてはやや小さく、それぞれ 6 Hz および 7 Hz であることより 6 員環はやや椅子型から少々歪んだ構造を採っていると思われる (図 7)。

図 7 化合物 5 と 6 の NOE 相関図

化合物 7 ($[\alpha]_D -13.6$) は無色粉末として得られ、高分解能質量分析の要求する分子式は前化合物と同様 $C_{24}H_{44}O_{10}$ で、その不飽和度は 3 であった。 ^{13}C -NMR スペクトルにおいて、8 位から 20 位の炭素は化合物 4~6 と同様な値を示し、18 位メチルを含む 2 位から 7 位の部分が 6 員環構造である 6, 7 と類似していたが 3, 5, 6 位に微妙な差異がみられた。位相検波型 NOE スペクトルを測定し検討した結果、18 位メチルと 4 位の水素の間に相関がみられたことより、2 位から 7 位は 5 員環を形成していると判断され、図 7 の構造であると結論された。同時に同相関により相対配置も図のような結論で間違いないと判断された。化合物 1~7 のグルコースに関しては酸加水分解後、旋光度検出器装備の HPLC で分析した結果、D-体であると決定した。化合物 1~7 まで水酸基の結合した 3 級不整炭素が存在し絶対構造の決定は不可能に近く

く、よってその他の不整炭素も全体構造の決定には至らなく、相対配置までの決定である。

図 7 化合物 7 の構造と二次元相関図

化合物 8 は ($[\alpha]_D -33.2$) 無色粉末として得られ、高分解能質量分析により分子式は $C_{25}H_{34}O_{11}$ と決定された。構成糖は ^{13}C -NMR スペクトル (δ_C 105.4, 74.9, 77.7, 71.2, 66.9) よりキシロースと予想された。酸加水分解後、旋光度検出器装備の HPLC で分析した結果、移動度からキシロース断定し、その絶対構造は D-体である判明した。

図 8 化合物 8 の構造と二次元相関図

^{13}C -NMR スペクトルにおいて 12 本の芳香環に由来するシグナル、二つのメチレン基、二つの 2 級水酸基を有する炭素、二つの 1 級水酸基を有する炭素および 2 つのメ

トキシ基に由来するシグナルが観測された。¹H-NMR スペクトルでは2組の ABX 型に結合した芳香族水素シグナル、2つの水酸基を有するメチン基および2つの一級水酸基を有するメチレンシグナルが観測され、これらのことを勘案すると C₆-C₃ の二量体すなわちネオリグナンであると推定した。¹H-¹H COSY および HMBC スペクトルを解析すると図8の構造を有することが判明した。化合物8を加水分解して得られた8aの7位と8位の結合定数が8Hzであることから、7位、8位の相対配置をエリトロと決定した[2]。さらに円偏光二色性スペクトルより、236 nm に負のコットン効果がみられたことより、7位、8位の絶対配置を7*R*,8*R*と決定した[2]。

化合物9 ([α]_D -19.9) は無色粉末として得られ、高分解能質量分析により分子式はC₂₆H₃₆O₁₂と決定された。構成糖は¹³C-NMR スペクトルよりキシロースと判断された。さらに炭素六個分の対称芳香環のシグナルおよび芳香環に由来する芳香環シグナルが6本観測され、残りの炭素はメチレン基が3本、2級水酸基を有する炭素が1本、一級水酸基を有する炭素が2本観測された。対称置換芳香環にプロピル側鎖が結合していることは2次元スペクトルを解析することで明らかとなり非対称芳香環も1,3,4,5であることが明らかとなり3'メトキシ、4'、5'ジヒドロキシであるとおもわれる。¹³C-NMR スペクトルでは非対称芳香環に由来するシグナル6本の化学シフトそれぞれ異なる値をしめしているが、¹H-NMR スペクトル芳香環シグナルは2個分、一本しか観測されなかった。偶然に2'、6'のシグナルの化学シフトが同じである

と思われる。2つのユニットの結合位置は8位水酸基と-4'位と推察されたが、8位水酸基と-5'位の可能性も否定できなかった。これらいずれかあをを支持するスペクトル的結果は得られなかった。そこで化合物9をジアゾメタンでメチル化を行い化合物9aを得た。非対称の芳香環は対称となり、HMBC スペクトルもそれを支持したので、結合位置は8位水酸基と-4'位と結論された。8位の絶対配置は円偏光二色性スペクトルに於いて、8と同様な波長に負のコットン効果を示すことより8*R*であろうと推察している。

図9 化合物9、9aの構造と9の二次元相関図

ギイマ葉部より得られた化合物20種についてDPPHラジカル除去活性試験を行った。フェノール性水酸基を有する化合物8から12および19、20に概ね強い活性がみられた。このうち新規化合物8、9および9aについて詳細に検討した。Troloxをポジティブコントロールとして用いた。それぞれのIC₅₀はtorolox: 14.4 ± 0.3 μM, 化合物8: 80.2 ± 2.6 μM, 化合物9: 21.3 ± 0.7 μMであった。化合物9ではtroloxとほぼ同等の活性を示したが、ジアゾメタンでメチル化され遊離の芳香性水酸基の消失し

た化合物 **9a** は全く活性を示さなかった。

図1 0化合物 **8**, **9**, **9a** および trolox の濃度依存的活性評価

D. 考察

本研究ではギイマ (*Vaccinium wrightii*) の葉部より直鎖状ジテルペンの配糖体 (**1**) 並びに bisnor 体でジテルペンより炭素2個が失われた化合物が6種 (**2**~**7**) 得られた。これらの化合物の神経に対する生物活性の精査はまだ行ってないが、ギイマの実可食からすると、劇的な活性はないものと思われる。またこれらがゲラニルゲラニルピロリン酸から生合成されていることは明らかである。毒性等生物活性を有するグラヤノトキシン類は図1に示すように多環性の化合物であり、サイクリゼーション酵素、酸化酵素の関与など数工程を経てゲラニルゲラニルピロリン酸より生合成されている。ギイマはゲラニルゲラニルピロリン酸を生合成する酵素は持ち合わせているが、その後の環化等に関与する酵素を有しないか、または何らかの理由で発現していないと考えられる。遺伝子解析を行いこれらの疑問を明らかにすることは、ジテルペンを産生する植物の相互比較の点においても興味深い。

E. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表等

なし

F. 知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし

G. 参考文献

- [1] 初島住彦 琉球植物誌 (追加・訂正) 462頁 沖縄生物教育研究会 1975、那覇、沖縄
- [2] Huo, C.H., Liang, H., Zhao, Y., Wang, B., Zhang, Q.Y.: Neolignan glycosides from *Symplocos caudata*. *Phytochemistry*, **69**, 788-795 (2008).